











W. A. J. 11  
4820718

J. VIII. Sie





Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library















# H A N D B O E K.



— ДЯТЛОВ —



H A N D B O E K  
O V E R D E  
K E N N I S E N G E N E Z I N G  
D E R  
Z I E K T E N  
V A N H E T  
V R O U W E L I J K E G E S L A C H T ;

D O O R  
E. V O N S I E B O L D,  
*Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.*

---

Uit het Hoogduitsch,  
naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave,  
door

G. J. V A N E P E N,  
*Heel- en Vroedmeester te Amsterdam.*

---


VIERDEN DEELS EERSTE STUK.

---



T E A M S T E R D A M , B I J  
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 6.





MANUSCRIPT

OF THE

RECORDS

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE





D E N

WELEDELEN, ZEER ERVAREN

H E E R E

A. VAN DER HOUT,

Practiserenden

HEEL- EN VROEDMEESTER,

STADS-OPERATEUR VAN DEN STEEN,

E N

CHIRURGYN VAN HET ST. PIETERS GASTHUIS,

TE AMSTERDAM;

MITSGADERE

*Lid van het aldaar gevestigde Genootschap ter  
bevordering der Heelkunde; van het Genootschap:*

*Vis Unita fortior, te Hoorn, en van het  
Geneeskundige Genootschap: Ratione et*

*Experientia, te Leuven,*

MIJNEN VOORMALIGEN LEERMEESTER

EN TEGENWOORDIGEN VRIEND,

Z IJ



z ij

## DEZE VERTALING,

als een gering bewijs mijner hoogachting voor  
's mans uitstekende bekwaamheden, en eene  
openbare hulde zijner verdiensten in de be-  
vordering en uitbreiding van al hetgeen  
der Heelkunde in ons Vaderland ten nutte  
kan verstrekken, met innige dank- en  
vriendschapsbetuiging,

opgedragen.

G. J. VAN EPEN.

## V O O R R E D E.

---

*Zoo heb ik dan eindelijk, door het in het licht geven van het vierde deel mijner Ziekten van het vrouwelijke geslacht, hetwelk die der kraamvrouwen bevat, mijne belofte, ofschoon ook laat, vervuld. Door den gunstigen ontvangst der vorige deelen werd er zelfs binnen dien tijd een tweede druk derzelve noodzakelijk, voordat dit deel nog afgewerkt was. In de vroegere voltooiing echter werd ik eensdeels door overkropte beroepsbezigheden, en anderen letterkundigen arbeid verhinderd, anderdeels gevoelde ik te zeer het moeilijke, om een der belangrijkste stukken in de Geneeskunde te behandelen, dat niet alleen op de Verlos- en Heelkunde, maar ook op de geheele Geneeskunde een' gewigtigen invloed heeft; en boven-*



dien heb ik eigenlijk in dit werk een veld  
bearbeid, waaraan, vóór mij, nog slechts weini-  
gen hunne krachten beproefd hebben. Met  
geen geringen schroom heb ik derhalve de pen  
opgevat, en dikwerf zelfs werd de arbeid daar,  
waar men reeds met het drukken was begonnen,  
afgebroken. Omtrent vele ziekten nu loopen  
de begrippen der Geneeskundigen zeker uiteen,  
waarom ik met de denkbeelden van den een'  
of den anderen niet altoos zal overeenkomen;  
ondertusfchen was de ervaring altijd mijne  
leidsvrouw; en naardien ik in de gelegenheid  
verkeerde, om datgene te zien en waar te  
nemen, wat andere Verloskundigen, die zich  
enkel tot het werktuigelijke van de verlossing  
bepalen en de verdere behandeling aan den  
Geneeskundigen overlaten, ontberen moeten, zoo  
heb ik mij altijd verpligt gerekend, de Ver-  
loskunde in haren ganschen omvang en eigen-  
lijke waarde te onderwijzen en te beoefenen,  
en niet, gelijk helaas! te dikwerf geschiedt,  
haar tot een bloot handwerk te vernederen, of  
haar als op zich zelve staande, of als een  
afgescheiden gedeelte van de Genees- of Heel-  
kunde te beschouwen. Verloskundigen, die zich  
al-

alleen tot het handdadige bepalen, onderscheiden zich alleenlijk daardoor van de Vroedvrouwen, dat hun in de uitoefening hunner kunst eenige meerdere vrijheid gegeven is. Verloskundigen, met zulke bekrompene begrippen omtrent hun vak toegerust, versterken dan ook, helaas! onder zulke omstandigheden, maar al te zeer de gegronde vooronderstelling van het publiek, dat de Verloskundige enkel werkman is, doch in zoodanige gevallen, waar men geneeskundige hulp noodig heeft, niet van dienst kan zijn. Aan deze Verloskundigen is de wetenschap inderdaad niet veel verschuldigd; zelfs heeft de bloote uitoefening hunner kunst niet altoos de gewenschte uitkomsten: het wezenlijk doelmatige en nuttige wordt slechts dan bereikt, wanneer beide zusterlijk vereenigd zijn; de ervaring en de wetenschap zijn beide, wat haar wezen betreft, onafscheidelijk van elkander, en vooral moeten zij daar op het naauwste verbonden zijn, waar de gelegenheid zich aanbiedt, om de laatste te bevorderen. Zonder ervaring overschrijdt de wetenschap hare grenzen, bouwt luchtkasteelen in het studeervertrek, welke, getoetst aan de ondervin-



ding, geene proef houden: zij overwint daarom op het papier ligtelijk alle moeijelijkheden, of geeft daartoe ten minste middelen aan de hand, die inderdaad onuitvoerlijk zijn; met een woord, zij is een ijdel ding, wanneer het vruchtbare veld der ondervinding haar niet tot aankweeking verstrekt. Doch ook ervaring zonder wetenschap kan niet wel op zich zelve bestaan, ten minste dan niet, wanneer aan het verhevene doel derzelve, het heil der menschheid namelijk en ijver voor de wetenschap, zal beantwoord worden. Zonder Theorie vervalt zij tot gemeene kwakzalverij; zonder wetenschappelijke kennis tast zij in het duistere rond en stoot overal tegen, gelijk eene vledermuis, die, bij den dag ontrust wordende, beproeft te vliegen; of zij gelijkt dien jongen, Griekschen waaghals, die met wasfen vleugelen tot de zon wilde opvliegen: even als deze, stort zij zeker ter neder, of in zee, of in hare eigene nietigheid, wanneer zij niet met de — hoewel moeijelijk te verkrijgene — vleugelen der wetenschap voorzien is, welke haar door zoo menigen doolhof moeten geleiden, doch haar ook zeker het oogmerk doen bereiken, als elke onberadene hand-

del-

delwijze, die, wel is waar, menigeen tot het einde, maar niet tot het doel heeft gebragt. Intusfchen is de tijd, waarin de Verloskunde, tot het bovengenoemde eenzijdige standpunt beperkt was, grootendeels in Duitschland voorbij. Vele geleerde mannen hebben aan den opbouw derzelve gearbeid, daarin reeds aanmerkelijke vorderingen gemaakt, en getracht haar uit ongewijde handen te redden.

Dat dan ook de verdere pogingen dezer verdienstelijke mannen bekroond, en hunne nasporingen door de wereld erkend en naar waarde geschat mogen worden: en zijn deze slechts met eenen zuiveren en voor de wetenschap bezielenden ijver in het werk gesteld, dan zullen zij ongetwijfeld aan hun heilrijk doel beantwoorden. Wat voor het overige de ziekten der kraamvrouwen, in dit deel behandeld, zelve betreft, deze zijn van zulk een' verscheiden en menigvuldigen aard, dat zij alle door een' enkel persoon onmogelijk konden waargenomen worden: om intusfchen aan het doel eens Handboeks te beantwoorden, en niets over het hoofd te zien, hebben wij bij de bearbeiding van hetzelfde op de belangrijkste waarnemingen van



x  
—  
anderen de aandacht gevestigd, en telkenreize de bronnen opgegeven, waaruit dezelve geput zijn.

Overeenkomstig mijnen wensch heeft de Uitgever voor diegenen, welke de drie vroeger uitgekomene deelen niet bezitten, bij dit deel een' tweeden titel gevoegd, opdat zij vervolgens deze afdeeling als een bijzonder werk zich kunnen aanschaffen.

Mogt dit deel, van hetwelk naar den tweeden druk alreeds eene Italiaansche overzetting, door Dr. P. SAVOLDI, in Italië is aangekondigd, even zoo gunstig, als de vroegere deelen ontvangen worden.

Dr. A. ELIAS VON SIEBOLD.

Berlijn,  
in April 1826.

# B E R I G T

V A N   D E N

V E R T A L E R.



Voor eenigen tijd werd ik door den Uitgever dezes aangezocht, om de vertaling van het onderhavige, vierde of laatste deel van des Schrijvers *Handboek over de Ziekten van het Vrouwelijke Geslacht* op mij te nemen, met welke taak ik mij gereedelijk belastte. Ik heb mij, zoo veel mijne bezigheden zulks toelieten, gespoed, ten einde mijnen landgenooten zulk een belangrijk werk niet lang te onthouden, zoodat ik het genoeg heb, nog dit jaar het eerste stuk van hetzelfde hun aan te bieden, belovende tevens met de twee overige stukken onverwijld voort te gaan.

Aangaande de overzetting zelve heb ik niets anders te berigten, dan dit: dat ik, om der  
dui-



duidelijkheidswille, wel eens van het oorspronkelijke ben afgeweken, doch overigens den Schrijver letterlijk heb gevolgd. Wijders, dat bij dit deel insgelijks een tweede titel gevoegd is, opdat de zulken, welke de vorige niet bezitten, dit als een afzonderlijk *Handboek over de Ziekten der Kraamvrouwen* kunnen gebruiken.

Mogt deze mijn arbeid de goedkeuring van welmeenende kunstgenooten wegdragen, en ik alzoo ook iets tot de bevordering dezer wetenschap in ons Vaderland bijgebragt hebben!

G. J. VAN EPEN.

*Amsterdam,*

December 1826.

# I N H O U D.

Bladz.

INLEIDING. . . . . I.

## E E R S T E A F D E E L I N G.

OVER DE ZIEKTEN DER TEELDEELEN.

### E E R S T E H O O F D S T U K.

OVER DE KWETSINGEN, DE ONTSTEKING EN  
DE ZWELLING DER SCHAAMLIPPEN. . . . .

3.

OORZAKEN EN GEVOLGEN. . . . .

ald.

VOORZEGGING. . . . .

6.

GENEESWIJZE. . . . .

7.

LITTERATUUR. . . . .

13.

### T W E E D E H O O F D S T U K.

OVER DE INSCHEURING DES BILNAADS. . . . .

15.

GEVOLGEN. . . . .

17.

GENEESWIJZE. . . . .

18.

LITTERATUUR. . . . .

26.

D E R



## D E R D E   H O O F D S T U K .

Bladz.

OVER DE ONTSTEKING EN KWETSING DER	
VROUWELIJKE SCHEEDE. . . . .	28.
OORZAKEN EN GEVOLGEN. . . . .	29.
GENEESWIJZE. . . . .	30.
LITTERATUUR. . . . .	36.

## V I E R D E   H O O F D S T U K .

OVER DE BLOEDVLOEIJING UIT DE BAAR-	
MOEDER. . . . .	37.
OORZAKEN. . . . .	41.
GEVOLGEN. . . . .	48.
VOORZEGGING. . . . .	49.
LIJKOPENING. . . . .	59.
GENEESWIJZE. . . . .	60.
LITTERATUUR. . . . .	125.

## V I J F D E   H O O F D S T U K .

OVER DE ONREGELMATIGE AFVLOEIJING DER	
KRAAMZUIVERINGEN. . . . .	128.
TE STERKE EN TE LANG AANHOUDENDE	
KRAAMZUIVERING. . . . .	133.
DIAGNOSIS. . . . .	134.
OORZAKEN. . . . .	135.
VOORZEGGING. . . . .	139.

GE-

GENEESWIJZE. . . . .	141.
VERMINDERDE EN ONDERDRUKTE KRAAMZUI- VERING. . . . .	148.
OORZAKEN. . . . .	149.
VOORZEGGING. . . . .	154.
GENEESWIJZE. . . . .	155.
DE HOEDANIGHEID NA EENE ONREGELMATIGE KRAAMZUIVERING. . . . .	158.
GENEESWIJZE. . . . .	161.
PIJNLIJKE KRAAMZUIVERING. . . . .	164.
LITTERATUUR. . . . .	166.

# ZESDE HOOFDSTUK.

OVER DE NAWEEËN. . . . .	168.
DIAGNOSIS. . . . .	169.
OORZAKEN. . . . .	174.
GEVOLGEN EN UITGANG. . . . .	183.
VOORZEGGING. . . . .	184.
VOORBEHOEDING. . . . .	185.
GENEESWIJZE. . . . .	188.

# ZEVENDE HOOFDSTUK.

OVER DE ONTSTEKING DER BAARMOEDER IN HET KRAAMBED. . . . .	194.
VERDEELING. . . . .	197.
	DIA-



	Bladz.
DIAGNOSIS. . . . .	198.
COMPLICATIËN. . . . .	204.
OORZAKEN. . . . .	205.
GEVOLGEN EN UITGANG. . . . .	212.
VOORZEGGING. . . . .	220.
GENEESWIJZE. . . . .	226.
LITTERATUUR. . . . .	239.

## A C H T S T E   H O O F D S T U K .

OVER DE ROTTING DER BAARMOEDER. . . . .	241.
UITGANGEN EN LIJKOPENINGEN. . . . .	251.
OORZAKEN EN WEZEN DER ZIEKTE. . . . .	255.
VOORZEGGING. . . . .	262.
LITTERATUUR. . . . .	270.

OVER DE

# ZIEKTEN

DER

## KRAAMVROUWEN.

---

### INLEIDING.

#### §. 1.

**H**et kraambed kan alleen onder de §. 77 (1<sup>sten</sup> deels, 1<sup>ste</sup> stuk) opgegevene voorwaarden regelmatig, gelukkig en zonder stoornis der gezondheid afloopen; eene doelmatige zorg voor den leefregel der kraamvrouw, zoo als dezelve §. 173 tot 183 in de praktische Verloskunde (derde druk) wordt opgegeven, is alles, wat de kunst ons gebiedt. Zoodra zich echter afwijkingen van haren gezonden toestand en den gelukkigen gang des kraambeds, en stoornissen in de gezondheid opdoen, welke of in eene onachtzame, of in eene ondoelmatige opvolging van de voorgeschrevenc leefregelen, in voorbeschikt-



heid of nadeelige invloeden gegrond zijn, welke door de voorafgegane zwangerheid en verlossing zelve veroorzaakt zijn geworden, dan moet de kunst niet alleenlijk op den leefregel letten, maar ook geneeskundig werken, ten einde de ziekelijke veranderingen op te heffen, of de ziekten des kraambeds te genezen; dit zal de stof van dit deel uitmaken.



---

## E E R S T E   A F D E E L I N G.

### OVER DE ZIEKTEN DER TEELDEELEN.

---

#### E E R S T E   H O O F D S T U K.

*Over de kwetsingen, de ontsteking en de  
zwellling der schaamlippen.*

##### §. 2.

**B**eleedigingen, ontsteking en zwelling zijn de gewone gebreken, welke men bij kraamvrouwen aan de schaamlippen waargenomen heeft. De beleedigingen (scheiding des geheels) zijn of kneuzingen, of gescheurde, of gesnedene wonden; deze beleedigingen gaan gepaard met ontsteking en zwelling, hoewel deze ook bijzondere oorspronkelijke gebreken, die tevens uit andere oorzaken te verklaren zijn, kunnen uitmaken.

##### *Oorzaken en Gevolgen.*

##### §. 3.

De kneuzing der schaamlippen wordt veroorzaakt of door beklemming, drukking of geweldige uitrek-



king derzelve, ten gevolge van een zeer groot, of in de doorsnede zeer lang teruggchouden hoofd, van zeer enge teeldeelen, van ruwe behandelingen, van instrumenten, inzonderheid bij zware tang-geboorten. De naaste gevolgen van kneuzing zijn zwakte, of verflapping; in den hoogsten graad volkomene vaneenscheiding der gekneusde schaamlippen. De toevallen, welke daardoor veroorzaakt worden, zijn gewoonlijk zwelling ten gevolge van ophooping en stilstand der vochten in de verzwakte vaten, ontsteking, en somwijlen uitstorting der vloeistoffen uit de gebarsten vaten in het nabijliggende celweeffel.

#### §. 4.

De inscheuringen van de schaamlippen zijn of de gevolgen van eenen hoogen graad van kneuzing, schielijk plaats gehad hebbende verlosfingen, of van het gebruik van stompe werktuigen, bij voorbeeld der tang, en nemen dan de groote, dan de kleine schaamlippen in, inzonderheid als deze te lang zijn (*nymphae pendulae*). De insnijdingen of gesnedene wonden kunnen door scherpe instrumenten bij verloskundige kunstbewerkingen, of door pogingen om de schaamte-spleet eenigzins te verwijden, veroorzaakt worden.

#### §. 5.

De ontsteking der schaamlippen openbaart zich dan eens na plaats gehad hebbende kneuzingen, inscheuringen of insnijdingen, dan eens wordt zij veroorzaakt door eene ondoelmatige aanwending van heete dampen tijdens de geboorte, of te heete  
om-

omslagen op de uitwendige teeldeelen, of door het gebruik van zeer scherpe of bijt-middelen. Na de verlossing kan dezelve door koude, die regtstreeks op de uitwendige teeldeelen werkt en door ophooping in de speenaderen, ontstaan; menigmaal is zij van eenen metastatistischen aard bij kraamvrouwen, die in hare zwangerschap aan huidziekten, bij voorbeeld aan schurft, rheumatismus, jicht of opzwellings der *Glandula Parotis* leden. Bovendien mag men zulk eene ontsteking der schaamlippen bij kraamvrouwen niet over het hoofd zien, die aan witten vloed en inzonderheid aan een' venerischen witten vloed lijden; gewoonlijk gaan daarmede gepaard ontvellingen, chankers en verzweringen, meestal op de inwendige zijde der schaamlippen. Soms treft men ook de ontsteking der schaamlippen na de geboorte bij zulke voorwerpen aan, bij welke de vrucht reeds tot verrotting was overgegaan, na vroegtijdige geboorten, als de nageboorte lang terug bleef en slukswijze afgedreven werd, waartoe de scherpe en ichoreuse kraamzuiveringen aanleiding gaven.

#### §. 6.

De zwelling der schaamlippen is of een ontsteking-, zucht- of bloedgezwel. Bij het ontstekingsgezwel zijn de schaamlippen zeer rood, pijnlijk, volkomen droog en heet; meestal is hetzelfde het gevolg van zware en moeilijke geboorten (inzonderheid na het vroegtijdig afloopen des vruchtwaters), ook wel van kneuzingen, zoo als §. 3 is opgegeven. Bij het water- of zuchtgezwel vertoonen zich



de schaamlippen wit en glanzig, zijn bij de aanraking onpijnlijk, latende de druk van den vinger eene deuk na. Dit gezwel grijpt veelal gedurende de zwangerheid reeds plaats, en ontstaat zeer zelden ten tijde van de geboorte of van het kraambad. Bij het bloedgezwel, meestal het gevolg van eene door de kneuzing des hoofds veroorzaakte verscheuring eens bloedvats, zien de schaamlippen blaauw, zijn uitermate gespannen, minder pijnlijk dan bij het ontflekingsgezwel en menigmaal voelt men vochtgolving; dikwijls bepaalt zich dit gezwel slechts tot eene schaamlip en bereikt na de geboorte spoedig eenen hoogen graad, waardoor het zich tevens van het ontflekingsgezwel onderscheidt. Hoe zich de zwelling der eene of der andere Schaamlip ten gevolge eener breuk van andere gezwellen onderscheidt, gaven wij §. 1478 op.

### *Voorzegging.*

#### §. 7.

De kneuzing en daaruit voortkomende zwelling en ontsteking van eenen geringen graad is zonder nadeelige gevolgen, en verdeelt zich dikwijls van zelve, vooral bij anders gezonde kraamvrouwen, als zij de haar voorgeschrevene leefregelen strikt in acht nemen; bij de zoodanige echter, die ziekelijk en zwak zijn, eene moeilijke verlossing en aanmerkelijke bloedstorting gehad hebben, veroorzaken geringe kneuzingen ook dikwerf verettering en versterking. Bij kraamvrouwen, die te voren aan kropklier- of venerische ziekte geleden hebben, ont-

ontstaan fomtijds ook wel, na abscesfen der fchaamlippen, scirrheufe gezwellen, zoo als men ze overigens ook bij eene noodlottige voorbeschiktheid tot gebreken van dien aard bij vrouwen waarneemt, zonder dat deze ziekten te voren hadden plaats gehad. Ontstond het gezwel der fchaamlippen door de verfcheuring van eenigerhande vat, dan wordt het fomwijlen nog verdeeld, tenzij dat hetzelve het gevolg ware eener verfcheuring van een aanmerkelijk vat der fcheede, zoo als wij §. 6 nader reeds aanhaalden. Het zuchtgezwel verdwijnt ook zeer dikwijls van zelf, als het alleen een gevolg van de drukking des hoofds en van de uitzetting der baarmoeder is; de gevaarlijkste dezer gezwellen zijn dezulken, welke tot knoestgezwel der baarmoeder of tot abscesfen in het bekken overgaan.

### *Geneeswijze.*

#### §. 8.

Daar een geringe graad van kneuzing der fchaamlippen alleen of voornamelijk in zwakte der beleedigde vaten, daaruit voortvloeiende ophooping en ftilftand der vloeistoffen, en verminderden zamenhang derzelve gegrond is, bovendien in celachtige deelen voorvalt, zijn nimmer verflappende en weekmakende, maar flechts verfterkende, zamentrekkende middelen, die de verzwakte levenswerkdadigheid der vaten opwekken, in den vorm van ftovingen aangewezzen; een afkookfel van hoppe, of warm bier en wijn, inzonderheid roode wijn, en onder dezen bij voorkeur de *Pontak*, afkookfels van aromatieke,



versterkende kruiden, zoo als van de *Species aromatica Ph. Boruss*, *Serpyllum* en meer andere vinden hier hunne plaats, en veelal zijn enkel uitwendige middelen reeds genoegzaam. Heeft de kraamvrouw echter een volbloedig en prikkelbaar gestel, ging er weinig bloed bij de verlossing verloren, en openbaren er zich verschijnselen eener wondkoorts, dan verbindt men daarmede inwendig de antiphlogistische geneeswijze, en om de plaatselijke ontsteking te verhoeden, of te verminderen en derzelver verdere uitbreiding voor te komen, en door vermindering der bloedmasse de zamentrekking en vernaauwing der onnatuurlijk uitgezette vaten te bevorderen, zal eene algemeene bloedontlasting zeer veel nut verschaffen.

#### §. 9.

Bij eenen hevigen graad van kneuzing en zwelling der schaamlippen vindt men altijd uitgestorte vloeistoffen in het celweeffel, welke verdeeld moeten worden. Dit bewerkt men het best door bloedontlastingen of andere ontlastende middelen, welke de hoeveelheid der vochten verminderen, derzelver toevoer naar afgelegene deelen bevorderen en daardoor de opslorping der uitgestorte vloeistoffen begunstigen. Te dien einde geve men zachte, verkoelende middelzouten in dikwerf herhaalde giften, of purgeermiddelen, als: het *Nitrum*, het *Glauber zout*, *Sal polychrest*, de *bitteraarde* en dergelijken, en late men omslagen op de schaamlippen leggen, welke de werkdadigheid der opslorpende vaten opwekken, de uitgestorte vochten vloeibaar houden en

de

de ontsteking voorkomen. De voornaamste middelen van deze soort zijn: het *Sal ammoniac*, opgelost in het *Aqua GOULARDI* of in gelijke deelen water en azijn; THEDENS wondwater; verdunde *Spiritus Mindereri* en de *Bals. vitae externus* met *Sal ammoniac*, welke in den vorm van laauwe stovingen met de noodige omzigtigheid moeten aangewend worden.

### §. 10.

Is de hoeveelheid van het uitgestorte bloed in de schaamlippen zeer aanmerkelijk, en laat zich dit niet verdeelen, of veroorzaakt het toevallen, welke eene spoedige hulp vereischen, dan moet hetzelfde door eene genoegzaam groote insnijding, welke men met een lancet of Bistouri op de inwendige zijde der schaamlippen maakt, terstond ontlast en vervolgens het gebrek als eene gekneusde wonde behandeld worden. Veroorzaakte de kneuzing der schaamlippen door het barsten van een groot bloedvat het §. 6 opgegevene bloedgezwel, en ontstond daardoor eene aanmerkelijke inwendige bloeding, die bestendig voortduurt, dan verzuime men insgelijks niet eene insnijding te doen en in de wond eene in brandewijn of in het meermalen aanbevolen bloedstelpende poeder gestipte tampon binnen te brengen. Dikwerf blijven er na het gebruik van verdeelende middelen hier en daar enkele brokjes geronnen bloed terug, welke men ook door de insnede verwijdert, en in beide opgenoemde gevallen de genezing volgens de aanwijzingen bij eene gekneusde wonde regelt; intuschen wete men, dat



bij de in het kraambed bijzonder verhoogde werkdadigheid des watervaatstelsels, benevens eene overigens doelmatige behandeling, bij voorbeeld met stovingen van de bloemen der *Arnica*, zelfs na eenen geruimen tusschentijd, nog dergelijke overblijffels van uitgestort bloed opgenomen worden. De bijzonderheden van het geval moeten dan beslissen, of men dat kan afwachten, of dat eene insnijding de voorkeur verdiene.

### §. 11.

Indien de kneuzing der schaamlippen door eene aanmerkelijke ontsteking achtervolgd wordt, dan moet men deze, ten einde de verettering en *Gangraena* voor te komen, op alle mogelijke wijzen trachten op te heffen. Bloedontlastingen en de ontstekingswerende geneeswijze hoofdzakelijk zijn zoo veel te dringender aangewezen, als het gezwel grooter, rooder en pijnlijker, en de ontstekingskoorts heviger is. Met de uitwendige middelen, welke men ter verdeeling aanwendt, neme men eene zekere voorzigtigheid in acht, opdat eene ondoelmatige behandeling den overgang tot verettering of heet vuur niet bevordere. Is het gezwel zeer hard, rood en pijnlijk, dan make men slechts een' korten tijd, en zoo lang tot de hardheid en pijn, als ook de algemeene ontstekingskoorts afnemen, gebruik van een aftreksel der kamillen, van de vlierbloemen, der doile kervel, des bilsenkruids in den vorm van laauwe pappen; dan echter ga men terstond over tot stovingen van eene oplossing des *Sal ammoniacs* in gelijke deelen water en azijn, en be-

flui-

fluite , wanneer de ontsteking geheel heeft nagelaten , de genezing met stovingen van een laauw af-trekfel van aromatieke kruiden , vermengd met eenigen rooden wijn of brandewijn. — Is het tijdstip ter verdeeling der ontsteking voorbij , en den overgang tot absces niet meer te verhoeden , dan trachte men de verettering door weekmakende pappen te bevorderen , en indien de ontlasting des etters niet spoedig mogte volgen of andere toevallen zoude kunnen veroorzaken , dezelve door eene insnijding aan de binnen - onderzijde der schaamlippen te helpen , om alzoo de vorming van fistels en holten te verhinderen. Gaat de ontsteking der schaamlippen tot *Gangraena* over , dan late men dezelve met een afkookfel van den kinabast en kamferbrandewijn stoven , en de verstorvene zweren met terpentijnolie aanstrijken , om de afscheiding der vernietigde en verstorvene gedeelten te bespoedigen. Bovendien trachte men , als de algemeene ontstekingskoorts reeds volkomen heeft opgehouden , de kraamvrouw uitermate krachteloos is en men gevaar te duchten heeft van de opslorping der *Ichor* in de verstorvene zweren , de herstelling derzelve op alle mogelijke wijzen te bevorderen door een voedend en doelmatig diët , en het inwendig gebruik der *Kina*.

#### §. 12.

Is ééne der groote schaamlippen ingescheurd of ingesneden , dan trachte men door zuiverheid , rust en eene zijdelingsche ligging de genezing te bewerken ; de ontsteking behandelt men met omslagen van GOULARDS water , bij aanmerkelijke dwarse wonden



den of scheuren kan de vereeniging door de bloedige hechting noodzakelijk worden. Zoo echter eene der kleine schaamlippen bij eene te spoedige ontwikkeling des hoofds gedeeltelijk mogt zijn afgescheurd, dan is het raadzamer dat gedeelte geheel af te snijden, dan de genezing door eene langzame verettering af te wachten, hetgeen bovendien oneindig meer pijn en moeilijkheden veroorzaakt; de genezing zal dan spoedig volgen, als men slechts eenige dagen de zweer met stovingen van een aftreksel van aromatische kruiden en rooden wijn bedekt.

### §. 13.

Wij merkten §. 7 reeds op, dat er zich, na abscessen der schaamlippen, gaarne knoestachtige gezwellen opdeden, vooral als de kraamvrouw *scrofuleus* was, of aan venerische ziekte geleden had; bespeurt men daarom eene verharding, dan late men, ter verdeeling derzelve, het vlugge kamfersmeersel met de *Ung. neapolitanum* inwrijven of dezelve met eene laauwe pap stoven, welke uit weekmakende kruiden met de *Cicuta* en zeep bereid wordt. — Doet er zich na de verlossing eene rheumatische zwelling op, dan zullen de schaamlippen op ééns meerder opzwellen, de zwelling bij de aanraking onpijnlijk en voornamelijk bij het zitten slechts gespannen en pijnlijk zijn. Tot derzelfver verdeeling prijst men het vlugge kamfersmeersel aan, waarbij men zweetdrijvende middelen toedient en een' dergelijken leefregel voorschrijft.

Bij het zuchtgezwel der schaamlippen, dat somwijlen zelfs den bilnaad inneemt, zijn drooge kruidenkusfentjes van zemelen met gebrand keukenzout, of van specerijachtige kruiden met kamfer van eene goede uitwerking; inwendig diene men water-afdrijvende geneesmiddelen toe. Verdwijnt daarna het gezwel niet geheel en al, dan scarificere men de schaamlippen op derzelver inwendige oppervlakte, late het water uitvloeijen en zette de opgenoemde stovingen daarbij voort. Zoo er versterking bij mogt komen, is eene tijdige opening het raadzaamste; daarenboven scarificere men de randen en verbind de geopende plaats met het extract van den wilgenbast, honig en kamfer, of bestrooije dezelve zoo lang met kinapoeder, tot zich het verstorvene gedeelte heeft afgescheiden. Ingeval de kraamvrouw koortfig en krachteloos is, dan trachte men door een voedzaam en krachtig diëet, en het inwendig gebruik van den *Peruviaanschen* bast, hare gezondheid op alle mogelijke wijzen te herstellen.

#### L I T T E R A T U R.

SCHURIG, *Embryologia*, p. 558. (*Labium partu raptum.*)

KRONAUER, *diss. de tumore genitalium post partum sanguineo*. Basilo 1734.

LÖFFLER, in STARK'S *Archiv*. IV. Bd. S. 255.

LOUIS, *de partium externarum generationi inservientium in mulieribus naturali, vitiosa et morbosa dispositione*. Paris 1754. 4°.



JUSTI, *diss. sistens observationum seriem circa genitalia muliebria. Marburgi 1798.*

PLENK, *Elementa*, p. III.

MACBRIDE, *Med. observat. and inquiries. Vol. V. p. 89.*

BAILLIE, *in Med. and phys. Journ. Vol. II. p. 42.*

LE DRAN, *Consultations etc. p. 413.*

VIGAROUS, *Maladies des femmes. Tom. II. p. 169.*

JÖRG, *Handbuch der Krankheiten des Weibes. Leipzig 1821. 2 Aufl. §. 679.*

CARUS, *Lehrbuch der Gynäkologie. Leipzig 1820. 2<sup>1</sup>. Theil. §. 1545.*

## T W E E D E   H O O F D S T U K .

*Over de inscheuring des Bilnaads.*

## §. 15.

De uitrekking, waaraan het toompje der scheede en de bilnaad inzonderheid bij eerstbarenden onderhevig zijn, heeft zeer dikwijls eene inscheuring en zoo veel te zekerder ten gevolge, als de bilnaad niet met de noodige voorzigtigheid is behandeld geworden. De beleediging of de inscheuring des bilnaads (*Ruptura Perenaei*) kan zeer verschillend zijn en wordt deels door de verhouding tot de breedte van denzelfden, deels door de gevolgen bepaald, welke eene inscheuring veroorzaakt. Het toompje nu scheurt of alleen, of met het begin van het naast daaraan liggende gedeelte des bilnaads, of de inscheuring strekt zich tot op het midden van dezen, of tot aan de sluitspier van den aars, ja zelfs wel door deze spier henen, uit. Heeft de verlostee een' smallen bilnaad ten gevolge van haren natuurlijken vorm, dan is de scheur tot aan den beginnenden dam aanmerkelijker, dan bij zoodanig eene, die een' breeden bilnaad heeft. De inscheuring kan regt of scheef zijn, hetgeen ook in betrekking tot de gevolgen moet onderscheiden worden. Somwijlen valt de scheur tusfchen de schaamspleet



spleet en den endeldarm (\*), zoodat in het vervolg bij de geboorte het kind langs dien weg gaat.

### §. 16.

Vele vrouwen hebben boven andere eene zekere voorbeschiktheid tot inscheuring des bilnaads; eene ten gevolge van den oorspronkelijken vorm te naauwe schaamspleet, een te breed toompje der schaamlippen, eene te sterke helling van het bekken tot den horizont, te naauwe schaambeensboog, buitengewone stramheid des bilnaads en der uitwendige teeldeelen, waarom reeds in jaren gevorderde vrouwen, die voor den eersten keer baren, veel meer aan inscheuring zijn blootgesteld; te groote dorheid der deelen, al te drooge teeldeelen als gevolg van gebrek of het te vroeg afloopen des vruchtwaters, ontsteking der schaamlippen en des bilnaads, een met harde drekstoffen opgevulde endeldarm geven bij voorkeur aanleiding tot inscheuring. Eene te spoedige ontwikkeling des hoofds, zware arbeid op een buitengewoon groot hoofd of bij eene gebrekkige ligging van hetzelfde, het staande baren, of zittende op een' stoel zonder bewegelijke rugleuning, eene ondoelmatige ligging der barende in het vierde tijdperk der geboorte, te

(\*) MECKEL, in MURSHINNA'S *Journal für Chirurgie und Geburtshülfe*. II. B. 4e. St. MENDE, *Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und gerichtlichen Medicin u. s. w.* I. B. mit K. Göttingen 1824. 8°. p. 35. FRANK, *über eine seltene Art von Zerreiſung des Mittelfleisches bei Entwicklung des Kopfes im neuen chiron* a. v. TEXTOR. I. B. 2. St. Sulzbach 1822. p. 257.

te sterke verarbeitung der weeën bij de doorsnijding des hoofds, ondoelmatige, verzuimde ondersteuning of te hevige uitzetting des bilnaads, onvoorzigtig gebruik van de tang en den hefboom, overhaasting, eene te vroegtijdige, te spoedige en ruwe ontwikkeling des hoofds bij eene tanggeboorte, bij de keering of verlossing met de voeten zullen bij de opgenoemde voorbeschiktheid, de inscheuring des bilnaads des te meer begunstigen.

### *Gevolgen.*

#### §. 17.

De *gevolgen* der inscheuring zijn, naar gelang van de grootte, verschillend. Neemt de scheur alleen het toompje der schaamlippen in, dan is het van geene beteekenis; werd echter dit en de bilnaad te gelijk beleedigd, zonder dat de sluitspier van den aars door het inscheuren geleden heeft, dan zijn alle verschijnselen pijnlijker en gewigtiger; de gevolgen kunnen zijn: hevige verbloeding, inzonderheid bij eene dwarse scheur (waarbij de Schrijver dezelve eens in eenen hevigen graad waarnam, daar er een aanzienlijke tak der *A. transversa perinaei* gekwetst werd); aanmerkelijke ontsteking en verettering; hevige pijn bij het zitten en nog heviger bij den stoelgang. Groeit de scheur niet gemakkelijk aaneen, dan wordt de scheede te wijd, en de pis niet behoorlijk buiten de uitwendige teeldeelen gevoerd, maar loopt langs de dijen naar beneden; zoodanige vrouwen hebben veel te lijden van ontvellingen,

IV. D. 1°. ST. B door



door het onwillekeurig afgaan der drekstoffen en door winden van voren, door aanbeijen en uitzakkingen der scheede. Niet altijd echter is de inscheuring van den bilnaad, maar ook dikwijls eene te sterke uitdrijving van den aars bij den stoelgang de oorzaak van de verlamming der sluitspier; dat in zulk een geval de oorzaak niet te zoeken zij in de verscheuring van den bilnaad, blijkt daaruit, dat het gebrek langzamerhand geheel verdwijnt. Kleine inscheuringen van denzelfden hebben het nadeel, om bij volgende verlosfingen tot grootere aanleiding te geven.

### *Geneeswijze.*

#### §. 18.

De aanwijzing ter genezing bij inscheuring van den bilnaad grondt zich op de stilling van den bloedvliet, bedaring der ontsteking en het bevorderen der genezing.

#### §. 19.

De bloedvliet wordt dikwijls reeds, indien er geen belangrijk bloedvat gekwetst is, door eene zijdelingsche ligging opgeheven, waarbij men de dijen over elkander laat leggen; is dit van geene uitwerking, dan neme men eene tampon of spons, welke men in koud water en azijn, in brandewijn, of in het bloedstelpende poeder, uit aluin en arabische gom gemaakt, doopt en tegen den gekwetsten bilnaad aanlegt. Slechts in zeldzame gevallen be-

behoeft men, naar des Schrijvers waarneming, zijne toevlugt te nemen tot de onderbinding van het bloedende vat.

### §. 20.

De ontsteking bij eenen ingescheurden bilnaad kan zeer onderscheiden zijn en hangt niet altijd van de grootte der wonde, maar ook van de kwetsingen en kneuzingen af, welke de uitwendige teeldeelen door eene sterke inspanning ter verarbeitung der weeën, door het dikwerf onderflaan, door ruwe handgrepen en werktuigen, door aanwending van heete dampen geleden hebben; waren de schaamlippen daardoor reeds gezwollen, dan klimt de ontsteking, en de oorzaak hiervan wordt aan de inscheuring toegeschreven. Over het algemeen doen er zich alle verschijnselen eener wondkoorts op, welke, bij prikkelbare gestellen inzonderheid, tot eene aanmerkelijke hoogte kan komen. In dit geval is de antiphlogistische geneeswijze, bij eenen vollen, harden pols, eene aderlating op den arm, hoogst nuttig, waarbij men eene *Emulsie* met *Nitrum* voege.

### §. 21.

Ten einde de genezing der wonde te bevorderen, gebruike men omslagen van GOULARDS loodwater, en late de lijderes strikt eene zijdelingsche ligging, met digt bij elkander geslotene dijen en billen, houden, waardoor de genezing, en indien de scheur niet te wijd, of tot de fluitspier van den aars zich uitstrekt, de vereeniging der gescheidene wondlippen, volkomen kan bereikt worden. Bij de ligging



op de zijde late men de kraamvrouw, als het ware, eenigzins voorover liggen, opdat de kraamzuiveringen niet langs de wonde, maar naar voren vloeijen; men binde de dijen bij elkander, om daardoor derzelve vaneenwijking te verhinderen, en late de *urin*, steeds op de knieën liggende, lozen. Door lavementen en in dringende omstandigheden, zelfs door zachte purgeermiddelen drage men zorg voor ontlasting, om door geene te sterke aanperfsing des stoelgangs, de vereeniging en genezing der wonde te verhinderen; intusfchen bevele men de meest mogelijke zuiverheid, en ettert de wond veel, dan late men haar drie of vier malen daags met versch plukfel, bevochtigd met *Aq. Goulardi*, bedekken. OSIANDER bedient zich te dien einde van eene dunne, langwerpige gefnedene looden plaat, welke hij met plukfel omwikkelt, en in de wonde gebragt zijnde, ombuigt; FICKER prijst het gewaschte taf aan, hetwelk evenwel ligt kronkelt.

## §. 22.

Door de §. 21 opgegevene geneeswijze kan, indien de kraamvrouw vier of vijf dagen eene bestendige zijdelingsche ligging in acht neme, bovendien gezond en voor de verlosfing met geen en kwaadaardigen, inzonderheid venerifchen witten vloed behebt is geweest, en hare kraamzuivering niet te overvloedig is, de genezing van eene aanmerkelijke fcheur in den bilnaad plaats grijpen. Vloeijen nogtans de *Lochia* in eene groote hoeveelheid af en hebben zij daarenboven een' kwalijken reuk, dan late men bij herbaling een aftrekfel van kamillen en

Ci-

*Cicuta*, of garstenwater met een weinig tinctuur van myrrhe en rozenhonig in de scheede spuiten, en koestert men slechts het minste vermoeden van witten vloed, dan gebruike men kalkwater of eene oplossing van loodsuiker tot inspuitingen (\*), waarbij men de Sublimaat voege, zoo de witte vloed een venerisch karakter heeft. Voorts moet men ook van tijd tot tijd de wonde onderzoeken, en vooral zindelijkheid in acht nemen, daar bij verwaarloozing derzelve, de wonde spoedig koudvurig wordt. — Somwijlen verhindert bij eene scheve of dwarse scheur, een, tusfchen beide wondlippen liggende, gefcheiden lap van den bilnaad, de genezing, doordien de beide randen der wonden elkander niet regtstreeks kunnen aanraken. In zulk een geval doet men het best deze lappen met eene fchaar af te fnijden, en de §. 19 en §. 21 opgegevene ligging aan te bevelen. Zijn de randen der wonde eenigzins eeltachtig geworden, dan trachte men dezelve door het aanstippen van eenigerhande bijtmiddel in een' ligten ontstekingstoestand te brengen en alzoo de genezing te bewerkftelligen.

### §. 23.

Als de fcheur zich tot aan de fluitfpier van den aars of geheel tot den aars uitftrekt, dan ontstaat

(\*) Zoude het wel raadzaam zijn onvoorwaardelijk eenen witten vloed regtstreeks te willen tegengaan? ons bedunkens niet.

DE VERT.



staat er meestal een ongeneeslijk, vreesfelijk gebrek; de *gevolgen* daarvan zijn: onwillekeurige afgang van drekstoffen en winden, aanhoudende ontsleking, pijn en uitvloeijing van vuile en stinkende stoffen, uitzakking van den aars, moeilijk gaan en zitten, hevige pijnen bij den bijslaap, volkomen ongeschiktheid voor denzelfden, of de man oefent dien onwetende in den endeldarm uit, waardoor in het §. 36 vermelde, merkwaardige geval zelfs zwangerschap volgde. Tot genezing van dit gebrek worden, om de hereeniging te bewerken, kleefpleisters, de bloedige of knoophechting, inkervingen en de aanstipping met den helschen steen aanprezen. Van de kleefpleister moet men niets verwachten, en de andere middelen zullen, zoo lang de kraamzuiveringen in het kraambed aanhouden, niet helpen, dewijl door deze de hereeniging der wonde verhinderd wordt; eerst na het volkomen ophouden derzelve moet men tot hun gebruik overgaan.

#### §. 24.

De bloedige of tusschengeknoopte hechting is aangewezen, wanneer het verlies van zelfstandigheid niet te groot is en men voor het uitscheuren der draden niet te duchten heeft. Voor dat men tot de kunstbewerking overgaat, late men door geneesmiddelen en klisteren eene genoegzame ontlasting bewerken, en eenen doelmatigen leefregel in acht nemen, opdat de opvulling der darmen en inzonderheid van den endeldarm met overtollige drekstoffen verhinderd worde; den morgen vóór de kunstbewerking kan men der lijderesse een tot twee

twee greinen heulsap toedienen , om gedurende de eerste dagen de drekstoffen op te houden. De kunstbewerking zelve wordt op de volgende wijze verrigt: zijn de uitwendige teeldeelen eenigermate meer naar voren gelegen , dan legge men de lijderesse op den rug met het bekken zeer hoog en late de dijen van elkander verwijderen; zijn trouwens de teeldeelen meer in het midden of achterwaarts geplaatst , dan verdient eene ligging op de knieën , zoo als bij de herstelling der omgekantelde baarmoeder , aanprijzing; de voeten en billen moeten daarbij tevens genoegzaam van elkander gevoerd worden. Vervolgens doorsnijdt men de verharde randen van de doorgescheurde huid des bilnaads , gelijk bij de *operatie* van de hazelip , zoodat zij sterk bloeden , en scarificeert met een *bistouri* , zoo het noodig is , gedeeltelijk de doorgescheurde sluitspier van den aars , gedeeltelijk het tusschen den scheedemond en den aars zich bevindende celweeffel , om alzoo eene volkomen bloedende oppervlakte te verkrijgen , en legt nu de bloedige hechting in dier voege aan , dat men met eene kromme , buigzame , zilveren of gouden naald , welke met een gewasten draad voorzien is , eene der wondlippen naar omstandigheden eerst de linker- , of de andere ter regterzijde doorsteekt , en dus de naalden van binnen naar buiten in het eerste geval door de regter , in het tweede evenwel door de linker wondlip eenige lijnen van den rand verwijderd , uitwendig doorvoert , en ze door middel van den draad , volgens de wijze van de tusschengeknoopte hechting behoorlijk vereenigt. Strekt de scheur zich echter



tot door de sluitspier van den aars uit, dan moet men bij de eerste steek te gelijk het te voren beleetigde celweeffel tusfchen de opening der fcheede en den aars, en zelfs de uitwendige vlakke van den endeldarm mede vatten, zal de vereeniging naar wensch gelukken. Daarop voert men eene tweede naald, eenige lijnen van de tweede verwijderd, op gelijke wijze door, en legt dan den tweeden knoop. Over de nu vast vereenigde wondlippen legt men droog plukfel, daarover eene met loodzalf dun beftrekenen wiek, ondersteunt de gansche vereeniging door doelmatig aangelegde kleefpleisters, laat de gansche tusfchenruimte van de billen met trapswijze kompresfen opvullen en dit alles met een T-verband bevestigen.

#### §. 25.

Na de kunstbewerking late men de lijderes eenige dagen eene bedaarde, zijdelingsche ligging in acht nemen en de dijen over elkander vastbinden. Voorts geve men haar tot haar onderhoud alleen vleeschnat of dunne foepen, en ledige de blaas voorzigtig met eenen katheter. Den vierden dag kan men naar de wonde zien, dezelve van vuiligheid en etter zuiveren, nieuwe hechtpleisters aanleggen, kortom het verband vernieuwen. Bij deze behandeling is het mogelijk, dat, zoo al niet eene volkomene, dan toch eene gedeeltelijke vereeniging plaats grijpe, waardoor vele van de vermelde akelige gevolgen verwijderd worden. Doch niet altijd bereikt men het gewenschte doel; de naalden fcheuren dikwijls, reeds voor dat de vereeniging der wondlippen geëindigd

digd was, uit, en dit zoo veel te spoediger, wanneer er of sterke aanpersing tot ontlasting bestaat, of de afvoering van eene in de baarmoeder teruggeblevene *mola* volgen moet. Dan kan somtijds andermaal, hoewel zelden, eene nieuwe proef met de hechting genomen worden; in dit, of in het geval waar, reeds in het begin, de vereeniging der wondlippen door de aanwending der tusschengeknoopte hechting niet meer te verwachten is, beproeve men alleen nog inkervingen van de wondlippen met eene *bistouri*, of het aanstippen van den helschen steen, op een tijdstip, dat de kraamzuivering volkomen heeft nagelaten, en waar men zeker is, dat er zelfs van de voor de eerste maal wederom intredende maandelijksche zuivering niets meer te duchten is; bovendien wachte men liever de *menstruatie* af en onderneme de kunstbewerking eerst in den tusschentijd van deze tot de volgende. Na de inkerving of aanstipping late men de §. 21 opgegevene ligging houden en behandel de wonde, zoo als daar geleerd wordt; de natuur bewerkt dan somwijlen de genezing nog op eene gelukkige wijze. — MAURICEAU (\*) prees, onder andere omslagen, het leggen van een' vetten eijerkoek over de beleedigde teeldeelen, en W. J. SCHMITT (†) vernieuwde de aanprijzing van dezen raad, welken CARUS ook goedkeurt.

L I T-

(\*) *Traité des maladies des femmes grosses etc.*  
Tom. I. p. 400.

(†) *Gesammelte obstetrische Schriften.* S. 105  
u. 448.



## L I T T E R A T U R.

- MAURICEAU, *Traité des maladies des femmes grosses etc.*  
*Paris 1721. VI<sup>ème</sup> Edition. p. 399.*
- JOHN HARVIE, *Practical directions Shewing a method of  
 preserving the perinaeum in birth and delivring the  
 placenta without violence. London 1767. 8<sup>o</sup>.*
- J. C. GEHLER, *de ruptura perinaei in partu cavenda.*  
*Lips. 1781. 4<sup>o</sup>. in dessen kl. Schr. II. Th. N<sup>o</sup>. 8.*
- HAGEN, *de praecavenda interfoeminei delaceratione. Mo-*  
*gunt. 1790.*
- VOELKENING, *de laesionibus perinaei muliebris. Gott. 1797.*
- G. J. SCHLEUSSNER, *de praecavenda perinaei ruptura.*  
*Jenae 1797.*
- MURSINNA, in LODERS *Journal für Chirurgie und Geburts-*  
*hülfe. I. B. 4. St. S. 658 und MENTZEL eben da selbst.*  
*II. B. 1e. St. p. 112—130.*
- VIETH, *de ruptura perinaei. Gott. 1799.*
- FR. W. NEDEL'S *Vorschlag einer neuen Verfahrensart,*  
*die Ruptur des Perinäi bey der Geburt zu verhüten,*  
*und die erfolgte zu heilen. Magdeburg 1806. 8<sup>o</sup>.*
- SCHAEFFER, in HUFELAND'S *Journal der pract. Heilkunde.*  
*vij B. St. III. p. 177.*
- MENDEL, *de perinaei cura in partu. Wratisl. 1812. 4<sup>o</sup>.*
- SAUCEROTTE, *Melanges de Chirurgie — in Sédillat Re-*  
*cueil periodique. Tom. IV. p. 417 en 425.*
- NOEL, in *Actes de la Societé de Medicine. Bruxelles 1799.*  
*Tsm. I. part. 2. p. 38.*
- REUSS, in B. VON [SIEBOLD'S *Samml. chirurg. Beobach-*  
*tungen. II. p. 44.*
- SAXTORPH, *Umritz der Entbindungswissenschaft für Weh-*  
*mutter. Kopenhagen 1811.*
- FABRICI, *med. chir. Beobachtungen. Nurnberg 1816. 4<sup>o</sup>.*  
*S. 1—30.*

ZANG, *Darstellung blütiger heilkundiger Operationen.*

III. B. 2e. St. S. 351. u. s.

OSIANDER, *Handbuch der Entbindungskunst. Tübingen*

1821. 8°. II. B. 2e. Abth. §. 113 u. f.

S. VAN SIEBOLD, *Ist es Schädlich das Mittelfleisch bey der Gebürt zu unterstützen? In dessen Journal a.*

B. 5. St. 1.

VAN ONSENOORT, *Operative Heelkunde, te Amsterdam, bij C. G. SULPKE.*

————— *Ziektekundige Heelkunde, bij denzelfden.*



## DERDE HOOFDSTUK.

*Over de ontsteking en kwetsing der  
vrouwelijke scheede.*

## §. 26.

Onder de ontstekingen der teeldeelen bij kraamvrouwen is die der scheede eene van de menigvuldigste; weinige moeilijke geboorten bestaan er, wier gevolg zij niet is; en zij kan, of met de ontsteking der baarmoeder, inzonderheid van het scheedegedeelte, en met die der schaamlippen gepaard gaan, of alleen op zich zelve bestaan. Zwelling, pijn en zeer vermeerderde hitte, welke men bij het onderzoek waarneemt, zijn gewoonlijk de teekens van eene aanwezige ontsteking der scheede; bovendien is zij veelal vergezeld van eene ontstekingskoorts, die, of het gevolg der ontsteking van de vrouwelijke scheede is, of somwijlen deze voorafgaat.

## §. 27.

De kwetsingen der scheede zijn, of slechts oppervlakkige beleedigingen der huid (*Excoriationes*), of gesnedene of gescheurde wonden, welke op alle plaatsen of wanden der scheede plaats kunnen vinden, en waarbij men wel degelijk dient op te letten, of de scheede slechts alleen, of tevens aangren-

grenzende deelen, bij voorbeeld de endeldarm, de hals der blaas of de pisblaas zelve, beleedigd zijn geworden. Over de merkwaardige verscheuring der scheede bij hare vasthechting aan de baarmoeder hebben wij §. 1494 III<sup>en</sup> D. II. St. reeds gesproken.

### *Oorzaken en Gevolgen.*

#### §. 28.

De ontsteking der scheede, tenzij geen gevolg der §. 27 opgegevene kwetsingen, ontstaat meestal door drukking, kneuzing en hevige uitzetting, welke dezelve bij de geboorte ondergaat; dien ten gevolge zijn veelal de naaste gevolgen: zwelling door ophooping en stilstand der vochten in de verzwakte vaten, of uitstorting van vloeistoffen (*Sugillatio*) uit de geborsten vaten in het nabijgelegene celweeffel. Buitengewoon naauwe teeldeelen bij een' jeugdigen leeftijd, de voor de eerste maal plaats grijpende geboorte bij eenigzins gevorderde jaren, te drooge teeldeelen en witte vloed geven eene bijzondere voorbeschiktheid tot genoemde ontsteking der scheede, welke dus bij een lang verblijf des hoofds in het bekken, bij beklemming, te hevige aanperfsing tot verarbeitung der weeën, ondoelmatige, ruwe en te dikwerf herhaalde onderzoekingen, ruw gebruik der handen of verloskundige instrumenten, inzonderheid van de tang, des te eerder moet veroorzaakt worden.

#### §. 29.

De wonden der scheede kunnen mede door ruw  
on



onderflaan, door een ondoelmatig gebruik van instrumenten, geweldig en ruw aanleggen der tang, door scherpe en stompe haken, hoofd- en vliezenboor, vingerbistouri's, scharen, waarmede knoeisters en vroedvrouwen de scheede, om ze te verwijderen, gekwetst hebben, door beensplinters na de doorboring des hoofds enz. voortgebracht worden. *Gevolgen* van dezelve zijn: hevige bloedvliet, bezwijming, ontsteking, ontstekingskoorts, verettering, abscesen, uitterende sluipkoorts, versterking in de scheede, moeilijkheden bij de pislozing, onvermogen om de pis op te houden, of pislustels, bijaldien de hals der blaas of de pisblaas zelve gekwetst werd, opstopping van den stoelgang, diarheën, onwillekeurige afgang der drekstoffen en aarslustels, bij kwetsuren van den endeldarm. Door het afvloeijen der *Lochia* en der pis langs de gewonde plaats, door de instrooming der onzuiver geworden lucht van buiten, door verwaarloosde ontlasting, door drukking der uitwerpselen in den endeldarm, bij stoornis in deszelfs verrigtingen, moet de ontsteking nog in eenen hoogen graad vermeerderd en de genezing der wonden uitermate belemmerd worden.

#### *Geneeswijze.*

#### §. 30.

De ontsteking der scheede vereischt, om den overgang tot verettering, hoofdzakelijk echter tot *Gangraena*, te verhoeden, de ontstekingwerende geneeswijze; vindt men den pols vol en hard, dan geve men het salpeter-mixtuur; doch is er ontstekings-

kings-

kingskoorts in eenen hevigen graad aanwezig, de scheede zeer heet, droog en pijnlijk, en vloeijen de *Lochia* niet, dan is eene algemeene bloedontlasting volstrekt aangewezen. Voor inspuitingen in de scheidde zijn bij eenen hevigen graad van ontsteking een laauwwarm aftreksel der kamillen en vlierbloemen, van de *Cicuta* en *Hyoscyamus* met melk uitmuntend geschikt; intusschen zorg men te gelijk voor ontlediging van den endeldarm door een lavement, en bedekke de uitwendige teeldeelen met eene spons, welke in het zoogenaamde kruiden-aftreksel nat gemaakt is.

### §. 31.

Bij wonden van de scheidde, moet men bij voorkeur toch ook op de daarmede gepaard gaande wond- of ontstekingskoorts letten en deze naar derzelve hevigheid, zoo als §. 30 is opgegeven, behandelen. De plaatselijke behandeling regelt zich echter naar den aard der wonde zelve. Bestaat deze alleen in ontvellingen, dan zijn slijmige afkookfels, verbonden met de loodsuiker, aangewezen, bij welke men bij groote gevoeligheid der scheidde het heulsap voegt; deze middelen laat men inspuiten, of door eene zachte spons, welke men in de scheidde voert, aanleggen. — Ontstaat er door eene inscheuring of insnijding der scheidde een aanmerkelijke bloedvliet, dan brenge men eene in azijn, brandewijn of in eene oplossing des aluins gedoopte tempon of spons in en drukke dezelve eenigermate sterk tegen de verwonde plaats aan.



Zijn de wonden der scheede afhankelijk van eene geringe insnijding of inscheuring, en is tevens daarmede ontsteking en koorts verbonden, dan moet men vooreerst de §. 30 opgegevene behandeling volgen; intusschen late men reeds in het begin, inzonderheid bij blijkbare zwakte der scheede en in het voorgaande geval na beteugeling der ontsteking, ten einde de genezing te bevorderen, zamentrekkende afkookfels van kina, salie, eikenbast met rozenbladeren of oplosfingen van aluin met witte vitriool door eene in de scheede gebragte spons aanwenden. — Is de snede of scheur evenwel groot, eeltachtig en fistuleus, dan moet men door de bloedige hechting, de hereeniging en genezing trachten te bewerkstelligen, hetgeen zich wel laat ten uitvoer brengen, indien de snede of scheur niet te diep of te ver naar achter aan de pisblaas plaats vindt; men gaat even als bij de kunstbewerking van den ingescheurden bilnaad te werk, scarificeert de randen, in geval zij eeltachtig zijn, zoo als daar wordt opgegeven; brengt daarop eenen katheter in de pisbuis, opdat zich de pis door dezen ontlasten kan; en beveelt eene ruggelingsche ligging en de grootste rust in het bed aan. Vindt de hereeniging door middel van de bloedige hechting geene plaats meer, dan kan somwijlen nog, door het aanstippen der eeltachtige randen met den hellschen steen, of met eene bougie, de vereeniging of genezing bereikt worden. Werd de hals der blaas, de blaas zelve of de endeldarm ingescheurd, en blijven

on-

onwillekeurige afgang der pis en drekstoffen, pis- of aarsfistels over, dan kan de onder op te gevene behandeling beproefd worden.

### §. 33.

De gesneden en gescheurde wonden kunnen tevens ligt in verettering overgaan, inzonderheid als eene doelmatige behandeling reeds in den beginne verwaarloosd wordt. Men zij in dit geval voorzigtig met digestiefmiddelen, welke de scheede, als slijmvlies, en als een te slap deel niet verdraagt en die spoedig geheele verwoesting derzelve, verrotting en versterving ten gevolge hebben, welke bovendien door het afvloeijen der *Lochia* nog vermeerderd worden; hierbij komt dan dikwijls eene sluipkoorts, en de dood volgt somwijlen tegen verwachting van degenen, welke noch het gebrek, noch de oorzaken van den dood kenden. Reden waarom men bij het begin van de verettering slechts garstenwater met rozenhoning in de scheede late inspuiten. Is het slijmvlies der scheede echter zeer verslapt, de zweer onzuiver en de uitvloeiende *Lochia* kwalijkriekend, dan doe men bij de vermelde inspuiting een weinig tinktuur van myrrhe, of late een sterk afkooksel van salie met rozenhoning inspuiten, en daarenboven eene met hetzelfde natgemaakte, zachte spons in de scheede brengen, om tevens de aaneengroeiing en ontvellingen op andere plaatsen te verhoeden.

### §. 34.

Als de ontsteking der scheede zoowel met als zonder verwonding derzelve in versterving over-



gaat, dan moet men tot uitwendig gebruik zulke middelen nemen, welke de plaatselijke verrotting in het verstorvene tegengaan, om de besmetting en opflorping te voorkomen, de afscheiding van de, door de versterfing vernietigde, deelen der scheidde en de genezing door bevordering der *reproductie* van het door versterfing aangedane deel te bewerken. Tot dat einde zijn inspuitingen in de scheidde van een aftreksel der alssemknoppen, der kamillen, der wilde thijm, des kalmuswortels, des kina- en wilgenbast, in verbinding met myrrhe en kamfer, aan-geprezen; deze middelen kan men tevens met eene spons, of wanneer de verstorvene zweer geene te hooge plaats inneemt, ook in den vorm van zalf op plukfel, waaryan men eene opgerolde wiek gemaakt heeft, beproeven. — Vermits de verstorvene zweer genezen kan, zoo dient men naauwkeurig acht te geven, of niet de scheidde op de eene of andere zijde aan elkander, of met het scheiddegedeelte der baarmoeder aaneen groeijen wil, ten einde dit volgens de §. 33 opgegevene wijs te verhinderen. Buiten de aangewezen plaatselijke behandeling, moet er tevens op de koorts gelet worden, die van drie-erlei aard kan zijn; het is namelijk, of eene ontstekings-, eene zenuw-, of eene rotkoorts. De ontstekingskoorts kan nog aanhouden, in weerwil dat er reeds versterfing in de scheidde op de eene of andere plaats ontstaan is; gemeenlijk zijn dan nog andere plaatsen ontstoken en pijnlijk; de kraamvrouw heeft eene zeer prikkelbare en volbloedige gesteldheid, de ontsteking was terstond vrij hevig, en de beleediging bij de verlossing zeer aanmerke-lijk;

lijk; men gaat dan evenwel met de noodige voorzigtigheid, om de zieke niet te veel te verzwakken, naar de algemeene antiphlogistische geneeswijze te werk, en schrijve een verdunnend diët van plantenvoedsel voor. Is de lijderes echter van eene zwakke gesteldheid, heeft zij veel bloed verloren, verkeert zij alleenlijk in een' staat van krachteloosheid, en heeft de koorts een zenuwachtig karakter, dan zijn vlugge, zweetdrijvende, zenuwversterkende middelen, als daar zijn: valeriaan, *Arnica* verbonden met de *Acet-ammon. liquida* of *succinata* en een voedende en versterkende leefregel van goeden dienst. Heeft de koorts echter een' rotachtigen aard, dan is de kina deels om de verzwakking, deels om het rotachtige bederf der vochten en de opslorping in de verstorvene plaats der scheede te beteugelen, dringend aangewezen; men geeft dezelve al naar omstandigheden, in eene oplossing van het extract, of in een aftreksel, in het afkooksel of in poeder. Heeft de rotkoorts reeds een' hoogen trap bereikt, dan verbindt men met de kina, mineraalzuren, of den aluin; en zijn er duidelijke teekenen van een verregaand krachtverlies, dan voegt men bij de kina zulke middelen, welke spoediger en meer regtstreeks de prikkelbaarheid van het zenuwstelsel opwekken, bij voorbeeld de *Arnica*, de *Serpentaria*, den wijn, en zoodra er zich flauwten, kramp, spiertrekkingen, koude ledematen enz. openbaren, dan make men benevens de kina van den valeriaan, het *Liq. cornu cervi succinatus* en de Moschus in groote giften gebruik.



## L I T T E R A T U R.

BARTHOLINUS, *Histor. anatom. Cent. II. N<sup>o</sup>. 63.*

SEDILLOT, *Recueil periodique. Tom. I. p. 187.*

BOËR, *Abhandl. und Versuche geburtsh. Inhalts. I. Theil. S. 61 und II. B. I. Theil. S. 35.*

JÖRG, *Versuche und Beyträge geburtsh. Inhalts. Leipzig 1806. S. 232.*

ZANG, *Darstellung u. s. w. 3 Th. 2 Abth. S. 333.*

M. COTE, in *Journal universel des Sciences medicales. Sept. 1819.*

VON SIEBOLD's *Chiron. II. p. 741.*

RUIS, *Observationes anatomic chir. N<sup>o</sup>. 59.*

CHAUSSIER, in *Bulletin de la Faculté de Médecine etc. 1812. p. 165.*

COFFINIERES, in *Recueil periodique Tom. vj. p. 444.*

MELITSCH, in *STARK's Archiv. II. p. 418.*

VELTKAMP, *Nieuwe Verhandelingen van het Heelkundig Genootschap te Amsterdam 1. B. 2. N<sup>o</sup>. 4.*

MORGAGNI, *Epistol XLVII. art. 12. 36. LII. art. 2. LXV. art. 8. LXIX. art. 16.*

## VIERDE HOOFDSTUK.

*Over de bloedvloeijing uit de baarmoeder.*

## §. 35.

Is de baarmoeder, zoo als §. 646 aangetoond werd, zelfs buiten de zwangerschap, de verlossing en het kraambed tot bloedvloeijing geneigd, krijgt zij daartoe nog meerdere voorbeschiktheid gedurende de zwangerheid en de verlossing zelve, dan is deze nogtans op geen' tijd en in geene van derzelve betrekkingen zoo menigvuldig, als onmiddellijk na de verlossing en gedurende het kraambed. In de zwangerheid zette zich de baarmoeder tot een' zeer aanmerkelijken graad uit, hare vaten, welke zich meer ontwikkelden en in omvang toenamen, werden langer en tevens meer verwijd, zij bevatteden eene grootere hoeveelheid bloeds, de toevoer naar de zelve was buitengewoon vermeerderd, de terugkeering tot hare vorige betrekking door zamentrekking kan zelfs niet, als vergezeld van eene bloedafscheiding, mogelijk zijn, eene groote vlakte derzelve, met welke de *placenta* door het afvallend vlies van HUNTER vereenigd was, moet men genoegzaam als eene gekwetste, opene plaats beschouwen, ontbloomt van middelen, door welke zij voor uitwendige invloeden en ook inzonderheid voor bloedingen beveiligd was.



De verhoogde werkdadigheid, welke op het einde der dragt in het vaatgestel zelf heerscht, gelijk de snelle, menigvuldige en volle pols en meer andere verschijnselen aanduiden, de tijdens de eerste dagen des kraambeds nog aanhoudende toefstrooming van bloed naar de teelwerktuigen, voornamelijk als het kind niet zuigt of stoornis in deze verrigting plaats vindt, de zamentrekking van de baarmoederlijke vaten en de sluiting van hunne uiteinden nog niet volkomen is, zijn nog zoo vele wezenlijke bijzonderheden, welke de baarmoeder tot bloedvloeiingen voorbeschikken.

### §. 36.

Men beschouwe echter niet ieder bloedverlies onmiddellijk na de verlossing, en in de eerste dagen van het kraambed, voor een onregelmatig verschijnsel; in het eerste geval is het gemeenlijk slechts het noodzakelijke gevolg van de afscheiding der nageboorte, in het tweede vergezelt het de eigendommelijke verrigting der baarmoeder, welke onder den naam van *kraamzuivering* bekend staat. Eene bloedvloeiing na de verlossing en in den loop des kraambeds is derhalve geen onnatuurlijk en ziekelijk verschijnsel, ten zij dezelve niet te lang aanhoude, in betrekking tot de hoeveelheid met geene storingen en gevolgen vergezeld ga en zich op een tijdstip van het kraambed openbare, in hetwelk eene bloedontlasting uit de baarmoeder tot de onverwachte toevallen behoort, hetzij dan, dat de regelmatige veranderingen, welke gewoonlijk in de eerste dagen van het kraambed plegen plaats te grijpen,

door

door toevallige oorzaken later teruggezet worden, gelijk men meermalen waarneemt, bij verlosfingen, welke met koortfen, bij voorbeeld eene *Synocha* of *Febris nervosa* te gelijk voorvallen, en waarbij de kraamvloed, zoowel als de zogaffcheiding tot aan de ziektescheiding onderdrukt blijven, en dan eerst op den negenden of tienden dag na de bevalling, die verrigtingen en tevens ook bloederige kraamzuiveringen zich opdoen, welke ten onregte voor eene onregelmatige of ziekelijke bloedvloeijing worden aangezien. Als een ziektescheidend verschijnsel treffen wij de bloedvloeijing uit de baarmoeder (*Metrorrhagie*) bij kraamvrouwen zeldzamer aan, dan men wel zoude gelooven; na baarmoederontsteking, ontsteking des eijerstoks, of van het buikvlies, enz. komt zij evenwel voor. In deze omftandigheid openbaart zij zich als eene *active* bloedvloeijing, welke door de bekende voorboden wordt aangekondigd.

### §. 37.

De bron, waaruit het bloed vloeit, is of het fcheedegedeelte, of de holte der baarmoeder zelve; in het laatste geval moet men zeer naauwkeurig onderscheiden, of de nageboorte nog teruggebleven, of reeds uit haar verwijderd is.

### §. 38.

Intusfchen kan eene op eenmaal zich openbarende bloedontlasting gevaarlijk worden, door dat zij te lang aanhoudt; het bloed nu ftort zich, of in ftroomen uit, of terftond na de bevalling, regtftreeks uit de vaten, of later na verloop van eenige uren



of dagen des kraambeds, naarmate het bloed zich een' korteren of langeren tijd in de baarmoeder had opgehoopt en door hare plaatsgrijpende zamentrekking plotseling werd uitgedreven; in dit geval is het bloed gemeenlijk van eene donker roode kleur, gestold en ontlast zich in stukken of klonters, even als eene zoogenaamde *bloedmola*. Een' van den natuurlijken regel afwijkenden bloedvliet moet men naar deszelfs hoeveelheid en hoedanigheid beoordeelen, zoo als wij §. 648 reeds opgaven; een gering bloedverlies immers kan reeds den naam van bloedvloeijing dragen, zoodra hetzelfde, bij voorbeeld, bij eene zwakke gesteldheid des voorwerps, met storing der gezondheid gepaard gaat: terwijl integendeel het verlies van stroomen bloeds dien naam niet verdient, wanneer het geenen na-deeligen invloed op de gezondheid uitoefent. Het denkbeeld van bloedvloeijing is diensvolgens slechts betrekkelijk.

### §. 39.

Eene bloedvloeijing uit de baarmoeder onmiddellijk na de verlossing des kinds ontstaat meestal op eens; openbaart zich dezelve evenwel later in het kraambed, dan kunnen hier de verschijnselen in §. 650 vermeld, voorafgaan. Zij zijn namelijk: moeilijke ademhaling, benaauwdheid, zuchten, groote onrust, hartkloppingen, beving der ledematen, snelle, driftige pols, duizeling, hoofdpijn, dofheid, suizing der ooren, een verhoogd gevoel van hitte in het gansche ligchaam, gloeijing van de handpalmen en voetzolen, volheid, gepaard met vermeerderde hitte

in

in den onderbuik, persing op de teeldeelen, opzetting van de schaamstreek, menigvuldige aandrang tot pislozing, branding en neiging tot jeuken der teeldeelen.

#### §. 40.

De bloedvloeijing uit de baarmoeder nu kan of *uit-* of *inwendig* (uitstorting of ophooping van het bloed binnen de holte der baarmoeder) (*Methrorragia externa vel interna, aperta vel occulta*) zijn; deze herkent men uit de toenemende uitzetting der baarmoeder, het inwendig gevoel van warmte, gepaard met koude ledematen, toenemende zwakte, fletsheid van het gezicht, klagten over benaauwdheid in de ademhaling, dikwerf geeuwen, flauwten, stuipachtige toevallen en somwijlen alleen uit de afvloeijing van het doorzijpelende bloedwater.

#### Oorzaken.

#### §. 41.

Reeds op eene andere plaats §. 13.6, merkten wij op, dat vele voorwerpen eene zekere ongelukkige voorbeschiktheid tot bloedvloeijingen uit de baarmoeder na de verlossing bezitten, van welke dikwerf de oorzaak uitermate moeilijk kan bepaald worden; ter verklaring derzelve is de §. 35 bijgebrachte algemeene voorbeschiktheid niet genoegzaam, vermits zij bij elke vrouw bestaat en de bloedvliet toch meestentijds eerst door zekere, bijzonder opwekkende oorzaken wordt te weeg gebragt; het zal dus altijd moeilijk blijven, middelen ter ver-



hoeding derzelve op te geven. Wij namen ten minste waar, dat zij, ondanks de zorgvuldigste voorschriften in de zwangerschap, den gelukkigsten en gemakkelijksten afloop der verlossing bij vrouwen, die zes tot acht malen gebaard hadden, ten allen tijde en dikwijls met de vreeselijkste verschijnselen vergezeld, zich openbaarde.

#### §. 42.

In den volstrektsten zin neemt men bloedvloeiingen der baarmoeder wel menigvuldiger waar bij voorwerpen van eene zwakkelijke, kwaadsappige gesteldheid, hetzij deze bij de geboorte overgeërfd, of eerst in het vervolg door schadelijke invloeden §. 655 veroorzaakt is. Hoe slechter voedsel echter eene zwangere vrouw gebruikte, hoe meer zij door natuur of uitwendige omstandigheden verzwakt werd, des te meer aanleg zal zij hebben tot bloedvloeiing na de bevalling. Bloedvloeiingen der baarmoeder na de verlossing en in den loop des kraambeds zijn nogtans ook niet altijd de onmiddellijke gevolgen van zwakte, maar men treft ze insgelijks bij gezonde, sterke, volbloedige voorwerpen aan, kunnende hare oorzaak in te groote sterke en eene verhoogde werking van het vaatgestel gelegen zijn, welke door eene te hevige inspanning bij de verlossing, door het gebruik van verhittende dranken en weeën bevorderende middelen, te sterke hitte en te veel menschen in de kraamkamer, algemeene verkoeling na voorafgegane verhitting, inzonderheid bij eene schieleke verandering der temperatuur en dergelijken kan ontstaan. Desnietteenstaande kan de

de baarmoeder in een' staat van kracht- en werkeloosheid verkeeren, waardoor het bloed zich stroomenderwijze uitstort, kunnende de vaten van dit werktuig het aandringende bloed geen' wederstand bieden.

#### §. 43.

De bloedvloeijing onmiddellijk na de bevalling en gedurende het kraambed wordt meestal door een plaatselijk lijden der baarmoeder zelve veroorzaakt; dit kan op kracht- en werkeloosheid, of op eene gebrekkige bewerktuiging en ligging, of op beletfelen, welke hare zamentrekking verhinderen, gegrond zijn, die in haar zelve, of in het door haar bevatte liggen.

#### §. 44.

De plaatselijke zwakte en werkeloosheid der baarmoeder kan een gevolg zijn van de zwakke, kwaadappige ligchaamsgesteldheid, van eene aanmerkelijke slapheid van derzelver vezelen, van langdurige, verzwakkende ziekten tijdens de zwangerschap, van drukking, welke de baarmoeder door het bekken, door het vast inbinden ter verbergung der zwangersheid, of door ruwe betastingen geleden heeft, of zij ontstaat na eene geweldige uitzetting in de zwangersheid, door eene ongewone hoeveelheid vruchtwaters, door een te groot kind, of door tweelingen, drielingen, enz.; waardoor de baarmoeder, ten gevolge van de onnatuurlijke uitzetting, een gedeelte harer zamentrekkingskracht verloren heeft.



## §. 45.

De bedoelde zwakte en werkeloosheid kan zich intusfchen op eene zeer verschillende wijze openbaren: 1) de baarmoeder blijft na de uitdrijving des kinds naar alle kanten in denzelfden graad van uitgezetheid, waarin zij te voren verkeerde; alsdan vindt men den onderbuik buitengewoon uitgezet, en indien op dezen oogenblik de moederkoek gedeeltelijk of zelfs volkomen afgescheiden was, zoo zij nog binnen de baarmoeder teruggehouden of reeds uit dezelve gedreven werd, dan blijven de openingen der baarmoederlijke vaten verwijd en het bloed stort zich stroomswijze uit; 2) de baarmoeder heeft alle zamentrekkingskracht nog niet verloren, haar bodem en ligchaam trekken zich dan in eenen minderen, dan in eenen meerderen graad, evenwel nooit zoo volkomen te zamen, dat de monden der vaten zich sluiten; de bloedvliet is dan meestal onbeduidender en er wordt tevens niet zoo veel op eenmaal verloren; 3) de baarmoeder trekt zich fchielijk na de uitdrijving van het kind, en fomwijlen al voor de ontlasting van den moederkoek, te zamen; doch na een' langeren of korteren tijd komt zij weder in een' minderen of meerderen graad tot haren vorigen staat van uitzetting, en alsdan stort zich het bloed in volle stroomen uit; 4) de zwakte der baarmoeder bepaalt zich slechts tot een gedeelte der baarmoeder, meestentijds tot datgene, aan hetwelk de moederkoek is vastgehecht, de baarmoedermond trekt zich dan te zamen, en kant zich tegen de uitvloeijing des bloeds aan,

ter-

terwijl dit onophoudelijk in de zich meer en meer uitzettende holte der baarmoeder stolt, of deze trekt zich op het midden van haar ligchaam te zamen, en blijft in haren bodem en hals uitgezet, waarmede even zeer een hevige bloedvliet gepaard gaat, hetzij de nageboorte nog in de baarmoeder begrepen, of geheel of ten deele reeds ontlast is.

#### §. 46.

Andere oorzaken van bloedvloeijing zijn ongelijke, meestal krampachtige zamentrekkingen der baarmoeder of zoodanige, welke hare zamentrekkingen ten eenenmale verhinderen, als daar zijn: ontsteking der baarmoeder, eene te vaste, ongelijke vasthechting of te dik, kraakbeenachtig weeffel des moederkoeks; aanhechting van denzelven aan den eenen of anderen zijwand der baarmoeder, die tot onregelmatige zamentrekkingen aanleiding geeft; te vroege afscheiding des moederkoeks als gevolg eener op zich zelve of door omstrengeling te korte navelstreng, of eene te ruwe poging tot afhaling des moederkoeks, van hier verscheuring der baarmoederlijke vaten of van hunne monden, beleediging van het weeffel der baarmoeder, voornamelijk bij eene te vaste vereeniging; teruggeblevene *mola*, of gedeelte des moederkoeks; uitzakking, achter- en vooroverbuiging, omkanteling en voornamelijk binnenwaarts-omkeering der baarmoeder; de laatste ontstaat niet altijd onmiddellijk na de verlossing, maar veelal eerst later in den loop des kraambeds, slechts in eenen onvolkomenen graad, en kan men gemakkelijk onderkennen; de gewoonlijk zeer ontstote-

te-



tene baarmoedermond, en de achter dezen voelbare, hoogst pijnlijke bodem, of de afgezakte voor- of achterwand der baarmoeder, maakt de *diagnosis* niet onzeker. Die oorzaak van bloedvloeijing is nog merkwaardig, waarbij zich slechts een gedeelte van het inwendige vlies der baarmoeder heeft afgescheiden; alsdan is de pijn bij de aanraking minder en de plaats zelve op het gevoel weeker, even als of de zelfstandigheid der baarmoeder zelve zich heeft omgekeerd. Tot de bijzondere oorzaken der baarmoederlijke bloedvloeijing, welke somtijds onmiddellijk na de verlossing voorvalt en geenszins voor nietsbeduidend moet gehouden worden, behoort het te diep afzakken van den *Uterus* in het bekken, waardoor niet alleen de aandrang van het bloed tot denzelfden gaande gehouden, maar tevens zijne zamentrekking belet wordt.

#### §. 47.

Als eene oorzaak van bloedvloeijing onmiddellijk na de geboorte, moeten wij nog gewagen van de scheuring, welke de moedermond meestentijds van den doortogt des kinds ondergaat, en waardoor de bloedvaten van het onderste gedeelte des *Uterus mechanisch* beledigd worden. Vermits alle bloedvaten der baarmoeder van het begin der zwangerheid tot aan haar einde, niet alleen in volumen, maar over het algemeen ook in werkdadigheid toenemen, zoo bevroedt men gemakkelijk, hoe dergelijke verwondingen, inzonderheid bij treffing van grootere bloedvaten, buitengewone, hevige bloedvloeijingen kunnen veroorzaken, waarbij het bloed nu eens bij

ge.

gedeelten uitvloeit, of in de scheede stolt, en ten gevolge van dien de baarmoeder uitzettende, zelfs tot eene inwendige bloeding aanleiding kan geven. Bij de verwonding van slagaderen ziet het bloed licht rood, terwijl het bij de aderen donker gekleurd is.

#### §. 48.

Buiten de opgenoemde oorzaken kunnen ten gelijken tijde aanwezige *Mola's* of *Polypen* zeer hevige bloedvloeiingen uit de baarmoeder veroorzaken, inzonderheid bij vroegtijdige geboorten, welke zelfs reeds de gevolgen van deze zijn geweest. Beide moet men niet te gering achten, wijl hare *diagnosis* dikwerf hoogst moeilijk en de bloedingen meestal van eenen hevigen graad zijn. Bij ieder geval blijft de baarmoeder meer dan gewoonlijk uitgezet, men voelt door den openstaanden moedermond het teruggebleven vreemde deel, en de pogingen des *Uterus* om zich zamen te trekken, duren nog altijd voort, terwijl onder zulke weeënachtige pijnen de *mola* wordt afgedreven of de polyp door den moedermond te voorschijn treedt. Insgelijks kunnen zweeren, welke door ontsteking in de baarmoeder ontstonden, tot bloedvloeiingen aanleiding geven, bijaldien de door dezelve aangedane plaats bloedvaten treft; lijdt de kraamvrouw aan *Scirrhus* of *Carcinoma* der baarmoeder, dan zullen bloedvloeiingen zeldzaam achterwege blijven.



## Gevolgen.

## §. 49.

De naaste gevolgen van bloedvloeijingen na de bevalling bestaan in de toevallen, welke bloedverlies en krachteloosheid vergezellen. Groote zwakte vereenigt zich met eene even groote aandoenlijkheid, deswege grijpen er krampen, stuipen en flauwten plaats; de ledematen en het gansche ligchaam worden slap, verliezen hunne natuurlijke warmte en zijn met een koud, kleverig zweet bedekt; er doet zich zuifing der ooren en moeilijke ademhaling op, en slaagt men niet in het ophouden van den bloedvliet, dan volgt spoedig de dood onder stuipen of door zenuwachtige beroerte (*Apoplexia nervosa*).

## §. 50.

Als latere gevolgen, vooral indien de bloedvloeijing langer geduurd heeft, dan wel hevig geweest is, vinden wij *asthenische* koorts, en maar al te dikwijls wordt de bloedvloeijing hebbelijk. De koorts gaat ligt tot slepende en uitterende zenuwkoorts (*Febris nervosa lenta* en *hectica*) over; niet zelden wordt er longtering (*Phthisis Pulmonum*) uit geboren, nog veelvuldiger waterzucht, nu eens onder den vorm van borst- (*Hydrothorax*), dan eens als buik- (*Ascites*) of als huidwaterzucht (*Anasarca*); men heeft zelfs de bleekzucht (*Chlorosis*) bij eenen tot gewoonte geworden baarmoederlijken bloedvliet zien ontflaan. — In den *Uterus* vernauwen zich de vaten; bij eene toenemende zwakte van dit werk-

werktuig, gepaard met eene bloedvloeijing, openbaart zich de baarmoedertering (*Phthisis uterina*); een langdurige, dikwerf ongeneeslijke, witte vloed kwelt en ondermijnt de krachten der lijderes, welke veelal eene neiging tot miskramen overhoudt, somwijlen volkomen onvruchtbaar wordt. — Ontstond de bloedvloeijing uit eene mechanische kwetsing, dan vereenigen zich met de opgenoemde gebreken al de gevolgen van deze, en wij zien hieruit polypen, zweren en dergelijke meer voortkomen.

### Voorzegging.

#### §. 51.

Wat nu de voorzegging omtrent bloedvloeijingen uit de baarmoeder onmiddellijk na de geboorte en in het kraambed betreft, zoo heeft men over het algemeen te letten op: 1) de gesteldheid der kraamvrouw, 2) het beloop der zwangerheid en der geboorte, 3) de oorzaken der *Haemorrhagie*, 4) het karakter derzelve, 5) de hoeveelheid van het afvloeiende bloed, en ten 6) de, met de bloedvloeijing gepaard gaande, verschijnselen.

#### §. 52.

Bij volbloedige gestellen heeft men over het algemeen minder van eene bloedstorting uit de baarmoeder, hetzij dezelve terstond na de geboorte, of wel later in het kraambed zich openbaart, te vreezen, dewijl in zulk een geval de *Metrorrhagie* welligt een *kritisch* verschijnsel is, en men daardoor andere ziekten in het kraambed, zoo als ontstekingen van den



onderbuik en van het hoofd, voorkomt. Men zij  
 volkomen gerust, bijaldien de hoeveelheid van het  
 afvloeiende bloed niet aanmerkelijk is, geene andere  
 gevaarlijke verschijnselen zich vertoonen en de bloe-  
 ding aanstonds op de geboorte volgt. Verder in  
 het kraambed is de voorzegging, zelfs bij krachtige  
 en bloedrijke gestellen, niet altijd zoo gunstig. —  
 Zwakke vrouwen ondergaan zelden een groot bloed-  
 verlies zonder nadeel. Men heeft echter vooral  
 reden om bevreesd te zijn, als de kraamvrouw een  
*leucophlegmatisch* (waterzuchtig) gestel heeft, dewijl  
 alsdan maar al te dikwerf waterzuchtige gebre-  
 ken de gevolgen zijn. — Zeer jonge voorwerpen  
 lijden even zoo veel in het kraambed van eene  
 baarmoederlijke bloedvloeiing, als meer in jaren ge-  
 vorderde vrouwen, bij beide heeft men boosaardige  
 koortsen en bij eenigen aanleg er toe, zelfs tering  
 (*Phthisis*) te vreezen. Daarenboven moet men niet  
 uit het oog verliezen, dat op onderscheidene tijden  
 bij alle kraamvrouwen, bloedingen uit de baarmoeder  
 zich vertoonen, waarbij het gevaar echter minder  
 beduidend pleegt te zijn, en dat men ook tot deze  
 ongesteldheid menigwerf eene erfelijke voorbeschikt-  
 heid waarnam. Een oplettend onderzoek dan ook,  
 naar de vroegere betrekkingen, ten aanzien van de  
 maandelijksche zuivering, voorafgegane verlosfingen  
 en kraambed, enz. zal den arts bij het beoordeelen  
 van het meer of minder gevaar der bloedvloeiingen  
 mede zeer belangrijk zijn. Vrouwen, welke bij de  
 maandstonden altijd veel bloed verloren, verdragen  
 ook na de verlosfing en in het kraambed veel beter  
 het verlies van eene groote hoeveelheid bloeds;

wederom andere overvalt na elke verlossing een hevige bloedvliet, zonder dat derzelver gezondheid er door benadeeld wordt; bij zulke behoeft men geene vrees te hebben voor eene *Metrorrhagie*, welke bij andere den Arts op goede gronden voor de gevolgen zeer op zijne hoede moet doen zijn.

§. 53.

Eene gelukkig afgeloopene zwangerheid, welke voor het overige door eene regelmatige verlossing achtervolgd werd, magtig wel, bijaldien al de omstandigheden zoo zijn, tot eene gunstige voorzegging; heeft men echter redenen, welke doen vermoeden, dat de baarmoeder en het voorttelingsstelsel in het algemeen reeds in de zwangerheid ziekelijk waren aangedaan; leed de kraamvrouw reeds in dien tijd aan pijnen van een' ontstekingsachtigen aard in de baarmoeder, of inzonderheid ter plaatse van de vasthechting des moederkoeks, enz., en is men overtuigd, dat de bloedvloeijing van geene andere oorzaak afhangt, dan wordt de voorzegging ongunstiger, omdat het moeilijker is zulk eene bloeding te stillen en in het vooruitzicht langdurige, zelfs organische gebreken te duchten zijn. Bloedstortingen, welke op zeer moeilijke, langdurige, ook wel op kunstmatige verlossingen volgen, ondermijnen veel spoediger de krachten, en er ontstaan onder zulke omstandigheden, zelfs na de ontlasting van eene geringe hoeveelheid bloeds, ligt flauwten en stuipen van den bedenkelijksten aard. — Bloedingen, welke zich openbaren na zeer langdurig geworden verlossingen door zwakte der weeën,



of na zulke, bij welke de baarmoeder door eene te groote hoeveelheid vruchtwaters, of door meerdere vruchten (tweelingen, drielingen, enz.) buitengewoon uitgezet was, zijn altijd bedenkelijk en niet buiten gevaar, dewijl zij meer het gevolg van eene verlamming der baarmoeder zijn. — Veeleer houde men bloedvloeijing voor een gelukkig verschijnsel, bijaldien eene *Plethora* des *Uterus* reeds gedurende de zwangerheid en geboorte duidelijk aanwezig was, of indien de ziekelijke gesteldheid der baarmoeder meer naar het ontstekingachtige overhelde. Desgeelijks is in den lateren tijd des kraambeds de voorzeggung veel beter te doen, indien eene gelukkige zwangerheid vooraf ging, de verlossing ten regten tijde plaats greep, noch te langzaam, noch te schielijk afliep en ook onmiddellijk na de bevalling geene gevaarlijke toevallen zich opdeden. — Van bloedvloeijingen na vroegtijdige geboorten heeft men bijkans altijd meer gevaar te duchten, dan van zulke, welke na voldragene kinderen voorvallen; dewijl na miskraam en vroegtijdige geboorte de afscheiding van het afvallend vlies moeilijker en langzamer geschiedt en bij eene vroegtijdige geboorte zelfs altijd reeds een ziekelijke toestand, nu eens van het gansche ligchaam, dan eens van de baringswerktuigen, te vooronderstellen of aan te toonen is.

#### §. 54.

Wanneer in het kraambed na eene ontsteking der baarmoeder, des eijersfoks of van andere in den onderbuik gelegene organen eene bloeding uit de baarmoeder als *crisis* intreedt, dan beschouwe en be-

beoordeele men dezelve als een gunstig verschijnsel. De voorafgegane ongesteldheid en de voorboden benemen ons de onzekerheid, deze soort van *Metrorrhagie* met eene andere te verwisselen, daar zij zich door het karakter der *Synocha* en als bloedontlasting door afscheiding boven alle andere bloedingen uit de baarmoeder kenmerkt. — Na ontstekingsachtige aandoeningen der hersenen, waaruit bij eenen hevigen graad derzelve wel eens razernij (*Mania puerperalis*) ontstaat, ten gevolge van eenen onderdrukten kraamvloed of achterwege geblevene zogaffscheidung, komt eene baarmoederlijke bloedvloeijing wel eens als een gunstig, *critisch* verschijnsel voor. — Bloedvloeijingen, welke door inmondig ontstonden, zijn minder gunstig te beoordeelen, offchoon van haar zelden gevaar voor het leven te duchten is, daar het der kunst meestal gelukt, dezelve spoedig te doen ophouden; des te meer heeft men voor *Metrorrhagie*, welke uit eene soort van verlamming voortspruit, te vreezen, die, het menigvuldigste voorvallende, niet zonder gevaar is, dikwerf spoedig den dood veroorzaakt en in sommige gevallen door geene middelen te beteugelen is. Wanneer een algemeen verzwakte toestand daarmede vergezeld gaat, dan heeft men nog erger te vreezen, en in zulk een geval laten zich de gevolgen van het bloedverlies niet berekenen. — De plaatselijke kracht en werkeloosheid der baarmoeder duldt insgelijks geene gunstige voorzegging, doch, bijaldien zij niet tot volkomene verlamming overgaat en de *Uterus* derhalve nog eenigermate deszelfs zamentrekkingskracht behouden heeft, dan



kan de voorzegging tot stuiting van de bloedontlasting gunstiger zijn, dan dat eene gedeeltelijke verlamming met ongelijke zamentrekking, inzonderheid toefnoering van den mond of het midden van het ligchaam der baarmoeder, tot bloedvloeijing aanleiding geeft. — Alle, uit eene verkeerde ligging der baarmoeder voortspruitende, bloedvloeijingen kan de kunst terstond verhelpen met dezelve te veranderen; het gevaarlijkste zijn de binnenwaarts-omkeering en de door MÖLLER beschrevene omkanteling. Eene geheel binnen de baarmoeder teruggeblevene *placenta* vordert, als geen minder gewichtig punt ten aanzien van de voorzegging, al onze oplettendheid. Het is beter, als dezelve geheel of gedeeltelijk los, en nog beter als zij reeds ontlast is; de nog volkomen vastzittende moederkoek, vergezeld van eene gelijktijdige, hevige bloedvloeijing, maakt de voorzegging altijd hoogst twijfelachtig en belooft zelden een' gunstigen afloop, daar het even zoo gevaarlijk is, denzelven terug te laten, als kunstmatig af te scheiden en weg te nemen (\*). Zelfs bij enkele, teruggeblevene stukken wachte men zich voor eene al te gunstige voorzegging, naardien onder zulke omstandigheden ook het verlies van eene geringe hoeveelheid bloeds den dood kan te weeg brengen. — Eene bloedvloeijing bij de ontlasting eener *mola* behoort volstrekt niet tot de bijzonderheden, en is alleen, bij een aanmerkelijk bloed-

(\*) m. s. Dr. W. J. SCHMITT, *über das Zurücklassen des Mutterkuchens, in des Verf. Journal f. d. Geburtshilfe*. III. B. 3 St. S. 452.

bloedverlies, gepaard met andere verzwarende omstandigheden, gevaarlijk voor het leven, en zoo ook zal eene, door een' polyp veroorzaakte, bloedvloeijing meer wegens de terugkeering en de gevolgen, eene slechte voorzegging vereischen, dan wel om de enkele bloeding zelve. — Baarmoederlijke bloedvloeijingen in het kraambed, welke door verscheuring der vaten (*Rhexis*) ontstaan, zijn ten aanzien van de belediging der vaten al niet gering te achten, en zoo ook die, welke door wegknaging (*Diabrosis*) verwekt worden, allereerst door hare gelegenheid gevende oorzaak — de zweer — gevaardreigend. Wat de voorzegging betreft bij bloedingen, door *mechanische vaneenscheiding* (*Diaresis*) veroorzaakt, geven men nauwkeurig acht: *a*) op de uitgestrektheid der kwetsing, — geringe zijn, zoo als ligt te begripen is, van weinig beteekenis; — *b*) op het gewonde deel, — scheuren van het scheidgedeelte treft men het menigvuldigste aan en zijn het minst gevaarlijk; van zoo veel te meer gewigt zijn de kwetsingen van den bodem en het ligchaam des *Uterus*, zoodat eene scheur in den eenen of anderen van zijne wanden, zeker altijd den dood ten gevolge heeft; — *c*) op den aard der kwetsuur, — bij gesnedenene wonden is de bloeding heviger, dan bij gekneusde en gescheurde, trouwens ook gemakkelijker te genezen.

#### §. 55.

Wat het karakter der bloedvloeijing aangaat bij *Synocha*, zoo doe men eene gunstige voorzegging, bijaldien niet op eenmaal eene aanmerkelijke hoe-



veelheid bloeds, uit zeer groote vaten, verloren gaat; ongunstiger echter zij dezelve bij *Metrorrhagiën* met het karakter van *Erethismus*, naardien zij meestal van een heverigen aard zijn en gemeenlijk dikwijls terugkomen; de ongunstigste voorzegging geve men bij baarmoederlijke bloedvloeijingen, die op verlamming gegrond zijn, wijl hier de bloeding zelve, niet, zoo als bij *critische* bloedvloeijingen, de oorzaak opgeheven, maar veeleer versterkt wordt, sneller en eerder de toevallen van uitputting (*Depletie*) zich vertoonen en ook de latere gevolgen bij deze oneindig veel erger plegen te zijn.

### §. 56.

Bij geene bloedvloeijing, uit welk orgaan het ook zijn moge, kan men uit de hoeveelheid van het geloosde bloed, minder en onzekerder den uitgang voorspellen, dan bij die der baarmoeder. Niet slechts, dat zeer dikwijls de gansche reeks van ziekelijke verschijnselen met de hoeveelheid des verloren bloeds in geene de minste evenredigheid staat, zeer gering en min beduidend is bij een bloedverlies van zes en acht ponden, en integendeel buitengewoon groot, nadat er pas zoo vele onsen afgevloeid waren; maar wij hebben zelfs voorbeelden, dat schijnbaar sterke en robuste vrouwen na de ontlasting van eene hoeveelheid bloeds, welke men na de bevalling naauwelijks voor iets onregelmatigs konde houden, plotselijk onder alle teekenen van groot bloedverlies den geest gaven, terwijl zwakkelijke, gevoelige voorwerpen, eene oneindig veel aanmerkelijker hoeveelheid zonder nadeel verloren.

Zoo

Zoo lang de *Uterus* na de geboorte nog voortdu-  
rend in zamentrekking verkeert, zal de bloedvliet  
zelden gevaarlijk worden, naardien dan alleen het  
reeds in hem bevatte bloed ontlast en het gansche  
*Organismus* geen bloed op nieuws, maar slechts  
datgene, wat als het ware van den omloop afge-  
scheiden is, verwijderd wordt. De bedenkelijkste  
gevallen zijn zulke, in welke het bloed snel en  
plotselijk in eene groote hoeveelheid op ééns zich  
stroomswijze ontlast, de zoogenoemde *bloedstorting*,  
en bij geene bloedvloeijingen vertoonen zich de  
verschijnselen van *Depletie* spoediger en zekerder,  
dan bij deze. Eene bloedvloeijing, waarbij het bloed  
niet op zulk eene geweldige wijze, maar in een  
langer tijdsbestek, hoezeer ook in geene geringe  
hoeveelheid, afvloeit, veroorzaakt weinige vrees;  
het minste ontstelt men zich bij eene druppels-  
wijze afvloeijing van bloed (*Stillicidium Sanguinis*),  
waardoor eene aanmerkelijke hoeveelheid van het-  
zelve kan verloren gaan, zonder dat er zich gevaar-  
dreigende toevallen vertoonen. Na een plotselijk  
aanmerkelijk bloedverlies heeft men altijd vele lang-  
durige naziekten te duchten, en onder deze inzon-  
derheid *waterzucht* en *uittering*.

#### §. 57.

Bij de baarmoederlijke bloedvloeijing is het van  
het grootste gewigt, of het bloed afvloeit (*Metror-  
rhagia aperta*), dan of het bij de afvloeijing door  
de bloedklonters, die de scheede opvullen, of door  
zamentrekking van den baarmoedermond of een ge-  
deelte van deszelfs ligchaam teruggehouden wordt,



en zich in den op nieuws uitzettenden *Uterus* ophoopt (*M. occulta*). De laatste is gevaarlijk, dewijl zij in den beginne dikwerf wordt over het hoofd gezien, en ook de nieuwe uitzetting der baarmoeder zich tegen derzelver zamentrekkingskracht aantant, haar verzwakt en *Paralysis* doet ontstaan, of de aanwezige nog vermeedert. Ten aanzien van de gevolgen behoeft men minder bevreesd te zijn, bijaldien de kraamvrouw zich wél gevoelt, de natuurlijke warmte en roodheid van de oppervlakte des ligchaams niet afneemt, de hoeveelheid des bloeds met de oorzaak en met de vergezellende toevallen in geene onevenredige verhouding staat en de werktuigen des gezichts onveranderd blijven. Wederinstortingen gedoogen geene zoo gunstige voorzegging, als in het eerste geval, en zijn voornamelijk in den lateren tijd des kraambeds, indien er reeds algemeene zwakte of zelfs waterzuchtige verschijnselen bijkwamen, hoogst gevaarlijk. Worden de lippen en tong bleek, vertoont zich een kleverig zweet aan het hoofd, op de borst en in de handen, verandert en valt het gezicht in, wordt de neus spits, de mond scheef getrokken, beven de lippen, is de dorst hevig, openbaart zich walging en braking, of hik, fuizing der ooren, verscheidenheid van kleuren voor het gezicht, blindheid, sprakeloosheid, wordt de pols klein, zeer snel, koordachtig gespannen, bevende en tuschenpoozende, klaagt de lijderes over gebrek aan lucht, overvallen flauwten, trekkingen of hevige stui-  
pen de zieke, dan heeft men weinige hoop te koesteren, en al gelukt zelfs de redding van het zoo zeer in gevaar geweest zijnde leven, dan heeft men nog

voor eene langdurige, dikwijls levenslange ziekelijke gesteldheid of doodelijke naziekten, onder deze inzonderheid borstwaterzucht (*Hydrothorax*), te vreezen.

### *Lijkopening.*

#### §. 58.

De lijken van alle aan bloedstortingen gestorvenen kenmerken zich reeds op het uiterlijke aanzien door eene algemeen, bleeke kleur, en slechts enkele keeren treft men in het witte der oogen, of aan de ledematen kleine uitvatingen (*Ecchymosis*) van bloed aan. Alle organen vindt men zonder bloed, de vaatvlechten (*Plexus chorodei*) volkomen wit, even zoo de hersenen; de longen te zamen gevallen, de veerkrachtige opgezetheid der lever vernietigd, hare kleur tot een smeurig, bleek geel overgegaan. Het hart en de groote stammen van bloedvaten zijn ledig en te zamen gevallen, alleen in den *Uterus* treft men somtijds de bloedvaten nog even ruim en meestal op de plaats van de vasthechting des moederkoeks verwijd aan. Bovendien vindt men de baarmoeder, nu eens door *koudvuur* aangetast; dan eens slap en los, even als een' zak, zonder eenige de minste stevigheid; dan eens uitgezet, evenwel vast en steviger, dan zij zijn moest, zoodat deze gesteldheid de zamentrekking verhinderde, de bloedvloeiing veroorzaakte en gaande hield; dan weder verhardingen in enkele deelen van dit werktuig, die op sommige plaatsen zelfs aan eene beenachtige hardheid grenzen; of abscesfen in de scheede, in de spieren, welke het bekken bekleeden,



den, of in de baarmoeder zelve; ook wel eens verscheuring des *Uterus*, kwetsingen van denzelven, of afscheidingen van het inwendige vlies.

*Geneeswijze.*

§. 59.

Bij het opgeven mijner wijze van behandeling van de hier afgehandelde bloedvloeijingen moet ik doen opmerken, welk een gansch ander geneesplan, de onmiddellijk na de verlossing intredende bloedvloeijingen, en de later in het kraambed voorkomende, vereischen, naardien bij gene zeer dikwijls de spoedigste beteugeling van den bloedvliet, daar zij het leven bedreigen, allerdringendst aangewezen is, bij deze echter, meestal minder hevig en sterk zijnde, de genezing door verwijdering der oorzaak plaats grijpt, hoewel het niet te ontkennen is, dat somwijlen in het beloop des kraambeds, op den derden, vijfden, zevenden, negenden en veertienden dag, zich buitengewone, ras doodelijke bloedvloeijingen kunnen openbaren, die even zoo schielijk hulp behoeven, als die, welke onmiddellijk na de bevalling intreden. Het beteugelen van de bloeding en derzelver vergezellende verschijnselen is derhalve het hoofdvereischte bij de behandeling, en voorts zal de Arts met een doelmatig opvolgend geneesplan, hetzij door geneesmiddelen, of leefregel en diëet, veel moeten afdoen, ten einde de, uit het verlies van bloed zoo ligt voortvloeiende, nadeelige gevolgen te verhoeden, of de reeds voorhandene te keer te gaan.

## §. 60.

De bloedingen uit de baarmoeder, welke of onmiddellijk, of spoedig na de verlossing volgen, zijn meestal van eenen zeer hevigen aard, niet zelden *ware* bloedstorting en vereischen behalve oplettendheid, omzigtigheid, tegenwoordigheid van geest en besluitvaardigheid eene zoo veel te krachtdadiger en sneller hulp, als bij iedere bloeding het leven meer in gevaar verkeert en de behoudenis van het leven ons alle overige aanwijzingen doet ter zijde stellen. Wel nimmer zullen zij met het karakter der *Synocha* gepaard gaan en als bloedontlasting zich vertoonen; zij ontstaan gedeeltelijk door inmonding der vaten, meer nog door verlamming en dragen het karakter van *Erethismus* of *Paralysis*; zelfs gaat de eerste wel in de laatste over, bijaldien de bloeding slechts eenigermate hevig en aanhoudend is. De Arts heeft in zulke gevallen niet slechts met de bloedstorting zelve te kampen, maar heeft menigwerf nog bij eene menigte van opvolgende verschijnselen, onder welke inzonderheid stuipen, kramp en langdurige flauwten, in weerwil van de stilling des bloedvliets, al zijne oplettendheid en besluitvaardigheid noodig.

## §. 61.

Onmiddellijk na de algemeene beschouwing heeft men dan den bijzonderen toestand der baarmoeder, door het uit- en inwendig vroedkundig onderzoek, naauwkeurig op te nemen, en zich door eigene onderzoeking van den aard des afgevoelden bloeds, de



de wijze waarop het afstroomt, en in welk eene hoeveelheid, en de betrekkelijke gesteldheid der baarmoeder te onderrigten, ten einde terstond de gelegenheid gevende oorzaak te kunnen beoordeelen. Men geve nauwkeurig acht, of en hoe ver de baarmoeder uitgezet, of zij zacht of hard op het gevoel, dan of zij uitwendig aan den onderbuik volstrekt niet te voelen zij, of de moedermond geopend of gesloten zij, in welk eene ligging en stand de baarmoeder zich bevinde, of zij, of andere deelen gekwetst zijn, of de *Uterus* nog werkzaam zij en zich trachte zamen te trekken, dan of zij ten eenemale in een' werk- en krachteloozen toestand verkeere.

#### §. 62.

Bij iedere bloeding van zoodanigen aard zorgen men, dat de temperatuur van de kamer, in welke de kraamvrouw zich bevindt, niet te warm, maar liever koel zij; men vrijware haar echter voor allen togt, als welke hoogst gevaarlijk is. Men verwijdere deswege alle overtollige menschen, stoven met vuur, heet water en alles, wat de warmte der lucht zoude kunnen vermeerderen, en late liever in tijd van nood met azijn en *Aether* sprengen, bijaldien men geene mogelijkheid ziet, om op de eene of andere manier, in frischere, koelere lucht te voorzien.

#### §. 63.

Rust, de ongestoordste rust is voor iedere kraamvrouw niet alleen nuttig, maar zij is behoefte voor dezelve, en zoo veel te eerder bij bloedvloeiingen, door welke buitendien de gevoeligheid en vatbaarheid

heid voor uitwendige invloeden geklommen en verhoogd is; om deze reden verbiede de Arts alle onnoodig gedruis, blijve zelf bedaard, verkieze van twee bijkans overeenkomende middelen liever het minder goede, doch aanwezige, dan een ander, dat eerst nog moet verkregen worden, en geve acht, bijaldien er iets gehaald moet worden, dat dit stil geschiede. Droevige nabestaanden verwijdere men ook op de best mogelijke wijze, wijl niets hier schadelijker is, dan zielsaandoeningen, en de Schrijver houdt zich overtuigd, dat vele vrouwen, die ten gevolge eener bloedvloeijing stierven, zouden gered zijn geworden, bij de inachtneming dezer regelen.

#### §. 64.

Der kraamvrouw zelve verbiede men, indien doenlijk, de minste beweging, en bijaldien het volstrekt noodig is, hare ligging en plaatsing te veranderen, dan bewerkstellige men dit met de meeste voorzigtigheid en behoedzaamheid; in dit geval nu verkeert zij, als zij nog op eenen kraamstoel ligt, van welken men haar, indien het zonder gevaar kan geschieden, in een bed legt, beter nog op stroozakken of matrassen, dan op vederen bedden. Zoo echter de overbrenging van den stoel, van wege de onvermijdelijke beweging, gevaarlijk is, dan late men haar stil liggen, en geve acht, dat zij door achteroverhelling der rugleuning, met de borst en het hoofd lager worde gelegd; eene waterpasse ligging is de verkieslijkste, en zelfs den door MOSCHION gegeven raad, om haar met de voeten en het bekken

hoo-



hooger te laten liggen, dan met het ligchaam, in vele gevallen na te volgen. Daarenboven zij de plaatfing der legerftede zoodanig, dat men er van alle kanten gefchikt kan bijkomen. Het deksel moet flechts ligt zijn, eene wollen of geftikte deken is voldoende; vooral vermijde men alle drukking op den onderbuik, en zorg, dat geene banden om het lijf of de knieën te vast zijn aangetrokken.

### §. 65.

Was de bloeding door eene werktuigelijke belediging veroorzaakt, dan rigte men naar het verfchil van deze, de behandeling in. Ontftond dezelve door het barften van een' aderknoop, dan gebruike men als het beste en vermogendfte middel eene, uit lijnwaat of eene fpons vervaardigde, *tampon*, welke men in koud water, azijn, brandewijn of in eene oplossing van aluin nat maakt, en met een bloedftelpend poeder, uit arabifche gom en gele hars zamengefteld, beftrooit, en zoo in de fcheede op de verwonde plaats brengt; dewijl inwendige middelen de bloeding even zoo min kunnen ftillen, als infpuitingen, welke laafte nog het nadeel bezitten, dat zij den reeds gevormden of zich vormenden bloedprop (*Trombus*) ligtelijk weder wegspoelen en zoo doende de bloeding vermeederen. — Eene dergelijke behandeling vindt plaats, als de baarmoedermond ingefcheurd, en de fcheur te diep, of door dezelve eene flagader of groote ader gekwetst werd. — Bij fcheuren der baarmoeder, die niet geheel doordringen, wendt men zachte wrijvingen van den buik op de baarmoeder aan; ten einde

ha-

hare zamentrekkingskracht te vermeerderen, legt men over den buik alvorens in koud water, azijn en water, of verſlapten brandewijn natgemaakte doeken, wier koude men nog vermeerderen kan, door in de vloeïſtof, *ſalpeter*, *ſal ammoniac* of *keukenzout* op te loſſen; voorts doe men inſpuitingen van koud water, in zeer dringende omſtandigheden voegt men er eenigen azijn of brandewijn bij, en ga men voorzigtig met de hand, ja zelfs met eene *tampon* binnen de holte der baarmoeder. Inwendig diene men in deze gevallen, wanneer de opgekome ne toevallen van *Depletie*, of andere gevaarlijke verſchijnselen, niet reeds een ander, meer aangewezen, middel vereiſchen, de *Tinctura Cinnamomi*, het *Elixir acidum Halleri*, het door HERDER inzonderheid aangeprezene, en door den Schrijver zoo dikwijls met het gelukkigſte gevolg toegediende, *Acidum phosporicum* of het *Acid. Sulph. dilutum* met koud of kaneelwater verdund; in geval van nood voege men er eenige druppels der *Tinctura Opii simplex* of *thebaica* bij. Was eene zweer de oorzaak der bloeding, en doorknaagde zij een bloedvat, dan zal de *tampon* na eenige gedane inſpuitingen zeer nuttig zijn, mits dat de plaats des gebreks deze bewerking toelate. Vindt men, dat eene verplaatſing der baarmoeder, hoedanig deze ook zij, de bloedvloeijing veroorzaakte en deed voortduren, dan moet, zoo als ligtelijk te begrijpen is, de herplaatſing boven alle andere middelen op den voorgrond ſtaan; is dit bewerkſtelligd, dan volgt men de wijs van behandeling op, welke la-  
ger in het negende Hoofdstuk der eerſte afdeeling

IV. D. 1<sup>o</sup>. ST. E voor



voor iedere bijzondere, onnatuurlijke ligging der baarmoeder breedvoeriger zal worden opgegeven. — Bij alle bloedingen, die door verwonding ontstonden, zijn plaatselijk, verbonden met eene algemeene doelmatige behandeling der opvolgende toevallen, ook nog lang inspuitingen aangewezen, naar omstandigheden, van een afkookfel der *Cicuta*, des bilsenkruids, van de *Radix* of *H. Althaea*, der *Malva*, gepelde garst, *Salie*, van roode rozenbladen, van sterk zamentrekkende kruiden, basten en wortels, waarbij men eenigen azijn- of rozenhonig, enz. voegen kan; deze zelfde middelen zal men ook moeten aanwenden, bijaldien er op de eene of andere plaats eene verzwering mogt aanwezig zijn. Als omslagen, tevens gewijzigd naar de gevolgen, zijn dan doeken met warmen, gewonen of specerijachtigen azijn, pappen van aromatieke kruiden, inwrijvingen van vlugge zalven, zoo als van het *Linimentum volatile*, somtijds met eenig heulsap vermengd, van geestrijke vochten en d. m. aanprijzing waardig. Evenwel heeft men gevallen, waar men van wege de opvolgende ontsteking, zoowel plaatselijk door bloedzuigers op den buik, als ook algemeen, en wel door aderlatingen op den arm, het ontstekingwerende geneesplan dient in acht te nemen.

#### §. 66.

Eene baarmoederlijke bloedvloeijing, gegrond op eene te hoog gestegene werking van het vaatgestel, waartoe eene te groote warmte, verhittende dranken of weeën aanzettende middelen aanleiding gaven, en zulk eene, welke bij zeer sterke, bloedrijke, aan

aan goed voedsel gewone en een onwerkzaam, onbezorgd leven leidende voorwerpen, het gevolg van eene te groote hoeveelheid bloeds is, zal zeldzaam zoo hevig worden, dat de Arts tot sterkere middelen zijne toevlugt behoeft te nemen. Zeer dikwijls zal zij, wanneer men de in §. 62—64 opgegevene voorschriften oplettend gadeslaat, van zelve ophouden, en men heeft haar dikwijls bij velen in menigerlei opzigt, mits niet al te hevig zijnde, eerder voor een gunstig verschijnsel te houden. Men geve der kraamvrouw verkoelende dranken; water met suiker en citroen- of wijnsteenzuur; op den buik legge men omslagen van enkel koud water of met wijnazijn vermengd, voorts spuite men in met koud water en een weinig azijn, en bij eenen heviger' graad geve men, hoewel kort op elkander, mineraalzuren in kleine giften. Voorzigtig zij men intusschen met sterke, verhittende middelen, die in vervolg van tijd zeer spoedig tot ontsteking aanleiding geven, waarvan reeds veelvuldige waarnemingen den Schrijver overtuigden. Inzonderheid wachte men zich ook hier voor het kaneeltinktuur, en zoo min deszelfs groote nut anderzins bij *Methorrhagiën* te ontkennen is, moet men echter der waarheid hulde doen, dat hetzelfde in gevallen van dezen aard dikwerf zelfs aanmerkelijk veel kwaad gedaan heeft, vooral omdat domme vroedvrouwen zonder eenige onderscheiding het bij elke baarmoederlijke bloedvloeijing en wel in vrij groote giften toedienen. — Na zoodanige bloedvloeijing zorge men inzonderheid voor de grootste stilte, schrijve een schraal diët voor, tot drank, water met eenig



plantenzuur, des noods een verkoelend mixtuur van eene oplossing des wijnsteenzuurs met brambozen-siroop, als ook verkoelende middelzouten, en bij eene al te snelle beweging van het vaatgestel zelfs *Nitrum* met laurierkerswater, of het *H. digitalis purpureae* in kleine giften.

### §. 67.

Bloedingen van eenen reeds meer bedenkelijken aard, die uit eene ongelijke zamentrekking van den *Uterus* ontstaan, vorderen, naarmate van derzelver oorzaken, eene verschillende behandeling, doordien de ongelijke en gedeeltelijke zamentrekking nu eens het gevolg van een werktuigelijk beletsel, dan eens van kramp, of eener gedeeltelijke kracht- en werkeloosheid der baarmoeder is. — Achtergeblevene gedeelten van den moederkoek of van eene *Mola* geven niet zelden aanleiding tot hevige bloedvloeiingen, die in sommige gevallen tot geen bedaren zijn te brengen, voordat men dezelve naar de regels der kunst verwijderd heeft. Is uit de bloeding niet regstreeks gevaar voor het leven te duchten, dan doet men beter, de *Placenta* nog vast met de inwendige oppervlakte der baarmoeder vereenigd zijnde, dat men den bloedvliet op eene andere wijze zoekt te beteugelen, vermits de kunstmatige afscheiding derzelve altijd met veel gevaar vergezeld gaat. Tot dat einde zijn koude omslagen van nut; inspuitingen van koude, echter niet te zamentrekkende vloeistoffen, inwendig mineraalzuren vereenigd met het kaneeltinktuur, de *Tinctura Castorei* of *Opit*; de grootste oplettendheid trouwens wordt er gevorderd,

op-

opdat geene inwendige bloeding plaats grijpe. — Zoo lang er nog een, den *Uterus* vreemd geworden, ligchaam, terugbleef, om het even wat, is het gevaar nog niet geheel verdwenen, en kan men voor eene bloedvloeijing op nieuws en andere ziekten der baarmoeder niet gerust zijn. Deswege lette men naauwkeurig op den toestand des *Uterus* en hetgene er uit de teeldeelen zich onttast. De afscheiding van vreemde lichamen bevordert men met inwrijvingen van vlugge zalven op de onderbuikstreek; men brenge eene kleine, cilindervormige spons in de scheede, tot, of binnen de baarmoeder, na dezelve alvorens met een afkooksel der *Malva* of *Althaea* bevochtigd te hebben, en late door laauwe inspuitingen van een aftreksel der *Cicuta* met bijvoeging van *Salvia*, *Serpyllum*, het water of de bladen der *laurierkers* en dergelijken dikwijls de teeldeelen zuiveren. Komen geheel en al afgescheidene deelen in den moedermond, dan neme men deze met de vingers, of met een klein rangetje (*Pince à faux germes*) weg, doch wachte zich om iets met geweld te verrigten. De inwendige middelen worden naar den algemeenen toestand gewijzigd; nu eens zijn bedarende, pijnstillende *Emulsiën* met *narcotica*, dan eens versterkende *antiseptica*, zoo als de kina in derzelfver onderscheidene bereidingen, met bijvoeging van het een of ander mineraalzuur, aangewezen. In meer dan een geval ter afzondering van eene *mola* of achtergeblevene gedeelte der nageboorte was de *Borax* van wezenlijken dienst; velen prijzen inzonderheid het *Castoreum*, vooral in een geestig aftrek-



trekfel (\*). Al deze middelen kunnen aan de verwachting beantwoorden, als men, overeenkomstig de algemeene gesteldheid het eene of het andere verkiest. — Is eene krampachtige aandoening oorzaak der ongelijke zamentrekking en derhalve ook der bloedvloeijing, dan zullen vooral zachte wrijvingen met de bloote hand, of ook met bedarende middelen, als: *Oleum Hyoscyami* of *Chamomillae coctum*, warme stovingen van *Flores Chamomillae*, *Arnicae*, *Herba Menthae*, *Melissae*, *Hyoscyami* enz.; de bedekking met warme doeken, laauwwarme inspuitingen van slijmige afkookfels met eenigerhande verdoovend middel bedeeld, de door COPLAND (†) aangeprezene lavementen met *Opium* zeer heilzaam bevonden worden. Inwendig laat men warme aftrekfels als thee, van kamillen, melisse, valeriaan, pepermint enz. bij tuschenpoozen toedienen, voorts geeft men de *Tinct. Cinnamomi* met heulsap vermengd, den *Spirit. Cornu Cervi succinatus*, de *Tinct. Valerianae* of *Castorei siberici*, ook wel het *Ol. Chamom. aethereum* in *Aeth. aceticus* opgelost, terwijl men zorg draagt voor algemeene verwarming des ligchaams. Stond de bloeding ten gevolge van de algemeene zamentrekking der baarmoeder, dan

(\*) Over de werking der *Tinct. Castorei* op achtergeblevene deelen in de baarmoeder van Dr. FRIEDRICH LUDMEISSNER, in *Bereicherungen für die Geburtshülfe und für die Phatologie des Weibes und Kindes. Herausgegeben von CHOULANT, HAAZE, KÜRTNER und MEISSNER. Leipzig 1821. 8°. S. 13.*

(†) RICHTERS *chirurgische Bibliothek. 14 B. S. 345.*

dan houde men met alle middelen nog niet terstond op, maar late een zacht aftreksel van den *Radix Valerianae minoris* met *Spiritus Cornu Cervi succinatus*, of eenige druppels der *Tinct. Opii simplex* nog eenigen tijd voort gebruiken, somwijlen een kopje flappe thee van lindenbloesems, kamillen en dergelijken drinken, en lette inzonderheid in den ganschen loop des kraambeds op de huiduitwaseming, welke men, zoo het noodig is, door de zachtste en minst prikkelende middelen der *Diapnoica* (zacht zweetdrijvende middelen) onderhouden en vermeerderen kan, waartoe de *Spirit. Mindereri* bij voorkeur zich aanbeveelt. Was de bloedvloeijing zoo aanmerkelijk, dat zij groote zwakte te weeg bragt, die het gebruik van versterkende middelen vereischt, dan zij men bij het toedienen van deze zeer voorzigtig en vermijde sterk prikkelende geneesmiddelen, en dergelijk voedsel en drank, doch verlieze niet uit het oog, dat de gelegenheid gevende oorzaak kramp was, en dat bij deze voorzeker altijd eene voorbeschiktheid tot krampachtige aandoeningen overbleef, die dan ook niet terstond versterkende, wrange, zamentrekkende middelen verdraagt. Men bediene zich hier liever van vlugge middelen, zoo als van een aftreksel der *R. Arnicae*, *Serpentariae*, *Caryophyllata*, in het vervolg van den *calamus aromaticus* met bijvoeging van het een of ander verdoovend middel, van het *Extract* van den *Hyoscyamus*, *Conium*, zelfs van de *Belladonna*, het *Aq. Laurocerasi* of van het geconcentreerd *Aq. amygd. amararum*, vereenigd met den eenen of anderen *Aether*, of *Spiritualia*, van welke men boven



anderen aan den *Aether aceticus* en *nitricus alcoholicus* de voorkeur kan geven. Voorts geeft men de *Quassia*, en eerst na deze kan men, echter behoedzaam, tot zachte bereidingen van den kinabast overgaan, waartoe men eene oplossing van het koud bereide extract en het afkookfel van denzelven rangschikken kan. Staalmiddelen zullen door zoodanige voorwerpen slecht verdragen worden en zijn ook niet dan met de uiterste voorzigtigheid te gebruiken; de *Tinctura Ferri cydoniata* en *aperiens* kan men nog het spoedigste, vereenigd met eenen doelmatigen, voedenden en versterkenden eetregel, voorschrijven. — Lag de oorzaak der bloedvloeijing in eene gedeeltelijke verlamming der baarmoeder, dan zijn als plaatselijke middelen aangewezen: wrijvingen des buiks, omslagen van, met koud water of ook met *alcohol* bevochtigde doeken, het besprengen van den onderbuik met *Aether*; prikkeling van de inwendige oppervlakte der baarmoeder door eene binnengebrachte hand; inspuitingen van verslapt brandewijn, koud water, van aftreksels van zamentrekkende kruiden, wortels en basten, algemeen echter, boven alle andere middelen het kaneeltinktuur en phospherzuur. In zulk een geval is het niet ondoelmatig, om tusfchenpoozend met koude en warmte af te wisselen, en den buik, nadat men denzelven alvorens met koude omslagen voorzag, met warme, wollen doeken af te droogen, te wrijven en te bedekken. Hierbij verschaft dikwerf het inwendig gebruik des heulsaps het grootste nut, terwijl het zich gevoegelijk met de genoemde middelen verbinden laat. — De handelwijze bij eenen besloten

nen

nen moederkoek, die niet zelden oorzaak wordt van de hevigste, en spoedig doodelijke *Methorrhagiën*, is reeds in §. 657 breedvoeriger opgegeven, weshalve wij den lezer derwaarts kunnen verwijzen.

### §. 68.

De gevaarlijkste, in alle opzigten gevaarlijkste baarmoederlijke bloedvloeijing na de bevalling, is diegene, welke op eene volkomene kracht- en werkeloosheid van den *Uterus* gegrond is, en het karakter van *Paralysis* duidelijk met zich voert. Hare verschijning bij zwakkelijke, door eene bekrompene, zorgvolle leefwijze, door ziekten of een langdurig lijden uitgeputte voorwerpen, na eene bovenmatige uitzetting of ziekten der baarmoeder, vermeedert het gevaar niet weinig; met groote stroomen stort het bloed zich uit, elken oogenblik worden de krachten meer en meer ondermijnd; nog weinige oogenblikken slechts, — en de dood maakt een einde aan dit lijden. Even zoo groot moet onze bekommering zijn, als de bloedvloeijing met het karakter van *Erethismus* begon en daarna dat van verlamming aannam, doordien reeds deze overgang door de groote hoeveelheid des verloren geganen bloeds te weeg gebragt werd. In het laatste geval was dan veelal de baarmoeder vóór of bij het begin der bloeding te zamen getrokken, en zette zich naderhand weder tot een' slappen zak uit, waarin nauwelijks eenige levenskracht meer huisvestte; in het eerste geval was het tot zamentrekking aanzetkend vermogen met de uitdrijving van het voortbrengsel der bevruchting uitgeput. Hier kan alleen



eene vaardige hulp nog redding aanbrengen; hier kunnen de vermogendste middelen de bloedstorting nog beteugelen en stelpen, en alleen de vlugste en sterkste prikkels het afnemende leven nog slepende houden. Hier wende men op den buik koude omslagen van water, ijs of sneeuw in blazen, van water met azijn, besproeiingen, plaatselijke dropbaden, doeken met *Alcohol*, inwrijvingen van vlugge zalven, vlugtige oliën in *Aether* opgelost, inzonderheid het *Oleum Cajaputi*, *Cinnamomi* en *Menthae piperitae*, verdampingen van *Aether* en zachte wrijvingen op de onderbuikstreek, aan; men wrijve de baarmoeder van den bodem af, naar het ligchaam en drukke haar met beide de handen te samen; bijaldien dit niet helpt, dan voere men de hand binnen de holte der baarmoeder, met oogmerk om haar plaatselijk te prikkelen, doe inspuitingen van koud water, water met azijn, zuiveren azijn en verdunnen wijngeest, zelfs zullen oplossingen van Aluin, het zwavelzure zink of ijzer wegens den verlamden toestand van de monden der vaten goede uitwerkselen doen, vermits behoudenis des levens hier de eenige aanwijzing is; moest men maar in de particuliere praktijk nimmer vele dezer middelen ontberen, of van derzelver gebruik afzien, daar met de bereiding en bezorging uit de Apotheek te veel tijd verloren gaat. Hetzelfde is van toepassing op het, in dit geval door REIL (\*) aangepre-

(\*) *Ueber das polarische Auseinanderweichen der ursprünglichen Naturkräfte in der Gebärmutter zur Zeit der Schwangerschaft und deren Umtauschung zur Zeit der*

prezene Galvanismus, als het terstond met nut konde worden aangewend. Bij gebrek aan den noodigen toestel daartoe, bediene men zich van eene lepel des tangs of van een ander glad en koud metaal. Buitendien kan men met het beste gevolg een stuk ijs binnen de holte der baarmoeder, als ook eene, met bloedstelpende en geestrijke middelen bevochtigde en bestrooide, met een bandje voorzien, spons binnen dezelve voeren. Of WIGANDS (\*) en SPANGENBERGS (†) raad: eene gelijktijdige wrijving des baarmoedermonds en des kittelaars, een nuttig en beproefd middel is, kan de Schrijver uit gebrek aan ondervinding niet beflissen. Inwendig geve men, benevens onmiddellijk bloedstelpende middelen, dadelijk zulke in groote giften, die de levenskracht schielijk en krachtdadig opwekken, te weten: het kaneeltinktuur bij kleine tusfchenpoozen van bijna tien minuten 40 tot 60 druppels enkel, of met het *Aqua Cinnamomi vinosa* en eenige druppelen van het enkele geestige aftreksel des heulsaps, of ook met het vooral hier aan te prijzen phospherzuur vermengd, waarvan men insgelijks 30 tot 40 druppelen in eens met eenigerhande slijmig vocht, kan toedienen. Afwisselend met deze middelen verordineere men zwavel- of azijnaether, waare

*der Geburt — im Archiv für die Physiologie. vij B. 3 Heft. Halle 1807. S. 402.*

(\*) *Von den Ursachen und der Behandlung der Nachgeburtszögerungen. Hamburg 1803. 8°. S. 83.*

(†) *Ueber die Blutflüsse in Medicinischer Hinsicht. Braunschweig 1805. 8°. S. 458.*



waarin men eenige druppels eener vlugge olie, zoo als van de echte kaneel-, pepermunt-, notenmuscaat-, kamillen- of der Cajeputolie heeft opgelost. Deze geneesmiddelen kan men gevoeglijkst met eene lepel ouden, sterken wijn, of goeden Rhijn- of Hongaarschen wijn ingeven, en krachtige bouillon menigvuldig drinken laten, gelijk bij volkomen gebrek aan geneesmiddelen eenige lepels vol goeden, krachtigen wijn, en als deze bij de armere klasse ontbreekt, goede brandewijn of likeur, theelepelswijze toegediend, wezenlijke diensten kan doen, inzonderheid bij vrouwen die daaraan gewoon zijn, zoo als in *Berlijn* en het noordelijke gedeelte van *Duitschland* dikwijls het geval is. De borst bedekt men met warme, wollen doeken, welke men in alle geval met eenigerhande vluggen geest of met het gewone *Eau de Cologne* besprengt; de bovenste ledematen laat men met warme doeken wrijven, met *Eau de Cologne*, *Spiritus Lavendulae*, *Alcohol* enz. waschen en warm omwikkelen. — Kolenpoeder, keukenzout en salpeter, welke men in groote giften heeft aanbevolen, werken veel te langzaam, en zijn hier, van wege derzelver niet plaatselijke werking het minst aan te prijzen; dit zelfde geldt omtrent het zetten van koppen en het leggen van blaarpleisters op de borst, welk eerste in vroegere eeuwen reeds, het laatste door POUTEAU (\*) aanbevolen werd. Van meerder nut zijn het warme bad en de waschingen der armen; doch min-

(\*) *Sammlung auserlesener Abhandlungen.* s. p. A. XII. B. S. 346.

minder de voorſlagen van LEAKE (\*) en CHAUS-  
 SIER (†) te billijken, van welke de eerſte koude  
 voetbaden, de laaſte de omwikkeling der heete  
 voeten met in iſskoud water natgemaakte doeken  
 aanraadde. De *Catechu*, het drakenbloed en *Gum*  
*Kino* werken niet ſpoedig genoeg, en zoo ook zal  
 het *Tinctuur* van het roode vingerhoedkruid hier  
 niet in aanmerking komen, eerder nog het door  
 BISPHORIEK (§) voorgeschreven mengſel van ge-  
 brand kopervitriool, drakenbloed en van overge-  
 haalden wijngeeſt; het kaneeltinktuur in de meng-  
 ſels, die STARK en PLENK hebben opgegeven; het  
 door OSIANDER geprezene mixtuur: R. *Extracti*  
*Corticis Salicis* ʒj ʒ. *Aluminis romani* ʒ ʒ—ʒj. *Aquae*  
*Cinnamomi ſimplicis* ʒv. *Syrupi Rubi Idaei* S. *Ri-*  
*besiorum* ʒ ʒ. S. Alle half uren twee eetlepels vol  
 of naar gelang van omſtandigheden meermalen eene  
 lepel te geven. — De *Tinct. acid. aromatica Ph. B.*,  
 het *Elixir vitrioli Mynſichti*, of de door ME-  
 LITSCH (\*) aangeprezene ruwe aluin in poeder met  
 ſuiker van vijf tot tien greinen, of opgelost in  
 water.

### §. 69.

Worden de pogingen van den Arts om het dreig-  
 gen.

(\*) *Practiſche Bemerkungen über verſchiedene Krank-*  
*heiten der Schwangern und Kindbetterinnen; a. d. Engl.*  
 1775. 5. S. 196.

(†) STARK'S *Archiv.* II. B. 3. St. S. 23.

(§) *Med. Commenti Dec.* II. Vol. X. *Edinburg* 1795.  
 S. 359.

(\*) STARK'S *Archiv.* III. B. S. 735.



gende levensgevaar af te keeren, de bloedvloeijing te bedaren en de dringendste toevallen, als krampen, flauwten en dergelijken te beteugelen, met een gelukkig gevolg bekroond, dan blijft de verdere geneeskundige behandeling nog altijd eene gewigtvolle zaak, doordien niet zelden, ondanks alle mogelijke oplettendheid en omzigtigheid, na ziekten zich openbaren, welke later insgelijks nog het leven bedreigen. Rust naar ligchaam en geest trachte men het eerst bij eene, door bloedvloeijing uitgeputte, kraamvrouw te bevorderen, en gelukkig treedt meestentijds een rustige en verkwikkende slaap in. In vroegeren tijd meende men dezen aan geene kraamvrouw te mogen toestaan, naardien men vreesde, dat gedurende denzelven de bloedvliet weder kon terugkeeren, en men veroorloofde haar daarom nauwelijks de oogen te sluiten. Het behoort ook volstrekt niet tot de bijzonderheden, dat bloedvloeiingen terugkomen en men gedurende den slaap niet zeker is, ja dat zij zelfs onder denzelven veelvuldiger zich plegen te openbaren. Eene zorgvuldige oppasster intusfchen, die getrouw hare taak vervult, en met de verschijnselen, die eene bloedvloeijing voorafgaan en meestal vergezellen, bekend is, en nauwkeurig op dezelve let, zal veel beter handelen, als zij de verlostte door verwijdering van alle stoornissen liever in slaap tracht te krijgen en te houden, dan alle moeite doet, denzelven te storen. Hij, die in de gelegenheid geweest is, om zich door eigene ondervinding te overtuigen, zal voorzeker met mij overeenstemmen, dat niets weldadiger werkt, dan een geruste slaap, gedurende wel-

welken de hoogere werkingen van den geest met het ligchaam rusten, de onstuimige beweging der bloedmasa bedaald is en alleen de voedingsverrigtingen nog voortduren, zoodat de vermeerdering en onderhouding van alle dierlijke stoffen daardoor aanmerkelijker is. Daarbij blijve men niet in gebreke, om de gezonkene krachten te ondersteunen en den terugkeer der bloedvloeijing te behoeden. Ter bereiking van het laatste doel bedekt men den buik nog met geestrijke, aromatieke, bij voorkeur laauwe stovingen, evenwel zonder dat er de buik door gedrukt of bezwaard worde, welke men van de *Species aromatica Ph. B.*, van kamillen en vlierbloemen met een weinig brandewijn of wijn klaar maken laat; tot zachte wrijvingen geve men het *Linimentum volatile* met een weinig *Opium* vermengd, late de kraamvrouw ligt bedekken, over de teeldeelen zuivere, zachte, drooge, witte lappen leggen, de lijdere eene zijdelingsche ligging, zoo mogelijk op matrassen, in acht nemen, en zorge, dat de temperatuur der kamer niet te warm en de lucht zuiver zij. Inwendig moet men in de eerste dagen bij afwisseling nu eens bloedstelpende, dan eens vlug opwekkende middelen geven; zoo als inzonderheid het *Acidum Phosphoricum* in kaneelwater met siroop, bij voorkeur den siroop van kaneel, vermengd met kaneeltinktuur en heulsap, bijaldien het hoest mogt verwekken; hiermede paren men afwisselend een aromatiek water met *Aether* en eene vlugge olie, de *Oleum Cajaputi* of *Menthae piperitae*. Bij het gebruik dezer middelen zij men echter altijd uitermate voorzigtig, en geve ze niet dan



dan bij de dringendste en op de beste gronden steunende aanwijzing, dewijl zij ligt te hevig prikkelen, en ten gevolge daarvan, mischien wel tot eene nieuwe bloeding, ontsteking der baarmoeder, koorts, ja zelfs tot eene *Febris puerperalis* aanleiding geven. Later zijn inzonderheid de kina, in verbinding met de mineraalzuren, naarmate der omstandigheden, het afkooksel met het verdunde zwavelzuur, of eene oplossing van het koud bereide extract met *Acidum muriaticum oxygenatum*, waarbij men eenige *Mucilago Gummi arabici* mengt, aangewezen; men gaat dan allengs van sterke tot sterkere middelen over, tot dat men de genezing met ijzermiddelen, en indien de omstandigheden het toelaten, ook gevoegelijk met staalbaden besluit. Om den buik late men nog lang een' met eiken-, kina-bastpoeder of specerijachtige kruiden gevulden gordel dragen en denzelven inwrijven met *Ung. nervinum*, *Spir. Lavendulae*, de *Mixtura oleosa balsamica*, *Eau de Cologne* enz. in de scheede inspuitingen doen van een aftreksel, van aromatieke, vermengd met zamentrekkende kruiden, met wijn of brandewijn. — Wijders heeft men nog te zorgen, dat zulke kraamvrouwen aan geen al te sterk licht worden blootgesteld, niet alleen omdat het de noodige rust stoort, maar ook spoedig een' nadeeligen invloed op het gezigtwerktuig uitoefent, waaruit men zelfs *Amaurosis* zag ontstaan. — Door den eetregel trachte men de werking der geneesmiddelen te ondersteunen en laat vooreerst om deze reden slechts voedende soepen, in kleine hoeveelheden, trouwens dikwijls; die van slakken en oesters; bij de arme

klas.

klasfe, brij-, meel- en bierfoepen, en dergelijken; voorts ligt vleesch, jong kalfs-, duiven- en hoendervleesch, vervolgens een weinig gebraden, niet te vet vleesch, inzonderheid van wild, nuttigen; trouwens alle fterk prikkelende, zwaar verteerbare en gekruide fpijzen vermijden. Tot drank geve men in de eerfte dagen alleen een dun afkookfel van haverdegort, broodwater, of het *Decoctum album Sydenhami*, bij welke vloeiftoffen men nu eens wat citroenzuur, het eene of andere plantenfap, dan eens een' ligten, belegen Franken-, moezel- of Rijnwijn, of rooden wijn, bij voorbeeld goeden *Medoc*, en dergelijken voegen kan. Eerst in lateren tijd kan men krachtig bier of zuiveren wijn als voedingsmiddel — niet als geneesmiddel — en, bij eene buitengewone zwakte, insgelijks de geleijen van ijslandsche mos, faleb en voornamelijk van den hartshoorn als voedingsmiddel toedienen. — Voor het overige moet de Arts inzonderheid de gefteeldheid en de neiging der ziekte in aanmerking nemen; zelfs na de hevigfte bloedvloeijingen kunnen er zich ontftekingachtige aandoeningen der baarmoeder opdoen, ten gevolge van aangewende, fterke plaatsmiddelen (men zie onder het zevende Hoofdstuk der eerfte afdeeling), hoewel de meest gewone gevolgen, kwaadfappige en dikwerf waterzuchtige ziekten plegen te zijn; doch niet zelden ook krampachtige aandoeningen van alle foort, zelfs *Epilepsie* en eene zekere zwakte van den geest, in het bijzonder van het geheugen terugblijven.



## §. 70.

Bloedvloeiingen, die later of gedurende het kraambd zich openbaren, zijn wegens derzelver hevigheid met zoo veel te meer gevaar vergezeld, hoe korter zij na de verlossing plaats grijpen, offchoon ook naderhand voorvallende en min aanmerkelijke geene al te gunstige voorzegging gedoogen, dewijl zij dikwijls, in den beginne verwaarloosd zijnde, een *chronisch* karakter aannemen. Dezulken, die men meer als eene buitengewone kraamzuivering heeft aan te merken, zullen in het volgende hoofdstuk dezer afdeeling afzonderlijk worden behandeld, reden waarom wij dezelve hier, even zoowel als diegene overflaan, welke in eene gebrekkige ligging der baarmoeder gegrond zijn, vermits deze meer tot het negende Hoofdstuk dezer afdeeling — tot de verplaatsingen der baarmoeder in het kraambd — behooren.

## §. 71.

Hier treft men wel eens eenen *critischen* bloedvliet uit de baarmoeder aan, deels bij ontstekingen van den *Uterus*, der eijerstokken, en van andere, nabijliggende organen, deels bij ontstekingachtige aandoeeningen van boven het middelrif gelegene deelen, deels bij hevige ontstekingskoortsen. De ontsteking der baarmoeder (*Metritis*) herkent men aan de bekende en Hoofdstuk VII. nader op te gevene verschijnselen; de onderscheiding (*Diagnostik*) der overige ziekten evenwel leert men in de bijzondere Geneeskunde. Zulk eene bloedvloeiing heeft meestentijds voorboden, offchoon zij ook maar al te dikwerf ont-

ontbreken. Deze openbaren zich door alle kentee-  
kenen van verhoogde opgewektheid (*Orgasmus*),  
namelijk: door een' vollen, radden, grooten, dik-  
werf harden, doch somtijds ook weeken pols, door  
eene hoogere roode kleur der huid en eene ver-  
meerderde hitte derzelve, door de verschijnselen van  
bloedophooping naar de teeldeelen (*Polyaemia to-  
pica*); door een gevoel van hitte, branding, pijn  
en spanning in den onderbuik, in de lendenstreek  
en het kruis; een dringend gevoel op de teeldee-  
len; menigvuldigen aandrang tot pislozing en bran-  
ding bij het verrigten derzelve; in sommige gevallen  
is de pols aanvankelijk klein en krampachtig, en  
wordt bij het begin der bloeding en kort voor deze,  
volgens BORDEN en VAN SWIETEN, sterker, golvend  
en slaat dubbel; huiveringen en eene hoogst onaan-  
gename en brandende hitte wisselen snel en dikwerf  
af. Het scheidgedeelte is gezwollen, heet, gevoe-  
lig, de afscheiding van de kraamzuivering veelal ver-  
minderd, dikwerf geheel onderdrukt. Treedt de  
bloedvloeijing als eene *crisis*, van aandoeningen der  
boven het middelrif gelegene organen, in, dan wordt  
deze wel eens voorafgegaan van duizeling, fuizing  
en klinking der ooren, van gezichtsvonken, hoofd-  
pijn, ook wel van ijlhoofdigheid, benaauwdheid in  
de ademhaling, hartkloppingen, vliegende steken in  
de borst en opzetting derzelve aan den voorkant.  
Het bloed wordt meestal door de uiteinden der  
slagaders uitgestort, is derhalve dun, vloeibaar, ligt  
rood en heet; nu eens met enkele gedeelten, dan  
eens met eenen aanhoudenden bloedstroom te voor-  
schijn komende. De bloeding zelve openbaart zich



door afzondering, meermalen met doorzijpeling, draagt het karakter van *Synocha*, of meestal van *Erethismus*, en verkeert slechts dan in die van verlamming, wanneer eene te groote hoeveelheid bloeds verloren was gegaan; even als de bloedafzondering tot bloedvloeijing met doorzijpeling, en het karakter van *Synocha* in dat van *Erethismus* kan overgaan. Ten tijde der bloedontlasting nemen de toevallen af, gevoelt de lijderes verligting en de Arts heeft dan slechts tusfchen beide te treden, wanneer, of de hoeveelheid van het verlorene bloed te groot, of de te lange duur der *Haemorrhagie* zijne hulp behoeft. Ontaardt de bloeding in ware bloedstorting, dan moet men tot beteugeling derzelve van alle opgegevene, fterkere middelen gebruik maken; men laat den buik zachtkens wrijven, koude kompresfen op de onderbuikstreek leggen, en voorzigtig koele infpuitingen van water, of water met azijn in de fcheede doen. Inwendig geve men, doch wegens derzelfer prikkelende eigenfchappen en alleen in de dringendfte gevallen, met de grootfte omzigtigheid, die middelen, welke de baarmoederlijke bloedvloeijing dadelijk doen ophouden, zoo als kaneel en mineraalzuren. Dikwerf zijn plantenzuren voldoende, zelfs verkoelende mixturen met middelzouten, inzonderheid de *Tartris Potassae* en het *Nitrum*; opbruifende poeders, eene kleine aderlating op den arm zelfs, zullen van goede uitwerkfelen zijn. In gevallen, waar men alleen op levensbehoud moet werken, zette men alle andere inzigten achterwege. Bij de opvolgende behandeling fchrijve men fchralen, dunnen plantenkost voor, verdunnende dranken, zoo  
als

als *Ptisane imperiale*, en behoeft men geneesmiddelen, dan de *Pulpa Tamarindorum* met een weinig wijnsteen zuur, of het laatste, opgelost in water, met de eene of andere siroop. Dat ook hier, rust, donkerheid der kamer en vermindering van iedere ontsteking door zielsaandoening of lichaamsbeweging ten strengste zijn aan te bevelen, behoeft nauwelijks eenige herinnering. Nopens de geringere, doch te lang aanhoudende bloedvloeijing, verwijzen wij naar het volgende Hoofdstuk.

### §. 72.

Na te sterke lichaamsbewegingen, bij het te vroeg verlaten des beds, na gemoedsaandoening, het gebruik van te verhittende en te prikkelende voedingsmiddelen, ook wel na bijwoning des bijslaaps, van welke onnatuurlijkheid den Schrijver menigvuldige voorbeelden bekend zijn, bij eene te groote kamerwarmte en ook na verkoudingen vindt men bij kraamvrouwen menigwerf genoeg bloedvloeijingen uit de baarmoeder. Al deze schadelijke dingen veroorzaken een' te sterken aandrang van bloed naar den *Uterus*, wiens in de zwangerschap wijder gewordene vaten, die nog niet tot den gewonen staat zijn teruggetreden, de ophooping des te eerder begunstigen, naarmate de baarmoeder voortdurend nog in verhoogde werkdadigheid benevens verminderde spierkracht verkeert. Hoogst zelden zal hier de bloedvloeijing zoo hevig worden, dat men sterkere en meer doorringende middelen behoeft in het werk te stellen; dikwijls slaagt men reeds in de genezing door eenen schralen eetregel, en de bloedvloeijing zelve wordt



gemeenlijk door eenige koude inspuitingen, omflagen, geringe giften van een zacht, verdund zuur en vermindering van de aanleidende oorzaken des gebreks, beteugeld. Lag de oorzaak in den, reeds in de eerste dagen des kraambeds uitgeoefenden, bijslaap, dan verzuime men niet, onder welk voorwendsel ook, om een naauwkeurig onderzoek naar de baarmoeder zelve te doen, vermits hier, even als na sterke ligchaamsbeweging, ligt scheeve liggingen ontstonden, die de bloedvloeijing onderhouden, welke door herplaatsing zeer spoedig, door geene andere middelen echter te stillen is, of in de gevolgen ligt organische gebreken des *Uterus*, geneigdheid tot vorming van schijnvliezen, ook zeer langdurige witte vloed terug blijven. — Bloedvloeijingen na verkoudingen behandelt men met zachte, niet prikkelende, zweetdrijvende middelen, laat de zieke warm bedekken, geve haar warme thee, mixturen met *Spiritus Mindereri* en *Rob Sambuci*; het *doversche* poeder, eene veriadiging van de koolzure potasch met citroen- of azijnzuur en dergelijken. Bij het uitbreken van een algemeen zweet, dat men door wrijvingen des ligchaams met doeken nog kan bevorderen, wordt de ziekte meestal weggenomen, terwijl men dan slechts te zorgen heeft, dat geene nieuwe schadelijke invloeden eene wederinstorting veroorzaken.

### §. 73.

Even als de bloedvloeijing na de bevalling het gevaarlijkste is, als zij op *Atonie* en *Asthenie* gegrond is, zoo is het ook met de baarmoederlijke bloe-

bloedingen in den lateren tijd des kraambeds gelegen, zij mogen dan door algemeene zwakte des ligchaams, des bloedvaatstelsels, of van het afzonderlijke orgaan, der baarmoeder veroorzaakt zijn geworden. In deze gevallen moet men de bloedvloeijing altijd maar zoo spoedig mogelijk, zoeken te stillen, en voorts door eene lang voortgezette, naauwkeurige behandeling eene wederinstorting verhoeden. Men maakt hier allereerst van koude en geestrijke omslagen op den onderbuik, dergelijke inspuitingen, eene met azijn, rooden wijn of brandewijn bevochtigde spons als *tampon* gebruik, inwendig echter geve men het phospherzuur, het zure elixer van HALLER, *Mixtura aromatica acida* Ph. B., de *Ta. acid. aromatica* Ph. B., het *Elix. vitrioli Mynsichti*; de *Tinctura Cinnamomi, aromatica, Ratanhiae, Chinae composita* met eenige droppels van de *Tinctura Opii simplex* of *digitalis aetherea* vermengd; tusfchen beide diene men *Aether* of geestrijke vochten met specerijachtige wateren en een paar droppels eener vlugge olie toe; wijders late men de lijderes menigmalen krachtig vleeschnat en eene lepel goeden, ouden wijn nuttigen, en neme ook hier de §. 68 en 69 opgegevene behandeling in acht. Omslagen met een aftreksel van aromatieke kruiden, deze zelfs in den vorm van pap met een geestrijk vocht besprengd, laat men nog langen tijd daarna over den buik leggen, en later rade men aan, benevens geestrijke en vlugge olieachtige inwrijvingen, waartoe het *Mixtura oleosa balsamica* en *succinea*, het bekende *Eau de Cologne* inzonderheid geschikt zijn, het dragen van



een' buikband, een' gordel, welke met kinapoeder, aromatieke kruiden, of met looistof gevuld is. De algemeene zwakte des ligchaams neemt men door het toedienen van versterkende, bittere, aromatieke middelen weg; aanvankelijk gebruikt men de aftrekfels van den valeriaan-, *calmus*- en den *serpentaria*-wortel, en gaat naderhand eerst tot zachte bereidingen van den kinabast over; men geeft den laatsten dan in een afkooksel of poeder en besluit de genezing met het ijzer, terwijl men te gelijker tijd ook kruiden-, looistof- en op het laatste staalbaden gebruiken laat. Verkeert het vaatgestel in eenen zeer verzwakten toestand, dan pare men met deze middelen nog de mineraalzuren, bij voorkeur het zwavel- of phospherzuur, van welks heilzame werking men het meeste kan verwachten. Bij deze zuren voege men echter altijd het een of ander specerijachtig en bitter middel, ten einde derzelver nadeligen invloed op de spijsverteringswerktuigen eenigermate te voorkomen. De plaatselijke zwakte des *Uterus* moet men met dezelfde middelen trachten te verhelpen, terwijl men inmiddels in de scheede nog inspuitingen doet van een aftreksel van specerijachtige en zamentrekkende kruiden, wortelen en basten met rooden wijn of zelfs met brandewijn. — Zijn verzweringsen in de holte zelve der baarmoeder, of aan haren mond, oorzaak der bloeding, doordien hare vaten gekwetst, of doorknaagd werden, dan heeft men vooral van de aanwending der *tampons* hulp te verwachten; bovendien doet men inspuitingen van azijn, afkooksels van zamentrekkende zelfstandigheden, van brandewijn met water verdund,

en

en laat inwendig de opgenoemde zuren gebruiken. Door de inspuitingen tracht men dan eensdeels de zuiverheid en zuivering der verzwering, anderdeels hare genezing te bewerken, en neemt daartoe zeer geschikt een *Decoctum Hordei* met rozenhonig en *Liquor* of *Tinctura Myrrhae*; inwendig evenwel geeft men spoedig kina, in verbinding met verdund zwavelzuur, ten einde voor hare schadelijke uitwerkselen op het gansche Organismus te zorgen. Zijn het kankerachtige verzweringen, dan rigte men de behandeling in naar de, in §. 765 tweeden deels eerste stuk opgegevene, voorschriften.

#### §. 74.

Niet zelden zelfs vertoonen zich bloedvloeijingen na de verlossing en tijdens het kraambed schier als *epidemisch*, men ondervindt ten minste dikwerf genoeg, dat het grootste gedeelte der kraamvrouwen, hetwelk wij zoo even gelegenheid hadden gade te slaan, daaraan onderhevig is. Volgens des Schrijvers ondervinding ligt dat in de weêrsgesteldheid, daar het of bij eene sterke, drooge hitte, als in de heete zomers van het jaar 1811, 1819 en 1822, of bij eene hevige, drooge koude, of bij zeer vochtig, natkoud weder plaats grijpt. Begunstigen de beide eerste omstandigheden *Haemorrhagiën* in het algemeen en is daardoor derzelver menigvuldige verschijning ligt verklaarbaar, zoo schijnt bij de laatste opgegevene weêrsverhouding de grond daarin te liggen, dat die gesteldheid der lucht tot rheumatismen in het algemeen en derhalve ook tot dat der baarmoeder voorbeschikt, waardoor evenwel onregelmatige



zamentrekkingen des *Uterus* ontstaan. Om deze reden zijn *Metrorrhagiën*, waartoe zulk eene oorzaak aanleiding gaf, meestal met teruggeblevene nageboorten, dikwerf met zamenfnoeringen der baarmoeder vergezeld, of zij openbaren zich later in het kraambed te gelijk met hevige naweeën, blijvende de baarmoeder onder dat alles uitgezetter, dan zij zijn moest. De voor ieder dezer gevallen te pas komende behandeling hebben wij boven reeds opgegeven; nu eens zullen verkoelende, bedarende, dan weder meer zweetdrijvende middelen, benevens spoediger bloedstillende geneesmiddelen aanprijzing verdienen, al nadat de aard der ongesteldheid meer tot het ontstekingsachtige of rheumatische overhelt; wat echter de behandeling en de vereischte voorschriften bij teruggeblevene nageboorten en zamenfnoeringen der baarmoeder betreft, dienaangaande verwijzen wij naar een ander gedeelte dezes werks (§. 1589 en volgende).

### §. 75.

Wij moeten te dezer plaatse nog van bloedvloeiingen gewag maken, welke onmiddellijk na de verlossing, als ook in het kraambed voorkomen, ten gevolge eene aderspattige ongesteldheid der baarmoeder. Dit is een toestand, welke inzonderheid bij gegoede, weinig lichaamsbezigheden verrigende vrouwen, die goed voedsel en verhittende dranken gebruiken, en eene zittende leefwijs hebben, dikwerf genoeg plaats heeft. Men herkent denzelfden, aan den meer dan gewoonlijk oneffen *Uterus*, van welken men onderscheiden aderen, dikwijls zelfs door de buikbe-

bekleedselen henen, en welker uitzetting men aan den hals en mond der baarmoeder, duidelijk door de scheede ontwaren kan. Gelijktijdig bemerkt men aan den aars gezwollen aderen, zelfs aanbeijen; de leverstreek is dikwerf eenigzins uitgezet, niet zelden pijnlijk; de kleur der huid, bovenal die des gezichts meer naar het gele hellende. Te voren werden deze vrouwen gekweld door vloeiende of blinde aanbeijen, en pijnlijke, meestal overvloedige maandelijksche zuiveringen; wij moeten hier nogtans doen opmerken, dat somtijds eerst in de zwangerheid de voorbeschiktheid tot wezenlijke ziekte overgaat. De bloedvloeiing bestaat, wel is waar, somtijds, hoewel zelden, in eene ware bloedstorting; gewoonlijk alleen bij de verscheuring eener zeer opgezwollene ader; anders draagt zij meer het karakter van *Erethismus* en openbaart zich met doorzijpeling. Plotsefelijk levensgevaar zet alle andere plannen ter zijde; anderzins zij men toch bij de behandeling zoo voorzigtig mogelijk, omzigtig met de aanwending van te hevige koude, zoowel uitwendig als op de gewonde plaats zelve, doordien zij even als zamentrekkende inspuitingen, *tampons* met bloedstelpende middelen en dergelijken gelegenheid geven tot vorming van bloedklonters en vliezen, waaruit dan ligtelijk knoestgezwollen en kanker des *Uterus* ontstaan, tot welke verschrikkelijke ziekte met aanbeijen behepte vrouwen bovendien reeds aanleg hebben. Men vermijde inwendig tevens, tenzij dringende omstandigheden ons daartoe nopen, alle sterke middelen, en lette vooral op eene doelmatige, opvolgende behandeling, ten einde alle beletselen in den

bloeds-



bloedsomloop des onderbuiks weg te nemen , waartoe de Schrijver inzonderheid het gebruik der *Kissinger* mineraalbronnen kan aanbevelen , van welke hij , zelfs in de hagchelijkste gevallen , de heerlijkste uitwerkselen zag.

### §. 76.

Reeds maakten wij melding van vrouwen , die na een weinigbeteekenend bloedverlies op de verlosfing plotseling sterven , zonder dat men eene zekere oorzaak voor den dood kan opsporen ; waarom leeken dan ook onvoorwaardelijk den Verloskundigen beschuldigen , en de bloedvloeijing , hoe gering zij ook geweest zij , voor de oorzaak des doods (*causa mortis*) houden. In drie volkomen gelijke gevallen , die de Schrijver waarnam , vond hij , toen bij twee de lijkopening dezelfde , nogtans geene bevredigende uitkomsten opgeleverd had , bij het laatste , hetwelk men aan het ruggemerg opende , *waterzucht* van het ruggemerg en ontsteking van deszelfs scheede. Bij eene zwangere , waarbij dergelijke verschijnselen , als bij gene ongelukkigen zich openbaarden , maakte de Schrijver gebruik van *Antiphlogistica* , in het bijzonder van bloedzuigers op de ruggegraat , en het gelukte hem deze persoon te redden , hoewel ook bij haar na de verlosfing stuipen zich opdeden. Wij zijn van gevoelen , dat er alleen iets van geneeskundige hulp kan verwacht worden , bijaldien men tijdens de zwangerheid het gebrek herkende en doelmatig behandelde. Thans doet het ons echter genoegen , Artfen en Vroedkundigen daarop te hebben opmerkzaam gemaakt , en hopen spoedig iets uit-

uitgebreider daaromtrent in ons *Journal* voor de verloskunde, de ziekten van het vrouwelijk geslacht en jonggeborenen te kunnen mededeelen.

§. 77.

De bloedvloeijingen in het kraambed zijn dikwijls met andere ongesteldheden gecompliceerd, als met krampachtige perfsingen op den endeldarm (*Tenesmus*) en maden (*Ascariden*) (de laatste niet slechts in den endeldarm, maar ook in de scheede) die door hare prikkeling oorzaak van baarmoederlijken bloedvliet worden, hevigen hoest, die of uit eene gelijke oorzaak ontstond, of door de door denzelfden te weeg gebragte schudding, aanleiding tot bloeding gaf, of eene nederzakking, of eene andere soort van verplaatfing veroorzaakte, ten gevolge waarvan zich de bloeding openbaarde; een' galachtigen toestand (*Status biliosus*), die zich tijdens de *Metrorrhagie* opdoet, hetwelk STOLL meermalen waarnam; huiduitslag van een' acuten aard, als mazelen en roodvonk, waarbij de bloeding fcheidend of ook wel als ontbindend werkt; eindelijk heeft men nog tusfschenpoozende koortfen in het kraambed waargenomen, welker verheffing (*Paroxysmus*) telkens met eene *Haemorrhagie* uit de baarmoeder vergezeld ging.

§. 78.

Den *Tenesmus* bestrijdt men met flijmige en vette oliën vermengde klisteren, waarbij men tevens een of ander verdoovend middel voegen kan; inwendig late men *Emulsiën* van amandel- of maankopolie met arabifche gom en eenig heulfap of het *Pulvis Doveri* vereenigd, gebruiken, en behandelt anders  
den



den aanwezigen buikloop naar deszelfs aard. Tegen de maden verdienen lavementen van een afkookfel des ajuins, des knoflooks, des stinkenden afants (*Asa foetida*) met water of melk, ook van den valeriaan, het wormkruid, den rijnyaar of de fenna-bladeren, aanprijzing; ook de oplossingen der zoutzure foda, der *Nitras* en *Tartris Potassae*; doch de Schrijver vond inzonderheid veel baat bij wasschingen, waarin van het bijtende salpeterzure zilver (gr. 1 op  $\frac{3}{4}$  vj—viij) opgelost was. De inwendige behandeling, ter verbetering van de gestoorde spijsvertering en den slijmachtigen toestand, welke de wormen voortbragten, kan natuurlijkerwijze eerst later worden in het werk gesteld. — Den hoest zoekt men door *sal ammoniac*, het bilsenkruidextract, het laurierkers- en bittere amandelwater te matigen, terwijl men inzonderheid de laatste middelen in den vorm van een' *Linctus*, met eenigerhande slijmig middel en siroop — bij voorkeur met *Syrupus Althaea* — voorschrijft, waarmede men echter alleen laauwe, slijmige dranken gebruiken laat en voor eene matig warme temperatuur der lucht in de kraamkamer zorg draagt; met de eene of andere ontstane verplaatsing des *Uterus* handelt men evenwel, zoo als wij verder naar onder nog zullen opgeven. — De met een' galachtigen toestand gepaard gaande *Metrorrhagiën*, plegen gemeenlijk, zoo als deze zelve, *epidemisch* voor te komen, en schijnen enkel van de prikkeling der gal op de maag af te hangen. De herkenning van deze oorzaak en van dezen toestand is niet moeilijk; de genezing vordert, bijaldien het eene zeer hevige en levensgevaar dreigen-

gende bloedontlasting is, plaatselijk en inwendig de aanwending van al die middelen, welke de bloeding regtstreeks en snel beteugelen, alsdan evenwel, en als zij minder hevig is, trachte men de oorzaak weg te nemen, namelijk de te overvloedige afscheidene gal, door een braakmiddel van de *Radix Ipecacuanhae* te ontlasten en de behandeling volkomen tegen den galachtigen toestand in te rigten. — Ook bij huiduitslagen treft men bloedvloeijingen uit de baarmoeder in het kraambed aan. De Schrijver zag dezelve bij een purperachtig gierstuitslag (*Miliaris purpura*), dat door eene te groote warmte van het bed en eene over het algemeen te verhitte levensregeling ontstond en slepende werd gehouden, mischien meer als gevolg van dezelfde ziekteoorzaak, offchoon ook naderhand het uitslag spoedig zonder eenig nadeelig toeval verdween; meermalen echter ook nog bij deze uitslagziekte, als scheidend voorkomen, en even zoo bij het uitkomen des scharlakenuitslags en der mazelen, waarop spoedig beterschap volgde. Blijkt het uit de verschijnselen, dat de bloedvloeijing scheidend (*critisch*) is, dan heeft de Arts niets te doen, dan haar te stillen en te matigen, indien zij te sterk of slepende wordt. Zoo lang zij niet in ware bloedstorting ontaardt, de krachten niet te zeer zinken, de pols niet al te snel en klein wordt, de huiduitslag niet plotselijk bleek wordt, verdwijnt, het gezigt invalt, eene reutelende ademhaling zich openbaart en dergelijke nare verschijnselen meer, dan kan men onbezorgd en gerust zijn. Alsdan heeft men alleen uitwendige middelen noodig, als omslagen en inspui-

tin-



tingen, inwendig hoogstens een verkoelend, zuurachtig middel, zoo als een afkookfel der tamarindevruchten met wijnsteenzuur, of eene goede limonade, of water met frambozen- of roode besfenazijn. — Hoogst verderfelijk nogtans is de baarmoederlijke bloedvloeijing bij kraamvrouwen, zoodra zij duidelijke kenmerken van ontbinding met zich draagt, welke men niet zelden in het laatste tijdstip van rotachtige koortsen, teringachtige en uitterende ziekten aantreft. Hier haaste men zich der bloeding door uitwendige middelen paal en perk te stellen, en verzuime niet door groote, dikwerf herhaalde giften van de sterkste, inwendige geneesmiddelen, der mineraalzuren met *Naphtha* en vlugge oliën, kina, *Opium* enz. de zinkende en bijkans uitgedoofde levenskracht te ondersteunen en te behouden. Voor het overige moet de Arts zijne wijze van behandeling meer naar de oorspronkelijke ziekte inrigten, op welker geneeslijkheid de voorzegging zich insgelijks grondt. Buiten deze gevallen kan de bloedvloeijing zich met eene afwisselende koorts vereenigen, en wel zoodanig, dat bij elk begin der verheffing ook eene bloeding uit de baarmoeder te voorschijn komt. De bloeding zelve zoekt men hier te matigen, waartoe men zich van de reeds meermalen genoemde uitwendige middelen, gewijzigd naar het karakter der bloeding en den algemeenen toestand, bedient; men zij nogtans indachtig, dat men hier dikwerf zal genoodzaakt worden, om van warme, specerijachtige omslagen en inspuitingen gebruik te maken, bijaldien de bloedontlasting tijdens strenge koude voorvalt, en dat men van de inwen-

di-

lige middelen de te prikkelende en het vaatgestel te sterk aanzettende vermijden moet, hoewel ook onder bijzondere omstandigheden terstond het gebruik van kaneel en heulsap kan aangewezen zijn. Gedurende de afwezigheid der koorts (*Apyrexie*) dient men de kina in groote giften toe, nadat men alvorens, als de teekens van *gastrische* onzuiverheden het vereischen, een braak- of ontlastmiddel had ingegeven. Hier verdient voornamelijk aanprijzing de *Sulphas Quininae*, van twee tot vijf greinen alle drie of vier uren, met eene oliesuiker verbonden, het in een kina-afkooksel of aftreksel opgeloste, koud bereide extract, bij welk mengsel men des noods nog eenig fijn kinapoeder in zelfstandigheid voegt, ten einde deszelfs werkzaamheid te verhoogden. Zelfs laat men daarna den Peruviaanschen bast nog een paar dagen voort gebruiken, waartoe men of het in een aromatiek water opgeloste extract, het aftreksel of het afkooksel, bij eene goede en sterke spijsvertering zelfs het poeder, dat men met eene oliesuiker, of het *Pulvis aromaticus Ph. B.* zeer gevoegelijk verbindt, nemen kan.

### §. 79.

Nadat de gevallen van baarmoederlijke bloedvloeiingen, welke na de verlossing en tijdens het kraambed zich kunnen vertoonen, zoo ver als het doel en plan dezes werks dit vorderde, afgehandeld zijn geworden, gelooft de Schrijver, dat het nutteloos, noch menigen beginnenden Arts en Verloskundigen onaangenaam zal zijn, wanneer hij aan het einde dezes Hoofdstuks nog eenige korte aanmerkingen,



over de , bij *Metrorrhagiën* aangetreffe, middelen en derzelver toepasselijk gebruik laat volgen, en voor een ieder derzelve de gevallen worden opgegeven, waarin hetzelfde aanwendbaar en van nut kan zijn. Eene veeljarige en uitgebreide praktijk veroorloofde den Schrijver de meesten zelf te beproeven, de waarnemingen, welke hij als consulerend Arts gelegenheid had te maken, maakte hem met de overigen bekend.

### §. 80.

Deze middelen §. 79 zijn naar derzelver wijze van aanwending drieledig: 1) in zulke, welke uitwendig worden aangewend — omslagen, drukking, voet- en handbaden; — 2) plaatselijke, waartoe de inspuitingen in den *Uterus* en de scheede, de *tampon*, de binnenvoering der hand en ook de lavementen in den aars behooren; en 3) het groote getal van inwendige middelen, de werkelijke geneesmiddelen. Geen dezer middelen kan men deszelfs waarde ontzeggen, voor ieder derzelve kan een bijzonder geval zich opdoen, waarin hetzelfde het nuttigste en werkzaamste is, offchoon ook het eene boven vele anderen eene uitgebreider aanwending toelaat. De ondervinding heeft den Schrijver overtuigd, dat bij hevige bloedvloeijingen, bij welke het bloed stroomswijze zich uit de scheede stort, en bij elken bloedvliet uit den *Uterus*, de uitwendige en plaatselijke middelen het meeste afdoen, zoodra het er op aankomt, de bloeding te stillen, terwijl de inwendige, *dynamisch* werkende medikamenten onontbeerlijk zijn ter beteugeling der gelijktijdig verschij-

ſchijnende nadeelige toevallen, ten einde de terugkeering der bloeding voor te komen en naziekten te verhoeden. Men zij nogtans bij de keuze eens middels, waarvan men gebruik maken wil, voorzigtig, en verkieze niet te roekeloos een derzelve, welks aanwending in het vervolg meer kan ſchaden, dan het op dezen oogenblik nut verſchaft; men beproeve eerst de zachtere, nimmer ſchadende, en ga niet eerder tot de ſterkere en meer vermogende middelen over, voordat de andere de verwachting hebben te leur geſteld. Is trouwens de bloedſtorting zoo hevig, dat zij met gevaar voor het leven dreigt, dat men alleen van de ſpoedige ſtilling derzelve nog iets verwachten kan, dan zij men ſtoutmoedig en beſluitvaardig, zelfs bij het gebruik van de ſterkſte middelen, en neme datgene, van hetwelk men redding hopen en verwachten kan. Zeer dikwijls gelukt het eener bedachtzame en bedaarde handelwijs, door afwiſſelende middelen, door vervanging van het eene voor het andere, ook dan nog te helpen, als alle hoop reeds verloren ſchijnt; en niet zelden doet nog in zulke gevallen, bij welke de oorſprong en de oorzaak der bloedvloeiing duister is, daar de Arts ook menigwerf, als hij bij de verloſſing niet tegenwoordig was, voorbedacht door vroedvrouwen en aanwezigen, om den tuin wierd geleid, een minder ſterk middel den beſten dienst, nadat men de ſterkſte reeds zonder gevolg had aangewend. Voor het overige raadt de Schrijver de organen van de borst met oplettendheid gade te ſlaan, en vooral bij geringe, doch aanhoudende baarmoederlijke bloedvloeiingen en eenigen



aanleg tot tering, elk middel te vermijden, dat der longen schadelijk zoude kunnen zijn; insgelijks gamen niet te lang daarna voort met prikkelende, opwekkende medikamenten, want maar al te ligt worden zij de aanleidende oorzaak tot kwaadaardige ontstekingen en koortsen, ja zelfs van den dood.

### §. 81.

Onder de uitwendige middelen is 1) het meest gebruikelijke, en bij alle bloedvloeijingen uit de baarmoeder, inzonderheid bij die, welke onmiddellijk na de verlossing zich openbaren: *het zachte wrijven van den buik*; en men moet bekennen, dat er geen ander middel bestaat, hetgeen bij volkomene onschadelijkheid, zoo zeer bij alle soorten van *Metrorrhagiën* te pas komt, als juist dit. Daardoor wordt op eene zachte manier de zamentrekkingskracht in den *Uterus* opgewekt en verhoogd, zonder dat er eene groote prikkeling door te weeg wordt gebracht en bijkans nimmer zal men een door hetzelfde veroorzaakt nadeel kunnen aanwijzen. Bij eene ongelijke en krampachtige, gedeeltelijke zamentrekking matigt het den *spasmodischen* toestand en bepaalt eene gelijkmatige *contractie*; het bevordert de afstooting van teruggeblevene gedeelten der nageboorte of *Mola*; en kant zich tegen de *Atonie* en *Asthenie* aan, en men dwaalde voorzeker, als men de wrijvingen des buiks geheel en bij uitsluiting tot de werktuigelijke middelen rangschikken wilde. Het is zelfs bij eenen *subinflammatorischen* toestand des *Uterus* niet te verwerpen, alleenlijk echter bij eene klaarblijkelijke ontsteking, zullen de daar-

daardoor noodwendig opgewekte pijnen, deszelfs aanwending verbieden. — 2) Een dergelijk middel als het voorgaande is *de uitwendige drukking*; slechts niet zoo algemeen aanwendbaar, naar den graad van drukking verschillend in hare werking, bij menigen toestand in eene hoogere mate zelfs gevaarlijk zijnde, zoo moeten wij de gevallen, in welke zij te pas komt, nader bepalen. Men bewerkstelligt dezelve of door de oplegging der handen, eenen buiksband, of door een overgelegd zwaar ligchaam. Men ontmoet, zoo als wij boven reeds aanhaalden, eene bloedvloeijing, waarbij de baarmoeder zich weder op nieuws begint uit te zetten, en deze is, tenzij haar inwendig opgehoopt bloed, als werktuigelijke oorzaak, te weeg bragt, het gevolg van *Atonie* en *Asthenie* van het werktuig zelve en altijd een bedenkelijke toestand. Hier ondervond de Schrijver, van de op den buik, ter wederzijde des *Uterus* vlak aangelegde handen, met welke hij de baarmoeder aanvankelijk zacht, daarna sterker zamendrukte, of ook van eenen aangelegden buikband, zeer veel nut; de drukking nogtans moet gelijkmatig zijn, opdat er niet eenigerhande gedeelte bij de aanwezige verslapping, bij het sterkere drukken van eene plaats, zich naar binnen keere. Andere drukking, als met het opleggen van een' met nat zand opgevulden zak, kan de Schrijver niet aanprijzen, daar hij denzelven of te vergeefs aanwendde, of na deszelfs gebruik eene volflagen binnen-buitenwaartskeering des *Uterus* zag ontstaan, offchoon hij zeer wel weet, dat vele Artsen en Vroedkundigen de voordeelen roemen, welke dit middel hun verschafte.



Het door MOHRENHEIM, indien ik niet mistaste, in zijne *Synopsis* aangehaalde voorbeeld van eenen boer is bekend, welke bij zijne zoo pas, op de straat, bevallene vrouw de *Metrorrhagie* stilde, door zich zelve op haren buik te plaatsen. — Bovendien zijn doelmatige buikbanden van uitstekenden dienst, voornamelijk dan bij aanvankelijke herstelling, als een zoogenaamde *Hangbuik*, of slechts eenige voorbeschiktheid daartoe bestond, dewijl daardoor de organen van den onderbuik in hunne ligging ondersteund, en de hieruit voortspruitende ongeregeldheden in den omloop voorkomen worden; gelijktijdig echter kan men deze banden, zoo als wij reeds opgaven, met versterkende middelen, waartoe bij gegoeden inzonderheid de kina en de *Species aromatica*, *Ph. B.*, bij armen de gewone looistof zich aanprijzen, opvullen en dragen laten. Tegenaanwijzingen voor de drukking zijn alle onnatuurlijke liggingen des *Uterus*, uitgezonderd de vooroverkeering (*Anteversio*), tegen welke buikbanden bij voorkeur zeer dienstig zijn. — 3) *Omslagen* over den buik, zoowel koude, als warme, worden niet minder menigvuldig aangewend en geprezen. De werkzaamheid van beide soorten grondt zich op de door hun vermeerderde zamentrekking, en van zelven vloeit hier reeds uit voort, dat derzelver gezegende of schadelijke uitwerking alleen zal afhangen van de juiste bepaling des toestands, waarin de baarmoeder op dien oogenblik verkeert. — *Koude* omslagen zijn dienstig: bij eene ontflekingachtige aandoening des *Uterus*; bij eene ongelijke zamentrekking, voor zoo verre deze op gedeeltelijke zwakte steunt; bij kwetsing van

vaten, of wijd geopende monden derzelve (zoo als bij de bloedvloeijing met doorzijpeling); bij algemeene *Atonie* en *Asthenie* der baarmoeder, voornamelijk als derzelve oorzaak uit eene alvorens plaats gehad hebbende te sterke uitzetting ontstond, door welke het spierachtig weeffel des *Uterus* verzwakt werd. Daarentegen zijn warme omslagen van nut, bij voorbeeld van een kamillenaftreksel, bilsenkruidafkooksel, of volgens de bijzondere aanprijzing van eenige Engelsche Geneesheeren van een aftreksel der *Belladonna*, in al die gevallen, waar iets krampachtigs tot de bloeding aanleiding gaf, zoo als bij de zakbesluiting der nageboorte, door eene gedeeltelijke kramp des *Uterus*; bij ongelijke zamentrekking deszelven, ten gevolge van ongeregelde zenuwwerking; bij de min hevige bloedvloeijingen, die door *Mola's*, terugblijffels der nageboorte, gedeelten der *Decidua*, nog te vast met den *Uterus* verbonden, veroorzaakt worden. Ook dan verdienen laauw-warme omslagen aanprijzing, als er nog eene zekere onnatuurlijke uitgezetheid des *Uterus* overbleef; bij aanmerkelijke kwetsingen van denzelven; bij goedaardige verzweringen van de baarmoeder en van haren mond, als ook bij en na bloedvloeijingen, die haren oorsprong aan eene gevatte koude verschuldigd zijn. Bij verplaatsingen der baarmoeder heeft men niet veel goeds van dezelve te verwachten, slechts na de herstelling van eenen binnen-buitenwaartsgekeerden *Uterus*, evenwel zal men eerst koude en vervolgens laauwe omslagen over den buik met nut gebruiken. Men zorge slechts, dat zij niet te warm gemaakt worden, en late liever stovingen (doeken in eenigerhande af-



trekfel of afkookfel gedoopt), dan pappen aanleggen, daar de laatste veelal te zwaar zijn en drukken. Of men zich van water, azijn of aftreksels van zamentrekkende, specerijachtige of ook van slijmige kruiden bedienen zal, moet uit de omstandigheden blijken. — 4) Inwrijvingen op de onderbuikstreek van vlugge, geestrijke vloeistoffen en zalven zijn natuurlijk niet dan bij eenen zeer verzwakten toestand te billijken. Zij werken gedeeltelijk door de, bij derzelver aanwending noodzakelijk plaatsgrijpende, wrijving, gedeeltelijk door hare opwekkende en versterkende kracht, of hare krampwerende eigenschappen. Het met de vloeijende *Ammonia* en eene vette olie gemaakte smeersel kan men zoowel bij groote zwakte, als ook bij krampachtige en ongelijkmatige zamentrekkingen gebruiken, en tot het laatste doeleinde zal hetzelfde nog werkzamer zijn, als men bij hetzelfde eenig heulsap doet en voorts den buik met verwarmde doeken bedekken laat. Een ontstekingsachtige toestand gedooft alleen vette oliën, als het *Oleum Hyoscyami* of *Chamomillae coctum*, doch bij eenig vermoeden omtrent denzelven, is reeds de bijvoeging van *Opium* niet volstrekt te billijken, zelfs al was de toestand van een' meer of min krampachtigen aard. Geestrijke inwrijvingen zullen voornamelijk bij de verdere behandeling te pas komen, zoowel om den *Uterus*, als de nabijgelegene deelen te versterken. Zelfs bij eene hevige bloedvloeiing, zoo zij op gebrekkige zamentrekking zich grondde, is de besprenging met koud water, eene soort van drop- en stortbad, de opdruppeling van *Aether*, wrijving met *Alcohol*, *Spiritus Lavendulae*,  
*Eau*

*Eau de Cologne* zeer doelmatig en nuttig. 5) LEAKE en CHAUSSIER geven den raad, om de onderste ledematen *koud te baden*, of met door koud water bevochtigde doeken te omhullen. Wij voor ons willen wel gelooven, dat dit middel in ettelijke gevallen, voornamelijk bij aanmerkelijke ophooping en naar de onderste deelen, nuttig kan zijn en ook dat hetzelfde werkelijk zoo is, intuschen zijn wij ook verplicht, om tegen deszelfs aanwending te waarschuwen, dewijl zeer ligt hersen- en longontsteking, of hevige koorts, *Rheumatismus*, de *Phlegmatia alba dolens*, zogverplaatsingen enz. daaruit ontstaan kunnen. Wij zijn ten minste den raad verschuldigd, om het alleen in zeer twijfelachtige gevallen in het werk te stellen, doordien bij geen levensgevaar dreigende bloedingen andere middelen deszelfs plaats kunnen vervullen, en het van hetzelfde te duchtene gevaar, in geene verhouding met het tegenwoordige staat. — 6) Minder beschroomd kan men zijn bij de aanwending van *warme handbaden*, welke als een uitnemend en doelmatig afleidend middel volstrekt geen gevaar met zich voeren. Zij verdienen bij iedere hevige bloedvloeijing aanprijzing en doen altijd eenig nut. In plaats van deze, kan men, vooral bij mangel aan geschikte vaten, in warm water natgemaakte doeken nemen en met dezelve de armen omwikkelen, of met verwarmde wollen doeken bedekken. Op mijne eigene ondervinding kan ik het bedekken van het bovenligchaam in het algemeen, en inzonderheid van de borst zeer aanprijzen, dewijl daardoor menigwerf bijkomende beklemde en krampachtige ademhaling, zelfs slaauw-



ten verhoed en weggenomen werden. Algemeene baden zullen wel niet dan in de zeldzaamste gevallen geoorloofd zijn. — 7) De met lof bekende *kopglazen* en *spaansche vliegenpleisters* op de borst zijn wel in de meer chronische en buiten de zwangerschap en het kraambed voorkomende bloedvloeiingen zeer dienstig; trouwens hier werken zij te langzaam, en zijn te vermijden, uit hoofde zij de borsten beleedigen, tot stilling ongenoegzaam of tot borstabscesfen en roosachtige ontstekingen aanleiding geven. — 8) *De binding der ledematen* werd door vroegere en latere Schrijvers nu eens verworpen, dan wederom aangeprezen. Wij voor ons kunnen op eigene ondervinding daarover geene uitspraak doen, daar het ons dusverre altijd gelukte, om meester over de bloedstorting te worden, bijaldien tijdig genoeg onze hulp werd ingeroepen en geen ander gelijktijdig, levensgevaardreigend toeval elke poging vrijdelde. LE ROUX en LEAKE verwerpen dezelve geheel, en JÖRG denkt ook zoo, dewijl door de zamendrukking der aderen, de overgang des slagaderlijken bloeds belet, en alzoo de aandrang des bloeds tot de bloedende slagaderen moet vermeerderd worden. „Doch,” zegt REIL, „deze tegenwerping betreft enkel de binding der onderste ledematen.” Ik voor mij omhels liever het gevoelen van J. P. FRANCK, welke in zijn *Epitome de curandis hominum morbis* (Lib. V. Pars II. §. 586) zegt: „*Magna quondam fuit, sed a circuli humorum doctrina non parum infrangi credebatur, fasciarum in sanguinis profluvio sistendo auctoritas. Ipse quidem sanguis per venas,*

*a ligitura arctatas, suo in itinere retentus, cruori novo per arterias contiguas adverte resistere, — hic vero, a corde, potentius irritato, liberiora in vasa urgeri, ac pervia vasorum per ostia facilius expelli videbatur. Haec interim cum rerum magistra, experientia, non satis et ubique correspondet theoria; ac licet aliquando nil, venas ligasse conduxerit: est tamen in fascis, recte, ne arterias majores simul conprimant, applicitis, non exigua sistendi profluvii cruoris asthenici utilitas. In longum quidem tempus hoc fasciarum non extendi videtur beneficium; sed jam summi momenti est, sub his extremis angustiis, artificialis haec, et singulos ad artus extensae, species lipothymiae, et sanguinis a loco profluvii vel brevior adversio. Sub his scilicet, tum vasis, a sanguinis torrente extensis, contractionis spontaneae conceditur libertas; tum cruoris, ut illorum ad oras in thrombum cogatur, occasio porrigitur; ac felix nonnunquam in viscere infirmo mutatio succedit.” (\*)*

§. 82.

(\*) Eertijds hadden de *bindsels*, ter beteugeling van den bloedvliet, offchoon het alles behalve met de leer van den omloop der vochten schein overeen te stemmen, zeer veel gezag. Want het bloed zelf, in de aderen, omgeven door het bindfel, in zijnen loop teruggehouden, schein aan nieuw bloed, uit de aangrenzende slagaderen komende, wederstand te bieden, — dit echter door het hart al sterker aangezet, in de ruimere vaten voortgestuwd, en gemakkelijker door middel van de opene monden derzelve, uigestort te worden. Deze Theorie stemt intusschen met de ondervinding, de beste leer-



## §. 82.

Tot de *middelen*, welke men plaatselijk op den *Uterus* vermag aan te wenden, behooren: 1) inspuitingen in de scheede en den *Uterus*, de zoogenaamde *baarmoederklisteren*, welke voorzeker wel bij iedere bloedvloeijing aangewend worden, doch ook bij iedere bijkans aangewezen zijn. Zoodra men toestemt, dat zij van een uitgebreid nut zijn, uitgezonderd de weinige gevallen, waarin men vreest, dat zij der vorming van een' bloedklonter hinderlijk zijn, dan schijnt het noode- en nutteloos, nu nog iets over haar gebruik te zeggen. Let men echter op de onderscheidene vloeistoffen, welke men tot dezelve heeft aangeprezen, daar het nu eens koud of warm water, dan eens azijn, nu eens brandewijn,

leermeesteresse, niet genoegzaam en overal overeen; en gesteld dat het binden der aderen er soms niet toe zal gedaan hebben: zoo hebben trouwens de bindingen, wel aangelegd, mits zij niet tevens de groote slagaderen drukken, geen gering vermogen in het beteugelen van een' *asthenischen* bloedvliet. Van langen duur nogtans schijnt deze heilzame werking niet te zijn; maar van het hoogste belang is, in dien uitersten nood, deze soort van *kunstmatige flauwte*, die tot alle ledematen zich uitstrekt, en zelfs de kortere bloedafwending van de plaats, waaruit het voortvloeit. Hierdoor wordt namelijk, zoowel aan de vaten, verwijd door den stroom des bloeds, vrijheid gegeven om zich van zelve zamen te trekken; als ook aan het *plastische* gedeelte des bloeds gelegenheid verschaft, zich tot een' bloedprop te zetten; zoodat niet zelden alsdan in het verzwakte werktuig eene gelukkige verandering plaats greep.

wijn, dan weder aromatieke of zamentrekkende af-  
trekfels, of zelfs oplosfingen van sterke metaalaar-  
dige zouten waren, welke men naar de volgorde  
daarvoor opgaf, zoo zal misfchien eene korte ver-  
melding der gevallen, waarin ieder dezer in fterkte  
en warmtegraad verfchillende middelen te pas komt,  
niet geheel en al nutteloos zijn. Het is, wel is  
waar, eene algemeene en bevestigde ftelregel, dat  
warmte, en vooral vochtige warmte, elke bloeding  
vermeedert, doordien de vermeerderde uitzetting  
van de uiteinden der vaten het meer in omvang  
toegenomene bloed niet wederftaan kan; doch in  
die gevallen, waar een krampachtige toefland enkele  
deelen des *Uterus* tot zamentrekking noopt, terwijl  
het overige gedeelte langzaam daartoe overgaat,  
zoodat nu eens de geheele baarmoeder krampachtig  
in de hoogte getrokken, dan eens de baarmoeder-  
mond alleen gefloten wordt, dan wederom zamen-  
fnoeringen in het midden der baarmoeder plaats  
grijpen, zijn laauwe injectiën in de fcheede en baar-  
moeder van nut, dewijl zij krachtig medewerken,  
om de onregelmatige zenuwwerking tot haren gere-  
gelden ftaat terug te brengen. Hier verdienen bo-  
ven het enkele koude water, de aftrekfels van ka-  
millen, van valeriaan, van bilfenkruid, der dollen  
kervel enz. voornamelijk aanprijzing. — Active  
bloedvloeiingen met het karakter van *Synocha* en  
*Erethismus* daarentegen vorderen veeleer de koude  
infpuitingen van water, of azijn met water verdund;  
bloedingen echter, met het karakter van *Erethis-*  
*mus* zich voordoende, kunnen ligt ten gelijken tijde  
met een' krampachtigen toefland vergezeld zijn, en  
als-



alsdan verdienen laauwe inspuitingen de voorkeur. — Bloedingen met het karakter van verlamming vereischen koude inspuitingen, deels enkel van water, deels van meer prikkelende en sterkere vloeistoffen, zoo als van water met wijngeest, aromatieke afkookfels, vermengd met een weinig *Alcohol*, of ook van azijn. — Azijn, wijngeest en zamentrekkende middelen, bij voorbeeld afkookfels van den eikenbast, *Tormentilla*, *Bistorta*, oplosfingen van aluin en vitriool zijn daar aangewezen, waar de bloeding door verscheuring der vaten (*Rhexis*) of verwonding (*Diaresis*) ontstond, als ook bij die, wier oorzaak op doorknaging (*Diabrosis*) gegrond is. Bij diegenen, welke door doorzijpeling (*Anastomosis*) ontstaan, zijn dezelfde middelen aangewezen, men voege slechts bij de hier opgegevene vloeistoffen nog iets slijmachtigs, opdat er zich een bloedprop vorme. Bij verlamming (*Paralysis*) gebruike men het sterkste dezer middelen, zelfs zuiveren brandewijn. Doch wij mogen de opmerking niet verzwijgen, dat men met de inspuitingen zeer omzigtig moet te werk gaan; wijl niet zelden de oorzaak van later verschijnende ongesteldheden, als van de baarmoederontsteking (*Metritis*), *Rheumatismus* derzelve, langdurige vloeijingen, zelfs van ziekelijke voortbrengfels, daaruit voortspruiten. In den lateren tijd des kraambeds, namelijk, zij men niet te voorbarig met het doen van koude inspuitingen, dewijl hier de gevallen, waarin zij te pas komen, slechts uitzonderingen op den algemeenen regel zijn (\*). —

Reeds

(\*) Onze beroemde landgenoot, de Hoogleeraar

Reeds in de vroegste tijden prees men de zoogenaamde *baarmoederproppen* bij baarmoederlijke bloedingen, van welken aard ook, en wendde men hen aan. In lateren tijd heeft men hen verworpen, doordien men de zuiver werktuigelijke beschouwingen varen liet, en betere, onschadelijker en bij hunne aanwending minder pijnlijke middelen kennen leerde. LE ROUX prees wederom op nieuws tot bloedstilling, de zamendrukking der bloedende vaten door middel der *tampon* aan, van welke SMEL-LIE en FR. HOFFMAN reeds vóór hem zich bedienden, en gebruikte daartoe die van lijnwaat, plukfel of spons, inzonderheid het allereerst bij de bloedvloeijing der zwangeren. Men kan haar met nut aanwenden, zoodra er mogelijkheid bestaat om haar tegen de bloedende plaats te brengen, van daar bij bloedingen uit eenen gescheurden baarmoedermond, bij kwetsingen des *Uterus* zelven, opengeborstene aderspatten en slagaderspattige uitzettingen; voorts bij eene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder, afscheiding van het inwendige vlies derzelve en bij

bloe-  
VROLIK, waarschuwt ook niet zonder reden, om zeer omzigtig met dezelve te zijn; zijn Hooggel. toch vond zich in zijne veeljarige praktijk nooit genoodzaakt tot dezelve zijne toevlugt te nemen, en zag altijd, zelfs in de gevaarlijkste en dringendste omstandigheden, mits tijdig genoeg ingeroepen, de beste uitwerkselen van het *stortbad*. Voor zoo verre mijne ervaring strekt, heb ik van dezelve nog geen gebruik behoeven te maken, integendeel met de navolging van zijn Hooggel. raad altijd het doel, ook in hagchelijke omstandigheden, bereikt.

DE VERT.



bloedingen uit de verzwakking van den *Uterus* en deszelfs banden. Zonder éene juiste kennis van de oorzaak der bloedvloeijing, bij een' gesloten en of te weinig geopenden baarmoedermond dezelve aan te wenden, daartegen moeten wij waarschuwen, dewijl dien ten gevolge ligt eene inwendige bloedvloeijing (*Haemorrhagia interna*) kan veroorzaakt worden; men kan zich trouwens wel van haar bedienen, indien bij eene bloeding, die door *Anastomosis* of *Paralysis* ontstond, de geopende baarmoedermond de invoering der *tampon* binnen de holte zelve der baarmoeder toelaat. Men bevochtigt dan eene, met een bandje voorziene, cylindervormig gesneden, spons met azijn, of een aftreksel van zamentrekende kruiden, eene oplossing van aluin of vitriool, en bestrooit dezelve, bijaldien eene verwonding aanwezig, daaruit de bloeding voortkomt en zeer hevig is, met een bloedstelpend poeder. De minste ontsteking verbiedt hare aanwending. Het *inbrengen van stukken ijs binnen de baarmoeder* raden wij af, wijl na derzelver gebruik zoo ligt krampen, en later ontstekingen der baarmoeder daaruit kunnen voortvloeijen. — 3). Zekerder en overeenkomende met de *tampon*, werkt de *invoering der hand* binnen de holte der baarmoeder. Men kan daarbij een drieledig doel hebben: *a*) bloedklonters uit de holte van den *Uterus* en deszelfs mond te verwijderen; *b*) de inwendige vlakte der baarmoeder te prikkelen, en *c*) voornamelijk hevig bloedende vaten zamen te drukken. Vroeger reeds maakten wij gewag van klonters geronnen bloeds, welke zich tegen de verdere zamentrekking aankantten, en even zoo goed als

als *Mola's* en overblijffels der nageboorte de bloeding kunnen gaande houden, en dat men, ten einde den bloedvliet te stuiten, volstrekt in de noodzakelijkheid verkeerde, om dezelve weg te nemen. Hiertoe is er geen zekerder en beter middel, dan de hand van den Verloskundige zelve, en alle daartoe opgegevene werktuigen zijn veeleer schadelijk, dan nuttig. — Eene prikkeling der inwendige vlakke door eene ingebragte hand, inzonderheid als men daarmede eene zachte wrijving van buiten op vereenigt, wordt reeds sedert lang voor een voornaam middel bij een' *asthenischen* en *atonischen* toestand des *Uterus* gehouden. Doch in ieder geval, waar verhoogde prikkelbaarheid en eene ontstekingsachtige aandoening aanwezig is, zal zij ten nadeele werken. Dikwerf gelukt het zeer hevige, plaatselijke bloedingen uit een gekwetst vat, door eene zachte drukking der hand te matigen en te stillen, en hiertoe is de hand bij voorkeur zeer geschikt, wijl men de drukking naar vereischte versterken of ook verminderen kan. — Den voorslag van PLOUCQUET tot zamendrukking der *Arteria aorta descendens*, om daardoor de baarmoederlijke bloedvloeijing te matigen, achten wij van weinige waarde, en wegens de noodwendig daaruit voorvloeiende ophooping naar de boven het middelfrif gelegene organen, zelfs voor hoogst gevaarlijk. Heeft zij ooit eenig goeds bewerkt, dan mag men dit veeleer aan de prikkeling door de ingebragte hand toeschrijven. 4) Voorts heeft men reeds in de vroegste tijden den raad gegeven, om de rook van balsamieke harfen binnen de holte der baarmoeder te geleiden, en in lateren



tijd tot hetzelfde doel gasfoorten willen aanprijzen. Onze ondervinding van beide middelen strekt zoo ver niet, wij gelooven echter, dat zij meer bij *chronische*, uit verslapping en zwakte voortkomende *Metrorrhagiën* zullen te pas komen. — REIL gebood, als een zeer vermogend middel in het bijzonder tot beperking der uitzetting, de stellige pool des *Galvanismus* in bloedstortingen bij eenen uitgezeten *Uterus* aan te wenden, en tot dat einde eene, in den vorm van een cirkelfegment gebogene slang van zink in den bodem der baarmoeder, en eene even zoo gebogene zilveren slang op den navel, en de beide vrije einden in aanraking, te brengen. Volgens de ondervinding, welke wij van het *Galvanismus* hebben, willen wij volstrekt er niet aan twijfelen, dat het aan deszelfs verwachting zal beantwoorden, de aanwending des middels evenwel vereischt meerdere toebereidsels, dan gewoonlijk onder zulke omstandigheden de betrekking gedooft. Tot nu toe had ik nog geene gelegenheid hetzelfde in het werk te stellen, of de uitkomsten met daarmede genomen proeven te beoordeelen. Wij moeten toch ook tevens herinneren, dat bij de buitengewoon sterke werking des *Galvanismus* dezelfde maatregelen van voorzigtigheid noodzakelijk en onmisbaar zijn, welke bij de aanwending des *Galvanismus* door mond en aars op schijndooden moeten worden in acht genomen, opdat niet uit het middel zelf meerder nadeel geboren worde. — 5) WIGAND prees bij *asthenische*, *paralytische* bloedvloeijingen, ten einde de levenskracht in het algemeen, en voornamelijk de organen der geslachtsverrigting op te wekken, de

wrij-

*wrijving van den baarmoedermond en den kittelaar*, aan. Het eerste behoort mede tot de prikkeling der baarmoeder door middel van de binnenvoering der hand; het laatste echter moeten wij volgens onze grondbeginsels verwerpen, doordien het de kieschheid beledigt en maar al te ligt verkeerde uitleggingen veroorzaken, zelfs bij zeer prikkelbare voorwerpen den bloedvliet vermeederen, en het ontstaan van krampen begunstigen kan; te meer daar het, onzes erachtens, door vele reeds opgegevene en nog te vermeldene middelen misbaar geworden is. — 6) *Lavementen* worden, wel is waar, niet regstreeks op de baarmoeder aangewend, doch zij komen door middel van hare achterste vlakke toch in aanraking. Wij kunnen derhalve op geen betere plaats dezelve aanhalen. Men kan of koud water, versterkende of krampstillende middelen in den endeldarm spuiten. Koude klisteren zullen bij eene zeer aanmerkelijke zwakte (*Atonie*) aanprijzing verdienen, bij een' verlamden toestand meer de, door RAGGI opgegevene, klisteren van wijngeest, of van een aftrekfel van aromatieke stoffen, die men meer of minder koud aanwendt; bij kramp daarentegen heeft men van warme lavementen, uit een kamillen- of valeriaanaftrekfel vervaardigd, en bij welke men op den raad van COPWLAND *Opium* of een ander *Narcoticum* voegt, de spoedigste en zekerste hulp te verwachten. Ten overvloede herinneren wij nog, dat men slechts kleine hoeveelheden op eens laat inspuiten, en dat *Narcotica* niet dan met de grootste omzigtigheid mogen gebruikt worden.



§. 83.

Van *inwendige* bij de baarmoederlijke bloedvloei-  
 jingen aangeprezene *middelen* heeft men een groot  
 aantal, wier uitwerkfelen niet alle aan de ver-  
 wachting beantwoorden, offchoon zij toch in en-  
 kele, bijzondere gevallen van nut hebben kunnen  
 zijn. Zoo heeft men te voren 1) *sljmige zelfstan-*  
*digheden* dikwerf geprezen, en, misfchien al te  
 werktuigelijk aan dezelve eene vermogende kracht toe-  
 gefchreven. Men gaf een afkookfel van rijst; een  
*Decoctum* van de *Symphytum officinale* (*Radix Con-*  
*solidae*); oplosfingen van gezuiverde lijn; volgens  
 HANDELS. (*Reichsanzeiger* 1800. N°. 136) en de  
 aanprijzing van anderen, het poeder van het *Viscum*  
*quernum* (eikenzwam) en meende daardoor de bloed-  
 vloeijing te stillen, doordien men van die middelen  
 bij uitwendige bloedingen, vooral van het laafte,  
 meermalen een gunftig gevolg had waargenomen.  
 Wij voor ons gelooven niet ten onregte, dat zij  
 bij bloedvloeiingen na de verlosfing en in het kraam-  
 bed te langzaam werken en alleen als *Vehiculum*  
 (voermiddel) van andere middelen, op zijn hoogst  
 als *adjuvantia* (medewerkende) te gebruiken zijn.  
 Op hen te veel te vertrouwen, zou ligt nadeelige  
 gevolgen voor de kranke kunnen hebben. — Zoo  
 ook heeft men zich, met hetzelfde inzicht, van het  
 2) *kolenpoeder* bediend, vooral van het geheime middel  
 (*Arcanum*) van FAYNARD (men zie *Med. Comment.*  
 1793. *Edinb.* 1794. — RICHTER *chirurgifche Bi-*  
*blioth.* XV. S. 338) van ODIER, welke er insgelijks  
 goede uitwerkfelen van zag, het onderzocht en ont-  
 dek-

dekte, dat het enkel en alleen uit tot poeder gebrachte kolen van beukenhout bestaat. Deze middelen dienen insgelijks meer voor *chronische* bloedvloeijingen, daar van dezelve geen genoegzaam schielijke werking te verwachten of gebleken is. Veeleer diene men toe 3) het drakenbloed (*Sanguis draconis*), 4) de *Gum Kino* (*Gummi gambiense*), en 5) *Catechu* (*Terra japonica*), waartoe men ook 6) den *ratanhiawortel* rekenen kan. Doch ook op deze middelen is hetzelfde toepasselijk, daar zij te langzaam werkende, meer in *chronische Haemorrhagiën* des *Uterus*, welke alleenlijk op *Atonie* des werktuigs of der vaten zich grondt, zonder dat er gelijktijdig een organisch gebrek plaats heeft, wegens derzelve zamentrekkend beginsel aanwendbaar zijn. Zonder hun gebruik regtstreeks te willen tegengaan, houden wij dezelve voor onnoodig, uit hoofde men meerdere, spoediger het gewenschte gevolg bereikende middelen bezit, door welke deze volkomen vervangen kunnen worden en ontbeerlijk zijn. — 7) De *loodkalken en loodzouten* in vereeniging met het heulfap en tusfchen beide of gelijktijdig gegevene ontlastmiddelen prees HELVETIUS reeds aan. REIL hield dezelve bij *Typhus* met verhoogde prikkelbaarheid, doch ook alleen dan voor aanwendbaar, wanneer, zoo als hij zegt, zij over het geheel kunnen verdragen worden. Bij ware bloedstorting, of ook slechts bij hevige bloedvloeijingen, zullen zij wel nimmer aan de verwachting voldoen, en zijn wegens derzelve ligt nadeelige werking op het gansche *Organismus*, welke zich toch niet altijd laat berekenen, noch ook altijd door het bijgevoegde



*Opium* laat wegnemen en verhinderen, hier niet aan te wenden. — 8) Het ijzervitriool (*Sulphas Ferri*) is van wege zijne werkzaamheid meermalen geroemd geworden. Als een sterk zamentrekkend middel, was het bij zuiver *asthenische* bloedvloeiingen allezins doelmatig, en men kan van hetzelfde mischien veelmeer, dan van andere dergelijke middelen verwachten, daar men het tevens als een middel, dat de werkzaamheid en kracht des prikkelbaren stelsels verhoogt en versterkt, hebbe aan te merken, en inzonderheid bij verslapping van de wanden der vaten aanprijzing verdient. Veelligt ware het ook aan zijne verdierlijking met het bloed, waarvan het ijzer zulk een voornaam bestanddeel uitmaakt, toe te schrijven en verklaarbaar, hoe daardoor het verlorene ten deele weder vergoed werd. Doch de ondervinding heeft in soortgelijke gevallen geleerd, dat het niet spoedig genoeg werkt, en alzoo meer bij langdurige en *asthenische* bloedvloeiingen en dan zal te pas komen, als uit zwakte van het vaatgestel oorspronkelijke bloedvloeiingen zoo ver beteugeld zijn, dat er slechts eene geringe bloedontlasting overbleef, en men deze opheffen of eene wederinstorting verhoeden wil; de bijkans *specifieke* invloed van het ijzer op de baarmoeder is tevens niet wel te doorgronden. — 9) Het witte vitriool (*Sulphas Zinci*) komt als een metaalzout, wat zijne zamentrekkende eigenschappen betreft, wel met het zwavelzure ijzer overeen, doch verdient vooral nog aanprijzing bij langdurige bloedvloeiingen, welke uit eene diep ingewortelde ontaarding van het weeffel der baarmoeder voortkomen. Tevens

neme men zijne brakingverwekkende kracht mede in aanmerking; uit dien hoofde kan men zich van hetzelfde bedienen tot genezing van bloedingen *door walging*; voorts zal het almede bij *Haemorrhagiën*, die op eenen krampachtigen toestand gegrond zijn, wegens deszelfs gewigtigen invloed op het zenuwstelsel aanwendbaar zijn. — 10) Bij bloedvloeijingen met het karakter eener *Synocha*, of ook bij die, welke het kenmerk van *Erethismus* draagt, die door afscheiding, of ook met doorzijpeling na eene hevige hitte, sterke beweging of na hevige gemoedsaandoeningen zich openbaren, doch tevens niet te hevig zijn, bij al diegenen, welke men wegens derzelve scheidend aanzien niet dadelijk durft te stillen, maar slechts in eenen geringen graad matigen wil, bij een' opgezetten pols, roodheid der huid, vermeerderde warmte, verdienen de *plantenzuren*, eensdeels als geneesmiddel, anderdeels tot vermeniging met de dranken, aanprijzing, terwijl zij ook te pas komen bij alle bloedingen, welke gelijktijdig met een' ontstekingsachtigen toestand zich openbaren. — 11) FR. HOFFMAN gebruikte dikwerf het *salpeter* en de *zwavelzure magnesia*; anderen wendden ook hier, even als bij *Haemoptosis* het zoutzure mineraal-loogzout aan. Men meende het nut van dit middel in zijnen invloed op de maag te vinden, door welken dan in zeker opzigt de bloedvliet door afleiding gestild werd; volgens ons gevoelen echter, dient men ook tevens op zijne *vis temperans* te letten. Deszelfs gebruik zal slechts enkel bij *active*, *stenische* bloedingen geoorloofd zijn, alsmede bij eene te hoog gestegene werkdadigheid van



het vaatgestel en eene ongestoorde spijsvertering. Tegenaanwijzingen voor hetzelfde zijn groote zwakte der maag en elke plaatshebbende, krampachtige ongesteldheid. — 12) De *aluin* is sedert de vroegste tijden bij alle soorten van *Haemorrhagiën* om deszelfs krachtadige werking aanbevolen en geprezen geworden; dat het als een zeer adstringerend, de monden der vaten te zamentrekkend middel uitwendig in eene oplossing, of als bijvoegsel tot bloedstelpende poeders van groot nut is, haalden wij boven reeds aan. Ook inwendig heeft men hem in poeder, of in eene oplossing van drie, zes tot tien greinen aanbevolen, en hij is daar, waar men een sterk *adstringens* gebruiken wil, wel boven anderen te verkiezen, inzonderheid daar, waar de overvloedige bloedafscheiding beteugeld moet worden. Dat deszelfs werkzaamheid niet bloot in het door hem bevatte zwavelzuur ligt, maar, dat dit in zijne verbinding met de thonaarde, hoezeer niet zoo als in de onzijdige zouten, deszelfs soortgelijke eigenschappen verliest, nogtans dan in zijne werking meer met het zwavelzure ijzer overeenkomt, is reeds lang uitgemaakt. Onder de mineralen is, zoo als boven §. 65 aangestipt werd, door HERDER 13) het *Phospherzuur* bij baarmoederlijke bloedvloeijingen aanbevolen, sedert dien tijd dikwerf aangewend en proefhoudend bevonden geworden. Bij alle *passive* bloedvloeijingen heeft men van hetzelfde schielijke hulp te verwachten, doordien het buiten de algemeene werking der mineralen, onmiddellijk deszelfs invloed op het levensbeginfel aan den dag leggende, niet slechts als

prik.

prikkel, op den ziekelijk veranderden staat der opwekbaarheid werkt, maar ook aan het *Organismus* eene tot zijne voortduring wezenlijke stof verschaft en de verlorene vergoedt. Daarenboven verdient het aanprijzing, omdat het de spijsvertering minder aandoet, dan andere zuren, en wel van deze het zachtste is. Bij te overvloedige *active* bloedvloeijingen kan men het mede gebruiken, en na de beteugeling des bloedvliets in geringere, en zelfs mindere giften, tot voorkoming eener wederinstorting toedienen. Men geve hetzelfde in geene te groote giften; van het *Acidum Phosphoricum dilutum* bij eenen zeer gezonken pols en aanmerkelijke *Asthenie* vijftien, twintig tot dertig droppels, met eenigerhande aromatiek water, een tinktuur of eene vlugge olie verbonden. — 14) Behalve het *Phospherzuur*, wordt er geen ander van de mineraalzuren bij baarmoederlijke bloedingen, dan het zwavelzuur, enkel of in deszelfs menigvuldige zamenvoegingen toegediend. Ook dit matigt den *Orgasmus*, vermindert de snelheid des pols en beteugelt voornamelijk de aderlijke ophooping. Men bedient zich of van het met water verdunde zwavelzuur, of vermengd met eenigerhande slijmigen drank, of ook van deszelfs verschillende zamenvoegingen. De laatste bestaan uit de verbinding met *Alcohol*, of met aromatieke stoffen en brandewijn. Men kan deze trouwens niet als enkele vermengingen aanmerken, maar neme tevens in acht, dat daarbij eene onvolkomene *Aethervorming* plaats grijpt. Het zure *Elixir* van HALLER, hetgeen uit gelijke deelen zwavelzuur en *Alcohol* bestaat, komt



meer overeen met de werking van het zuur, dan de *Mixtura sulphurico — acida Ph. B.* (*Aqua Rabelii*), bij welke een deel van gene, en drie deelen *Alcohol* gemengd zijn. Men gebruike deze even als ook het *Elix. vitrioli Mynsichti* (hetwelk de *Tinctura acida aromatica* vervangt) meer in die gevallen, waar men de werkdadigheid der *irritabiliteit* krachtdadig dient op te wekken, en deze middelen doen ons als van zelve overgaan tot de 15) *Specerijen* en derzelve bereidingen, 17) de *bijzondere soorten* van *Aether* en *geestrijke vochten* en 18) tot de *vlugge oliën*. De aanwending van al deze middelen is slechts bij een' zeer hoogen graad van *Atonie* en *Asthenie* geoorloofd; bij de minste ontsteking op de eene of andere plaats zullen zij nogtans ongetwijfeld schaden. Zij zijn alle meer middellijk (indirect) bloedstillend, en kunnen zelfs, bijaldien men ze te lang voortzet, op nieuws bloedvloeijing verwekken. Ditselfde geldt omtrent het zoo zeer geroemde, zoo dikwerf aangewende kaneeltinktuur, tegen welks onvoorzigtig en te lang gerekt gebruik wij moeten waarschuwen. — Tot opwekking der gezonkene en bijna uitgebluschte levenskracht, welke het aan genoegzame opwekking faalt, werkt tevens zeer krachtdadig 19) de *Ammonia*, zij is echter niet zoo zeer een versterkend, als een zenuwopwekkend middel, inzonderheid bij flaauwten, als ook bij stuipen snel en zeker hulp verschaffend. Veroorzaakte een meer krampachtige toestand, voornamelijk bij een te voren *hysterisch* voorwerp, de bloedvloeijing, dan mag men zich veel van 20) het bevergeil (*Castoreum*) beloven, hetwelk

men

men in poeder van vier tot twaalf greinen, van het tinktuur veertig tot tachtig droppels geeft. Later gedane waarnemingen prijzen het bij *Mela's*, of teruggeblevene gedeelten der nageboorte binnen de baarmoeder en dergelijken aan, en de wezenlijk goede werkingen, welke men van dit middel zag, moedigen ons aan, hetzelfde menigvuldiger aan te wenden, dan thans geschiedt. Voor het overige kan men bij elke krampachtige gesteldheid, van welke soort ook, 21) het *Opium* wel voor het voornaamste middel houden. Overal waar eene krampachtige *complicatie* aanwezig is, verschaft het heulsap de snelste en zekerste hulp. Tevens kan men hetzelfde met alle opgenoemde middelen verbinden, inzonderheid met de zuren, welke zeer ligt bij gevoelige gestellen hoest verwekken. Duidelijke verschijnselen van ontsteking echter verbieden deszelfs gebruik; uitgezonderd dit geval, zal men het zeker bij alle andere met nut toedienen. Men late het trouwens niet te lang gebruiken, daar het zeer ligt door sterke ophoopingten naar de hersenen achtervolgd wordt, die tijdens het kraambed oneindig gevaarlijker zijn, dan op alle andere tijden. Ging eene verkouding de bloedvloeijing vooraf, dan is de toediening van het *Pulvis Doveri* zeer doelmatig; ook hebben wij om de, bij bloedvloeijingen zoo dikwijls voorkomende, koude huiveringen te matigen, geen beter en zekerder middel, dan het *Opium*. —

22) De *Digitalis purpurea* heeft men insgelijks bij *Metrorrhagiën* aangeprezen. Zij zal bij minder hevige, van een' krampachtigen aard, bij verhoogde opgewektheid van het vaatgestel tevens, niet nuttelooos



loos zijn, en is ook misfchien door haren invloed op de maag en derzelver zenuwen in enkele gevallen dienstig, hoewel ook ontbeerlijk. — 23) Eindelijk heeft men dan ook dikwerf met de zoogenaamde *genezing door walging*, het gebruik van kleine giften eenes braakmiddels, weggelopen, zelfs braakmiddelen tot hunne volledige werking toegediend, voorgeslagen. De laatsten zijn reeds bij eenen zeer geringen bloedvliet niet geoorloofd; de eersten echter, welke wij ook bij eene zwakke, langdurige bloeding met gewenscht gevolg aanwendden, werken voorzeker te langzaam, om bij zware bloedstortingen in het werk gesteld te worden.

#### §. 84.

De, als een verzwakkend en afleidend middel, aangeprezene *aderlating op den arm* kan in vele gevallen, en inzonderheid dan zeer nuttig zijn, ingeval een ontstekingachtige toestand des *Uterus* of buitengewone hevige ophoopingten naar de baarmoeder de bloedvloeijing vooraf gingen, dezelve veroorzaakten of vergezelden. Een nauwkeurig voorschrift, wanneer en in welk eene hoeveelheid dit middel nuttig is, laat zich niet opgeven, en REIL zegt zelfs: (*Kur und Erkenntniss der Fieber*. B. III. §. 117): „— — waar zoo veel bloed verloren gaat, daar behoeft men er geen geweten van te maken, een kopje bloeds aan den arm af te tappen, ten einde uit de gevolgen te oordeelen, zoodra de Theorie ons verlaat.”

## §. 85.

Om den, ten gevolge van bloedverlies, zonder eenige andere oorzaak, bloot door uitputting dreigenden dood, af te keeren, deed J. P. FRANK de vraag: of het niet raadzaam zoude zijn de overgieting (*Transfusion*) in zwang te brengen; en beantwoordde deze vraag bevestigend, daar hij zegt: dat proeven, met dieren genomen, dit hulpmiddel schiepen aan te bevelen en aan te raden. Dat het bloed zelfs in bijzondere dieren niet zoo zeer verschilt. Wij gelooven wel, dat men er nut van zou kunnen verwachten; doch zijn van gevoelen, dat, vermits deze kunstbewerking niet slechts een' ervaren Heelmeester vordert, maar men ook meerdere toebereidselen noodig heeft, in de meeste gevallen de hulp te laat zal komen, zoo niet het gevaar reeds door andere middelen verhoed werd.

## L I T T E R A T U U R.

REICHARD, *de haemorrhagia uteri partum insequente.* Arg. 1775.

KALTSCHMIDT, *de haemorrhagia post partum nimia.* Jenae 1759.

SPENCE, *Diss. de sanguinis ex utero gravidarum et puerperarum profluviis.* Edinb. 1767.

LE ROUX, *Observations sur les pertes de sang des femmes en couches et sur les moyens de les guérir.* Paris 1776. 8°. *Waarnemingen over de bloedvloeijingen der kraamvrouwen, en over de middelen om dezelve te beteugelen*, van LE ROUX, door A. D. FRANZ overgezet, in het Hoogduitsch. Koningsb. 1784. 8°.



G. F. BEZOLD, *de haemorrhagia uteri partum insequente*.  
*Argentor.* 1780. — In SCHLEGEL, *Sylloge ad art.*  
*obstetr.* Vol. II. N°. 42.

JOH. PET. FRANK, *Discursus de haemorrhagia uteri ex*  
*spasmo secundinas incarcerante* — in *Opusc. med.* N°. 13.

PH. G. SCHROEDER, *de haemorrhagia uteri*. *Gotting.*  
 1771. 4°.

LEAKE, *über verschiedne Krankheiten der Kindbetterinnen*.  
*p.* 157.

H. L. HENKE, *Diss. de haemorrhagiis uteri nocivis*. *Erford*  
 1791. 4°.

J. H. F. BILLING, (*Praes. C. C. SIEBOLD*) *Metrorrhagia*  
*seu uteri haemorrhagia*. *Wirceburgi* 1799. 4°.

A. V. A. LE ROY, *Lecons sur les pertes de sang pendant*  
*la grossesse, lors et à la suite de l'accouchement, sur*  
*les fausses couches, et sur toutes les hémorrhagies*.  
*Paris* 1801. 8°. — A. LE ROY'S *Voorlezingen over de*  
*baarmoederlijke bloedvloeijingen tijdens de zwanger-*  
*schap, bij en na de verlossing, enz.* Naar het Fransch,  
 met aanm. van J. CLAUDIUS RENARD. *Leipzig* 1802. 8°.

KARL JOSEPH. MEYER, *Systematisches Handbuch zur Er-*  
*kenntniss und Heilung der Blutflüsse*. *Wien* 1805. 8°.

G. A. SPANGENBERG, *über die Blutflüsse in medicinischer*  
*Hinsicht*. *Braunschweig* 1805. 8°.

A. D. DE SAINT-AMAND, *Diss. sur les pertes de sang, qui*  
*affectent les femmes pendant la grossesse, lors et à la*  
*suite de l'accouchement*. *Paris an XI.* 8°.

J. B. DEMANGEON, *de fallaci atque nocuo obturamenti*  
*in haemorrhagiis uteri cohibendis usu etc.* *Paris an*  
*XI.* 4°.

VALENTIN, *sur les pertes, qui précèdent, accompagnent,*  
*ou suivent les accouchemens*. *Paris* 1808.

L. MENDE, *über eine Ursache des Gebärmutterblutflusses*  
*nach Entbindungen* — in HUFELAND'S *Journal* XX  
 VI. B. 1. St. N°. 4.

- THOMANN, *über Gebärmutterblutflüsse* — in RÖSCHLAUBS *Magazin*. 5<sup>r</sup>. B. S. 257.
- FR. CHR. BRUCH, *Beobachtung über die vortheilhafte Anwendung der kalten Aufschläge bey entstehenden Gebärmutterblutflüssen* — in *Archiv für die prakt. Arzneiw.* I St. N<sup>o</sup>. 4.
- HENRICHSEN, *etwas über warme Umschläge bey Blutflüssen aus der Gebärmutter nach der Entbindung* — in E. VON SIEBOLD'S *Lucina*. I B. 2 St. N<sup>o</sup>. 5.
- BUSCH, *de haemorrhagiis uteri* — in OSIANDER'S *Denkwürdigkeiten*. 2. St.
- CH. BEDEL, *Considerations sur les hémorrhagies uterines*. Strasbourg 1815. 4<sup>o</sup>.
- TH. GUERARD, *Diss. de metrorrhagia haemorrhoidali*. Erlang. 1817. 8<sup>o</sup>.
- E. L. A. HENNE, *Diss. de Hysterorhagia gravidarum, parturientium et puerperarum. Pars I et II. Regiomonti* 1823. 4<sup>o</sup>.
- Die Handbücher von* BURNS, JOERG, CARUS, J. P. FRANK, VOGEL, REIL, HAASE u. a. m.
- De verloskundige Handboeken van* BAUDELOCQUE. SALOMON, bij J. VAN DER HEY. WIGAND, *Geboorte van den Mensch*. Naar het Hoogduitsch. Door C. VAN ELDIK, M. D. te Nymegen, bij BERNTROP. Amsterdam.
- FUZOS, *Verhandelingen over de bloedstorting*.
- VAN DER HAAR, *over het afhalen der nageboorte*.



---

 VIJFDE HOOFDSTUK.

*Over de onregelmatige afvloeiing der  
kraamzuiveringen.*

## §. 86.

De uitvloeiing eener bloedige, waterachtig-bloedige, wijachtige en eindelijk slijmige, etter- en melkachtige vochtigheid uit de teeldeelen na de verlossing behoort tot de regelmatige en vereischte physiologische verschijnselen in het kraambed, ontstaande uit de verwonding van de inwendige vlakke der baarmoeder door de afscheiding der *Placenta*, uit de, tijdens het geheele beloop des kraambeds voortdurend plaatsgrijpende zamentrekking des *Uterus* en zijne pogingen om alle teruggeblevene gedeelten van het ei, inzonderheid de *Tunica decidua Hunteri* (volgens JÖRG: *Placenta uterina*) af te scheiden en af te voeren. Men kan nogtans niet ontkennen, dat de scheede in vele gevallen tot deze afvoering als afscheidend orgaan, medewerkt. Men bestempelt deze uitvloeiing met de namen van *Lochien* (kraamvloed, kraamzuivering, kraamvrouwenzuivering, *Lochia*, *Vuidanges*).

## §. 87.

Zoo min als bij de maandstonden laat zich bij de kraamzuiveringen bepalen, hoe veel bloed er zich ont-

ontlasten, en hoe lang de uitvloeijing aanhouden moet; de opgaven toch der Artsen loopen reeds sedert HIPPOCRATES, welke eene van zestien tot twintig onsen voor natuurlijk hield, aanmerkelijk uiteen, doordien gesteldheid, vroegere leefwijs, beledigingen van den *Uterus* tijdens en na de geboorte, zogaffcheiding en meer andere toevallige omstandigheden daarin eene groote onevenredigheid en verscheidenheid maken. Wijders kan men geene vaste bepaling omtrent haren duur maken, daar volgens mijne en de opmerking van meerdere Artsen, de bloederige uitvloeijing bij sommige kraamvrouwen slechts een', twee of drie dagen zich vertoonde, terwijl zij bij andere acht, tien, twaalf en meerdere dagen en weken voortduurde, zonder dat men, uit hoofde van de volkomenste gezondheid, het regt had, de vroegere op- of de langere aanhouding als een ziekelijk verschijnsel aan te merken. STORCH (\*) verhaalt zelfs een geval, waarin bij de geboorte en in het kraambed geheel geen bloed ontlast werd, de kraamvrouw nogtans volkomen gezond was en bleef.

### §. 88.

STAHL was van gevoelen, dat men tot maatstaf der afvloeiende hoeveelheid, dien der maandelijke zuivering moest nemen, om naar de gesteldheid van deze den kraamvloed te beoordeelen. Het gegronde dezer stelling heeft de ondervinding bewezen, en

(\*) D. J. STORCHS, as *Pelargi vj. Band. Von Weiber Krankheiten. (Krankheiten der Wöchnerinnen). Gotha 1751. Casus XL. §. 162.*



en al hetgene, wat wij §. 282 en §. 314 over de *Menstruatie* zeiden, is dus op den kraamvloed toepasselijk. Niet zoo gemakkelijk laat het zich bevatten, of de *Lochia* betrekkelijk derzelve hoeveelheid onregelmatig zijn, doordien hiertoe eene hoogst naauwkeurige beoordeeling van de gesteldheid, gewone leefwijs, den leefregel, den ouderdom en van alle uitwendige betrekkingen, enz. gevorderd wordt, en niets gemakkelijker is dan mistasting, welke tot eene verkeerde behandeling kan aanleiding geven.

### §. 89.

In de meeste gevallen ontlast er zich in de eerste twee tot vier dagen een vloeibaar, of met kleine stukjes vermengd bloed (*Lochia rubra, primaria*), hetwelk dan in eene meer aan bloedwater gelijkende, ichoreuse vloeistof, en na verloop van omstreeks drie dagen, in eene witte, wit geelachtige, dikwijls in een, met melk of etter overeenkomend, vocht verandert, en langzamerhand in hoeveelheid verminderende, na veertien dagen, drie of vier weken geheel ophoudt. Bij vrouwen, welke niet zogen, is niet alleen de uitvloeijing in het algemeen, maar ook inzonderheid de bloedige en met bloed geverwde van een' langeren duur, ontbrekende bij haar de, door de aanlegging des kinds aan de borst, veroorzaakte prikkel, door welken de aandrang van vochten op den *Uterus* na de verlossing werd afgeleid. Bij zeer jonge, of reeds bejaarde kraamvrouwen treft men mede eene mindere kraamzuivering aan; meestal sterker bij eerstbarende, dan bij meer gebaard hebben.

bende, hoezeer niet zelden hare meerdere hoeveelheid met elke bevalling toeneemt, terwijl de irritableit des *Uterus* vermindert. Hoe sterker en bloedrijker het gestel is, des te rijkelijker is meestentijds de bloedontlasting in het kraambed, doch zelden houdt de uitvloeijing zeer lang aan. Zwakke voorwerpen verliezen gewoonlijk minder bloed, de afvloeijing eener slijmige stof echter duurt langer. Vrouwen, welke te voren aan krachtige, zeer voedzame spijsen en dranken gewoon waren, ook tijdens de zwangerschap dergelijke dingen rijkelijk genoten, zullen eenen zuiverder en langer aanhoudenden kraamvloed hebben, dan zulke, die onder bekrompene omstandigheden zich slechts met mindere spijsen voedden, of van wege sterke misfelikheid in de gansche zwangerschap slechts weinig konden gebruiken; denzelfden invloed heeft de leefregel tijdens het kraambed zelf; de *Lochiën* zullen sterker vloeijen, indien de kraamvrouw krachtige soepen, vleeschspijsen, wijn of sterk bier nuttigt, dan bij anderen, welke slechts eene dunne haverdegort-pap en dergelijken bekomen kunnen. De temperatuur der kamer is mede van eenigen invloed; eene te sterke warmte heeft meestal eene sterkere kraamzuivering ten gevolge; en vrouwen, die te vroeg het bed verlaten, te veel gaan en zich bewegen, plegen de kraamzuivering sterker en langer te hebben. Ging er veel bloed bij de verlossing verloren, dan vlieten de roode *Lochiën* gemeenlijk slechts korten tijd, somtijds niet boven de vier en twintig en zes en dertig uren. Dat vrouwen, die zeer sterk de maandstonden hadden, in het kraambed meestal veel bloed



verliezen, en omgekeerd, is reeds in de vorige §. vermeld. STHAL strekt zijnen stelregel: *Lochia mensium praegressorum indolem imitantur* (de kraamzuiveringen regelen zich naar de gesteldheid der voorafgegane maandstonden), nog verder uit, doordien hij er bijvoegde: *Lochia succedentia indolem praegressorum induunt* (de opvolgende kraamzuiveringen nemen het karakter der voorafgegane maandstonden aan).

### §. 90.

Vermits er nu, zoo als gebleken is, niets zekers of algemeen geldends voor het regelmatig zich laat vaststellen, ziet men reeds hieruit, dat het hoogst moeilijk zijn moet, om eene juiste onderscheiding te maken tuschen de grenzen van gezondheid en ziekte; en men zal toch zelden in het kraambed eene algemeene ziekte of eene ongesteldheid des *Uterus* en deszelfs aanhoorige deelen, zonder oorspronkelijke of wederkeerige stoornis der kraamzuivering, aantreffen. In welke gevallen het dan dikwijls hoogst moeilijk te onderscheiden is, of die ongesteldheid, dan of de ziekelijk veranderde kraamvloed, de oorspronkelijke ziekte, en wie van beide de oorzaak of het uitwerksel van elkan- der zij; want de stoornissen in de regelmatigheid der kraamzuivering zijn even zoo dikwijls eigen- als medelijdend (*idiopatisch, sympatisch*). Men heeft des dikwerf misgetast, daar men in enkele gevallen of te zeer de algemeene ziekte, of integendeel slechts den kraamvloed bij uitsluiting gadesloeg, en niet genoeg zich bemoeide met opsporing van de oor-  
spron-

spronkelijke verhouding, wat er te voren plaats greep en den eersten oorsprong der ziekte.

### §. 91.

De afwijkingen der kraamzuivering zijn naar hare uiterlijke verschijnselen de volgende: 1) zij is te sterk of houdt te lang aan; 2) te zwak of geheel onderdrukt; 3) in vorm en menging veranderd; 4) met pijnen bij de afscheiding vergezeld. — Wij hebben hier echter alleen het plan, deze afwijkingen van den natuurlijken gang, als op zich zelve staande ziektegevallen te beschouwen, zonder de met haar gelijktijdig voorvallende, haar veroorzakende, of haar achtervolgende ziekten verder af te handelen, zullende deze ieder op zich zelve op andere plaatsen dezes werks nader beschreven worden.

#### *Te sterke en te lang aanhoudende kraamzuivering.*

### §. 92.

Wij mogen de kraamzuivering, betrekkelijk hare hoeveelheid en haren duur, voor onregelmatig houden, zoodra een sterker en langer dan gewoonlijk aanhoudende kraamvloed (men zie §. 89) met zekere ziekelijke verschijnselen vergezeld gaat, tenzij de §. 89 vermelde omstandigheden eene meer overvloedige en langer durende afscheiding behoeven. Uit het boven gezegde vloeit van zelf voort, dat bij vele vrouwen de kraamvloed nog binnen de natuurlijke grenzen kan zijn, terwijl bij andere de ontlasting eener gelijke hoeveelheid reeds een ziekelijk verschijnsel



is; voor den Arts zal, zoo lang er zich geene stoornisfen in de algemeene gezondheid openbaren, eene meer lijdelijke handelwijze de beste regelmaat zijn.

### *Diagnosis.*

#### §. 93.

De plaatselijke verschijnselen zijn de volgende: er ontlast zich of zuiver bloed, zoodat dit geval schier overeenkomt met bloedvloeijing, of eene, aan vleeschwater gelijkende, vloeistof, — of de afscheiding bestaat meer uit een wit, fomwijlen met bloedstrepen vermengd of gekleurd slijm, hetwelk in geheele stukken uit de scheede vloeit; deze verschijnselen openbaren zich nu weder of in een tijdstip, in hetwelk eene eenigzins sterkere afscheiding natuurlijk is, — of zij houden te lang aan, de bloedontlasting meerdere dagen of weken, de slijmvloed zelfs maanden, — of er vertoont zich, nadat de zoogenaamde *witte* kraamzuiveringen een' tijd lang gevloed hadden, weder bloed, zonder dat men in het laatste geval grond heeft, om te vermoeden, dat dit de terugkeerende maandstonden zijn.

#### §. 94.

Bovendien plegen de volgende verschijnselen den te sterken kraamvloed mede te vergezellen: gewoonlijk gaan snijdende pijnen, even als in de eerste week, in den onderbuik, het kruis en de lendenen vooraf, en duren benevens de vermeerderde afscheiding voort; de *Uterus* is meer uitgezet, doch ook weeker op het gevoel dan gewoonlijk; de scheede  
slap,

flap, het scheidgedeelte weinig tot deszelfs natuurlijke staat teruggekeerd, de baarmoedermond nog wijd geopend, zoodat de onderzoekende vinger zelfs nog in de holte der baarmoeder kan komen. De zieke klaagt over algemeene zwakte, inzonderheid van het gezigt, het hoofd en der ledematen; menigvuldige duizeling; soms doen zich ligte flauwten op; de aangezigtskleur is bleek; de glans der oogen, die door blaauwroode ringen omgeven zijn en diep in de oogholte liggen, vermindert; de zogaffcheiding is veelal minder. Menigmaal zelfs doet zich eene tusfschenpoozende en *asthenische* koorts met verheffingen tegen den avond op; de eetlust vermindert; somtijds afkeer van spijsen, beslagene tong, in enkele gevallen overgeving eener waterige vloeistof. Bij personen, welke te voren daartoe eenigen aanleg hadden, zwellen de voeten ligt zuchtig op, als mede openbaren zich wel eens waterzuchtige aandoeningen. De geheele ongesteldheid draagt het karakter van *Asthenie*, inzonderheid van groote zwakte der spieren en der prikkelbaarheid in het geheel.

#### *Oorzaken.*

#### §. 95.

De naaste oorzaak van eene te overvloedige kraamzuivering ontstaat uit prikkelbare zwakte van het baarmoederlijke stelsel, waardoor onder andere medewerkende omstandigheden des te eerder eene te sterke afscheiding en afvloeiing plaats grijpt, naarmate de ontlasting op zich zelve op dit tijdstip tot de regelmatige verschijnselen behoort. Algemeene



zwakte voorbeschikt hoofdzakelijk, inzonderheid echter die der baarmoeder, tot te overvloedige kraamzuiveringen; uit dien hoofde treffen wij haar bij kraamvrouwen van een allerzwakst gestel aan, die vroeger door ziekten, vooral van een' kwaadsappigen aard, zeer ondermijnd werden, welke tijdens hare zwangerschap sukkelde; bij zulke, die schielijk op elkander meerdere kinderen baarden; na eene zwangerschap van tweelingen en na *Abortus*. Voorts worden zij veroorzaakt door eene te bovenmatig genotene warmte, verflappende, doch ook integendeel door zeer verhittende dranken (zoo is bij voorbeeld een te overmatig gebruik van kamillenthee niet zelden de oorzaak), welke het bloed in eene onstuimige beweging brengen, en zoo doende ophooping naar de reeds minder krachtige, en door de verlossing en voorafgegane zwangerschap tot deze reeds voorbeschikte teeldeelen aanleiding geven. Zoo ook brengen gemoedsaandoeningen van allerlei soort eene te overtollige kraamzuivering te weeg. Dergelijks vinden wij ten gevolge van vermeerderden aandrang van bloed te sterke *Lochiën* na sterke lichaamsbeweging, indien vrouwen te vroeg het bed verlaten, of te veel overeind staan en wandelen. Zoo ook zien wij haar menigvuldig na eene te warme verpleging, na het gebruik van warme fleschen en dergelijken; alsmede na eene te sterke persing bij de ontlasting, voornamelijk bij vrouwen, die te voren door aanbeijen gekweld werden, welke bovendien reeds voorbeschiktheid hebben tot eene overvloediger en langduriger bloedontlasting in het kraambed. Bij iedere verkeerde ligging der baarmoeder

ont-

ontmoeten wij eene bovenmatige kraamzuivering, inzonderheid echter van de bloedige ten gevolge van dien, tenzij er veelligt door de verplaatfing des *Uterus* ontfteking van denzelfven veroorzaakt werd, hoezeer nogtans ook bij ontfteking dezes orgaans niet slechts eene overvloediger bloedaffcheiding, maar zelfs eene bloedvloeijing volgen kan, zijn bij de *Metritis* in het kraambed de *Lochiën* toch gewoonlijk eerder onderdrukt. Het laafte is dan altoos het geval, zoodra het weeffel en de inwendige vlakke der baarmoeder ontftoken is; bloedontlasting kan zich echter dan, en dikwerf vermeerderd, openbaren, als het, den *Uterus* uitwendig bekleedende, vlies, dat een verlengfel van het buikvlies is, in eenen ontftekingachtigen toefland verkeert. — Bleef er nog eenigerhand vreemd ligchaam binnen de baarmoeder terug, hetzelfde of dit eene *Mola*, *Polyp*, of een gedeelte der *Placenta* zij, dan zien wij toch altijd eene heviger en langer durende kraamzuivering volgen. Den laaften van beide toeflanden ontdekt men door een naauwkeurig vroedkundig onderzoek; doch bij teruggeblevene gedeelten, zal ook de afvloeiende ftof meeflal in menging veranderd en de ontlasting met pijnen vergezeld zijn.

### §. 96.

De *Gevolgen* van eenen te hevigen, te lang voortdurenden kraamvloed zijn naarmate van de hem vergezellende omftandigheden en van het bijzondere des gefiels, zeer verfchillend. Over het algemeen beftaan zij in eenen te verzwakten toefland van het geheele ligchaam zoowel, als ook voornamelijk van het gan-



fche baarmoederstelsel. De koorts, welke zoo menigwerf deze stoornis des kraambeds vergezelt, heeft meestentijds een kwaadaardig karakter, en ont-aardt ook soms, bijaldien de hulp niet doelmatig, of te laat komt in 'eene slepende zenuwkoorts (*Febris nervosa lenta*). Niet minder nogtans geeft ook eene te overtollige kraamzuivering (inzonderheid de bloedige) gelegenheid tot waterzucht, niet slechts tot zuchtgezwel der voeten en der schaamlippen, of huidwaterzucht (*Anasarca*), maar ook zeer ligt tot buik- (*Ascites*) en borstwaterzucht, op welke bijzonderheid men bij *leucophlegmatische* gestellen, harer belangrijkheidswege, alle reden heeft, immer zeer oplettend te zijn. Bij voorbeschiktheid tot te-ring kan het insgelijks gebeuren, dat zich eene wezenlijke longtering — eene etter- of slijmachtige — na uitputting door zoodanig verlies van vochten opdeed; de longen zijn mede over het algemeen, bij alle gebreken van dien aard, in het kraambed zeer aan gevaar onderworpen, en bij eene geringe voorbeschiktheid is er dikwerf slechts de minste aan-leiding noodig, om de ziekte tot eene verschrikke-lijke hoogte te brengen. — HALLER zag in een geval na eene te overtollige kraamzuivering, zwakte van het geheugen en eene soort van onnoozelheid (*Amentia*); eene veranderde stemming van het zenuwgestel; en om deze reden is hoofdpijn, *Hys-terie* en maagkramp geen ongewoon verschijnsel. Als plaatselijke gevolgen vindt men een' langdurigen, dikwijls ongeneeslijken witten vloed; eene nablij-vende zwakte van den *Uterus*, uit beide ontspruit onvruchtbaarheid, menigvuldige miskraam bij volgende zwan-

zwangerschappen, en *desorganisatie* van het ei tot eene *Mola*, derhalve *Molazwangerschap*. Zoo zag men ook naderhand werktuigelijke gebreken der baarmoeder daaruit ontstaan, als: ontaarding van het inwendige vlies der baarmoeder, polypen, aderspat-tige opzwellingen en aderspatten der baarmoeder. Dat knoestgezwel en kanker enkel hieruit zou kunnen voortvloeijen, is te betwijfelen, ofschoon men niet ontkennen kan, dat bij de daartoe reeds aanwezige voorbeschiktheid, de aanleg tot deze gebreken meerder en sterker kan worden. Wij hebben aan verkeerde plaatsingen des *Uterus* bij de oorzaken reeds gedacht en hier nog slechts te herinneren, dat uitzakkingen, zelfs scheeve liggingen des *Uterus*, gedeeltelijke binnen-buitenwaartskeering, en inzonderheid de losscheuring en de afzakking van het inwendige vlies der baarmoeder een gevolg van de algemeene verflapping en *Atonie* kunnen zijn. Uitzakkingen der scheede komen zelfs niet zelden na overvloedige, inzonderheid echter na te lang aanhoudende, *Lochiën* voor.

### *Voorzegging.*

#### §. 97.

Bij de voorzegging geeft men voornamelijk acht op de gesteldheid, de algemeene gezondheid, den toestand des *Uterus* en het teeltstelsel in het algemeen, op den duur der uitvloeijing en derzelver geaardheid. Hoe sterker, bloedrijker de lijdende was of nog is, des te minder vrees behoeft men te koesteren; met zwakkelijke, *leucophlegmatische* kraamvrou-



vrouwen zij men voorzigtig zich niet te veel te beloven; bij zeer gevoelige voorwerpen zijn de latere gevolgen niet met zekerheid te berekenen, en moet men de zielsgesteldheid aandachtig gadeslaan, doordien in deze maar al te dikwijls de grond der ziekte en der vruchteloze aanwending aller geneesmiddelen ligt. Zoo lang er nog geene koorts aanwezig, deze niet te aanmerkelijk, geene bijzondere aanleg tot andere gebreken, als waterzucht en tering, of eene reeds wezenlijke ziekte voorhanden is, laat de te overtollige kraamvloed, vooral als hij nog bloedig is, altijd eene gunstige voorzegging toe. Het is beter, dat de *Uterus* goed zamengetrokken en stevig, dan dat hij bij eene buitengewone uitzetting slap en sponsachtig op het gevoel is; de toestand is gunstig, indien er geen spoor van eenige ontaarding voorhanden is, zoodra zich aan de baarmoeder geene of slechts onbeduidende beleedigingen laten ontdekken, en ook de nabijgelegene deelen hun natuurlijk werkvermogen bezitten. Op te overvloedige kraamzuiveringen, door verplaatsingen der baarmoeder te weeg gebragt, is de voorzegging van deze toepasfelijk; is de herstelling derzelve mogelijk, dan zal ook de kraamvloed met gene ongesteldheid ten einde spoeden, bijaldien er niet gelijktijdig eene andere zamengesteldheid plaats hebbe. Blevens er nog vreemde lichamen binnen de holte der baarmoeder terug, dan zal vóór hunne verwijdering wel geene genezing volgen, en de uitvloeijing niet eerder ophouden, dan dat ze door de natuur afgestooten of door de kunst geholpen zijn. Hoe langer de uitvloeijing duurde, des te moeilijker is de

ge-

genezing, want in de door haar verwekte zwakte, ligt juist weder eene nieuwe bron tot langere voortdoring, en het uitwerksel wordt wederom oorzaak. — Eene ontlasting van bloed ondermijnt de krachten rasfer, dan een enkele slijmvloed, nogtans schijnt doorgaans de genezing spoediger te gelukken, dan wanneer het meer *Blenorrhöea* is, die zelfs gaarne in een' witten vloed ontaardt. Dat de voorzegging zoo veel te gunstiger kan zijn, als de hoeveelheid van het afvloeiende minder is, behoeft naauwelijks vermelding. Minder gunstig zij onze oordeelveling, wanneer, nadat er zich reeds witte kraamzuiveringen openbaarden, op nieuws eene bloederige ontlasting zich voordoet, welke in dit geval meestal eene meer gewigtige verftoring pleeg aan te duiden.

### Geneeswijze.

#### §. 98.

De geneeskundige hulp bij eene te overvloedige kraamzuivering grondt zich op: de, in te groote hoeveelheid afwijkende, afscheiding tot regelmatigheid terug te brengen, middelerwijl men zoo mogelijk de oorzaken wegneemt, de reeds ontstane gevolgen herstelt en de veelligt nog te vreezene verhoedt. — Heeft de kraamvloed, bij vrouwen die haar kind zelve niet zogen, de hulp van den Arts noodig, dan zal, mits dat geene andere oorzaken, dan juist het nalaten van het zogen en de diensvolgens te sterke toevoer van vochten naar de baarmoeder, de ongesteldheid veroorzaakten, eene afleidende behandeling de meeste aanprijzing verdienen. Men schrijve een' schra-



schralen eetregel, meer drooge spijsen voor en zorg  
 voor eene genoegzame buikopening door verkoelende ontlastmiddelen. Tot dit oogmerk is het afkooksel der *Tamarinde* met een zacht middelzout, de *Tartris Potassae*, *Tartris Sodae* enz., de oplossing van manna met *Sulphas Potassae* of *Sulphas Sodae* van eene *drachma* tot eene halve in poeder of in eene oplossing dagelijks drie tot vier malen van de beste uitwerkselen. Men wachte zich bovendien voor eene te warme verpleging, late de kraamvrouw op matrassen liggen, den buik met *Oleum Hyoscyami* of *Chamomillae coctum*, waarbij men in alle geval een weinig *Ammonia liquida* voegt, inwrijven, of soms ook alleen de onderbuikstreek met de hand zacht wrijven; tenzij men geene tegenaanwijzingen voor het wrijven hebbe en tevens de bloedvliet er door vermeerderd worde, zoo als somtijds wel eens het geval is. — Op dergelijke wijze behandelt men te overvloedige kraamvloeijingen, die in ophooping naar den *Uterus* gegrond zijn; men gebruike hier nogtans liever de plantenzuren, of geve, doch slechts bij kleine hoeveelheden, eenigerhande mineraalzuur, waartoe het verdunde zwavelzuur, eenige droppels onder den drank, bijzonder geschikt is. Mocht de ophooping tot aan het ontstekingsachtige klimmen, of mogten zich pijnen in den onderbuik openbaren, dan zal eene kleine aderlating op den arm van vier tot zes onsen zeer heilzaam zijn, en eene *Emulsio* met *Nitrum* zeer goede diensten doen. Verwekten een te warme leefregel, verhittende dranken en spijsen bij al te gevoelige voorwerpen eene te onstuimige beweging  
 des

des bloeds, eene ophooping van hetzelfde in den *Uterus* (*Plethora topica*, plaatselijke volbloedigheid), dan zullen bloedzuigers op den onderbuik zelfs dan nog zeer nuttig zijn, wanneer daaruit reeds eene verandering in de gevoeligheid ontsproot; inwendig dient men een bedarend, verkoelend *Mixtuur*, met een der zoogenaamde *Narcotica frigida* (koude, verdoovende middelen), als het *Aqua Laurocerasi* of *Extractum Hyoscyami* bij kleine giften toe, en eerst later, bijaldien de slijmige ontlasting te overvloedig of van te langen duur mogt worden, schrijft men een zwak aftreksel der valeriaan, *Mentha crispa*, *Melissa* en dergelijken voor, tot men eindelijk de genezing voleindt met meer versterkende middelen. In zulke gevallen zijn insgelijks inspuitingen van zacht zamentrekkende afkookfels, uit laauw water en een weinig azijn, of rooden wijn zeer nuttig, alsmede dergelijke stovingen op den onderbult. Gaf eene te sterke persing bij den stoelgang aanleiding, dan verzuime men even zoo min, als wanneer eene te vroege verlating des beds en te sterke beweging de oorzaak was, het verloskundige onderzoek, ten einde van eene veelligt plaats gegrepene verplaatfing des *Uterus* of der scheede kennis te erlangen; is deze niet aanwezig, dan vervalt de handelwijs hiertegen van zelve; in het eerste geval zorg men door lavementen, amandel- of *Ricinusolie*, het *Electuarum lenitivum*, een afkookfel van manna en dergelijken voor eene matige ontlasting; in het laatste bevele men de strengste rust, eene zijdelingsche ligging, koelen leefregel en des noods eene zwakke oplossing van het *Acidum*

tar-



*tartaricum* met eenigerhande zuren siroop tot gebruik. — Vreemde ligchamen in den *Uterus* vereischen, dat men ze verwijdere, zonder dit zal de bloedvloeijing niet te stillen zijn. Polypen, die ook dikwijls hier de oorzaak van bloeding worden, vorderen de kunstbewerking, zoodra zij maar geoorloofd is; inwendig het gebruik van mineraalzuren en aluinmelken; gelijktijdig nogtans ook wel het gebruik van versterkende middelen, en een' dergelijken eetregel. De afvoering van *Mola's* en overblijffels der nageboorte bespoedigt men door zulke middelen, welke de zamentrekkingskracht des *Uterus* aanzetten en versterken, middelerwijl men plaatselijk voor zuiverheid en bevordering der afstooting door *Injectiën* van een aftreksel der *Cicuta*, *Belladonna*, laurierkersbladen, met iets omwindends bij een' prikkelbaren toestand, of bij eene zeer slappe, krachtelooze gesteldheid der deelen met iets zacht zamentrekkends, als de *Sabina*, de *Herba Salviae*, *Flores Rosarum rubrarum* en dergelijken verbonden, zorg draagt en tevens eene met dergelijke vloeistoffen of nog beter met een *Althaea*- of haverdegort - afkooksel natgemaakte spons aan of binnen den baarmoedermond, brengt. Men zij zoo voorzigtig mogelijk bij de kunstmatige wegneming van vreemde ligchamen, welke niet alleen tot de hevigste bloedingen, maar ook naderhand tot *organische* gebreken van den *Uterus* aanleiding kan geven; alleenlijk als zij in den baarmoedermond liggen en ze voelbaar zijn, kan men ze met de hand, eene kleine polyptang, eene *Pince a faux germes* of een dergelijk instrument wegnemen. Komen er

ont-

ontstekingachtige toevallen van den *Uterus* bij, dan heeft men tot beteugeling van deze door de aanwending van eenige bloedzuigers, *Emulsiën* met eenigerhande middelzout en dergelijken te zorgen; bovendien geeft men tot inwendig gebruik versterkende middelen met zuren, naar de omstandigheden, ook met kaneel verbonden; doch men kan met dit middel niet te omzigtig zijn, doordien bij eene te sterke zamentrekking het bloed zelve door den baarmoedermond teruggehouden wordt, pijn, alsmede dikwijls ontsteking verwekt en het vreemde ligchaam achterblijft. Soms tijds voegt men bij de genoemde middelen eenige druppels der *Tinctura Castorei*, alsmede *Opii simplex* of *crocata*; laat den buik met een vlug smeersel inwrijven en denzelven warm bedekken, ook dikwerf zachtjes met de bloote hand wrijven. Gebrekkige liggingen van den *Uterus* zelven vereischen hare eigene, in het negende hoofdstuk dezer afdeeling op te gevene behandeling.

### §. 99.

De behandeling eener te overvloedige kraamvloeiing, welke in een' algemeen *asthenischen* toestand, of in eene bovenmatige groote zwakte des *Uterus* ligt, verschilt in het wezenlijke niets. Men geeft hier inwendig versterkende, doch geene te prikkelende geneesmiddelen, als de aftreksels van valeriaan, melisse, kruizemunt, kalmuswortel, later der *Quassia*, met bijvoeging van eene geringe hoeveelheid *Aethers* of van eenig geestrijk vocht; en laat afwisselend met deze mixturen een mengsel van het eene of andere zuur, hetwelk men naarmate van de



omftandigheden, uit een planten- of mineraalzuur verkiest, met een aromatiek water en eenen firoop gebruiken. Men vermijde trouwens al te prikkelende en opwekkende middelen, welke in het kraambad voornamelijk niet dan bij de gegrondfte aanwijzingen mogen toegediend worden. Het heulfap geven men mede wegens zijne bijzondere werking op den *Uterus* niet, tenzij eene krampachtige *complicatie* deszelfs gebruik volftrekt noodzakelijk mogt maken. Nimmer zal het fchaden, dat men de ziekte meer overwint door het wijzigen van den leefregel, dan door iets anders. In dit opzigt verdienen vleeschnat, foepen van flakken en oesters gekookt, de fago en falep met vleeschnat of met bijvoeging van eenigen rooden wijn bereid, aanprijzing; voorts komen het bekende gelei van hartshoorn en andere dergelijke geleijen, alsmede de *Gelatina Lichenis Islandici* hier in aanmerking. Voor drank zijn melken, vooral de met aluin bereide, dienftig; broodwater, met een weinig ligten wijn en dergelijken. Op den onderbuik late men vlugge zalven, als het *Linimentum volatile*, het *Unguentum nervinum*, de *Mixtura oleosa balsamica*, vlugge oliën in *Naptha* opgelost of enkelen *Aether* inwrijven; een' niet drukkenden, juist paffenden buikband, welke echter vernaauwd en vaster kan aangetrokken worden, aanleggen, naar omftandigheden denzelven met kina-poeder, aromatieke kruiden of de gewone looiftof opvullen, en bij het gebruik met iets geestrijks bevochtigen. Indien de betrekkingen der kranken het gedoogen, dan zullen baden een groot nut verfcaffen. Men late in enkel water, of kruidenaf-

trek-

trekfels , afkookfels der looiftof niet te warm , langzamerhand koeler , het geheele ligchaam baden , of de halve baden (*Bidets* , *Incessus*) gebruiken. De met ijzeroplosfingen bereide baden mogen eerst aan het einde der genezing worden aangewend , daar zij anders ligt ten nadeele kunnen werken. De fcheede late men met dergelijke middelen , als de aftrekfels der falie , der roode rozen , der wilde thijm , rozemarijn , des St. Jans kruids (*Ruta*) , des alfems ; de afkookfels van kina , looiftof , *Tormentilla*- en *Bistorta*-wortel , van den eiken- , olm- of granaatbast , vermengd met rooden wijn , inspuiten , ten einde de zamentrekbare vezelen des *Uterus* te verfterken. Men kan mede , tot verfterking van de plaatselijke werking , eene met dezelfde middelen natgemaakte spons in de fcheede laten brengen , hierdoor het voordeel hebbende , om gemakkelijker , de dikwijls na overvloedige kraamzuiveringen intredende uitzakkingen der fcheede en afzakkingen der baarmoeder te verhoeden. Bespeurt men eenigen aanleg of neiging tot waterzuchtige ziekten bij de kraamvrouw , dan trachte men de werkzaamheid der huid door zachte *Ammoniabereidingen* , *Sal ammoniac* , *Spiritus nitri dulcis* gaande te houden , doch vermijde prikkelende *Diuretica* toe te dienen , als *Scilla* , *Gummi gutti* , zelfs de geneverbesfen , wijl door deze de toefland zeer ligt erger wordt. De zeeajuin (*Scilla*) namelijk is bij elk vermoeden van eene gelijktijdige leverongesteldheid fchadelijk. In eenige gevallen zagen wij veel nut van het kina-poeder , vereenigd met den *Tartarus depuratus* , waarmede J. P. FRANK reeds veel op had.



*Verminderde en onderdrukte kraamzuivering.*

## §. 100.

Nog moeilijker is voorzeker de vraag te beantwoorden: of de kraamzuivering in eene te geringe hoeveelheid afvloeije, of te vroegtijdig ophoude? dan deze, of zij te overtollig zij. Wij merkten boven reeds op, dat bij vele vrouwen dezelve zonder stoornis in de gezondheid, reeds op den tweeden of derden dag geheel ophoudt, ja dat men in een geval zelfs een volkomen gemis derzelve waarnam. Bovendien is de onderdrukking der kraamzuiveringen bijkans meer slechts een verschijnsel van andere ziekten, waarvoor onder anderen HAASE (*Kur und Erkenntniss der chronische Krankheiten*. I. B. S. 344. §. 147) haar altijd houdt, dan eene eigenlijdige en oorspronkelijke ongesteldheid; verschijnende zij ook met de genezing van die ziekten weder, zonder dat men noodig heeft, regtstreeks daarop te werken. Bij ziekten in het kraambed moet men altijd iedere storing van dezen aard nauwkeurig onderzoeken en gadeslaan, vermits de kraamvloed, als eene eigendommelijke en voor de kraamvrouw in het algemeen noodzakelijke verrigting te beschouwen is, en hoezeer zijne onderdrukking wel niet de bron der ziekte ware, zoo vermeedert en doet hare standhouding dezelve toch voortduren. Men schrijve hierbij de onderdrukking dus meer aan de ziekelijke verschijnselen, dan de ongesteldheid aan de afwezigheid of de geringe hoeveelheid der uitvloeijing toe.

## §. 101.

De *verschijnselen*, welke bij eenen ziekelijk verminderden of geheel onderdrukten kraamvloed veelal worden aangetroffen, zijn: een gevoel van volheid en opzwellling in den onderbuik; snijdende en drukkende, pijnlijke gewaarwordingen in dezen en de kruisstreek; een gevoel van zwaarte in de lenden en pijnen in deze tot beneden de knieën; moeilijkheid bij de pislozing en den stoelgang; opgezetheid des buiks; pijnen van een' koliekachtigen aard in denzelfven, die dikwijls tot eenen aanmerkelijken graad kunnen klimmen; opzwellling der borsten, benaauwdheid in de borst; spanning in het hoofd, vermeerderde roodheid des gezichts, zware hoofdpijn en alle teekenen eener *active* bloedophooping naar de boven het middelrif gelegene organen. De eetlust is verminderd; de slaap gestoord door akelige droomen, zeer onrustig, of geheel afwezig. Soms vermeerderd de afscheiding van zweet, doch ook dikwijls is de huid droog, heet, gevlamd en niet zelden treft men een roodachtig uitslag aan. De teeldeelen zelve zijn droog, gevoelig en hunne warmtegraad verhoogd.

*Oorzaken.*

## §. 102.

De onderdrukking en vermindering der kraamzuivering is maar al te dikwijls het gevolg van zulke indrukken, welke een' aan ontsteking grenzenden toestand van de baarmoeder veroorzaken, vooral als



deze zich niet genoeg zamentrekt, om het binnen haar opgehoopte en dikkere bloed af te voeren. Om deze reden ontmoeten wij deze gesteldheid na het gebruik van te voedende en te prikkelende spijszen en dranken, inzonderheid in de eerste dagen des kraambeds, even zoo dikwerf, als onder andere betrekkingen eene ziekelijke vermeerdering dezer afscheiding uit dezelfde bron ontspringen kan, waarbij men mischien nog heeft op te merken, dat door geestrijke en specerijachtige dingen, ophooping naar het bovenste gedeelte des ligchaams ontstaan. Ook veroorzaken zwaar verteerbare spijszen, eene slechte spijsvertering, alsmede een galachtige toestand zeer ligt eene te vroege wegblijving der *Lochiën*, of derzelver vermindering, zoo het schijnt, door de overeenstemming tuschen de maag en de baarmoeder. — Eene der gemeenzaamste, zoo niet de menigvuldigste, oorzaken van den onderdrukten kraamvloed is verkouding, in het bijzonder van de voeten en der teeldeelen. De gewone inrigting der kraamkamer en de leefregel der kraamvrouw is meestal zeer gebrekkig, en niets in dit geval ligter, dan dat, bij elke beweging en ontblooting de kraamvrouw zich aan togt blootstelt; niet zelden is de gansche dampkring met vochtige dampen van het waschen des kinds, of zelfs van droogende waschen vervuld. Daarenboven staan ook wel vrouwen, die zich frisch en niet zoo zwak gevoelen, reeds in de eerste dagen op, zonder de vereischte maatregelen te nemen; zij zetten de bloote of slechts ligt bedekte voeten op den kouden vloer; de teeldeelen worden met te koud water afgewaschen, of voor-

en

en ondergelegde doeken blijven voor dezelve doornat nog liggen, — en het is, onder zoo vele schadelijke invloefels van dien aard, waarlijk nog verwonderenswaardig, dat er niet meer kraamvrouwen ongesteld worden. De uiteinden der vaten worden plotseling samengetrokken, nu eens meer door eenen ontstekingsachtigen, dan eens meer krampachtigen toestand, en in beide gevallen zijn onderdrukking der afscheiding, meermaals nog andere gevaarlijke ziekten de gevolgen. De nederdrukkende, zoowel als opwekkende gemoedsaandoeningen hebben eene gelijke werking; toorn, verdriet, schrik, kommer, gramschap, te sterke vreugde zijn in dit opzigt van een' even verderfelijken invloed. Ook heeft men de kraamzuivering na eene kramp in de baarmoeder bij *hysterische*, zeer gevoelige voorwerpen zien ontstaan. Bij hevige, bloederige buikloopen, bovenmatig sterke zogaffscheidung, na zeer sterk zweeten, bloedvloeijingen uit andere organen is het wegblijven der *Lochiën* een niet ongewoon, hoewel geen onheilspellend verschijnsel. — Werktuigelijk wordt de kraamzuivering gestuit, bijaldien achtergeblevene overblijffels of geronnen bloed (zoogenaamde *Molae cruentae*) den baarmoedermond verstoppen; hevigere, zeer dikwijls pijnlijke zamentrekkingen verhelpen veelal dit toeval spoedig, hetwelk alleen op den langen duur, door zijne gevolgen kan gevaarlijk worden. Zoo ontstaat ook menigmaal vermindering of geheele onderdrukking der kraamzuivering bij voor- en achterwaartskanteling des *Uterus*; als verschijnsel vertoont zij zich het menigvuldigste bij de *Metritis*.



De gevolgen van eene onderdrukking der *Lochiën* zijn: verhoogde gevoeligheid en opzwellings van den buik, welke uitzetting dikwerf tot het daaraanvolgende kraambed blijft, waarin zij dan fomwijlen door een' bloedvliet, of in vele gevallen vroeger door eenen buikloop verdwijnt; moeilijke en pijnlijke pisolozing en stoelgang; pijnen in het kruis; hevige, koliekaardige pijnen in de darmen; hevige naweeën; ontsteking van den *Uterus*, de eijerstokken, de trompetten, van het buikvlies, van het net en der darmen, ook wel van de lever; HALLER nam eene uitstorting van bloed door de trompetten in de buikholte waar; ontsteking der maag heeft men meermaals, als ook bloedbraking, daaruit zien geboren worden; de borsten zwellen dikwijls bovenmatig op en worden pijnlijk; de ademhaling moeilijk, door ophooping naar de longen, welke ook dikwerf tot ontsteking overgaan, zelfs na onderdrukking der witte kraamzuiveringen (*Peripneumonie laiteuse*); voorts doen zich op hoofdpijn, welke tot ijligheid en hersenontsteking klimmen kan; eene, tenzij geene andere, plaatselijke aandoeningen haar karakter veranderen, ontstekings-, fomwijlen zelfs *asthenische* koorts, eene aanhoudende (*continua*) met verheffingen tegen den avond, en een' vollen, eenigzins harden, verhaasten pols; fomtijds vertoont zich een roodachtig uitslag, en neemt de ziekte een kwaadaardig karakter aan, dan ziet men spoedig blutsvlekken (*Petechiën*) opkomen. Plaatselijke en algemeene kramp, zelfs *epileptische* toevallen, *periodieke* krankzinnigheid

volk

volgen niet zeldzaam; HIRZEE nam zelfs in een geval eene volkomen regtstijvigheid waar.

§. 104.

De *Uitgang* is zeer verschillend. Soms gelukt het der natuur de hinderpalen te overwinnen, en de kraamvloed openbaart zich, nadat hij eenigen tijd onderdrukt was, weder van zelven; een geval, dat dikwijls voorkomt, bijaldien de *Suppressio lochiorum* een verschijnsel van andere ziekten geweest was; terwijl men na een' tusschentijd van meerdere weken, bij de herstelling eene ontlasting van bloedderige stoffen uit de teeldeelen waarnam, welke in het verdere beloop het duidelijkste kenmerk van kraamvloed droeg, even zoo als de, door ziekte opgehouden, zogaffcheiding ook weder op nieuws voor den dag komt. De ervaring heeft deze zaak in de kwaadaardige *Epidemie* van den jare 1813 dikwijls genoeg bevestigd. Of er openbaren zich ook andere, meer of minder gunstig scheidende (*critische*) ontlastingen, door een zeer overvloedig, algemeen zweet; de lozing eener groote hoeveelheid zeer verzadigde *Urin*, eenen somtijds zelfs bloederigen buikloop; door neusbloedingen (*Rhenorrhagiae*), bloedspuwing of bloedbraking (*Vomitus cruentus*). — Soms kan het geval ook een doodelijk einde nemen, als bij een' te sterken aandrang van bloed naar de hersenen, door beroerte, of andere, door de onderdrukking veroorzaakte, ongesteldheden, als *Metritis*, *Peritonitis*, *Pneumonia* (ontsteking van het weeffel der longen zelf) en zelfs de koorts, wanneer de ligchamelijke en



algemeen heerschende gesteldheid tot een kwaadaardig karakter overhelt, en niet vroegtijdig genoeg eene juiste en vermogende hulp wordt aangebragt; of er komen naziekten voor den dag, als langdurige bloedspuwing en bloedbraking, tering, leververhardingen of verettering derzelve; tot gewoonte geworden vallende ziekte enz. somwijlen loopende zweren en andere zeer hardnekkige huidziekten (*Impetigines*).

### Voorzegging.

#### §. 105.

Bij de voorzegging heeft men inzonderheid op de algemeene terugwerking te letten, welke ten gevolge van de onderdrukte kraamzuivering ontstaan was; hoe onbeduidender de toevallen en hoe minder zij in getal zijn, des te meer hoop mag men voeden. Bovendien vereischt het oorspronkelijk ziekelijke orgaan en de wijze, hoe het werd aangedaan, eene oplettende beschouwing; zelfs bij eene gelijke hevigheid der ziekte behoeft men minder voor eene ontsteking des *Uterus* en der eijerstokken bevreesd te zijn, dan voor long- en hersenontsteking (*Pneumonia*, *Encephalitis*), naardien uit de eerste ligt *organische* gebreken der longen, uit de laatste zielsziekten in een' meer- of minderen graad geboren worden. Scheidingen door zweet, *Urin* en ontlasting, alsmede door neusbloeding, beschouwe men in de meeste gevallen als gunstige verschijnselen; bloedbraking en bloedspuwing zijn integendeel hoogst bedenkelijk. Wordt de scheede wederom vochtig,

is zij minder pijnlijk en heet, geen vermoeden op overgang in heet vuur (*Gangraena*) aanwezig zijnde; en vertoont er zich weder eenige, hoezeer ook weinige, afscheiding der kraamzuivering, dan koestere men hoop op eene spoedige herstelling. Alle kramp heeft men, inzonderheid wegens hare neiging om hebbelijk te worden, te vreezen; de voorzegging nogtans zal het ongunstigste zijn, indien de koorts, welke de ziekte vergezelt, het karakter van *Typhus* verkrijgt.

### Geneeswijze.

#### §. 106.

Tot de genezing wordt vereischt, dat men den onderdrukten kraamvloed weder tot zijnen regelmatigen staat terug brengt, en tevens de toevallen, deze ongesteldheid vergezellende, wegneemt. Ter bereiking van het eerste oogmerk, vordert de behandeling een naauwkeurig onderzoek van de gelegenheid gevende oorzaken, ten einde naar de geaardheid van deze, zoowel als naar de overige verschijnselen het geneesplan nader in te rigten. Waren het derhalve te verhittende spijsen, dranken of geneesmiddelen, welke de ziekte verwekten, dan zorgen men voor onthouding dezer nadeelige dingen, geve een verkoelend, bedarend mixtuur, eene *Emulsie* met *Nitrum*, *Tartarus boraxatus* of *natronatus*, de *Tartris Sodae* of *Sulphas Potassae*, en late vele verkoelende dranken toedienen; den buik bedekken met pappen uit de *Species emolliens*, *Flores Chamomillae*, *Herba Hyoscyami*, *Cicutae*, *Malvae*,  
Al-



*Althaeae* en dergelijken, inspuitingen in de scheede doen van een aftreksel der *Cicuta*, *Hyoscyamus*, *Chamomillae*, tegen de teeldeelen eene met dezelfde vloeistof natgemaakte spons leggen, dikwerf warme voetbaden, welker werking men door bijvoeging van asch, looistof of mosterd versterkt, nemen, mischien ook warme, lökkende dampen tegen de teeldeelen, halve baden aanwenden, en zuurdeeg aan de kuiten of ook aan de inwendige zijden der dijen leggen. Helt de toestand zeer tot het ontstekingachtige over, dan kan men van eene kleine aderlating op den voet zeer veel verwachten, doch bovendien zullen ook bloedzuigers op den onderbuik, of aan de schaamlippen en het bovenste gedeelte der dij, alsmede bloederige en drooge kopglazen op het laatste deel gezet, zeer werkzaam zijn. Kwam de kraamzuivering terug, dan ga men wel met een dergelijk mixtuur voort, doch vermijde alles, wat de ophooping naar de baarmoeder te zeer vermeederen en het tegenovergestelde voortbrengen kan. Bij vuiligheden in de eerste wegen, moeten de overige bijzonderheden beslissen, of een *Emeticum* of *Purgans* aangewezen is; de galachtige toestand vordert de toediening van het eerste; bestonden er trouwens gelijktijdig aanmerkelijke ophooping en naar het bovenste gedeelte des ligchaams, en is er deswege van het gebruik eens braakmiddels gevaar te duchten, dan opene men alvorens eene ader, en geve dan onmiddellijk na de kunstbewerking een schielelijk werkend braakmiddel van *Ipecacuanha* met *Tartris Potassae stibiata* in. Zeer dikwijls brengt reeds de, door het braken te weeg gebrachte, algemeene schud-

ding

ding des ligchaams den kraamvloed weder te voorschijn, wiens terugkoming men uitwendig door de boven opgegevene middelen tracht te bewerken. Zoo is een braakmiddel mede zeer dienstig, als de onderdrukking der kraamzuivering aan gemoedsbewegingen toe te schrijven is, tenzij geene andere, haar vergezellende omstandigheden deszelfs gebruik verbieden; men moet hier echter eene doelmatig *psysische* behandeling niet uit het oog verliezen, noch den staat des zenuwstelsels over het hoofd zien, en deswege bij de, naar de overige verschijnselen te verkiezene, middelen in de meeste gevallen, een zacht *Narcoticum* voegen, waarvan onder anderen de *Aqua Laurocerasi*, het *Extractum Hyoscyami* en *Belladonnae* bijzondere aanprijzing verdienen. — Bij eene door kramp gestoorde afvloeijing der kraamzuivering, verdient het heulsap, zoo geene andere toevallen deszelfs gebruik verhinderen, vooral aangewend te worden, wijl het de plaatselijke kramp der baarmoeder het zekerste en schielijkste wegneemt; in al deze gevallen nogtans moet de behandeling met plaatselijke en uitwendige middelen niet verwaarloosd, maar altijd met de inwendige hand aan hand gaan. — Wordt de baarmoedermond werktuigelijk gesloten door een teruggebleven stuk der *Placenta*, een misvormsel of geronnen bloed, dan zullen laauwe inspuitingen en verwijdering van het werktuigelijk beletsel toereikend zijn, om den kraamvloed weder te herstellen; de handelwijze bij de onregelmatige liggingen nogtans zal in het negende hoofdstuk dezer afdeeling worden opgegeven. — In al die gevallen, in welke de kraam-



kraamvloed alleen ten gevolge van andere algemeene of plaatselijke ziekten onderdrukt werd, rigte men de behandeling geheel naar de oorspronkelijke ziekte, zijnde het voor het toevallige (*symptomatische*) gebrek genoegzaam, de boven vermelde uitwendige en plaatselijke middelen in werking te brengen.

*De hoedanigheid na eene onregelmatige  
kraamzuivering.*

§. 107.

Men neemt soms ook waar, dat het bij en door den kraamvloed afgescheidene in zijne menging van den natuurlijken staat afwijkt, dat het scheikundig verandert, sterk en kwalijk riekend, etterachtig, bruinachtig, aan etter gelijkend, of ook reeds wezenlijk, witte vloed is, of dat het de deelen, waarmede het in aanraking komt, invreet en zweren op dezelve voortbrengt. — De *Diagnosis* van zulk een' onregelmatigen toestand blijkt reeds uit de uiterlijke verschijnselen: aan den eigendommelijken, ook bij de grootste zindelijkheid niet weg te nemen stinkenden reuk, aan het opengaan der dijën en schaamlippen, en uit de geaardheid der geloosde stof zelve kan men dezelve ligtelijk herkennen.

§. 108.

De *oorzaken* van zulk eenen kraamvloed gronden zich altijd op eene ziekelijke gesteldheid der baarmoeder, inzonderheid van het inwendige vlies derzelve, hetwelk op de eene of andere wijze ziekelijk aangedaan, aanleiding geeft tot afscheiding eener on-

ongezonde stof. Een' kwalijk riekenden kraamvloed ontmoet men dikwerf na moeilijke verlosfingen, die zeer lang duurden en door natuur of kunst volbragt werden; menigvuldig bij achtergeblevene nageboorten en eene kunstmatige afscheiding des moederkoeks; voorts als men bij eene *Metrorrhagie* na de verlosfing, van te fcherpe, zamentrekkende infpuitingen, inzonderheid van flechten azijn, gebruik gemaakt heeft. Dit verschijnsel doet zich op, wanneer na de geboorte van een voldragen kind, de *Decidua vera* niet volkomen werd ontlast, maar eerst later gedeeltelijk zich afscheidde en tot rotting overging; wanneer gedeelten van het ei, der vrucht of der *Placenta* terugbleven, en ook bij de vorming eener *Mola*; zoo openbaart zich fomtijds eene uitvloeijing eener stinkende, kwade, met kleine vezeltjes vermengde stof, als een *Polyp* binnen de baarmoeder begrepen is. De uitvloeijing, afhankelijk van eene kankerachtige ontaarding des *Uterus*, slaan wij hier over, daar dezelve reeds op eene andere plaats dezes werks (§. 755) breedvoerig behandeld werd, en de *Diagnosis* dezes, buitendien op zich zelf staande, niet wezenlijk tot het kraambed behorende gebrek, zoo duidelijk is, dat men het moeilijk voor iets anders kan aanzien. — Andere foorten van zweren in de holte der baarmoeder gaan insgelijks vergezeld met de uitwerping eener etterachtige stof, welke meer of minder invretend en stinkend, naarmate van de geaardheid der zweer, zijn kan. Wijders moeten wij hier nog doen opmerken, dat fomtijds, hoewel niet altijd, bij kraamvrouwen, van eene kropklierige of *arthri-*  
*ti-*



*rische* gesteldheid, de uitvloeijing eenen eigenaardigen, leelijken reuk aanneemt, en tevens ook de nabijgelegene deelen wegknaagt. Zij vertoont zich ook bij vrouwen, wier maandstonden en zweet dikwijls eene zeer onaangename lucht afgaven; ook na de verdwijning van het zweet der huid en der voeten tijdens de zwangerschap, en bij en na de geboorte, en volgens onze ondervinding, van uitflag, eener met geweld teruggedrevene schurft of van andere huidziekten. — Vergezelt een venerische witte vloed (*Fluor albus venereus*) de kraamzuivering, dan zal men dezen uit de vlekken in het linnen, uit mogelijk gelijktijdig aanwezige zweren, welke het venerische karakter bezitten, en volgens SCHMIDTMÜLLER uit den eigendommelijken, zuren reuk dezer vloeistof, alsmede uit het te voren plaats gegrepene (*Anamnese*) ligt herkennen. — Men wete daarenboven, dat de te vroeg verrigte bijslaap in het kraambed, de kraamzuiveringen in hare hoedanigheid kan veranderen, even als zij, aangaande de hoeveelheid, nu eens vermeerderd, dan eens onderdrukt is. — De *gevolgen* van zulk eenen, in zijne hoedanigheid veranderden kraamvloed, bestaan teensdeels in den last, welke de onaangename lucht en het ontvellen der dijën, der schaamlippen en der scheede veroorzaken; anderdeels hebben zij ook op het inwendige vlies der baarmoeder invloed, en kunnen daar, tot hoogst gevaarlijke en kwaadaardige ontaarding en aanleiding geven. Uit deze ontaarding des inwendigen vlies, ziet men *Mola's*, ongeregelde maandstonden, dikwerf miskraam, zelfs volkomen onvruchtbaarheid; baarmoedertering, knoestgezwollen,

polypen, vleesch- en spekgezwellen ontstaan. De *voorzegging* is, betreffende de te duchten gevolgen, en dan, als de oorzaken van dien aard zijn, dat hare wegneming onmogelijk of zeer moeilijk is, als bij knoestgezwel, verouderde jicht, slepende huidziekten enz. ongunstig. Men zij over het algemeen in gevallen van deze soort met de voorzegging zeer voorzigtig; zelfs uit goedaardige zweren kunnen zeer ellendige gebreken geboren worden, bijaldien daartoe reeds eene zekere voorbeschiktheid in het ligchaam huisvestte.

### *Geneeswijze.*

#### §. 109.

De genezing berust hoofdzakelijk hierop: de in hare menging ziekelijk veranderde afscheiding te verbeteren, en de schadelijke gevolgen te verhoeden, welke daaruit veelligt konden voortvloeijen. Aangaande de eerste aanwijzing heeft men alleen de oorzaken te onderzoeken, en naar het onderscheid van deze, de behandeling verschillend in te rigten. Diensvolgens is eene juiste kennis van hetgeen er voorafging, en van den toestand, waarin op denzelfden oogenblik het gansche *Organismus* zoowel, als ook het bijzondere orgaan — de *Uterus* — verkeert, volstrekt noodzakelijk, opdat men geen gevaar loope, een' verkeerden weg in te slaan. Was de afscheiding ten gevolge van een zeker bederf in de vochten, kwalijkkriekend, scherp en *ichoreus*, hetwelk zich vroeger reeds door stinkende maandstonden, kwalijkkriekend zweet en adem bespeuren

IV. D. 1<sup>o</sup>. ST. L ren



ren liet, dan is inzonderheid inwendig de *Peruviaansche* bast met eenigerhande mineraalzuur aangewezen, van welke hier het *Acidum muriaticum* eene bijzondere aanprijzing verdient; ook pillen van het *extract* van kina met de *Gummi Myrrhae* en de *Asa foetida* of de *Gummi Galbanum*, bij welke men een weinig poeder des *Belladonnawortels* voegen kan, doen dikwerf goede uitwerkfelen. De door BAYLER en WEDEKIND geprezene *Sabina*, houdt ook SCHMIDTMULLER voor heilzaam; wij voor ons hebben van dezelve nog geene genoegzame blijken, naardien wij ze slechts in eenige gevallen eerst konden toedienen; ook de kamfer, zoowel tot in- als uitwendig gebruik aangeprezen, wilden wij ten minste, wegens hare nadeelige werking op de zogaffcheiding, niet liefst aanwenden. Ligt de oorzaak van den flank der kraamzuivering in verrotting van teruggeblevene gedeelten van het ei, of van misvormfels, dan heeft men inwendig dergelijke middelen, als in het voorgaande geval, alsmede aftreksels des *kalmus*, der *serpentaria* en a. m., naarmate der, uit de koorts, blijkende algemeene gesteldheid, voor te schrijven; den buik laten men met pappen of stovingen, uit specerijachtige kruiden vervaardigd, bedekken, en somtijds met eene vlugge zalf, een' specerijachtigen *Spiritus* of met *Aether* inwrijven. Voor het overige zorgt men voor de meest mogelijke zindelijkheid, niet alleen van de hierin betrokkene deelen, maar ook van het linnen, in het algemeen, der bedden, der kamer en vooral der lucht, welke laatste ook onder zoodanige omstandigheden niet te warm mag zijn. Tot in-

inspuitingen prijst men de afkookfels der *Herba Salviae*, *Cicutae*, *Folia Laurocerasi*, der *Belladonna*, der *Herba Sabinæ*, van den *Cortex Quercus*, *Ulmi campestris*, bij gegoede lijdenden des kinabast en *Serpentaria* — der *Radix Tormentillæ* en *Bistortæ* in lateren tijd met rooden wijn, met het *Acidum pyrolignosum* (*Xylicum*, houtzuur) van twee tot drie eetlepels in een afkookfel der salie en dergelijken aan; voorts verdienen nog genoemd de *Mel Rosarum*; kalkwater met melk of enkel; het *Extractum Salicis fragilis* in kalkwater opgelost; eene oplossing van aluin en koolzuurijzer; en, ten einde verzwerigen te verhoeden, slijmige vloeistoffen, van het *Decoctum Hordei* bij voorbeeld, waarbij men gepast een weinig *Tinctura Myrrhæ* en rozenhonig mengt. Goedaardige zweren binnen de holte der baarmoeder behandelt men volkomen op dezelfde wijze, en zorgt tevens nog door eene doelmatige nabehandeling, voor terugblijving van misvormfels, waarom men met *adstringerende* middelen zeer voorzigtig moet zijn. Gedoogen het de omstandigheden, dan zal het gebruik eener warme zwavelbron, en naderhand van een versterkend, ijzerhoudend mineraalwater tot baden, zeer nuttig zijn. — Ligt de oorzaak in de eene of andere kwaadsappige gesteldheid, dan grondt men de geneeskundige behandeling op de oorspronkelijke ziekte, en gaat daarbij te werk, zoo als de Handboeken voor de bijzondere Geneeskunde zulks leeren. — Ontstond het gebrek na onderdrukking van een buitengewoon huid- en voetenzweet, dan staan die middelen op den voorgrond, welke de onderdrukte



huiduitwafeming mede te voorschijn brengen; de *Sal ammoniac*, in vereeniging met den braakwijnsteen in kleine giften, de spiesglanswijn, de *Spiritus Mindereri*, zachte *Ammonium preparaten* over het algemeen, de *Liquor Ammonii aceticus* enz., waarmede men een' doelmatigen leefregel, laauwwarme baden en bij een onderdrukt voetzweet, zuurdeeg aan de voetzolen vereenigt. Is de plotselijke verdwijning van een haarwormig uitslag de oorzaak, dan dient men inwendig de daartegen bekende middelen toe, legt nogtans dadelijk uitwendig op de plaats, waar het uitslag zich bevond, Spaansche vliegenpleisters, zuurdeeg of ook *bois de garou* bast, om zoo doende het haarwormig uitslag weder naar de huid te brengen. Of na eene teruggedrevene schurft, de inenting derzelve baten kan, willen wij niet beslissen, naardien het ons hieromtrent aan ondervinding mangelt. — Bij eene venerische zamengesteldheid eindelijk kunnen *Mercurialia*, mits voorzigtig aangewend, niet ontbeerd worden; als inspuiting eene zwakke oplossing der Sublimaat, verdund *Aqua Phagadenica* en dergelijken.

### *Pijnlijke kraamzuivering.*

#### §. 110.

Er vertoonen zich pijnen bij de afscheiding der kraamzuivering, wanneer een gedeelte bloeds stolde, en of als *coagulum* den baarmoedermond sluit, waarvan wij §. 102 reeds spraken, of pijnen, in zoo verre de tot deszelfs uitstooting noodige kracht, sterkere zamentrekking van den *Uterus* behoefde,

ver-

veroorzaakte. Soms ontmoet men geen groote bloedklompen, maar benevens een weinig gekleurd bloed, eene groote hoeveelheid kleiner, geronnen stukjes, en ook deze gesteldheid in het kraambad van pijnlijke gewaarwordingen vergezeld. Bij miskramen is het geen ongewoon verschijnsel, dat de afscheiding en ontlasting der *Decidua vera* (afv. vlies) door zeer onaangename, pijnlijke gewaarwordingen begeleid wordt, trouwens bij de geboorte van een voldragen kind, vindt men dit zeldzamer; zoo ook is gemeenlijk de kraamzuivering bij eene krampachtige gesteldheid des *Uterus*, bij ontaarding van zijn weeffel, en dan pijnlijk, als de *Menstruatie* te voren ook met pijnen gepaard ging.

### §. III.

Ter verhelping van dit gebrek, hetwelk, bijaldien het aanmerkelijk is, door een' geheelen stilstand des kraamvloeds, ja door ontsteking der baarmoeder kan achtervolgd worden, zijn aangewezen: zachte wrijvingen van den buik met de bloote hand; inwrijvingen op de baarmoederstreek van *Oleum Hyoscyami*, *Chamomillae*, of enkel, of met bijvoeging van *Ammonia liquida*, als ook van een pijnstillend middel: laauwarme inspuitingen van een afkooksel der *Species emolliens*, der *Herba Cicutae*, *Hyoscyami*, *Malvae*, *Althaeae*, *Millefolii* enz. Zeldzaam zal deze toestand inwendige middelen behoeven, zoo al, dan moeten deze naar de algemeene gesteldheid geregeld worden, vooral echter lette men hierbij op, of men met een ontsteking-, of een krampachtig geval te doen heeft; reden waarom *Emulsiën*



met *Nitrum* of andere zouten, *Aq. Laurocerasi*, *Extractum Hyoscyami* of *Opium* te pas komen. — Daarbij zorgt men voor eene stille ligging, warme verpleging, laat den buik met warme, drooge doeken, pappen of stovingen bedekken, en bevordert de minste neiging tot uitwaseming en het in ieder geval heilzame zweet, door laauwwarme aftreksels als thee van de *Flores Tiliae*, *Sambuci* en dergelyken meer.

#### L I T T E R A T U R.

JOAN. FRIDR. TEUBER, *Praes. R. G. KRAUSS, de lochiis naturaliter fluentibus en praeternaturaliter suppressis. Jenae 1682. 4°.*

ARNOLDUS FRIDERICUS REIER, *Praes. J. H. SLEVOGT, Aegra ex lochiorum retentione graviter decumbens, Diss. Jenae 1697. 4°.*

JOH. ANDR. ROEPER, *Praes. M. ALBERTI, de lochiorum statu legitimo et morbo. Halae 1724. 4°.*

JOH. MATTHAEUS NOHR, *Praes. M. ALBERTI, de lochiorum suppressione. Halae 1731. 4°.*

H. JUCH, *de naturali et praeternaturali lochiorum statu hujusque periculosus consecretariis. 1749.*

MART. GOTTL. HALPITIUS, *Praes. POHL, de febre lochiali. Lipsiae 1705. 4°.*

EPHR. HENR. THEOD. FISCHER, *de lochiorum retentione. Erford 1762. 4°.*

MELLET, *in Recueil periodique. Tom. I. p. 219.*

*Theoretisch-praktische Abhandlung über die Geburtshülfe und Krankheiten der Schwangeren, Kindbettinnen und neugeborenen Kinder. Aus dem Französischen. Mit Vorrede und Anmerkungen von J. C. STARK. Erfurt 1800. 8°. 2<sup>e</sup>. Band.*

C. L. MURSINNA, *Abhandlung von den Krankheiten der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Säuglinge.* Berlin 1792. 8°. 2<sup>r</sup>. Theil. S. 39.

D<sup>r</sup>. BREFELD, *Beobachtungen und Reflexionen über die Kindbetterinnen Krankheiten — in HUFELAND's Journal der prakt. Heilkunde.* XXIV. B. 2. St. S. 130.

SCHMIDTMÜLLER, *Medicinische Geburtshülfe.* 2<sup>r</sup>. Theil. S. 20.

CARUS, *Lehrbuch der Gynäkologie.* 2<sup>r</sup>. Theil. S. 545. §. 1564. folg.



## ZESDE HOOFDSTUK.

*Over de naweeën.*

## §. 112.

Onder *naweeën* (*Dolores post partum, tranchées*) verstaat men die pijnen, welke kraamvrouwen meestal terstond na de verlossing of in de eerste dagen des kraambeds overvallen; uit de streek des heiligbeens haren oorsprong nemen en naar de schaambeenderen overgaan; ten opzigte van haren aanvang en beloop met de door pijnen vergezelde, de uitdrijving des kinds en der nageboorte te weeg brengende zamentrekkingen der baarmoeder, zeer veel overeenkomst hebben, naardien zij even als deze onpijnlijke tuschenpoozen hebben en slechts bij wijle in hevigheid toenemen. Hierbij komt nog, dat zij blijkbaar haren zetel in den *Uterus zelve*n hebben, gelijk dit zijne meerdere uitzetting en gevoeligheid, als ook zijn harder worden bij den aanval der pijn bewijzen; wat haar intusfchen verder — ten opzigte van haar doel, nog meer met de ware geboorteweëën doet overeen komen, is: dat gemeenlijk aan het einde dezer pijnlijke zamentrekking een vermeerderde kraamvloed zich openbaart, en zij, met de verdere terugkoming tot het punt van zamentrekking, waarin de *Uterus* buiten de zwangerschap, wil

wil hij in een' natuurlijken staat verkeeren, zijn moet, tevens ophouden.

### §. 113.

Zeldzamer worden vrouwen na hare eerste bevaling door deze pijnen gekweld; veelal zijn het zulke, die reeds meermalen gebaard hebben, en het is eene beproefde waarneming, dat zij zich in ieder volgend kraambed heviger en langduriger plegen te vertoonen, dan in het voorgaande; offchoon ook hiervan eene menigte uitzonderingen in de praktijk voorkomt. Niet alleen openbaren zij zich na de geboorte van voldragen kinderen, maar dikwerf genoeg (zeker in de meeste gevallen) na vroegtijdige geboorten en miskramen; ja zij zijn meermalen na deze veel pijnlijker en heviger. Het gestel heeft in zoo verre invloed op haar, dat gevoelige, *hysterische* en zwakke vrouwen door dezelve meer gekweld en veelvuldiger er door overvallen worden; en hoezeer zij in ieder jaargetij en onder alle uitwendige betrekkingen waargenomen worden, openbaren zij zich toch, onder anderzins gelijke omstandigheden, meer bij vochtig koud weder en bij eene bijzondere weërsgesteldheid (*Constitutio annua*), die het ontstaan van *rheumatische* gebreken begunstigt.

### *Diagnosis.*

### §. 114.

De naweeën onderscheiden zich door den aard der pijn zoowel als door hare *periodieke* verschijning, van alle andere ziekelijke verschijnselen



in het kraambed. Meestal verschijnen zij onmiddellijk na de bevalling, houden twee, drie en meerdere dagen aan, en verdwijnen dan, allengs meer in sterkte afnemende, terwijl de baarmoeder zich aanhoudend meer en meer zamentrekt; zonder de algemeene gezondheid door iets anders te storen, dan door de pijn, welke haar wezenlijk kenteeken is. Warmte vermindert haar gemeenlijk, en een algemeen zweet neemt haar voor een' zekeren tijd, zelfs geheel weg. Koorts gaat zelden met dezelve gepaard, alleen bij zeer gevoelige personen, of bij zeer hevige pijnen vertoont zich eene *continua remittens* met een ontstekingsachtig karakter; doch bij verschijning der pijn, wordt de pols gewoonlijk sneller, kleiner, zelfs wel eenigzins hard. Hoofdpijn doet zich nog al eens op, doch is even zoo min een vast kenteeken, als eene onware *gastrische* (*pseudogastrische Zustand*) gesteldheid, waarbij de tong wit en dik beflagen, de eetlust geheel weg, de dorst trouwens bovenmatig groot is. Met de borsten en de zogafscheiding staan de naweeën telkens nu in eene meer, dan in eene min duidelijk zichtbare betrekking, wijl deels bij iedere aanlegging des kinds de pijnen zich verheffen, deels ook wel eens nalaten, zoodra de verrigting (*Process*) der zogafscheiding volkomen aan den gang is, en nu de borsten in plaats van de baarmoeder, het middelpunt der voeding geworden zijn. De afscheiding der kraamzuivering is gewoonlijk kort voor de, en tijdens de toeneming der pijn eenigermate onderdrukt, bij hare meeste hevigheid nogtans vermeerderd zij gewoonlijk, er ontlasten zich minder groote bloed-

bloedklonters, en na de ontlasting houdt de pijn op. Zelden en slechts bij meer zamengestelde gevallen wordt de pislozing en stoelgang gestoord; de pijnen echter verhinderen meestal den slaap, of maken denzelfven ten minste onrustig.

### §. 115.

Te gelijk met de naweeën ziet men wel eens *rheumatische* en ontstekingsachtige aandoeningen des *Uterus*, welke inzonderheid de uitwendige, met het buikvlies bekleede vlakke en dit gedeelte des buikvlies zelf treffen. Ook openbaren zich als zamengesteldheden van andere ziekelijke toevallen, bij groote algemeene prikkelbaarheid zelfs wel stuipen, en bij zulke vrouwen, bij welke de gevoeligheid over het prikkelbare en herstellende (*reproductive*) stelsel de overhand heeft; dikwerf gaan ook ongeregeldheden in den kraamvloed met dezelve gepaard. — De naweeën hebben, wat hare uitwendige verschijnselen aangaat, overeenkomst met de ontsteking der baarmoeder, doch niet met die, in welke de inwendige vlakke en het *Parenchyma*, maar het naar buiten gekeerde gedeelte derzelve, en het haar bekleedende vlies begrepen wordt; met het *Rheumatisme* der baarmoeder; met de afzakking der baarmoeder; ophoopingen in de speenaderen, ziekten der eijerstokken en trompetten der baarmoeder, en met de onderscheidene soorten van kolijk.

### §. 116.

Zij onderscheiden zich echter van de *Metritis* daardoor, dat bij de laatste de pijn zich niet verplaatst,



plaatst, geene vrije tusschenpoozen, noch het eigendommelijke karakter der weeën heeft, maar meer van een' stekenden, brandenden aard is, welke bij elke aanraking vermeerdert, en door de koorts, welke bij de baarmoederontsteking, ook bij eene gedeeltelijke — zoo wij deze uitdrukking bezigen mogen — derzelve niet ontbreekt. Gelijkerwijze wordt ook het *Rheumatisme* altijd door koorts vergezeld, welke bij hetzelfde, door het veelvuldig tusschen beide komende gevoel van koude nog duidelijker is, en ook hier zijn weder of geheel geene, of slechts onregelmatige tusschenpoozen, en wel in dier voege, dat de toeneming (*Exacerbation*) of veel liever de verheffing (*Paroxysmus*) der pijn, veel langer duurt, dan de onpijnlijke tusschenruimte, tijdens welke de koorts nooit geheel af is, en gene met nieuwe huivering en koude voorbijgaat. — Bij verzakking der baarmoeder, meestal gegrond op verflapping der baarmoederlijke banden, bevinden zich wel dergelijke pijnen, wat de hoedanigheid betreft, doch de meer zamenge trokkene *Uterus*, deszelfs geringe gevoeligheid, de bevinding bij het onderzoek en de bijzonderheid, dat bij verbetering der gebrekkige ligging, welke bovendien nog meestentijds met moeilijke (*Dysurie*), zelfs wel met belette pislozing (*Ischurie*), en verstopping of persfingen op den aars vergezeld is, alle ziekelijke verschijnselen verdwijnen, zijn genoegzaam om eene juiste kennis des gebreks te verkrijgen. — Naweeën, ten minste met deze veel overeenkomst hebbende pijnen, vergezellen gewoonlijk ophooping in de speenaderen naar den *Uterus* en naar de omgelegene deelen, en men kon zonder eene naauwkeu-

keurige en oplettende beschouwing van den toestand en in het bijzonder van hetgeen er voorafging (*Anamnese*), bij de behandeling ligt grove misflagen begaan. Intusschen bestond deze toestand in de speenaderen, zeker altijd reeds vroeger, ten minste in de zwangerschap, en de ziekelijke gesteldheid der aderlijke vaten, alsmede de verhoogde *veneusiteit* blijkt reeds uit de aderspatten aan de dijen, en schaamlippen, uit de bloederige ontlastingen, knopen, en opzwellingen aan den endeldarm, uit de gesteldheid der baarmoeder tijdens de zwangerschap en de geboorte, de verhouding van het scheidegedeelte en den mond des *Uterus*, als thans uit de verschijnselen van *passive* ophooping naar het baarmoederstelsel. Het in de adercellen der baarmoeder, in de *Plexus pampiniformis* opgehoopte bloed verwekt dan ligt, niet alleen pijnen in de kruisstreek en den buik, maar deze vertoonen zich ook wel eens alleen op zekere tijden, doordien het bloed ten deele door de opvolgende, en nu door de uitzetting op nieuws verwijderde zamentrekkingen des *Uterus* uitgedreven, zich andermaal verzamelt en de vorige verschijnselen zich weder openbaren. Wij meenen derhalve de aandacht hier bijzonder op te moeten vestigen, naardien hier een gansch ander geneesplan, dan bij de gewone behandeling der naweeën, vereischt wordt, daar er maar al te ligt door eene ondoelmatige handelwijze des Geneeskundige, organische gebreken des *Uterus* ontstaan kunnen. Deze *Status haemorrhoidalis* daarentegen vordert het aanzetten van bloedzuigers op den onderbuik, in de nabijheid van den endeldarm, somtijds op de teel-

dee-



deelen zelve; het gebruik van oplofende extracten, als van het *Extractum Graminis*, *Taraxaci*, *Saponariae*, *Chelidonii* enz, van de zachtere middelzouten, der rabarber en der zwavel, om de verstoppingen weg te nemen, den bloedsomloop in den onderbuik vrijer te maken, en, ware het mogelijk, den aanleg tot dien toestand geheel te vernietigen. Van gebreken der eijerstokken en der overige omliggende deelen zijn de naweeën reeds door hare zitplaats en het op zekere tijden terugkomen der pijn, de ter harer plaatse voelbare zwelling en den algemeenen koortfigen toestand onderscheiden. Het kolijk heeft men niet alleen dikwijls met naweeën verwisfeld, maar het zelfs voor eene soort derzelve gehouden, of onder de benaming: „valsche weeën” aangevoerd: beide ongesteldheden nogtans kenmerken zich door: de plaats waar de pijnen zich doen gevoelen, welke bij het kolijk veelal uitgebreider en hooger is; de voorboden, welke de kramp der buikspieren meestentijds voorafgaan, en in rommeling, drukking en zwaarte in den onderbuik, geringere pijnen, walging en belemmerden stoelgang bestaan; door de rigting der pijnen, welke bij het kolijk meestal zwervend en minder tot eene plaats bepaald zijn, en gemeenlijk aanhouden, wel afnemen, doch geene vrije tusfchenpoozen laten.

### *Oorzaken.*

#### §. 117.

Over het wezen en de naaste oorzaak der naweeën zijn dusverre de gevoelens der Geneeskundigen  
zeer

zeer onderscheiden. Te voren meende men den grond derzelve in de onevenredige zamentrekking van den bodem en het onderste *segment* der baarmoeder te moeten zoeken, omdat de baarmoedermond minder bij de verlossing en in de zwangerschap verzwakt, nu zich sterker zamentrekkende, het afgezonderde bloed belette af te vloeijen, en daardoor tot sterker en heviger zamentrekkingen des *Uterus* aanleiding gaf. Men wordt versterkt in dit gevoelen, wanneer men op eene nawee de kraamzuiveringen sterker ziet vloeijen, terwijl zij kort voor en tijdens dezelve meer onderdrukt waren. Anderen meenden, dat deze pijnen alleen door ongelijke, gedeeltelijke zamentrekkingen veroorzaakt werden; velen hielden dezelve slechts voor kolijk-aardige pijnen, welke door de toetreding van lucht, ook zelfs wel door ophooping van deze binnen de holte der baarmoeder verwekt werden. Gelijkerwijze geloofde men, dat zij uit vreemde lichamen in den *Uterus*, waartoe deze tot uitstooting moeite deed, om het even of dit bloedklonters, *Mola's* of vleeschachtige aangroeisels zijn, ontstonden, doordien, om ze te ontlasten, eene verwijding des baarmoedermonds moest vooraf gaan; om deze reden, zeide men, verschijnen zij na langdurige, moeilijke verlossingen niet, nogtans wel na snelle, onverwachte verlossingen, omdat bij gene de baarmoedermond in eenen meer verzwakten toestand verkeert, en deze den kraamvloed geene hinderpalen in den weg zet; bij bekraamde lichamen komen zij echter ook daarom veelvuldiger voor, omdat deze gemeenlijk spoediger verlossen. MULLER (*der Arzt für Wöchnerinnen*.  
Frank-



*Frankfurt a. M.* 1805. 8°. 1. B. §. 4) houdt ze voor krampen, die uit een geprikkeld zenuwstelsel oorspronkelijk zijn. JÖRG (*über das physiologische und phatologische Leben des Weibes. Leipzig* 1821. 2<sup>e</sup>. *Ausg.* II. B. §. 693) koestert bijkans hetzelfde gevoelen, naardien hij de naweeën van eene, door de baring niet genoegzaam bedwongene prikkelbaarheid en levenswerking des *Uterus* afleidt, en meent, dat zij van eene te groote gevoeligheid dezes orgaans afhangen. Ter staving van zijn gevoelen voert hij aan, hoe men dezelve inzonderheid dan waarnam, als een klein kind, wijd bekken, of geringe wederstand der kringvezelen (*Sphinkteren*) aan het onderste gedeelte der baarmoeder eene spoedige verlosning te weeg bragten. Hier werkt de *Uterus* (op eene andere plaats zijns werks §. 695) in het kraambed niet anders, dan bij eene langzame verlosning; hij trekt zich desgelijks te zamen, doch de vrouw ontwaart deze zamentrekkingen door de pijn, middelerwijl zij de zamentrekkingen na eene langzame en behoorlijk krachtige uitdrijving des kinds niet gevoelt. Reden waarom zich de naweeën zeer goed met de voorzeggende weeën laten vergelijken, doordien ook deze alleen bij eene verhoogde gevoeligheid der barende, pijnlijke gewaarwordingen doen ontstaan. SCHMIDTMÜLLER (*Handbuch der medicinischen Geburtshülfe. 2<sup>r</sup>. Band. §. 295*) welke haar voor ware weeën, welke als opvolgende zamentrekkingen noodzakelijk zijn, verklaart, meent zelfs, dat zij te zwak kunnen zijn, houdt ze alzoo meer voor een natuurlijk verschijnsel, waarvoor men ze toch wel niet beschouwen kan; wij konden ten

minste hare afwezenheid na eene plaatselijke, overigens regelmatige verlosfing, niet voor iets zieke lijks erkennen. — CARUS (*Gynäkologie. 2<sup>r</sup>. Band. §. 1562*) meent, dat naweeën, bij meermalen ge baard hebbende en na snelle verlosfingen, tot het regelmatig beloop des kraambeds behooren, doch als onregelmatige verschijnselen zijn aan te merken bij eerstbarende, zoodra zij te veelvuldig, buitengewoon hevig en van te langen duur zijn. Als oorzaken derzelve neemt hij aan, verhoogde gevoeligheid in het algemeen en van de teeldeelen in het bijzonder, vreemde ligchamen in den *Uterus*, pijnlijke gebreken der tepels, en alle prikkels, welke het vaat- en zenuwgestel buitengewoon opwekken. Nog onlangs heeft CARUS (zie *Lehre von Schwangerschaft und Geburt u. s. w. Zweite Abtheilung. Leipzig 1824. 8°. S. 135*) de naweeën verklaard te bestaan in wormswijze bewegingen der baarmoeder, die na het uitdrijven van het voortbrengfel der bevruchtiging nog niet geheel hadden nagelaten; want, naar zijn inzien, neemt de werking der *weeën* dan een begin, wanneer de baarmoeder niet slechts de inrigting tot zamentrekking en uitzetting, door de ontwikkeling van hare zelfstandigheid in langwerpige en kringswijze vezelen bereikt heeft, maar vooral dan, wanneer de geregelde afwisseling van zamentrekking en uitzetting als *peristaltische* beweging in haar een' aanvang neemt; wanneer nu de baarmoeder, na de voltooiing der verlosfing, tot haren vorigen, meer onvolkomenen, toestand terugkeert, en bij de eerste pogingen daartoe een einde maakt aan de regelmatige afwisseling van zamentrekking en



uitzetting, kan zij daarin echter niet zoo spoedig flagen, dat niet nog wel eenige dagen daarmede verloop en, en hierin meent hij de grondoorzaak tot *naweeën* te vinden. Niet de minste lust hebbende tot het opmaken eener nieuwe *theorie*, zoo verge- noegen wij ons, met nog op eenige punten opmerk- zaam te maken, die volgens ons oordeel, offchoon wij het niemand opdringen, van geen gering belang daarbij fchijnen te zijn. Welk eene groote veran- dering, de *Uterus* ook in zijn weeffel tijdens de zwangerschap ondergaat, is bekend, en voor het grootfte gedeelte door de fijnere Ontleedkunde dui- delijk bewezen. Wij herinneren dan ook niets, dan dat er eene, anderszins niet te vinden, fpierachtige zelfftandigheid aan het einde der zwangerschap dui- delijk in denzelfven zich laat aantoonen, en TIEDE- MANN's (\*) uitmuntende nafporingen hebben ons, flechts weinig tijd geleden, niet alleen over den loop en de hoeveelheid der bijzondere zenuwen en derzelver vlechten, maar ook tevens geleerd, hoe de zenuwen zelfs in *volumen* zich vergrooten, en, wat hare ftof betreft, zwellen. De drukking alleen op deze vergroote zenuwmasfa's — een volftrekt gevolg der zamentrekking — fchijnt hier een' zeer gewigtigen rol in te fpelen. Ter bepaling van de *periodieke* verfchijning zal wel geene andere verkla- ring noodig zijn, dan de van CARUS elders opge- gevene, en het is niet volftrekt noodig, opgehoopt kraambloed, dat zich tot klonters gezet heeft, als

we-

(\*) *Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822. Fol. c. Tab. aen.*

wezenlijke voorwaarde tot opwekking der naweeën aan te nemen, meer nogtans schijnt daartoe het in de adercellen der baarmoeder zelve opgehoopte bloed, dat in de zelfstandigheid zelve een hinderpaal voor de zamentrekking wordt, mede te werken.

§. 118.

Op zich zelve zijn vrouwen, welke bereids een- of meermalen gebaard hadden, wel is waar, meer tot naweeën voorbeschikt, en het schijnt als of met iedere opvolgende verlossing, tevens de naweeën in hevigheid en duur toenemen, hetgeen zich uit de verminderde kracht der zamentrekbare vezelen door de herhaalde uitzetting wel laat opmaken. Trouwens wij zien ze ook in het eerste kraambed somtijds allerhevigst plaats grijpen. Dit is gemeenlijk het geval bij zeer gevoelige, *hysterische* voorwerpen; ook kan men er niet voor instaan, dat, als de *Hysterie* deze ongeregeldheid te weeg brengt, zij niet met deze, en, zoo het schijnt, door haar vermeerdert. Zoo ook laat zich hare verschijning altijd met zekerheid vooruit bepalen, wanneer tijdens den arbeid, zoogenaamde wilde, krampachtige weeën voorhanden waren, zoodat tusschen zamentrekking en uitzetting reeds onevenredigheid, ten gevolge eener afwijking van het beginsel des zenuwstelsels, dat beide voortbrengt, plaats had gegrepen. Tevens hebben zulke kraamvrouwen, welke aan volbloedigheid, aan eene aderspattige gesteldheid des *Uterus* en aan de door WIGAND beschrevene zuchtige opgezetheid (*Volllymphigkeit*) lijden, groote vatbaarheid voor naweeën, reden waarom dan het geneesplan,



naar deze verschillende omftandigheden, geheel anders kan en moet ingerigt zijn, zoo als verder zal bewezen worden. — Van den invloed der weersgefteldheid maakten wij reeds boven gewag; even zoo belangrijk nogtans is ook de handelwijze bij het gansche verlosfingswerk. Hoe onftuimiger de natuur — in zeldzame gevallen en flechts onder bijzondere omftandigheden, welke op de verhouding van de grootte des kinds tot de wijdte des bekkens gegrond zijn — te werk ging, of hoe hulpvaardiger de kunst zich betoonde, om den regelmatigigen gang te befpoedigen en te ftoren, hoe minder volkomen de gewone uitgangen gefchiedden of konden plaats grijpen, des te meer en langer heeft de kraamvrouw van naweeën te lijden. De kraamftoelen, in het bijzonder die van de flechte foort, vereenigen beide fchadelijke hoedanigheden in zich, omdat zij niet alleen de barende aanzetten om te fterk — en dikwerf te vroeg — hare weeën te verarbeiden en het kind gewelddadig voort te ftuwen, maar ook tot algemeene verkoeling, in het bijzonder tot die der teeldeelen, gelegenheid geven, en bij het gebruik derzelve zeldzaam een weldadig zweet te voorfchijn komt, of zoo het aanwezig is, gelftoord moet worden, doordien na de uitdrijving des kinds de vereifchte bedekking ontbreekt. Wij meenen ook de afbinding van het moederlijke gedeelte der navelftreng hier als hoogst nuttig te moeten aanbevelen, wijl de moederkoek door bloed gevuld, en dus meer uitgezet blijvende, zich tegen eene fpoedige zamentrekking aankant. Even zoo belangrijk is het, de verbreking der vliezen van het ei, zoo mogelijk,

der

der natuur over te laten, en dit alleen bij eene zeer grondige en dringende aanwijzing te verrigten. Niet alleen, dat de *Uterus* bij zulk eene lijdelijke handelwijs slechts langzamerhand ontledigd, maar ook alle overige deelen, baarmoedermond, scheede en de uitwendige opening van deze langzamer verwijd en tot den doortogt des kinds voorbereid worden, dan door de laatste zelve. De ondervinding heeft ons geleerd, dat het, inzonderheid onder vroedvrouwen in zwang zijnde, vroege breken des waters, voornamelijk bij vrouwen die meermalen baarden, menigmaal de eenige aanleiding tot allerevigste naweeën was. Op eene voorbarige afhaling der nageboorte, onmiddellijk na de uitdrijving des kinds, behoeven wij niet eens de aandacht te vestigen, daar dit wel niet dan door zeer ruwe en onkundige Vroedvrouwen zal verrigt worden. De op ware verloskunde en echte wetenschap steunende vraag: wanneer heeft de natuur wezenlijke hulp noodig? is misfchien allermoeijelijkst te beantwoorden. Men doet nogtans zeker meer kwaad door te vroeg, dan te laat haar bijstand te bieden.

#### §. 119.

Menigmaal heeft men tot deze ziekelijke verschijnselen aanleiding gegeven, ten minste hen vermeerderd, doordien men der pas verlostte al te voedende en verhittende spijsen en dranken vergunde, en vele voorname Fransche vrouwen, van welke MAURICEAU verhaalt, dat zij ter bevrijding van de naweeën, eene, van eene oude patrijs met zeker soort van uien, of van melk met muskaatnoot en suiker,



bereide soep, plagten te nuttigen, zullen daardoor dit steeds verergerd hebben. Gelijkerwijze kunnen ook tegen bloedvloeijing en krampen aangewende heete middelen, indien zij te lang worden voortgezet, naweeën voortbrengen, heviger maken, en den overgang derzelve tot *Metritis* bevorderen. Dat snelle verlosfingen eene hoofdoorzaak derzelve zijn, bleek reeds; doch wij ontmoeten ze ook dan, wanneer de *Uterus* door een groot kind, of tweelingen, of te buitengewoon veel vruchtwater al te sterk was uitgezet, waarbij in menigerlei opzigt dezelfde betrekkelijke oorzaak ten grondslag ligt, als bij te snelle verlosfingen. Dikwijls waren wij in de gelegenheid allerhevigste, hoogst pijnlijke weeën waar te nemen, wanneer het kind dwars had gelegen, en tevens daarop de baarmoeder in het kraambed haren scheeven vorm behield, in twee gevallen, ten aanzien harer gedaante, met eene tweehoornige baarmoeder (*Uterus bicornis*) overeenkomende. Hier lag blijkbaar de grond, in de voorafgegane ongelijke uitzetting, en vandaar de nu onregelmatige zamentrekking, zoodat de naweeën niet eerder ophielden, voordat de ovale vorm hersteld was. Opmerkenswaardig is het tevens, dat in twee gevallen bij latere zwangerschap weder dwarse liggingen zich vertoonden. De ondervinding heeft ons daarenboven geleerd, dat zekere ziekelijke, vooral verharde, plaatsen des *Uterus*, door welke ongetwijfeld de regelmatige voortgang verhinderd werd, vergezeld gingen met hevige naweeën; hetzelfde namen wij ook waar bij spekachtige uitwasfen aan de uitwendige vlakke der baarmoeder. Dat uit-

was-

wasfen op hare inwendige vlakke, als polypen; of ook veranderingen der *Decidua*, *Mola's*, overblijfsels der nageboorte en bloedklonters (ten onregte, *Molae cruentae* genaamd) naweeën voortbrengen, is algemeen bekend; gelijkerwijze hare verschijning bij hoogst gevoelige, inzonderheid raauw gezogene tepels, tijdens het aanleggen des kinds, waar zij uit het medelijdende gevoel der zenuwen verklaarbaar zijn.

### *Gevolgen en Uitgang.*

#### §. 120.

De gevolgen der naweeën zijn onderscheiden, al nadat de gelijktijdige gesteldheid der baarmoeder, meer naar het ontsteking- of krampachtige overhelt. Om deze reden klimt de pijn in sommige gevallen tot eene geduchte hoogte; de tusschenpoozen worden korter, deze zijn niet geheel vrij meer en de pijn vermindert slechts, zonder volkomen op te houden, tot deze gesteldheid in eene openbare ontsteking der baarmoeder overgaat, bijaldien men haar in het begin niet spoedig genoeg paal en perk stelde. Bij verergering des gebreks vindt men ook meer andere ziekelijke gebreken, kramp in de sluitspier der blaas en ten gevolge van dien, nu opstopping, dan onwillekeurige afvloeiing der *Urin*; deelt de endeldarm er ook in, dan openbaart zich dit nu eens door verstopping, dan eens door eene hoogst lastige persing tot afgang en ware kolijkpijnen (*Dolores colici*). Of er vereenigen zich krampen van eenen anderen aard mede, als: maag-



pijn, kramp in den flokdarm (*Spasmus oesophagus*), in de borst, hevige hik, braking, *hysterische* toevallen, zelfs algemeene stuiptrekkingen. — De *Uitgang* is of in genezing, of in andere zoo even genoemde ziekten. Door een algemeen zweet scheidt de natuur veelal zelve de ziekte; somtijds door vermeerderde zogaffscheidung, gedurende welke en het zweet, waarmede de zogkoorts afgaat, en de naweeën ophouden; zeldzamer door een' buikloop, of eene bloeding uit de scheede of den endeldarm. Hoe de kunst den ziekelijken staat te verbeteren hebbe, en dit bewerkstelligende, zal beneden §. 123 en volgende worden opgegeven.

### *Voorzegging.*

#### §. 121.

Bij de voorzegging neme men den algemeenen toestand, waarin zich het ligchaam bevindt, en den invloed, welken de pijn op hetzelfde uitoefent, de hevigheid en duur dezer laatste, mitsgaders de oorzaak en de geneigdheid om in de eene of andere krampachtige aandoening te veranderen, in aanmerking; waarom niet al te hevige naweeën in de eerste dagen des kraambeds, bij eene reeds meermalen gebaard hebbende, wier toestand niet veel van den gezonden afwijkt, gepaard met regelmatige kraamzuiveringen en niet gestoorde zogaffscheidung, de beste voorzegging toelaten. Dan alleen heeft men gevaar te duchten, wanneer de aanvallen hevig zijn, zeer schielijk op elkander volgen, geen ware noch volkomene tusschenpoozen vormen, door koorts ver-  
ge-

gezeld zijn, de onderbuikstreek bij de aanraking pijnlijk is, de kraamzuivering gestoord wordt, verschijnselen eener beginnende ontsteking zich vertoonen, of andere krampachtige aandoeningen als zamengesteldheden of gevolgen zich openbaren. Op zich zelve beschouwe men de naweeën als eene niet gevaarlijke ziekte, die slechts, onder zeer ongunstige omstandigheden, vrees kan verwekken.

### *Voorbehoeding.*

#### §. 122.

Eertijds, inzonderheid toen men aan iedere pas verlostte of nieuwgeborene geneesmiddelen meende te moeten toedienen, trachtte men ook de naweeën door geneesmiddelen te verhoeden, of ten minste hare hevigheid te beteugelen. De soepen der voornamste Parijsche vrouwen hebben wij boven reeds genoemd; ofschoon deze ook meer schade dan nut te weeg bragten, zoo hebben ze toch niet dat walgelijke van andere zoogenoemde *Specifica*, bij voorbeeld, bloed van de nageboorte met gelijke deelen olie en siroop, en dergelijken meer. Andere, zowel vroegere als latere Artsen, prijzen het gebruik eener vette olie, als de amandel-, papaver- of notenolie; den buik warm te houden; koud drinken te vermijden; losmakende klisteren, en MAURICEAU de bedekking des buiks met een' met zoete amandelolie, of verschen boter gebakken eijerkoek. — Wij gelooven, dat in de meeste gevallen de naweeën niet verhoed kunnen worden, doch zijn overtuigd, dat eene doelmatige handelwijs bij de geboorte, inzon-



derheid vrijwaring voor iedere verkoeling bij en na dezelve, een doelmatige leefregel in het kraambed hare hevigheid zeer zullen matigen. Wij geven daarom inzonderheid den raad, om de teeldeelen, te weten na de ontlasting des moederkoeks, met eenen zuiveren, zachten en matig verwarmden doek te bedekken, ten einde de geprikkelde deelen voor de toetreding der lucht te vrijwaren. Wij verwerpen echter elke geneeskundige behandeling, die bij geene de minste aanwijzing, enkel als voorbehoevend, wordt in het werk gesteld.

### *Geneeswijze.*

#### §. 123.

Ontstaan de naweeën, zoo als aangetoond is, uit eene onevenredige verhouding tusfchen de uitzetting en zamentrekking der baarmoeder, of van bijzondere gedeelten derzelve, uit eene voortdurende *Contractie* en *Expansie*, of eene te sterke wormswijze beweging, dan moet de Arts deze te keer gaan, en tot dit doel door wegneming van de oorzaken medewerken. Volgens ons oordeel moet men inzonderheid bij de geneeskundige aanwijzingen, hoogst naauwkeurig op den toestand der baarmoeder letten, en wel of zij meer geneigdheid tot het ontstekings-, dan tot het krampachtige heeft, doordien beide gesteldheden eene bijzondere en geheel onderscheidene behandeling vorderen.

#### §. 124.

Zijn de naweeën niet al te hevig, de baarmoeder  
nog-

nogtans nog aanmerkelijk of ongelijk uitgezet en bij de aanraking pijnlijk, dan late men den buik met warme *Oleum Hyoscyami* of *Chamomillae coctum* inwrijven, vervolgens met warme wollen doeken, of wel met een afkookfel van den *Hyoscyamus*, der *Cicuta*, van verzachtende kruiden, of met dergelijke pappen bedekken. Dikwerf heeft men bij deze plaatselijke middelen niets anders te geven, dan een aftreksel der *Flores Tiliae*, *Sambuci*, *Chamomillae*, *Herba Menthae* of *Melissae*; men late echter deze aftreksels niet te sterk maken, en niet te veel daarvan drinken, wijl men anders door dezelve zeer ligt de zaak verergeren, ja zelfs den overgang tot ontsteking veroorzaken kan. In het bijzonder wordt van de kamillenthee veel misbruik gemaakt, en meermalen zag ik na derzelver overdadig gebruik, zoowel baarmoederlijke ontsteking en bloedsvloeiingen, alsmede langdurige koortsen, inzonderheid met huiduitslag, in het kraambed ontstaan. Eene nauwkeurige beschouwing van het beloop der naweeën, als zij geheel der natuur worden overgelaten, leerde mij, dat veelal een overvloedig, algemeen zweet en eene ontlasting van geronnen bloed (*Bloedmola's*) in vorm met den *Uterus* overeenkomende, gunstige uitgangen waren, en zoowel de vermeerde omvang des *Uterus*, als deze soort van afscheiding overtuigden mij, dat veelligt die onevenredige verhouding tusfchen de zamentrekkende en uitzettende kracht alleen in die gesteldheid lag, welke WIGAND zuchtige opgezetheid (*Volllymphigkeit*) noemde, en op dit vermoeden afgaande, heb ik, hetgeen bijzondere opmerking verdient, altijd

ee-



eene op de omftandigheden toegepaste zweetdrijvende geneeswijze ingeflagen. Beantwoorden derhalve dergelijke kruidenaftreksels niet aan de verwachting, dan fchrijve men eene verzadiging der koolzure potasch (*Carbonas Potassae*) met citroenfap, de azijnzure potasch (*Acetis Potassae*), het *Liquor ammonii acetici*, den *Spiritus Mindereri* met *Aqua Florum Sambuci* en eenen firoop of fuiker voor, en voege, ingeval van noodzakelijkheid, een weinig *Extractum Hyoscyami* of *Aqua Laurocerasi* daarbij. Van uitftekenden dienst zullen ook de klisteren van een afkookfel van verzachtende kruiden, het *Semen Lini*, de *Herba* en *Rad. Althaeae* zijn, wjl zij niet alleen ontlasting bewerken, maar, zoo zij doelmatig en in kleine hoeveelheden gezet worden, voor den *Uterus*, als het ware, nog tot ftovingen verftrekken. Is de buik verftopt, is dezelve ten gelijke tijde pijnlijk, dan geve men eene lepel vol *Ricinus* - olie, die mij dikwerf heerlijke dienften bewees, en welke ik derhalve bijzonder kan aanprijzen. Bovendien fchijnen ook hiermede de waarnemingen van meest alle vroegere Artfen overeen te ftemmen, daar bij voorbeeld HIPPOCRATES, RODERICH A CASTRO, LUD. MERKATUS en MAURICEAU de vette oliën, in het bijzonder echter de versch uitgeperste, zoete amandelolie (*Oleum amygdalarum dulcium recens expressum*) op hoogen prijs ftelden. Tot het doen van infpuitingen uit een *Infusio Cicutae*, *Hyoscyami*, of een *Decoctum Malvae*, *Althaeae* enz. behoeften wij nooit de toevlugt te nemen, als alleen bij ongeregeldheden, of geheele onderdrukking der kraamzuivering, of

als

als teruggeblevene gedeelten van het ei, of andere vreemde deelen blijkbaar de oorzaak der vermeerderde pijn waren.

§. 125.

Dikwerf echter zijn deze zachte middelen van geene uitwerking, en openbaart zich eene meer naar het ontstekingsachtige overhellende gesteldheid of eene plaatselijke volbloedigheid (*Polyaemia topica*) in de baarmoeder. Hier waren het olieachtige *Emulsiën* met kleine hoeveelheden van het *Extractum Hyoscyami* of *Aqua Laurocerasi*, met bijvoeging van *Tartris* of *Nitras Potassae*, *Sulphas* of *Phosphas Sodae*, *Tartarus natronatus*, zure, bloedverdunnende dranken, in een' nog hooger en graad bloedontlasting, *Nitrum* in groote giften en de zoete kwik (*Merc. Hydrargyr. oxydul.*), welke ons den meesten dienst bewezen. Zou eene aderlating op den voet, zelfs aan de dij of den onderbuik niet de voorkeur verdienen, ten einde de plaatselijke ophooping te verminderen? Bloedzuigers werken veel te langzaam, en veroorzaken ligt verkoudheid, als men bij het aanzetten niet de grootste voorzigtigheid in acht neemt. Als hulpmiddel, inzonderheid tevens om, als afleidend middel, de werking der haarvaten van de huid op te wekken, verdienen de drooge koppen op de dij, zuurdeeg en Spaansche vliegen aan de kuit en de inwendige vlakte der dij, en naarmate der omstandigheden, ook op den buik gelegd, aanprijzing. — Ik veroorloof mij hierbij op te merken, dat men in de behandeling van ziekten van het kraambed,

ten-



tenzij er geene volstrekt *asthenische*, duidelijk waar te nemene verzwakte toestand plaats heeft, veelal gelukkiger zal zijn, als men niet te lang met bloedontlasten wacht en er te bevreesd voor is. Men neme toch wel in aanmerking, dat volbloedigheid van den *Uterus* tot de gemeenzaamste verschijnselen behoort, en dikwijls andere ziekten uit deze ontstaan, die alleen uit haar voortvloeijen, en desniettemin een geheel ander karakter schijnen te hebben, zoo als bij voorbeeld krampachtige toevallen. Is de pols maar eenigzins vol, hard, menigvuldiger dan gewoonlijk, de dorst hevig, de huid zeer rood en warm, dan laat ik eene kleine aderlating doen, en nooit had ik reden tot berouw over deze handelwijs, daar dikwijls de pijn onder de kunstbewerking reeds naliel, of zoo dezelve bleef, spoedig wegging.

#### §. 126.

Zeldzaam zal men evenwel een geval aantreffen, waar de naweeën zuivere zenuwaandoening, of werkelijke kramp zijn, ontsproten uit eene verhoogde gevoeligheid; doch hoezeer de zenuwen ook altijd mede aangedaan worden, zoo pleeg dit toch meestal eene medelijdende aandoening te zijn, en dit lijden niet uit de zenuwen zelve zijn' oorsprong te nemen. Men ontmoet deze bijzonderheid meestentijds bij zeer gevoelige, *hysterische* vrouwen, en onderkent dezelve deels uit hetgeen er voorafging (*Anamnese*), deels uit de gansche gesteldheid, den weeken, kleinen, zwakken en versnelden pols, andere gelijktijdig zich openbarende krampachtige toevallen, bleef-

bleeke *Urin*, koude, drooge huid en a. m. Dit is een toestand, waarin het heulsap de spoedigste en zekerste hulp verschaft. Men had eens een' tijd, waarin men bij alle naweeën, geene uitgezonderd, het *Opium* toediende, doch ook dikwerf voer men er ongelukkig mede. Men zou kunnen zeggen, dat er toch vele gelukkige proeven met dit middel genomen zijn, zelfs bij geneigdheid tot ontsteking — doch hem, die deze tegenwerping mogt doen, herinnere ik dan, dat J. P. FRANCK in het ziekenhuis te *Pavia* tegen longontstekingen ook *Opium* toediende en ze daarmede genas, en later nogtans aan het lancet en het *Nitrum* de voorkeur gaf, wijl deze geneeswijze hem niet beviel. Heeft men echter duidelijke aanwijzing tot de aanwending dezes middels, dan diene men hetzelfde in kleine giften toe, van  $\frac{1}{4}$  tot  $\frac{1}{2}$  grein ieder vier of vijf uren, of 3 tot 5 droppels der *Tinctura Opii simplex*, of *Vinum Opii aromaticum*; of vereenige hetzelfde met de *Radix Ipecacuanha*, of het Tinktuur met den *Vinum stibiatum*. Zoo ook geef ik het heulsap liefst in eene *Emulsie*, wijl ik heb waargenomen, dat het in dezen vorm minder verstoppingen te weeg brengt. — Zachter dan het *Opium*, doch ook minder sterk, werken de aftreksels der versche oranjebladeren (*Folia aurantii viridia*), der *Radix Valerianae*, het *Liquor ammonii Succini* (*Sp. Cornu Cervi succinatus*) en de stinkende *Asant* (*Asa foetida*), welke men inzonderheid in den vorm van klisteren aanwendde en prees. — Het bevergeil (*Castoreum*), dat zulk eenen naam in deze ziekte heeft, diende ik slechts ik enkele ge-



gevalleu toe, en zag er even zoo min eenig nut van, als jörg. Misschien dat het de voorkeur boven andere middelen verdient, bijaldien er blijkbaar eene *hysterische* voorbeschiktheid voorhanden is, of vreemde ligchamen binnen de baarmoeder terug gebleven zijn.

§. 127.

Voorts vindt men nog naweeën, welke met een' zuiver *asthenischen* toestand des *Uterus* vergezeld, oogenschijnlijk op verminderde spanningskracht (*Tonus*) deszelven gegrond zijn. Men ontmoet ze bij kwaadsappige (*cachectische*), bleeke, door eene slechte levenswijs of zielesmart verzwakte voorwerpen, bij eenen slapen, weinig werkzamen *Uterus*, gepaard met eenen zwakken, langzamen, ledigen pols, ook wel na groot bloedverlies, bij overtollige kraamzuiveringen, zonder koorts en tevens echter zeer gevaarlijk, daar de krachten op alle manieren moeten worden aangetast, en door de pijn nu nog meer ondermijnd worden. Hier legge men op den buik pappen van specerijachtige kruiden; met *Unguentum nervinum* (*Ung. Rorismarini comp.*), *Balsamus Vitae externus*, met een weinig heulsap wrijve men den buik in, en schrijve inwendig meer versterkende, opwekkende middelen voor, als: valeriaan, *Serpentaria*, kalmuswortel, *Gentiaan*, eindelijk de bereidingen der kina. Somsijds vordert de algemeene ongesteldheid tot het voltoojen der genezing het ijzer. Baden met specerijachtige kruiden, vervolgens met looistof, en eindelijk met de boiletjes der *Tartarus martiatus* zullen uitmuntende werkingen doen. —

Ont-

Ontbrak er aan eene der voorafgegane ongesteldheden ter volkomene genezing nog iets, dan zullen het juist deze middelen zijn, die den *Uterus* zijne regelmatige zamentrekking en kracht doen wederkrijgen, en zoo veel mogelijk, den aanleg daartoe ontnemen.

J. H. C. MATTH. FENNER, *de doloribus post partum eorumque curatione*, Diss. Marburgi 1795. 8°.

*Zwo Abhandlungen aus der Geburtshülfe über die Wehen vor und nach der Geburt* von Dr. G. VETTER und Dr. J. H. C. FENNER. Leipzig 1796. 8°.



---

 ZEVENDE HOOFDSTUK.

*Over de ontsteking der baarmoeder  
in het kraambed.*

## §. 128.

De ontsteking der baarmoeder (*Inflammatio Uteri*, *Metritis*, *Hysteritis*) behoort mede tot die ziekten, welke dikwijls in het kraambed voorvallen, het menigvuldigste echter komt zij op het tijdstip der baring voor, hoezeer zij ook tijdens de zwangerschap, in een' onbezwoangerden staat, bij meisjes, en volgens nieuwere waarnemingen, zelfs nog voor de manbaarheid en de volkomene ontwikkeling des werktuigs is aangetroffen. Men beschouwe haar immer als eene hoogst gewigtige ongesteldheid, die dikwijls ligt doodelijk wordt, bijaldien de Arts ze niet vroegtijdig genoeg onderkent, of ondoelmatig behandelt, en de ontsteking een' ongelukkigen keer neemt.

## §. 129.

Het aanzijn eener baarmoederlijke ontsteking laat zich niet met volle zekerheid bepalen, voordat de naaste oorzaak der ontsteking vastgesteld en bewezen is. De verschijnselen, die haar vergezellen, en de voor haar passende geneeswijze stellen het buiten twijfel, dat zij op eene ziekelijk verhoogde werking

king des prikkelbaren stelsels met gelijktijdige zenuw-aandoening berust, zonder dat men dusverre in staat is, om over de nadere betrekking der naaste oorzaak (*Causa proxima*) eene verdere verklaring te geven.

§. 130.

Deze ziekte kenmerkt zich door eene aanhoudende, bepaalde pijn in de schaamstreek (*regio pubis*), welke door drukking, en zelfs door de enkele aanraking, zeer vermeerderd wordt, in sommige gevallen tuschenpoozen, geene geheel vrije heeft, stekende en brandende is; voorts klagen de lijderezen over een gevoel van hitte, en volheid in het bekken; boven den venusheuvel zwelt het eenigzins op, en onderzoekt men deze plaats nauwkeurig met de hand, dan ontwaart men, dat de baarmoeder min of meer hard, pijnlijk en niet zoodanig zamgetrokken is, als zij na den afloop des kraambeds pleegt te zijn. Hierbij openbaren zich moeilijkheden bij de pislozing en pijn bij de ontlasting, welke niet zelden ten eenemale ophoudt, en een pijnlijk gevoel in de darmbeenstreek en de dijen, hetgeen in eenen hoogen graad, zelfs tot verlamming kan overgaan. Het scheidegedeelte is meestentijds eenigzins opgezwollen, somwijlen schijnt het echter ook meer zamgetrokken, eenigermate hard; het is evenwel altijd pijnlijk, heet; de kraamzuivering meestal onderdrukt, bijaldien de ontsteking in het inwendige vlies, het weeffel der baarmoeder en inzonderheid in die plaats zetelt (*substrat*), waar de *Placenta* heeft vastgezeten; zeldzamer ondergaat zij storing, als de



ontsteking zich slechts tot het uitwendige vlies der baarmoeder bepaalt.

§. 131.

De ontsteking der baarmoeder gaat altijd met eene hevige koorts vergezeld, welke bij het begin derzelve meestal zuiver ontstekingachtig (*Synocha*) is, en eerst later naar de omstandigheden in eenen *Synochus* of *Typhus* overgaat. De pols is veelal klein, hard, koordachtig op het gevoel, en zeer snel, niet zelden tusfchenpoozend. HARLESS beweering, dat hij aanvankelijk vol en sterk is, en eerst na den derden dag klein, hard en zeer snel zou worden, vond ik door eigene waarneming niet bevestigd. De lijdenden zijn altijd zeer onrustig, de slaap ontbreekt geheel, zij klagen over hevige hoofdpijn, welke meer het achterhoofd, somtijds ook den nek inneemt, dikwerf zelfs tot ijlhoofdigheid klimt; zij hebben hevigen dorst en trek naar koude en zuurachtige dranken; dikwijls komt er dan toevallige (*symptomatische*) braking eener scherpe, groenachtige, waterige vloeistof bij, welke somwijlen met eene vlokachtige, naar kaas gelijkende stof, vermengd is; te gelijk niet zelden een hevige, dikwijls wederkerende en lang aanhoudende hik, in sommige gevallen een waterachtige buikloop, vergezeld met hevige perfsingen (*Tenesmus*). De gelaatstrekken ondergaan ook hier, gelijk bij vele andere ziekten, die hare zitplaats in de baarmoeder hebben, of uit dezelve voortkomen, eene bijzondere verandering, wier mismaaktheid zich ligt erkennen, nogtans moeilijk beschrijven laat. Dikwijls verdwijnt de melk uit

uit de borsten, waarbij men evenwel niet uit het oog moet verliezen, dat, hoezeer dit verschijnsel ook veelal een gevolg der ziekte is, het toch even zoo dikwijls voortvloeit uit de niet te vermijdene behandeling van deze door aderlatingen en andere regstreeks verzwakkende middelen. Vervolgens voegt zich nog wel eens ontsteking van het buikvlies, der darmen, der maag, des middelrifs, der lever, in een' zeer hevigen graad ook wel der longen, bijaldien zij er maar eenigen aanleg toe hebben, daarbij, en het aantal der verschijnselen wordt natuurlijk met iedere nieuw bijkomende ongesteldheid vermeerderd, zonder dat daarom alle aanwezige ziekelijke en ziekteverschijnselen tot de *Metritis* behooren, zoo als vele vroegere Schrijvers, gene zamengesteldheden over het hoofd ziende, schijnen voorondersteld te hebben.

### *Verdeeling.*

#### §. 132.

De *Metritis* openbaart zich in het kraambed gewoonlijk als eene oorspronkelijke ziekte, nogtans komt zij ook wel medelijdend (*deuteropatisch*) voor; wijders ontmoet men haar bij eene hevige en zich veruitbreidende ontsteking van het buikvlies, ontstekingen van andere onderbuiksingewanden, ten gevolge van storingen in den bloedsomloop, inzonderheid in het poortaderstelsel, ook als een hoogst ongunstig verschijnsel bij kwaadaardige koortsen. — Nu eens verstrekt de gansche baarmoeder ten zetel (*substrat*) der ontsteking, dan weder zijn het slechts bijzondere



gedeelten derzelve, welke voornamelijk in dezelve betrokken zijn. Reden waarom nu eens alleen dat gedeelte van het buikvlies, hetgeen hare bovenste vlakke bekleedt, dan eens het *Parenchyma*, dan weder slechts de inwendige vlakke, of juist die plaats ontstoken is, waarop de moederkoek was ingeplant. Meermalen ziet men, dat enkel de bodem, of het ligchaam, of ook slechts het onderste segment van den *Uterus* door deze ziekte is aangestast; somwijlen de voorste of de achterste wand. — Ten opzichte van den aard der ontsteking, ontmoet men ook bij *Metritis*, eene zuivere (*Phlegmone*), meestal eene *catarrhale*, zeldzamer eene roosachtige ontsteking. In de meeste gevallen draagt de ziekte een *hypersthenisch* karakter, enkele *asthenische* gevallen uitgezonderd, namelijk, voor zoo verre deze uitdrukking geoorloofd is. De koorts, die nooit ontbreekt, kenmerkt meerendeels zich als eene *Synocha*, is zelden *Synochus*, doch altijd zeer geneigd, bij daartoe aanleidende omstandigheden, om van een' bedenkelijken en rotachtigen aard te worden.

### *Diagnosis.*

#### §. 133.

Over het algemeen bestaan er geene vaste ken-teekenen eener *Metritis*, daar somwijlen het gebrek met de verschijnselen der algemeene ongesteldheid — de ontstekingskoorts (*Synocha*) — een' aanvang neemt, tijdens welke dan de plaatselijke aandoening zich openbaart, terwijl in andere gevallen de blijken van het plaatselijke lijden de koorts voorafgaan. Het  
laat-

laatste schijnt het meest gewone te zijn, en meestal bereikt eene geringe, reeds aanwezige pijn in den onderbuik onder eenen hevigen koortsaanval en voornamelijk in het tijdperk der koude, de werkelijke hoogte van ontsteking. Deze koude is meestentijds zeer hevig en lang aanhoudend, volkomen gelijk aan het *Paroxysme* eener tuschenpoozende koorts, doch de gedurende dezelve kleine, krampachtig zamengesprokkene, harde, gespannen en radde pols, blijft onveranderd in de daarop volgende hitte, en zelfs dan nog, wanneer er, zoo als somtijds gebeurt, zich zweet vertoont. De stekende, bij uitstek gevoelige, pijn neemt daarbij altijd in hevigheid toe, iedere beweging, aanraking des onderbuiks, verloskundig onderzoek, vermeerdert haar zeer, dikwijls is iedere overdekking van den buik voor de kranke ondragelijk. Veelal openbaart zich deze ongesteldheid in de eerste negen dagen na de bevaling; genoegzame waarnemingen echter hebben aange- toond, dat zij zich ook na den veertienden dag, zelfs na de vier weken opdeed, en men mag haar, zoo lang als bij hare verschijning nog de na de geboorte ontstane kraamzuivering plaats grijpt, of hare verwijderde of gelegenheid gevende oorzaak in de verlosfing zelve lag, wel als eene ziekte tot het kraambed behoorende, aanmerken.

#### §. 134.

Voorloopige teekenen ziet men zeldzaam, of het moest zijn, dat de aanleidende oorzaken, te weinig kracht bezittende om terstond eene ware ontsteking te verwekken, aanvankelijk slechts eene geringe



ongesteldheid te weeg bragten. Nadat nu echter de koude had aangevangen, plegen de *extremiteiten*, voornamelijk de onderste, koeler te blijven, terwijl het overige gedeelte des ligchaams, inzonderheid de borst en onderbuik, dikwerf ook het hoofd, uitermate heet zijn. Daarenboven is de dorst zeer hevig, de lijdenden drinken veel en zeer dikwijls; de tong is droog, rood, wordt vervolgens ook wel donker van kleur, met eene taaije slijm bedekt, of zij is alleenlijk vochtig aan de randen, in het midden droog, onbewegelijk en spits; zij is ook van den beginne af met eene wit- of geelachtig taaije slijm overtoegen. Thans krijgen de gelaatstrekken, bij eene volledig ontwikkelde *Metritis*, een eigenaardig iets; de oogen zijn aanvankelijk glinsterend, het bindvlies dikwerf met bloedvaten opgelopen; naderhand worden zij flets en niet zelden tranend; de wangen zijn rood en heet, de handpalmen dikwerf brandend heet. Slaap is hoogst zeldzaam, en bestaat er al eenige neiging daartoe, dan is hij nog onrustig, dikwijls afgebroken en in denzelfden vertoont zich dikwerf ijlhoofdigheid. De *Urin* is rood, zonder eenig bezinkfel, en er wordt minder geloosd; het gebeurt ten minste zelden, dat de hoeveelheid der gebruikte dranken in eene juiste verhouding tot de geloosde *Urin* staat. De buik is gewoonlijk verstopt; buikloop openbaart zich slechts zelden. De huid is droog, heet, of perkamentachtig op het gevoel, en wordt maar zelden volkomen vochtig; eerder verschijnt er een gedeeltelijk zweet, op het voorhoofd en tusschen de borsten. Stoornissen in de kraamzuivering hangen van het gedeelte des

*Ute.*

*Uterus*, dat in ontsteking verkeert, af, zij kan geheel onderdrukt, doch ook slechts verminderd, zelfs geheel natuurlijk zijn. Zog blijft er meestal in de borsten, en bijaldien hetzelfde later vermindert, of mede geheel verdwijnt, dan kan dit ook menigmaal, zoo als wij boven reeds opmerkten, meer ten gevolge van het ingeslagene geneesplan, dan van de ziekte zelve zijn. De koorts is meestentijds eene *Continua continens*, inzonderheid bij eene zuivere ontsteking (*Phlegmone*), en bijaldien het weeffel der geheele baarmoeder ten zetel der ontsteking verstrekt; soms laat zij af, doch verheft zich, des morgens en des avonds, op nieuw. Is de ontsteking van eenen *rheumatischen* aard, dan openbaart zich somwijlen ook een nieuwe aanval van koude.

### §. 135.

Men beseft ligtelijk, dat, hoe verder de ontsteking zich heeft uitgebreid, ook alle verschijnselen des te heviger zullen zijn; reden waarom de ziekte-toevallen tot eene bedenkelijke hoogte klimmen, als de gansche baarmoeder door eene zuivere ontsteking werd aangetast. De hevigheid der koorts, welke dan gewoonlijk eene zuivere *Synocha* en tevens *Continua continens* is, de zeer hevige pijn, de zwelling boven den schaambeensboog enz. laten dezelve ligt onderkennen. — Deelt nogtans enkel de uitwendige oppervlakte van den *Uterus* in de ontsteking, dan is dezelve meer van eenen roosachtigen aard, de pijn zeer hevig, stekend, en wordt door de uitwendige betasting der schaamstreek zeer vermeerderd, terwijl de kraamvloed ongestoord en



het vroedkundig onderzoek bij eene natuurlijke gefteldheid van het fcheedegedeelte zonder pijn kan verrigt worden; de koorts is hier minder hevig, afwiffelend; de pols nogtans klein, dikwerf onregelmatig. Daarenboven heeft deze foort van ontfteking groote geneigdheid om zich verder uit te breiden, doordien eigenlijk alleen dat deel — het buikvlies — hetwelk den *Uterus* omkleedt, ten zetel der ontfteking verftrekt, waarom hierbij meestal belette ftoelgang, fomwijlen een flijmige buikloop met perfingen op den endeldarm, bijaldien de ontfteking zich over het *Intestinum rectum* heeft uitgebreid, en ook ftoringen in de pislozing voorhanden zijn. Somtjds is zelfs de pisaffcheiding ten eenemale onderdrukt, zoodat ook bij de aanwending des katheters geene *Urin* uitvloeit, integendeel de blaas volkomen ledig wordt bevonden. — Dergelijke verfchijnfelen vertoonen zich ook dan, wanneer de voorwand der baarmoeder ontftoken is, doordien hierbij maar al te ligt ook de blaas medelijdend wordt aangedaan. Daarentegen gaat de ontfteking van den achterften wand met pijnen in het kruis en in den endeldarm, en met opftopping der drekftoffen vergezeld. Zijn de zijvlakten ontftoken, dan onderkent men dit gemakkelijk uit de plaats der pijn. Ook in dit geval verfpreadt zich de ziekte ligt verder, doet de trompetten en eijerftokken aan, in vervolg van tijd zelfs fpoedig het buikvlies, doch in den beginne plegen de algemeene verfchijnfelen niet van zulk eenen hevigen aard te zijn. De inwendige vlakte der baarmoeder gaat in het kraambed het menigvuldigfte in ontfteking over, doordien de-

deze het meeste aan die schadelijke invloeden is blootgesteld, welke haar veroorzaken. Bij deze neemt de baarmoeder zelden in omvang toe; slechts eene sterkere drukking vermeedert de pijn, en aandoeningen der pisblaas en van den endeldarm zijn hier bijzonderheden; de kraamzuivering nogtans is altijd gestoord, veeltijds geheel onderdrukt; de koorts is hevig, afwisselend, doch heeft eene groote geneigtheid, om kwaadaardig te worden. De pijn bestaat meer in eene hevige, aanhoudende branding, en is zeer hevig. De baarmoedermond is dikwijls gesloten, niet zelden ook verder geopend, dan hij behoort; de bijzondere deelen der scheede zijn hoogst pijnlijk bij het aanraken, de scheede zelve is zeer heet, dikwijls mede ontstoken.

### §. 136.

Als verdere verschijnselen bij de *Hysteritis* worden nog wel eens klagten over groote zwakte en lusteloosheid gehoord, zonder dat de voorafgegane omstandigheden en betrekkingen tijdens het kraambed en de geboorte daarvoor genoegzamen grond schijnen op te leveren. Flauwten en andere verschijnselen, welke duidelijke blijken dragen, dat het zenuwgestel mede aangedaan is, komen dikwijls voor, waardoor men ligt konde verleid worden, om het voor een' krampachtigen toestand te houden. Bij hevige hoofdpijn, die niet zelden tot ijlhoofdigheid klimt, is het wezen koud, bleek, ingevallen, op alle gelaatstreken de innigste angst en grootste droefheid uitgedrukt, terwijl de lijderessen, bij eene groote liefde tot het leven, staag



staag de vrees te kennen geven, om het te verliezen. De ademhaling is stenend, kort en moeilijk, iedere diepe inademing vermeedert de pijn. Later voegen zich hierbij walging, koring en braking, dikwijls ook een zeer lastige hik en peeshuppeling, inzonderheid bij de verheffing der koorts, niet zelden ook *Meteorismus*. Koudwording der ledematen, koud, kleverig zweet op het voorhoofd en de borst; hoogst moeilijke ademhaling; zeer hevige, naauwelijks leschbare dorst; beving der ledematen, ligte stuiptrekkingen en fluimering zijn meestal de voorboden van den dood, welke dan op den zevenden, veertienden, of ook soms reeds met den derden en vijfden dag pleeg te volgen.

### *Complicatiën.*

#### §. 137.

Als zamengesteldheden ontmoet men het menigvuldigste, ontstekingen van nabijgelegene deelen, allereerst der scheede, welke, gelijktijdig met de baarmoeder, aan eene menigte van schadelijke, de *Metritis* verwekkende, invloeden blootgesteld is; voorts der trompetten en eijerstokken, der pisblaas, des endeldarms, des ganschen darmkanaals (*Tractus Intestinorum*) en der maag, der lever en milt, van het buikvlies en deszelfs verlengselen, als ook des middelrifs. Dikwijls gaan hiermede gepaard ontstekingachtige aandoeningen van de longen en het borstvlies. Menigmaal openbaren zich, hoewel schijnbaar, alle verschijnselen eener ongesteldheid van de eerste wegen, die nergens anders uit voortvloeit.

vloeijen, dan uit de naauwe overeenstemming, welke er tusschen den *Uterus* en de spijsverteringswerktuigen plaats heeft. Voor het overige behooren *rheumatische* toevallen, uit dezelfde oorzaak voortkomende, niet tot de zeldzaamheden. Krampen van allerlei aard overvallen wel hoogst gevoelige, tot krampen (*Spasmen*) geneigde, gestellen, mitsgaders als de ziekte een' ongelukkigen uitgang neemt. Bij eene oogenschijnlijk algemeen heerschende (*epidemisch*), uit eene ongeschikte behandeling bij de geboorte, voortspruitende *Metritis*, nam ik als een bestendig toeval een allerboosaardigst uitslag waar.

### Oorzaken.

#### §. 138.

Gelijkèrwijze elke kraamvrouw tot alle ontstekingsziekten, als zoodanig, reeds voorbeschiktheid heeft, zoo ook tot de ontsteking der baarmoeder; en het is juist *de Metritis*, welke kraamvrouwen het meeste overkomt, daar het veranderde leven dezes werktuigs, deszelfs betrekking tot het overige *Organismus*, hetwelk nu gansch anders geworden is, het ontstaan dezer ziekte buitengewoon begunstigt. Spoedig op elkander volgende zwangerschappen en verlosfingen, in het bijzonder ook menigvuldige miskramen, vroegere gebreken der baarmoeder buiten en in de zwangerschap, voornamelijk zulke, welke eenige verharding van de eene of andere plaats der baarmoeder terug lieten, heeft men als zoo vele voorbeschikende oorzaken aan te merken. Was er tijdens de zwangerschap reeds eene ontstekingachtige gesteldheid

heid



heid des *Uterus* aanwezig geweest, dan openbaart zich deze na de verlossing met meerdere hevigheid, of klimt, wanneer het meer eene *chronische* ontstekingachtige gesteldheid der baarmoeder (*Paraphlogosis Uteri chronica*) was, in het kraambed (*Puerperium*) tot ware, openbare ontsteking met een snel verloop. Zeer volbloedige, welgevoede vrouwen, die maandelijks veel bloeds, nogtans na de verlossing slechts weinig verloren, krijgen in het kraambed ligtelijk deze ziekte, welke ook zeer dikwijls oude, voor den eersten keer, barende vrouwen overvalt. Zij vertoont zich niet zelden bij hoogst prikkelbare, gevoelige voorwerpen, welke door de verlossing zelve, meer dan andere, aangetast werden.

#### §. 139.

Zijn zwangerschap, geboorte en kraambed op zich zelve reeds als voorbereidende omstandigheden te beschouwen, hoe veel te meer worden het dan deze natuurlijke betrekkingen, als zij van den natuurlijke regel afweken. Het *Rheumatisme* der baarmoeder houdt tot na de geboorte aan, of keert na den afloop derzelve weder terug. Eene volbloedige gesteldheid des *Uterus*, welke de verlossing langzaam en pijnlijk maakte, wordt bij eene ongeschikte behandeling menigmaal de oorzaak van opvolgende ontsteking, gelijkewijze eene te hevige inspanning bij eene trage verlossing, hetzelfde of de oorzaak in eenen ziekelijken toestand dezes orgaans zelve, in eene onevenredige verhouding van de wijde des bekkens tot de grootte des kinds, of in andere omstandigheden ligt, dikwerf aanleiding geeft tot *Me-*  
*tri-*

*tritis*. Hetzelfde is toepasfelijk op moeilijke kunstbewerkingen met de handen of instrumenten, gelijk bij voorbeeld tanggeboorten, inzonderheid als zij door onervarene en ruwe Verlofkundigen met kneuzing en kwetfing der baarmoeder verrigt worden, zware keeringen na een lang afgevlœid vruchtwater, alsmede de keizerlijke fnede, en misfchien zullen er meer door verwonding te weeg gebragte ontstekingen plaats grijpen, dan men wel denkt, daar de hulpbetooningen van een groot aantal Vroedvrouwen zeker in even zoo vele fchadelijke handgrepen en *Manipulatiën* beftaan, waartoe ook die handeling van menige Vroedvrouw behoort, bij welke zij de uitdrijving des kinds door drukking van den baarmoederbodem met de handen onder de weeën tracht te befpoedigen. OSIANDER keurde reeds in dit opzigt het zoo menigvuldig plaatsgrijpende onderzoeken met fcherpe en vurige nagels af. Doch er wordt niet altijd eene wezenlijke verwonding gevorderd, de lage ftand des hoofds in de zwangerschap, de drukking, welke het onderfte gedeelte des *Uterus* tufchen het kinderhoofd en de beenderen des bekkens ondergaat, de pogingen om den baarmoedermond met geweld te verwijden, of hem over het hoofd terug te fchuiven, en meer dergelijken zijn vermogend genoeg deze ziekte voort te brengen. Ook de kunstmatige afhaling der nageboorte, in het bijzonder bij eene onregelmatige inplanting of aaneengroeijing der *Placenta* met den *Uterus*, of eene ondoelmatige handelwijze in dit tijdstip der verloffing, is eene vruchtbare oorzaak der *Metritis*, waarom ook HALLER de fpoedige en kunst-



kunstmatige wegneming laakte, en den raad gaf, de afscheiding en uitdrijving liever geheel der natuur over te laten.

### §. 140.

Hoofdstuk 4 van boven werd reeds aangemerkt, dat na bloedvloeijingen uit de baarmoeder ook dikwijls ontstekingen derzelve voorkomen, doordien somwijlen eene allerondoelmatigste, niet zelden echter ook, door dringende noodzakelijkheid aangewende behandeling derzelve, en de daartoe gebruikte verhittende en opwekkende middelen de grondoorzaak der *Metritis* uitmaken. Ook de *Tampon*, het ingaan met de hand, inspuitingen van koude of scherpe vloeistoffen, koude omslagen over den buik, geven daartoe aanleiding. Blevens na de bevalling enkele deelen van het ei, zoo als van de vliezen, der *Placenta* of des kinds, of zijn, buiten deze, nog andere vreemde deelen aanwezig, *Mola's* of polypen, dan zal in de meeste gevallen door de prikkeling derzelve eene ontsteking des *Uterus* ontstaan. Even gewigtige oorzaken zijn alle plaatsveranderingen der baarmoeder, als uitzakking, voor- en achterwaartskeering, doordien door dezelve stoornissen in den bloedsomloop ontstaan, boven alle andere echter de geheele en gedeeltelijke binnen-buitenwaartsomkeering. Dat de onderdrukking des kraamvloeds meer een gevolg der *Metritis*, dan hare oorzaak zij, is boven reeds vermeld; zij zal nogtans zonder daarop plaatsgrijpende ontsteking der baarmoeder wel slechts zelden en alleen dan voorkomen, bijaldien de vroegere stilstand dezer afscheiding meer voor iets zie-

ziekelyks te houden is, of een ander orgaan daarentegen eene bloederige stof afscheidde. — Openbaart zich de ziekte onmiddellijk na eene plotselinge onderdrukking der zogaffcheiding, hoezeer dit zelden gebeurt, dan kan men nogtans slechts in enkele gevallen een zeker in verband staan der oorzaak van beide gebreken vooronderstellen, en de *Hysteritis* voor eene zoogenaamde zogverplaatfing (*Metastasis lactea*) houden, omdat dezelve oorzaken, welke de verdwijning van het zog plegen te weeg te brengen, ook eene baarmoederontfteking kunnen verwekken, gelijkerwijze gemoedsaandoeningen en verkoudingen. Op eene andere plaats dezes werks zullen wij nog gelegenheid hebben; verder over deze zogverplaatfingen uit te weiden; hier zij het intusfchen genoeg, dezelve als mogelijke oorzaak aangevoerd te hebben. Een oorzakelijk verband tusfchen de onderdrukking eenes aanbeijenvloeds en de *Metritis* is niet te loochenen. Deze bloedige affcheiding ftaat in eene te naauwe betrekking met den bloedsomloop in den *Uterus* zelven, en zijn ftilland, als het niet uit de natuur der zake voortvloeit, moet noodzakelijkerwijze eene fterke ophooping van bloed in den *Uterus* veroorzaken, zoodat de gewigtigfte voorwaarde tot het ontftaan der ontfteking reeds daar is. Als ontfteking, door ziektestofverplaatfing, zag men menigmaal de *Metritis* ten gevolge van teruggedreven huiduitflag, zoo als van gierst-, fcharlakenuitflag, mazelen, of na met geweld teruggedrevene huidziekten van een' anderen aard, fchurft, het hoofdzeer, of na in het kraambed fpoedig toeclopende verouderde zweren, inzon-



derheid aan de beenen, als ook wel ten gevolge van eenen onderdrukten jichtaanval. De jicht op zich zelve moet men reeds als eene verwijderde oorzaak aanmerken, doordien zij, even als kropklier- en engelsche ziekte, ligtelijk stremmingen en kleine, somwijlen goed-, dikwijls ook kwaadaardige verhardingen in den *Uterus* doet ontstaan.

#### §. 141.

Groote droefheid, angst, schrik, bovenmatige en plotselijke vreugde heeft men menigmaal baarmoederontstekingen zien veroorzaken, en de, bij kraamvrouwen zoo zeer verhoogde, vatbaarheid voor indrukken van dien aard, maakt de verklaring van het verband niet moeilijk, tevens behoort de ziekte, uit deze bronnen voortgevloeid, tot diegene, welke juist het gevaarlijkste zijn. Dat de naweeën zelve zich tot zulk eenen hoogen graad verheffen kunnen, dat het hoogst moeilijk wordt, de juiste grensfcheiding van den overgang derzelve tot ware ontsteking te bepalen, werd bij hare opzettelijke beschouwing reeds opgemerkt. Ook na eenen, in de eerste dagen des kraambeds verrigten, bijslaap zag ik *Metritis*, gelijk in andere gevallen hevige *Metrorrhagiën*, ontstaan; hier heeft men, als het ware, eene dubbele oorzaak, de gemoedsopwekking namelijk en de werktuigelijke prikkeling der gekwetste teeldeelen en der lager staande baarmoeder, welke aanleiding tot de ziekte geeft. Het vatten van koude is mischien ook eene vruchtbare oorzaak van de ontsteking der baarmoeder. Tijdens de verlossing zelve is daartoe reeds zoo menigvuldig

dig gelegenheid gegeven, vooral als dezelve in een' kraamstoel geschiedt. De inrigting der kraamkamer en de behandeling der kraamvrouwen zelve, aangaande de regeling van haar gansche gedrag, doen maar al te ligt koude vatten, en de vrouwen zelve zijn, wanneer zij zich slechts eenigzins wel en sterk gevoelen, zeer geneigd zich aan zulke nadelige invloeden bloot te stellen, doordien zij te vroeg, en niet met de noodige behoedzaamheid, het bed verlaten. Ook wil men *Metritis* in het kraambed hebben waargenomen, ten gevolge van onzuiverheden in de eerste wegen (*Gastricismus*), doch waarbij men mischien ook de, ten gevolge der baarmoederontsteking dikwijls voorkomende, valsche *gastrische* verschijnselen, als braking van galachtige stoffen, misfelijkheid en beslagen tong, voor de oorzaak heeft gehouden. Dat de baarmoederontsteking op den eenen tijd meer voorkomt, dan op den anderen, ligt voorzeker wel in de weêrsgesteldheid; wij hebben ze ten minste nooit algemeen zien heerschen (*epidemisch*), een *Contagium* is toch wel niet bewezen. Bij andere ontstekingen der onderbuiksingewanden, koortsen van een' zeer kwaadaardigen aard, alsmede bij kraamvrouwenkoorts, waarbij zij somwijlen in het begin de oorspronkelijke ziekte schijnt uit te maken, doch ook meermalen eerst op het einde, als een der kwaadste verschijnselen zich vertoont, zien wij dezelve dikwijls als *symptomatisch* verschijnen.



## Gevolgen en Uitgang.

§. 142.

§. 620. II D. I St. en §. 1334 en 1335 III D. I St. zijn de gevolgen van de ontsteking des *Uterus* in den onbezwangerden staat en tijdens de zwangerschap reeds opgeteekend. Het hoofdzakelijke daarvan geldt ook omtrent de *Metritis* in het kraambed. Er grijpt of eene volkomene verdeeling, door gunstige scheidingen, of met behulp der kunst, plaats; of er ontstaat ook verettering met vorming van absces; of de ontsteking gaat schielijk en plotseling in versterking over, zoodat de dood bij de meeste hoogte der ziekte intreedt, of er ontstaan naziekten, die als ware gevolgen der ontsteking te beschouwen zijn.

§. 143.

De gunstigste uitgang door volkomene verdeeling valt gewoonlijk op den vierden of zevenden dag voor, het behoort meer tot de zeldzaamheden, dat deze door eene niet merkbare scheiding (*Lysis*) geschiedt, zoodat de ziekte eerst tegen, of met den veertienden dag afloopt. De *crisis* grijpt somtijds door eene bloedvloeijing uit den *Uterus*, of de scheede, in eenige gevallen ook door eene bloeding uit de speenvaten des endeldarms, plaats; deze soort van ziektescheiding valt meestal bij de *phlegmoneuse*, *synochale* ontsteking vóór, of op den zevenden dag, voor. Zeldzamer treft men eene *critische* neusbloeding, of bloedspuwing aan, hoewel ook deze door meerdere Artsen reeds is waargenomen, nadat er blijken van bloedophooping in het hoofd en de borst waren voorafgegaan. Gelijkerwijze neemt somtijds

tijds de baarmoederontsteking door eene hevige *Diarrhoea* een' gelukkigen keer, welke op een' der *critische* dagen plotselijk, of na de gewone voorboden zich vertoont, inzonderheid dan, wanneer onzuiverheden in de eerste wegen, of eene bovenmatige uitstorting van gal de aanleidende oorzaak der *Metritis* geweest waren, mitsgaders als dezelve zich grondde op eene gemoedsaandoening. De meest plaatsgrijpende ziektescheiding geschiedt, door een algemeen, overvloedig zweet, zoo als het vooral bij de *rheumatische* ontsteking dikwerf het geval is. Deze uit zich zelve, met verligting, vermindering der pijn en afneming der koorts, plaatsgrijpende, voorname scheiding doet zich gewoonlijk met den vierden of den zevenden dag op; de harde, kleine pols wordt week, golvend, voller en langzamer; de harde, gespannen huid weeker en vochtiger, de koude ledematen behouden hunne natuurlijke warmte, en een zuur riekend, zeer overvloedig zweet komt, veelal na de derde, vierde of zevende toeneming der koorts te voorschijn. Dikwijls wordt ten zelfden tijde nog eene donker gekleurde met troebele, vervolgens echter met een roodachtige of zandachtig *sediment* bezinkende *Urin* in eene groote hoeveelheid geloosd, en vertoont er zich eene uitvloeijing van slijmige, aan etter gelijkende stoffen uit de teeldeelen, welke laatste zich, ook na de roosachtige ontsteking van het inwendige slijmvlies der baarmoeder, pleeg te openbaren. Soms tijds gelukt het nu der kunst, door de, onder op te gevene, behandeling, dergelijke ontlastingen te verwekken en de gewenschte verdeeling



te bewerken, waartoe zij bloedontlasting (plaatselijk en algemeen), ontlastmiddelen, prikkelende huidmiddelen (*Epispastica*) en zweetdrijvende middelen (*Sudorifera*) aanwendt.

### §. 144.

Slaagt de natuur in hare pogingen, noch de kunst door de aangewende middelen, om de verdeeling te bewerken, dan is de uitgang van baarmoederontsteking in verettering een der meest gewone, en in zekeren zin na gene, de beste. Menigvuldige huiveringen, zonder werkelijke koude te bereiken, of die het kenmerk dragen eener nieuwe verheffing der koorts, de verandering der stekende, doordringende pijn, in eene meer drukkende, kloppende, nieuwe koortsbewegingen, na den negenden en veertienden dag, geven de vorming van *absces* te kennen. Naar gelang nu de ontsteking dit of dat gedeelte des *Uterus* heeft ingenomen, naar die mate is ook de plaats, waar zich het ettergezwel vormde, onderscheiden. Het gelukkigste geval is dat, waar de etter zich door de scheede ontlast, hoezeer ook de hier zich vormende likteekens en verhardingen voor de gevolgen een' nadeeligen uitgang, of bij groote uitgebreidheid der zweer, zeer vreeselijke verettering, ondermijning der krachten of *Phthisis uterina* duchten doen. Uitstorting des etters in de buikholte, in het nabijgelegene celweeffel, in den endeldarm, of pisblaas, behoort tot de ergste gevallen, omdat daaruit meestal ongeneeslijke naziekten geboren worden; immers gevallen van volkomene genezing der etterachtige buikwaterzucht (*Hydrops abdo-*

*minis purulentus*), van abscesfen in de bekkenholte, die zelfs dikwijls op den oogenblik van de uitstorting des etters den dood met zich voeren, behooren tot de zeldzame en gelukkige verschijnselen; baande zich de etter evenwel, doordat de ontsteking de pisblaas of den endeldarm tevens had aangetast, eenen weg door deze deelen naar buiten, dan zullen niet alleen zeker ongeneeslijke fistels, maar ook veelal *Phthisis Uteri* de treurige gevolgen zijn. Werd de ontsteking verwekt in een' tijd, dat vroegere ziekten, als kropklier-, jicht-, venerische ziekte enz. de reeds klierachtige deelen des *Uterus* aangedaan en in eenen ziekelijken toestand gebragt hadden, dan is eene verettering dezer bijzondere deelen (*Apostema tuberculosum*) de meest gewone uitgang, opvolgende *Phthisis uterina* echter onvermijdelijk, wijl altijd weder ontstekingachtige toevallen en nieuwe ettering zich opdoen, tot eene uitterende koorts de reeks van ziekelijke toevallen besluit, tenzij er reeds eerder een rotachtig bederf zich geopenbaard had.

#### §. 145.

Jonge vrouwen met eene volbloedige gesteldheid verkeeren in groot gevaar van schielijk haar leven te verliezen, door den overgang der ontsteking in heetvuur (*Gangraena*) des *Uterus*, terwijl bij zwakke, kwaadfappige voorwerpen meer *koudvuur* zich vertoont. Dezen uitgang heeft men te verwachten, wanneer geen der doelmatig aangewende middelen het vermogen heeft, de toevallen te beteugelen, de pijn steeds heviger en aanhoudender, de pols kleiner en



sneller wordt, de ledematen hunne natuurlijke warmte geheel verliezen, in de dijen zich eene zekere soort van gekruip en een gevoel van doofheid openbaart, de pijn plotseling ophoudt, een buitengewoon kwalijk riekende *Ichor* uit de teeldeelen vloeit, het wesen invalt, de neus spits wordt, de lippen bleek worden en beven, peeshuppeling en ligte stuiptrekkingen zich opdoen, onder welke de lijderes stilt den geest geeft. Deze uitgang zal na den zevenden dag voorzeker nooit plaats grijpen, meestal valt hij reeds op den derden, dikswijls zelfs na verloop van de eerste vier en twintig uren voor. Bij de lijkopening vindt men den *Uterus* op enkele plaatsen in eene bleeke en papachtige massa, omgeven door een' rooden kring, veranderd, de plaats, waar de *Placenta* zich inplantte, voornamelijk aangedaan, dikwerf het buikvlies op meer dan een punt ontstoken, gelijkewijze het darmkanaal. Zetelt het gebrek in de voorste vlakte der baarmoeder, dan vindt men somtijds de blaas aan dien kant tevens aangedaan; veelal ook de scheede in rotachtige ontbinding overgegaan en de schaamlippen opgezwollen, bleek, dikwijls zwart van kleur.

#### §. 146.

De *Metritis* in het kraambed heeft eene bijzondere geneigdheid tot uitzweeting eener *plastische lympa*, die tot *desorganisatie* van dit werktuig aanleiding geeft. De ziektegevallen nemen dan, wel is waar, in hevigheid af, de koorts wordt gematigder, laat dikwijls geheel na, de pijn verliest dat stekende en prikkelende, en verandert meer in

een

een onaangenaam, drukkend gevoel in den onderbuik, dat menigwerf met pijnen in het kruis, moeilijkheden in de *Urinlozing* en de ontlasting der drekstoffen, knagende pijnen in de lenden, walgingen en dergelijken meer vergezeld is. Doch geen spoor van ziektescheiding was er te ontdekken, de ziekte werd langdurig en hield tot, of in de vierde of vijfde week aan. Voorts openbaart er zich een bovenmatige slijmvloed, welke somwijlen met bloedstrepen vermengd, of ook kwalijk riekend is; de *Uterus* blijft boven den schaambeensboog voelbaar, bij het inwendig onderzoek vindt men de lippen van den baarmoedermond tot eenen wrong opgezwollen, pijnlijk, somwijlen naar buiten uitpuilende, doch ook dikwijls schijnbaar volkomen gezond, en slechts deszelfs bovenste gedeelte in omvang toegenomen, harder op het gevoel, den bodem meer voor- of achterwaarts gekeerd, en de baarmoeder *retorts*-wijze omgebogen. De maandstonden zullen hier zelden hunnen regelmatigigen gang houden, soms staan ze geheel stil, terwijl ze in andere gevallen meermalen en sterker zich vertoonen. Eindelijk gaat deze gesteldheid in ettering, en bij voorbeschiktheid daartoe, in eene kankerachtige verzwering over.

#### §. 147.

Wanneer de, in de vorige § beschrevene, uitgang in verharding, door de uitstorting van *plastische lympha* in het weeffel, in de bijzondere cellen des *Uterus* plaats greep, dan ontstaat er na eene dergelijke ziekelijke verrigting waterzucht der baarmoeder. Deze soort van *Hydrometra*, welke wij met



den naam van *Oedema Uteri* bestempelen en in ophooping van water in het celachtig weeffel der baarmoeder gegrond is, heeft zeer veel overeenkomst met het vorige gebrek, doch is door de lijvigheid en mengingsbetrekkingen der vloeistof, en veelligt alleen door haren meer of minderen rijkdom aan waterstof, in betrekking tot de stik- en koolstof, en, zoo het schijnt, ook tot het zuurstoffelijk beginsel, daarvan onderscheiden. Was bij den uitgang in verharding met vermeerdering des omvangs, de uitzweeting of uitstorting meer *Lympha*, hier is het meer eene dunne, vloeibare wei, welke in en tusfchen het celachtig en vaatachtig weeffel des *Uterus* uitgestort werd. Wanneer men in aanmerking neemt, hoe elke ontsteking de geneigdheid heeft, nieuwe, vreemdaardige of ten minste in plaats en menging ziekelijke voortbrengfelen te ontwikkelen, hetgeen menigen ziektekundige verleid heeft het wezenlijke der ontsteking, in betrekking tot ophooping, juist in dit streven naar overmatige voeding (*Hypertrophie*) te stellen, en doordien, voornamelijk wanneer de zogaffcheiding gestoord is, het verhoogde vormingsleven der baarmoeder, dat na de verlossing moest ophouden, op nieuws begint en als voortbrengende kracht zich openbaart, dan behoeft men zich niet te verwonderen, dat verharding en waterzucht der baarmoeder, zoo ligt na hare ontsteking ontstaan, en in een' meer- of minderen graad zeker altijd er bijkomen, wanneer geene volkomene verdeeling, inzonderheid door eene ontlastende ziektescheiding (*Crisis evacuatoria*), of ettering, welke meer naar den vorm, dan het wezen

zich

zich onderscheidt, plaats greep. Het zuchtgezwel des *Uterus* nogtans ontstaat meest na zuivere *passive* ontstekingen der zelfstandigheid; *Inflammatie* der inwendige vlakke, die reeds op zich zelve meer van een' roosachtigen, het menigvuldigste van een' *rheumatischen* aard is, gaat eerder tot eene ophooping van water in de baarmoeder zelve over, hoewel het water in de holte der baarmoeder (*Hydrometra ascitica*) tijdens het kraambed juist tot de zeldzaamste verschijnselen behoort, wijl eene zoo aanhoudende toefluiting van den baarmoedermond in dit tijdperk des levens slechts in enkele gevallen kan voorkomen; eerder nog mag men, inzonderheid als er gedeelten der vliezen van het ei terug bleven, de vorming eener *Mola hydatitosa* vooronderstellen. Nopens het verder beloop dezer ziekten heeft al datgene waarde, wat in §. 629 en volg. staat opgeteekend.

#### §. 148.

Wij hebben reeds gezegd, dat ook ontstekingen van andere, inzonderheid nabijgelegene organen zich met de *Metritis* vereenigen, en moeten hier alleen nog aanmerken, dat na ontstane verettering, ook dit altijd hoogst nadeelig toeval mede nog kan te voorschijn komen, voornamelijk eene hevige *Psoitis*, wanneer de etter tusfchen de buikspieren zich eenen weg baande. Wij hebben tevens melding gemaakt van de *Phthisis uterina* en de *chronische Paraphlogosis Uteri*, in welke eene *acute* ontsteking fomtijds overgaat. Voorts heeft men men nog als gevolgen een' overtolligen, niet zelden ongeneeslijken slijmvloed uit den



den *Uterus*, die zelfs onvruchtbaarheid, menigvuldige miskramen of ontaarding van het ei tot eene *Mola* te weeg brengt, en vele andere verschijnselen, die uit de gestoorde levenswerking van den *Uterus*, vooral ten aanzien van zijne gevoeligheid, hunnen oorsprong ontleenen, en welke wij met den naam van *Hysterie*, in den uitgestrektsten zin des woords, bestempelen.

### *Voorzegging.*

#### §. 149.

De ontsteking der baarmoeder in het kraambed heeft men altijd voor eene der bedenkelijkste en gevaarlijkste ziekten te houden, die, dikwerf zeer schielijk te werk gaande, een doodelijk einde neemt, dikwijls ook door andere ziekten, waarin zij overgaat, een langdurig fukkelen en den dood ten gevolge heeft. Moeijelijk is het hieromtrent iets zekers vooruit te zeggen; het volgende echter zal genoegzaam zijn, om elk bijzonder geval eenigermate te kunnen beoordeelen.

#### §. 150.

Hoe spoediger en eerder na de verlossing de ziekte zich openbaarde, inzonderheid nog voor de zogaffcheiding geregeld aan den gang was, des te grooter is het gevaar, vooral omdat ook hier alles van een' snel verloopenden aard is. Ontleende zij haren oorsprong reeds uit de zwangerschap, klom de *chronische* ontsteking reeds tot een' *acuten* vorm door de voorafgegane verlossing, dan is wezenlijke ge-

genezing in vele gevallen onmogelijk, en is ook hier de bekende voorzeggingsstelling van HIPPOCRATES, dat vrouwen, die koortsend in het kraambed gaan, meestal sterven, toepasselijk. *Metritis* na zeer langdurige, moeilijke geboorten, bij welke de verlostte zeer veel kracht moest inspannen, vooral wanneer mischien eene miskende *Plethora Uteri* de oorzaak der vertraging was, is hoogst bedenkelijk. Gelijkerwijze is het gesteld met de *traumatische* ontsteking na beleedigingen door beklemming des hoofds, door tanggeboorten, keeringen, andere kunstmatige verlosingen, na de keizerlijke snede, kunstmatige afscheiding en wegneming der vergroeide of nog vastgehechte *Placenta* enz. De gunstigste gevallen zullen mogelijk diegene zijn, bij welke de beleediging het scheidgedeelte en het onderste segment der baarmoeder trof, terwijl bodem en ligchaam vrij bleven, hoewel juist gene deelen meer tot verharding in den kwaadaardigen vorm geneigd zijn, kan ook bij opvolgende verettering de uitvloeiing des etters langs de scheede gemakkelijker geschieden. Het gevaar bij de ontsteking na de keizerlijke snede, is daarenboven nog bijzonder gevaarlijk, omdat hier de beleediging des *Uterus* meestal bij kwaadsappige, te voren *rachitische*, *scrofuleuse* voorwerpen, of de zoodanige plaats vindt, die door eene andere ongesteldheid in de vochten zijn aangedaan, en de kunstbewerking na eene lange inspanning, hevige gemoedsaandoening ondernomen wordt, zoodat niet alleen het zuiver ontstekingsachtige door de *Dyscrasie* veranderd is, maar ook de ontsteking zelve het *asthenische* karakter draagt.



draagt. Dien ten gevolge was men misfchien te voren, toen men minder fchroom voor deze *Operatie* had en ze fpoedig na de verfchijning der weeën ondernam, gelukkiger dan in lateren tijd.

### §. 151.

Wat de gefteeldheid der lijdenden betreft, zoo heeft men bij zeer bloedrijke, welgevoede, jonge voorwerpen, meer hevige, zuivere ontfteking, het *Phlegmone* en den overgang in heetvuur te duchten, doordien bij deze alles fpoediger in zijn werk gaat. Intusfchen mag men hier veel eerder op eene gunftige fcheiding, door eene bloeding of eene andere ontlasting hopen, en behoeft men minder voor naziekten bekommerd te zijn, wanneer het gelukt de hevigheid der ontfteking te beteugelen. Zwakke, zeer gevoelige vrouwen, welke door *Metritis* aangedaan worden, verkeeren altijd in groot gevaar, en de voorzegging kan bij deze niet gunftig zijn, wijl bij haar ligt langdurige naziekten de ontfteking achtervolgen, deze bij een fchielijk verloop zich ligtelijk met krampen vereenigt, de koorts meestal vermengd is en zeer veel geneigdheid heeft, om van een' bedenkelijken aard te worden. Als oorfonpronkelijk lijden heeft de baarmoederontfteking altijd minder gevaar, dan wanneer zij toevallig (*symptomatisch*) bij andere ontftekingen, of andere ziekten des kraambeds verfchijnt, gelijkewijze ook elke zamengefteeldheid de voorzegging haghelijker maakt. Reden waarom zij hoogst bedenkelijk is, als zij in het laafte tijdperk van *Typhus* zich opdoet, en naauwelijks ooit genezing te hopen is,

wan-

wanneer zij blijken eener algemeene ongesteldheid van het *Organismus*, inzonderheid van ontbinding, met zich draagt. Het spreekt van zelve, dat het gevaar met de hevigheid der ontsteking toe- en afneemt; men neme echter hierbij in aanmerking, dat eene zuivere, hevige ontsteking, zelfs bij eene aanmerkelijke uitbreiding, minder te vreezen is, dan eene van minder aanbelang, die meer als eene *asthenische* en zenuwachtige zich kenmerkt, doordien de kunst bij gene regstreeks tegen de ziekte werken kan. — Hoe uitgebreider de ontsteking is, des te grooter is natuurlijk het gevaar; om deze reden is het geval, waar de baarmoeder geheel in ontsteking verkeert, ook het bedenkelijkste. De stilstand der kraamzuivering, altijd onafscheidelijk van de ontsteking der inwendige vlakte der baarmoeder, maakt deze hoogst gevaarlijk, en zij zoowel, als die, bij welke het gansche weeffel des *Uterus* ten zetel der ontsteking verstrekt, verwekken het menigvuldigste gebrekkige bewerktuiging van de baarmoeder. Het grootste gevaar bij de ontsteking der uitwendige vlakte ligt daarin, dat deze foort de meeste geneigdheid tot verdere uitbreiding heeft, en dat het buikvlies, de eijerstokken, trompetten, kortom alle in de bekken- en onderbuiksholten gelegene organen ligtelijk mede in de ontsteking begrepen worden. Juist deze foort van *Metritis* hebben eenige Geleerden, voor het begin der *Febris puerperalis*, of voor onafscheidelijk met haar verbonden, aangezien. De ontstoken voorste vlakte der baarmoeder heeft ligt, hoezeer niet altijd, op de blaas, die der achterste op den endeldarm en de spieren in het bek-

ken,



ken, eenen nadeeligen invloed, en bij de aandoening van den een' of beide zijranden, verkeeren de eijerstokken in groot gevaar, en het is niet onwaarschijnlijk, dat de eijerstokontsteking (*Oophoritis*) hierbij meer medelijdend (*Deuteropatisch*) dan als oorspronkelijke ziekte voorkomt.

§. 152.

Let men bij de voorzegging op het karakter alleen, dan zal eene *rheumatische* ontsteking, het *Rheumatisme* der baarmoeder in het kraambed, waarop CHAMBON DE MONTEAU bereids voor WIGAND de aandacht gaande maakte, de beste voorzegging gedoogen, omdat bij deze, in de meeste gevallen, dikwerf zelfs zonder eenigen invloed der kunst, met eene verwarmende, uitwaseming bevorderende verpleging eene volkomene verdeeling met de verschijnselen van een scheidend, kwalijk- en zuurriekend zweet plaats grijpt. Ook klimt deze soort van ontsteking, ten ware met *Phlegmone* vereenigd, niet tot zulk eene aanmerkelijke hoogte, dat zij tot versterving zoude kunnen overgaan, en daar zij in de vliezige, peesachtige deelen zich zetelt, heeft men ook minder voor onttaarding (*Desorganisation*) te vreezen. Geschiedt deze verdeeling door zweet en *Urin* niet in de eerste veertien dagen, dan gebeurt het somtijds dat de haar vergezellende vermengde ontstekingskoortsen met de gewoonlijk daarmede vereenigde *gastrische* verschijnselen ophouden, en *chronisch* worden, ook ziet men wel eens eene stofverplaatsing (*Metastasis*), en de *rheumatische* ontsteking doet, terwijl zij in den *Uterus* ver-

verdwijnt, een der ledematen, de scheeden der borstspieren, het borstvlies enz. aan. Schijnvliezen vertoonen zich hier gemeenlijk niet bij, en er zal schier geen voorbeeld bekend zijn, waarin zulk een geval met den dood eindigde. Van meer gevaar is de roosachtige ontsteking, welke ook in alle hare verschijnselen met meerdere hevigheid zich openbaart. Veel spoediger gaat deze tot versterking en verrotting over, om het even, of zij eerst in heet- (*Gangraena*) en dan in koudvuur (*Sphacelus*), of terstond in het laatste, ten gevolge eener *asthenische*, ontbindende ontsteking overgaat. De verdeling grijpt bij deze soort van *Metritis* voor het minst spoedig en volkomen, meer onvolkomen en eerst laat plaats, meermalen ontstaat er eene langdurige, dikwerf vernietigende verettering en uitzweeting van *plastische Lympha*. Aan scheidingen door de natuur kan men hier nauwelijks denken, en volgen zij, dan is het zelden voor den negenden dag door zweet en eene donkere *Urin*, met een aanmerkelijk zandachtig bezinksel, hoogst zeldzaam door eene bloeding. Altijd heeft deze ontsteking, als ook de haar vergezellende koorts een kwaadaardig karakter; *gastrische*, medegevoelige verschijnselen treft men er dikwijls bij aan, zoo ook krampachtige, bij eene gevoelige, zenuwachtige gesteldheid, terwijl zij door hare geneigdheid om van plaats te veranderen, groote vrees verwekt, doordien zij ligt naar de longen verhuist, ja zelfs dikwerf tot zogverplaatsingen aanleiding geeft. Door haren *acuten*, dikwijls hoogst *acuten* aard, en hare dikwijls buitengewone hevigheid, door den niet ongewonen uit-



gang in *Gangraena*, verharding en verettering wordt de zuiver *stenische Metritis* gevaarlijk, doch haar veelal onvermengd karakter daarentegen veroorlooft de aanwending van regstreeks ontstekingswerende geneesmiddelen. Is de haar vergezellende koorts van een' vermengden, ontstekingsachtigen aard, dan zij men meer op zijne hoede, dan bij eene zuivere ontstekingskoorts; onder alle overige omstandigheden nogtans is de *Typhus* altijd het bedenkelijkste, en bovendien het geval, waarin onder de eene of andere verhouding eene *Febris hectica* zich openbaart.

Van de zamengesteldheden (*Complicatiën*) zijn ver uitgebreide ontstekingen, werktuigelijke beleedigingen, uitslag, en ongesteldheden in de vochten voor hoogst ongunstig te houden. Als gelukkige uitgangen merke men de verdeeling en verettering aan, trouwens de laatste alleen, wanneer de etter onverhinderd naar buiten kan vloeijen, en geene etterholten of fistels vormt. Heetvuur brengt voorzeker altijd den dood met zich, slechts daar, waar het scheidgedeelte alleen er door aangedaan werd, en dit gedeelte zich afscheidde, is genezing mogelijk. Verhardingen bevatten meestentijds de aanleidingen tot eenen vroegen of lateren dood.

### *Geneeswijze.*

#### §. 153.

De *Metritis*, als ontstekingsziekte, berust op eene plaatselijke, ziekelijk verhoogde werkzaamheid des prikkelbaren stelsels; het wezenlijke der genezing ligt diensvolgens in beteugeling der ver-  
hoog-

hoogde werking en terugwerking; wijl deze ontsteking zoo ligt tot versterking en verettering overgaat, en deswege meerendeels aanwending dier middelen vordert, die spoedig het doel bereiken, inzonderheid bij zulke, waar, door eene hoogst moeilijke verlossing en het gebruik van instrumenten de baarmoeder gekwetst werd. Overmits nu de eigenlijdige koorts, elke ontsteking vergezellende, als onafscheidelijk met haar verbonden en als het naaste uitwerksel der ziekteoorzaak en des plaatselijken lijdens tevens, gewoonlijk ook in hare vermeerdering of vermindering met den kraamvloed gelijken tred houdt, kan men zich dikwijls ligt vergissen, met om het algemeene lijden, het plaatselijke over het hoofd te zien, en meende men, gelijktijdig met de koorts, ook de ontsteking te kunnen wegnemen. Doch, wanneer gelijk bij *hyperstenische* ontstekingen, meestentijds door eene *stenische* koorts vergezeld, beider behandeling op de ontstekingwerende geneeswijze zich grondt, dan vereischen die gevallen, in welke de plaatselijke ziekte (verhoogde prikkelbaarheid met vermeerderden toevoer van bloed), met eene *asthenische* koorts, bijv. den *Typhus* vereenigd is, en welke men dien ten gevolge met den naam van *asthenische* ontstekingen bestempeld heeft, eene hoogst voorzigtige en blijkbaar van de plaatselijke verschillenden, algemeene behandeling, waarom de onderscheiding in *hyperstenische* en *asthenische Metritis* (baarmoederlijke ontstekingen met algemeene en plaatselijke terugwerking van het vaatgestel) voor de *Therapie* gewis de belangrijkste zijn zal.



## §. 154.

Van minder belang voor de behandeling is de verdeeling in *phlegmoneuse*, roosachtige en *rheumatische* ontsteking der baarmoeder, offchoon ieder dezer bijzondere foorten eenigen invloed op de keuze der aan te wendene, bijzondere middelen, zoo niet op de algemeene geneeswijze tevens heeft. Dus vereischt de *phlegmoneuse* ontsteking, voor zoo verre zij in de meeste gevallen zich met *Synocha* vertoont, meer regtstreeks het ontstekingwerend geneesplan; algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, het gebruik der *Nitras Potassae* en de overige zouten in groote giften; minder (over het algemeen) de aanwending van kwik- of der zweetdrijvende middelen.

Bij de roosachtige ontsteking moet men voorzigtiger met bloedontlastingen zijn; minder verdraagt zij zoutachtige middelen, en behoeft meermalen den *Calomel* met de *Digitalis*, de *Sulph. auratan-tim.* enz. in enkele gevallen de zacht afvoerende geneeswijze (*antigastrische*). Zweetdrijvende middelen komen wederom meer bij een *rheumatisch* lijden te pas, hetwelk den koeleren, bij de zuivere ontsteking, aangewezenen leefregel niet verdraagt, maar volstrekt eenen meer warmen verlangt, ten einde de scheiding door huiduitwaseming te bespoedigen.

## §. 155.

De graad der ontsteking komt bij de verkiezing der bijzondere geneesmiddelen even zoo zeer in  
aan-

aanmerking, als het tijdperk, waarin zij zich bevindt. Zoo zal men bij het begin der ziekte dikwijls nog in staat zijn, hare verdere uitbreiding door zekere middelen te voorkomen, en schielijk een' gelukkigen uitgang te bewerken, welke in den hoogsten graad der ontsteking naauwelijks eenig vermogen meer zullen hebben; desgelijks heeft men de sterkeren middelen te vermijden; als de *Crisis* eenen aanvang neemt, of als de ziekte haar einde nadert. Hoofdzakelijk wachte men zich, zonder genoegzame aanwijzing, voor een te onbeperkt gebruik van verzwakkende middelen, opdat men niet tot een' altijd ongunstigen overgang (*Metaschematismus*) in den *asthenischen* vorm aanleiding geve; men zij evenwel niet schroomvallig met het doen eener aderlating, of de toediening des salpeters, en handele stoutmoedig, als het gevaar dringt. Men bedenke hier altijd, dat, indien het vrouwelijke geslacht over het algemeen meer geneigdheid heeft tot herstelling (*Reproductie*), tijdens de zwangerschap de bloedmaking nu nog schielijker geschiedt, en ook in het kraambed steeds die verhoogde toestand van het *reproductive* leven voortduurt; waarbij men tevens in aanmerking neme, dat de geneigdheid tot vorming van schijnvliesen, juist bij kraamvrouwen, en desgelijks de ontsteking van den *Uterus* en des buikvlies het grootste is. De kleine, ingetrokkene pols heeft, wel is waar, somwijlen aanleiding gegeven, om het karakter der ziekte voor krampachtig en dit meer voor naweeën te houden. Bijkans nooit echter hebben die gevallen eenen gelukkigen afloop, welke men met krampwerende middelen be-



handelt, bijaldien niet een tijdig inzicht der dwaling, de aanwending eener andere geneeswijze doet verkiezen. De koude der ledematen, het bleeke, vervallene, in deszelfs trekken veranderde gezigt, kunnen benevèns de zoo even opgegevene geaardheid des pols, den jongen, onervaren *Practicus* zeer ligt in dit valsche, en voor de lijderes hoogst nadeelige vermoeden brengen, omdat het juist deze gevallen zijn, waarin alleen eene stoutmoedige en spoedige aanwending van ontstekingswerende middelen, en bovenal groote aderlatingen, redding en hulp verschaffen kunnen.

### §. 156.

De *hyperstenische Metritis*, welke de voorafgaande invloeden, de grondoorzaken, de gesteldheid der lijdende en alle haar vergezellende blijken eener verhoogde werking des vaatstels kenmerken, verlangt boven alle andere middelen de aanwending des *lancets*; doordien, zonder voorafgegane bloedontlasting, de overige middelen zelden dat nut uitwerken, hetwelk men na dezelve van hen verwachten kan. Goed zal het zijn, geëvenredigd aan de ligchaamsgesteldheid, en de overige betrekkingen, terstond in den beginne teene aanmerkelijke hoeveelheid bloeds te ontlasten, wijl de ondervinding geleerd heeft, dat groote aderlatingen sneller en langduriger de werkdadigheid des prikkelbaren stelsels verminderen, zonder tevens het nadeel, van lang aanhoudende zwakte, inzonderheid van het *reproductive* stelsel, te verwekken, dat herhaalde kleine aderlatingen altijd hebben. Trouwens er

kun-

kunnen bij groote hevigheid der ontsteking gevallen voorkomen, in welke de aderlating herhaald moet worden, alsdan gewoonlijk in de daarop volgende of tweede verheffing der koorts. Doorgaans is het raadzaam de aderlating niet tot na den derden dag te verschuiven, omdat alsdan zelden de volkomene verdeeling nog gelukt; anderszins is het om het even, of men voor of in de verheffing de ader openen laat. Het bloed late men vloeijen, tot de pols deszelfs hardheid verliest, voller en golvender wordt, langzamer en minder slaat, en nadat hij voller en golvender werd, begint af te nemen. Over de herhaling der aderlating beslist alleen de ziekte zelve, de gesteldheid des pols, nieuwe verheffing van pijnen en der overige verschijnselen, doch niet de geaardheid van het afgetapte bloed, dat voorze-ker altijd een' grooten bloedkoek, en eenen zooge-naamden *zamengetrokkenen ontstekingskorst* (*Crusta pleuritica contracta*) bezit, zoo als dit bij zwangeren meestal aangetroffen wordt. Is de ontsteking eerst in haren oorsprong, niet zeer hevig, het gestel niet zeer bloedrijk, of blijven na de aderlating nog ligte pijnen over, dan kan men, om de plaatselijke bloedophooping te verminderen, de aanzetting van acht, tien tot twaalf bloedzuigers op den onderbuik beproeven. Wij, die van het vermogen dezes middels bereids in zeer vele gevallen blijken hadden, en zonder daarom met BROUSSAIS ingenomen te zijn, wel overtuigd zijn, dat in sommige gevallen geen ander middel de bloedzuigers geheel ontbeerlijk maakt, moeten echter hierbij aanmerken, dat bij vrouwen, die zeer tot uitwaseming geneigd



zijn, zij niet dan met de uiterste voorzigtigheid mogen aangewend worden, alleen dan, wanneer men overtuigd is, dat van de zijde der kraamvrouw iedere noodige voorbehoedingsmaatregel in acht genomen zal worden. Zeer ligt veroorzaakt men verkouding, en de ondoelmatige aanwending des middels wordt eene nieuwe ziekteoorzaak.

### §. 157.

Inwendig geve men de falfpeterzure *potasch* in groote giften, in het uur van tien tot vijftien greinen, het beste in eene amandelmelk, eene *Emulsio oleosa*, of in een *Decoctum Radicis Althaeae*, vereenigd met kleine giften van het bilfenkruidextract of van het geconcentreerde, bittere amandelwater. Minder dienstig zijn de zwakkere *Tartris Potassae*, de *Sulphas Potassae*, *Sodae* en de overige midden- en onzijdige zouten, omdat hunne ontlastingverwekkende kracht ze niet aanprijst, hoe vele waarde zij ook, vooral de *Tartris Sodae*, in een afkookfel der *Tamarinde* opgelost, in eene andere betrekking hebben. Verstopping, die bij totale ontsteking des *Uterus*, of bij die van deszelfs achtersten wand dikwijls voortkomt, verhelpt men beter door het gebruik van vette oliën, als van het *Oleum Ricini*, *Amygdalarum dulcium*, *Papaveris albi* enz. en door het zetten van lavementen, uit een afkookfel van verzachtende kruiden, lijnzaad met bijvoeging van olie en in alle gevallen eenige zeep. Zijn de valsche brakingen zeer hevig, houdt de braking na de aderlating niet op, dan late men eenige giften van het uit *Carbonas Potassae* en *Acidum tartari-*

*ricum* bestaande opbruifende poeder gebruiken. Een hoogere graad van ontsteking, welke door aderlating, noch salpeter geheel weggenomen, slechts verminderd kan worden, geneigdheid tot uitzweelingen of schijnvliezen, gelijkerwijze bij vermoeding eener aaneengroeiing, onderdrukte kraamzuivering en de roosachtige ontsteking vorderen het gebruik van het zoete zoutzure kwik in groote giften, van twee, drie, vier greinen, alle twee, drie uren. Men heeft het gelaakt, om het *Calomel* met *Nitrum* afwisselend toe te dienen; mischien mag het ook volgens de leer der doode *Chemie* niet zeer doelmatig zijn; doch eene lange, en met gelukkig gevolg bekroonde ondervinding geeft ons het regt, juist deze behandeling aan te prijzen. Welke eene levendscheikundige werking (*biochemisch Process*) er plaats grijpe, laat zich slecht verklaren; doch de verzekering, dat wij het met de heerlijkste gevolgen in honderden gevallen zonder nadeel hebben toegediend, is ook voldoende. De roosachtige ontsteking, als ook de *stenische*, waar men vrees heeft voor de vorming van vreemde deelen, uitzweeting of verharding, gelijkerwijze het laatste tijdperk der *rheumatische*, bij welke eene aderlijke ontsteking van het slijmvlies *chronisch* dreigt te worden, en door eenen wijachtigen slijmvloed vergezeld is, vorderen kleinere, zeldzamere giften dezès middels, soms zeer doeltreffend met spiesglansmiddelen vereenigd, bijv. in den vorm van het beroemde *Plummersche* poeder, of in plaats van dit, de *Aethiops antimoniæ*; mede heeft men in dit geval wel eenig nut van het *Oxydulum Hydrargyri nigrum* te verwach-



ten. Alleen zorg men voor het ontstaan van kwijling (*Ptyalismus*), dat een hoogst onaangenaam verschijnsel is. Wij moeten hier evenwel aanvoeren, dat er dikwerf na de kleinste giften van het kwik reeds speekselvloed ontstaat; wij zagen denzelfden in een geval na twee derde grein met spoedige vermindering der ontsteking plaats grijpen, en meenden, hem in dit en nog eenige gevallen wel voor een *critisch* verschijnsel te mogen aanmerken. Mogelijk kan hij van nut zijn, als de uitgang tot verharding overhelt, — of reeds aanvankelijk bestaat. Of het gebruik van het *Extractum Cicutae* bij de *Metritis* enkel op zich zelf dezelve zal genezen, kunnen wij uit gebrek aan ondervinding niet beslissen. Beteugelde men de ontstekingskoorts, zonder dat evenwel de plaatselijke aandoening volkomen naliet, — heeft zich binnen den zevenden of negenden dag geene volkomen scheiding geopenbaard, werd de koorts van een' meer onzuiveren aard, zoo-dat zij tot ontbinding overhelt, of kwaadaardig dreigt te worden, — neemt de aandoening des hoofds toe, dan kan men nog veel goeds verwachten van de toediening der minerale zuren, en volgens onze ondervinding verdienen hier het *Acidum muriaticum oxygenatum*, en het *Elixer acidum Halleri*, of de *Mixtura sulphurico-acida* de meeste aanprijzing.

#### §. 158.

Met de inwendige middelen moeten noodzakelijker wijze tevens uitwendige verbonden worden, daar door deze, zeer dikwijls de pijnen ten minste gematigd, en gunstiger uitgangen verkregen worden.

Men

Men laat den buik met pappen uit verzachtende kruiden, lijnmeel, *Herba Malvae*, *Althaeae*, inzonderheid *Hyoscyami* en *Cicutae* bedekken, of, bijaldien de lijderes mogelijk den vorm van pap, wegens de drukking niet mogt verdragen, dan stove men de onderbuiksstreek met de afkookfels dezer dingen. Tot stovingen verdient ook vooral warme, gewone bierazijn, of *Acetum Vini crudum*, met de helft of twee deelen water vermengd, aanprijzing. Men zorge hier slechts, dat de omflagen dikwijls vernieuwd, niet te nat worden aangelegd, en dat men, wegens de zoo ligt mogelijke verkouding, de uiterste voorzigtigheid bij de verwisseling in acht neemt. De lavementen haalden wij reeds in de vorige §. aan. Zij zijn in kleine hoeveelheden, voorzigtig gezet, een uitnemend goed middel bij ontsteking van den achtersten wand der baarmoeder, dewijl zij in een' zekeren zin, den *Uterus* tot stovingen verstrekken. Wil men de baarmoeder inspuiten, hetgeen hier zeer aangewezen is, mits dat het hoogst voorzigtig geschiede, dan kan men daartoe dezelfde vloeistoffen nemen, welke men tot de stovingen gebruikt, uitgenomen den azijn. Onderdrukte kraamzuiveringen worden daardoor dikwijls weder aan het vloeijen gebragt, inzonderheid door menigvuldig herhaalde, warme inspuitingen van een aftreksel des scheerlings, en teregt verdient hier de *Cicuta* boven het *Conium* de voorkeur. De vraag: zoude men het scheede-gedeelte ook met vrucht scarificeren kunnen? moet eerst de ondervinding beslissen, doch zoo veel belovends er ook in opgesloten ligge, dient men



men toch eerst naauwkeurig te overwegen: of de verwonding van dit hoogst gevoelige en tot verharding geneigde deel, naderhand geene ergere gevolgen kan naar zich slepen, dan zij op het oogenblik van nut is? deswege moest men haar slechts in de ergste en hagchelijkste gevallen beproeven. — Als inwrijvingen op den buik verdient het *Oleum Hyoscyami coctum*, het *Ung. Hydrargyri cinereum*, of beide zamengenomen, aanprijzing. Mostaardpappen en Spaansche vliegenpleisters zijn alleen na plaatsgegrepene bloedontlasting geoorloofd, en bij vreeze voor aaneengroeiing, de laatste op den buik, tot herstelling der kraamzuivering, de eerste op de inwendige vlakke der dij te leggen.

#### §. 159.

Zeer zelden treft men de *asthenische Metritis*, als oorspronkelijken ziektevorm aan, hoewel ook gevallen van dien aard na groot bloed- en algemeen krachtverlies voorkomen, wanneer op de baarmoeder een van die nadeelige dingen werkte, welke het vermogen bezitten om dit werktuig in ontsteking te brengen. De *Metritis* na de keizerlijke snede heeft veelal een *asthenisch* karakter. De pols is hier van weinig belang, want hoezeer hij ook meestal klein, en week en snel is, zoo komen er insgelijks enkele oogenblikken, waarin hij hard en zamengetrokken, zelfs vol zich voordoet. Over het algemeen is hij gewoonlijk aan vele veranderingen onderworpen, en er wordt reeds veel voorzigtigheid vereischt, hiernaar een doeltreffend geneesplan in te rigten. De lijdereffen zijn hoogst zwak, dikwerf open-

openbaren zich flaauwten; de huid is, over het algemeen, samengetrokken, somwijlen met een kleverig, gedeeltelijk zweet bedekt; het gelaat vervalt zeer spoedig, is bleek, de glans der oogen vermindert. Het gemoed is onrustig, de geest met zwaar-  
moedige, treurige denkbeelden vervuld. De Arts moet hier alle omstandigheden bedaard overwegen, voor hij zijn geneesplan vaststelt, doordien in de meeste hevigheid eener *hyperstenische Metritis* dergelijke verschijnselen zich openbaren, en bovenal zijn hier tot soortelijke onderscheiding der ziekte de aanleidende oorzaken van groot gewigt. Hier verdient, gelijk bij alle ontstekingen van den onderbuik, bij welke de koorts meer het karakter van *Synochus* of van *Typhus* aanneemt, het aanzetten van bloedzuigers ter beteugeling der plaatselijke, buitengewone werkdadigheid des prikkelbaren stelsels boven de algemeene aderlating verkozen te worden, inzonderheid hoe meer de koorts afwisselt, de plaatselijke pijn daarentegen ongemeen hevig is. Dikwerf zijn zuurdeegen en Spaansche vliegpleisters tot dit doel hier nog van nut. Bovendien vergete men niet de *Nitras Potassae*, *Murias Hydrargyri oxydulatum*, de *Murias Ammoniae*, *Acetis Potassae* en *Sodae*, den *Tartarus boraxatus* en *natronatus*, de mijnstoffelijke zuren, de *Tartris Potassae stibiata*, het beste in den vorm van *Vinum stibiatum*, alle deze middelen echter in kleine, dikwijls herhaalde giften, toe te dienen. Bloedzuigers, tijdig en in genoegzame hoeveelheid aangewend, zijn alleen in staat, de ontsteking zoo niet geheel weg te nemen, dan toch aanmerkelijk te bekorten en min gevaarvol te



te maken. In een' hooger en graad der ziekte geeft men de *Infusa* van aromatieke kruiden, den kamfer, zelfs *Opium* en *Moschus*; trouwens deze toestand is ten aanzien van het bijzondere des gestels en de bijomstandigheden zoo onderscheiden, dat geene andere voorschriften, dan die der algemeene Geneeskunde, zich op laten geven, die onder anderen REMER breedvoerig en opzettelijk (*Algemeine Therapie der Krankheiten des Menschen. Breslau 1818. 8º. §. 63—88*) heeft uit elkander gezet.

#### §. 160.

Ontstond de ziekte door *Metastasis*, dan trachte men zoo snel mogelijk de oorspronkelijke ongesteldheid weder te herstellen. Verdween het zog uit de borsten, dan bedekke men deze warm, legge roodmakende middelen tusschen de schouderen, late het kind dikwijls aanleggen, om zoo door dezen prikkel de zogafscheiding weder aan den gang te helpen. — Bestonden er haarworm of andere uitslagziekten der huid, dan legge men *Vesicotaria* op zulke plaatsen, welke de ziekte te voren innam. — Bij achtergeblevene gedeelten van het ei, brengt men eene kleine, in een slijmig afkooksel gedoopte spons tegen den baarmoedermond, en herhaalt de inspuitingen zoo dikwijls mogelijk. — De binnen-buitenwaartskeering des *Uterus* tracht men na de aderlating dadelijk te herstellen, zoo zij onvolkomen was; andere verplaatsingen tracht men door het leggen der patiente te verbeteren, tot de afgenomene ontfleking de verdere behandeling, zoo als dezelve in het negende hoofdstuk zal opgegeven worden, toelaat. — Vertoont er zich ge-

gelijktijdig eene *gastrische* ongesteldheid, dan geeft men terstond na de aderlating een braakmiddel, het beste uit *Radix Ipecacuanhae* met een weinig *Tartris emeticus*. — De dikwerf voorkomende moeilijke en belette pislozing (*Strangurie*) en (*Ischurie*) wordt veelal door de aderlating en het aanzetten van bloedzuigers, gelijk ook door stovingen en soms door plaatselijke dampbaden verholpen; men hoede zich echter, om den katheter binnen te brengen, wiens aanwending hier niet alleen pijnlijk en doelloos, maar tevens hoogst schadelijk is. Ging de ontsteking in verettering of koudvuur over, dan heeft men in het eerste geval voedende, geene verhittende, in het laatste vlug opwekkende middelen toe te dienen. In de verdere genezing komen bittere middelen, de kina, en ten besluite derzelve, ijzer- en mineraalbaden te pas. De behandeling van de waterzucht der baarmoeder, der verharding en der overige naziekten echter, is reeds op eene andere plaats dezes werks opgegeven.

#### L I T T E R A T U U R.

C. G. KIESLING, *Diss. sistens uterum post partum inflammatum. Lipsiae 1754. 4°.*

J. F. HULSENBUSCH, *Diss. de hysteride puerperarum. Argentorati 1764. 4°.*

TIMMERMAN, *de inflammatione uteri. Rintel 1761.*

C. H. STOELZEL, *de metritidis diagnosi et cura, Lipsiae 1794. 4°.*



F. E. SCHNEIDER, *de inflammatione uteri. Wirceburgi*  
1820. 8°.

C. WENZEL, *über die Krankheiten des Uterus. Mainz* 1816.

Dr. J. C. MENDE, *die Krankheiten der Weiber. Leipzig*  
1810 und 11. 8°. 2<sup>r</sup>. Th. S. 12.

J. BURNS, *Grundsätze der Geburtshülfe. A. d. Englisch.*  
v. KOLPIN. Stettin 1820. 8°. S. 589.

JÖRG, *Handbuch der Krankheiten des Weibes. §. 697.*

*Die Speciellen therapeutischen Lehrbücher von* FRANK,  
MARCUS *und* RICHTER.

# ACHTSTE HOOFDSTUK.

## Over de rotting der baarmoeder.

### §. 161.

De rotting der baarmoeder, welke C. WENZEL *koudyurig bederf* noemt, is onlangs eerst, te weten door BOËR, als eene bijzondere ziekte afgeschetst en beschreven geworden; hoewel het schijnt, als of reeds F. PLATER (\*) een geval van dien aard hadde waargenomen, en LE ROY (†) in den jare 1793 te *Rouân* denzelfden toestand algemeen zag heerschen, welken men naderhand met den naam van *rotting* bestempelde. BAUHINUS bezigt reeds deze uitdrukking: *Uterus putrefactus*. LE ROY daarentegen hield de ziekte voor eene soort van *Febris puerperalis* met verminderde spanningskracht der baarmoeder; doch hij laat zich zoo duidelijk over dezelve uit, dat de gelijkheid van beide ziekten terstond in het oog valt, en men zich moet verwonderen, niet eerder deze aanmerking gemaakt te hebben, doordien hij reeds dezelfde regelen voor de genezing op-

(\*) C. BAUHINI, *Apendix histor. ad FR. ROUSSETI, de partu caesareo tractatum* N<sup>o</sup>. iij.

(†) *Vorlesungen über Gebärmutterblutflüsse u. s. w.* S. 100.



opgaf, die men later voor dezelve ontworpen en met geluk gevolgd heeft.

§. 162.

Deze ziekelijke gesteldheid berust op een rotachtig bederf van de inwendige oppervlakte des *Uterus*, in het bijzonder van deszelfs onderste gedeelte, hetgeen uit de *Decidua* schijnt voort te komen, en geen uitgang eener ontstekingsachtige aandoening is. Hierin is zij, in zeker opzigt, aan de versterking bij oude lieden (*Gangraena senilis*), bij het doorliggen (*Decubitus*), aan het koudvuur (*Sphacelus*) van *scorbutische* of in eene andere betrekking, aan den waterkanker der kinderen (*Noma*), gelijk, offchoon zij ook door haar gansche wezen van ieder ander gebrek onderscheiden, als eene zelfstandige, met geen' anderen ziektevorm verbonden, zich vertoont.

§. 163.

Even als LE ROY het geheel voor kraamvrouwenkoorts hield, zoo zegt ook BOËR, dat hij bij aan *Febris puerperalis* gestorvenen een' gedeeltelijken verrotten *Uterus* gevonden heeft, en bij de in den jare 1823 in het *Weener* kraamhuis waargenomen en door LIPPICH beschrevene algemeen heerschende kraamvrouwenkoorts, leverden de uitkomsten zoo veel verschillends op, dat het ons ongepast voorkomt, aan deze ziekte den naam van rottende baarmoederontsteking (*Metritis septica*) te geven. — Doch men moet over het algemeen in aanmerking nemen, dat vele Schrijvers over dit onderwerp niet zeer naauwgezet op de kennis der ziekte gelet, en niet genoeg bedacht hebben, dat

bij

bij de eigenlijke, ware rotting der baarmoeder, juist het kenmerkende, gemis van alle ontsteking is, dat zij om die reden niet uit de hoogst mogelijke toeneming der, bij de verlossing werkzame krachten, uit welke, door hare te bovenmatige inspanning, uitputting voortvloeijen kan, ontstaat, zoo als onder anderen KAISER van gevoelen schijnt; maar dat de kracht der baarmoeder reeds zelve zoo ver gezonken, en zij in eenen toestand van levenloosheid en zwakte verplaatst is geworden, welke haar in zeker opzigt buiten den kring des levens verwijdert. Om die reden gelooven wij niet te dwalen, wanneer wij vooronderstellen, dat de rotting der baarmoeder op zich zelve zeldzamer voorvalt, dan vele Artsen haar, sedert haar bestaan bewezen is, hebben willen waarnemen.

§. 164.

De beroemde BOËR, die onlangs het eerste de aandacht der Geneeskundigen op deze ziekte bepaalde, en die voorzeker tot waarneming van de meeste gevallen in het groote Verlosfingshuis te Weenen, de beste gelegenheid had, en van zich zelve zegt, dat hij meermalen de ziekte reeds vroeg erkend en haren doodelyken uitgang naauwkeurig voorspeld had, voordat andere Artsen nog eenig kwaad vermoeden hadden, verklaart rondborstig, dat de ziekte volstrekt geene bepaalde, kenschetsfende verschijnselen heeft, en zegt: „Haar eenigst eigenaardigs bestaat mogelijk daarin, niets eigenaardigs te bezitten,” zoodat in ieder bijzonder geval de teekens der ziekte verschillende zijn. Het-



geen tot de kennis des gebreks nog het belangrijkste mogte zijn, zal uit eene beschrijving van deszelfs loop het beste blijken.

§. 165.

Naar de tot dusverre in het licht verschenen waarnemingen en bevindingen, zijn het meestentijds slecht gevoede voorwerpen met eene losse, flappe vezel, kwaadsappig uitzigt, welke door de rotting de baarmoeder aangedaan worden. Komen bij zulk eene kwaadsappige gesteldheid, nog eene slechte levenswijs, slechte en bedorvene levensmiddelen, vochtige, bedompte woning, kommer, zorg en toorn, gebrek aan genoegzame beweging in de vrije, zuivere lucht, is het weder natkoud en vochtig, dan is het gevaar, van door deze ziekte te worden aangedaan, aanmerkelijk geklommen. Wij vinden haar diensvolgens meest alleen bij personen uit de arme en geringere klasse, niet zelden bij zoodanige ongelukkigen, die buiten den echt zwanger worden.

§. 166.

Klagen zwangeren, welke in de opgegevene betrekkingen verkeerden, in den laatsten tijd voor de op handen zijnde bevalling, over groote vermoeidheid en lusteloosheid, zonder dat daarvoor genoegzame redenen bestaan; vervalt derzelver gansche gelaat, wordt de opslag van het oog flauw, de oogen dof; de kleur des gelaats smeurig, tanig; gaat de eetlust verloren; slapen zij onrustig, of in het geheel niets, uiten zij tevens eene sterke begeerte

om alleen te zijn , en gelooven zij met groote zekerheid en overtuiging aan haar naderend einde , dan heeft men inderdaad meer te vreezen , dan eene voorbeschiktheid tot rotting des *Uterus*. De *Uterus* verliest gewoonlijk iets van zijnen omvang en wordt kleiner ; de lijderes gevoelt meer zijne zwaarte , en beschrijft het gevoel , dat zij heeft , even als dat van zulke vrouwen , wier vrucht binnen haar gestorven is. Daarenboven heeft de baarmoeder hare spanningskracht verloren , en is losser en deegachtiger op het gevoel geworden. Dikwijls ook klagen de zwangeren over ligte pijnen in den onderbuik , die nu eens meer het aanzien van een waar koliek , dan weder meer van de voorbereidende weeën hebben. Reeds LE ROY maakte op deze buitengewone weekheid der baarmoeder opmerkzaam , en zegt niet alleen , dat bij de *Epidemie* , welke hij in *Rouan* waarnam , de buik der zwangeren , welke door gene ziekte werden aangedaan , in eenen buitengewonen staat van weekheid en opgezetheid , vereenigd met eene mindere veerkracht des *Uterus* , verkeerde ; maar merkt ook nog later op , dat deze weekheid der baarmoeder in den laatsten tijd der zwangerschap en zelfs tijdens de weeën , bloedvloeiingen en zware ziekten in het kraambed over het algemeen pleeg vooraf te gaan. Koliekaardige pijnen in den buik , deden bij gene *Epidemie* in de laatste dagen voor de verlossing al die vrouwen aan , welke door de ziekte aangetast werden.



## §. 167.

Zijn er pijnen van dien aard voorhanden, dan gaan zij eindelijk tot weeën over, hoézeer men slechts als een buitengewoon iets, regelmatige en natuurlijke weeën aantreft, maar meestal zeldzame, zwakke en doelsrijdige zamentrekkingen des *Uterus* waarneemt. Dit verschijnsel is ligt verklaarbaar, zoodra men den ziekelijken toestand in acht neemt, waarin de baarmoeder verkeert; en even zoo duidelijk is het, dat niet dan onder de gunstigste betrekkingen der ligging en grootte des kinds, benevens eene zeer gunstige gesteldheid des bekken, de volbrenging der geboorte door de natuur op zich zelve mogelijk is. Alsdan loopt het verlossingswerk gemeenlijk veel spoediger af, doordien de bodem van den *Uterus*, het minste aangedane gedeelte is, het onderste deel der baarmoeder echter, vooral haar mond, in zulk eenen krachteloozen toestand verplaatst is geworden, dat hij geene krachten genoeg bezit, om den gewonen wederstand te bieden. Dikwijls echter schiet de natuur in hare pogingen te kort, en de volkomene ophouding der weeën of derzelver zwak vermogen, somtijds ook buitengewoon pijnlijke zamentrekkingen van het baringswerktuig maken de hulp der kunst noodzakelijk, en des te dringender, zoodra er eenige onevenredige verhouding tusschen de grootte des kinds en de wijde des bekken bestaat. Had het gebrek reeds groote vorderingen gemaakt, en openbaarde hetzelve zich reeds in de eerste maanden der zwangerschap, dan geeft het ligt aanleiding

tot

tot miskraam en vroegtijdige geboorte, en is het in een' hoogen graad aanwezig, veroorzaakte het den dood der vrucht, dan ontlast er zich gemeenlijk eene *ichoreuze* stof met eenen vreesfelijken stank, die de metalen aandoet. Veelal is de vrucht slecht gevoed, klein, hare kleur bleek en smeurig geel. Aan de nageboorte neemt men meermalen sporen van een aanvankelijk bederf, alsmede eene bleeke, groenachtige kleur en eene weeke, spons- en papachtige gesteldheid waar, terwijl de navelstreng niet zelden in het bederf deelt; het vruchtwater troebel, doch niet bedorven is. Intusschen wachte men zich om uit de zoo even opgenoemde verschijnselen alleen, met zekerheid tot eene aanwezige rotting te willen besluiten; want in sommige gevallen ontmoet men dezelve bij volkomen frische kinderen, wier moeders zoo wel en gezond zijn, als men, in een zeker opzigt, eene kraamvrouw wenschen kan. Boër zag zelfs wel zwangeren of pas verlost in stuipen sterven.

#### §. 168.

Zelfs tot na den afloop der verlossing kan het twijfelachtig blijven: of de rotting der baarmoeder een begin gemaakt heeft, of reeds aanwezig is, en ook nu nog kan alles het beste aanzien hebben. Spoedig echter openbaart zich het ziekelijke in de wijze, waarop de teelwerktuigen uit den kring van hun verhoogd en toegenomen leven terugkeeren. De *Uterus* blijft uitgezet boven de schaambeenderen voelbaar; even alsof de vijfde maand der zwangerschap nog niet voorbij ware.



Hij is week en slap op het gevoel, zeldzaam eenigzins hard en gespannen; niet altijd treft men er pijnen bij aan, hoewel ook in sommige gevallen ligte naweeën werden opgemerkt, en de aanraking verwekt noch vermeedert de pijn. Ook het inwendig onderzoek geschiedt zonder pijnen, men ontwaart echter hierbij eene verminderde warmte, niet zelden reeds de verwoesting aan het scheedegedeelte. De kraamzuivering onttaardt vroeg of laat in eenen graauwen of zwartachtigen *Ichor*, waaronder somwijlen eenige kleine stukjes bloed vermengd zijn; altoos echter neemt de uitvloeijing bij verderen voortgang der verwoesting, een' zeer onaangenen, rotachtigen, stinkenden reuk aan, die den omstanders zoowel, als der lijderesse zelve tot last is. Boër nam zelfs waar, dat bereids weinige uren na de bevalling door den uitvloeienden *Ichor* metalen werden aangedaan, en vingers en nagels der onderzoekende personen eenigen tijd onuitwisbaar bruin geverwd en ingevreten werden. Stoornissen in de zogaffscheidung zijn bij deze ziekte zeer gemeenzaam; de zogaffscheidung grijpt, wel is waar, plaats, en de borsten worden gevuld, doch de melk blijft, of dun en weiachtig, of zij gaat langzamerhand weg, of verdwijnt ook plotselijk in eens. Daarentegen heeft men ook gezien, dat de borsten met zog gevuld bleven, in de laatste oogenblikken des levens en zelfs na den dood eerst regt sterk daarmede gevuld werden, en meer zog bevatteden, dan ooit te voren. De werkzaamheid der huid is insgelijks gestoord. Nu eens openbaart zich een overvloedig zweet, dan weder is de huiduitwaseming

geheel onderdrukt; altoos echter verkeeren de algemeene bekleedfelen in een' ziekelijken, lijdelijken toestand, zij zijn bleek en ingevallen, en hun ontbreekt dat levendige koloret, hetgeen men anders reeds op den tweeden dag des kraambeds ontwaart.

§. 169.

De koorts, welke men als gevolg dezer ziekte waarneemt, is gewoonlijk eene *Continua remittens*, wier verheffingen hevig, doch zeer ongeregeld zijn. Nieuwe koude is echter niet bestendig waargenomen geworden, maar alleen in de kwaadaardigste gevallen, in welke na den derden koortsaanval op het laatste de dood intreedt. Meestal openbaart zich tegen den avond algemeen vermeerderde hitte, met een opvolgend, echter geene verligting aanbrengend, maar slechts nog meer afmattend zweet, de krachten nemen daarbij meer en meer af; de zieken gevoelen duidelijker hare zwakte. De pols is zeer verhaast, doch klein en geprikkeld; het algemeene gevoel gestoord, het gansche uitzigt vervalt al meer en meer, de oogen verliezen hunnen natuurlijken glans, zijn ingevallen en met donkere randen omgeven, de gelaatstrekken geven hevige pijn, nog meer groote neerslagtigheid van geest te kennen. De eetlust ontbreekt, de smaak is bitter en zoet; de tong veelal vochtig en bijkans zuiver, somtijds beflagen en droog; de dorst zeker altoos ongemeen hevig, zoodat de zieken bestendig om drinken vragen. De geloosde *Urin* is rood en ongekoekt, hooggeel of bruinrood gekleurd, en in de laatste oogenblikken des levens als met slijm of etter ver-



mengd; dikwijls voelen de lijdenden noch de verzameling van deze, noch de ophooping der drekstoffen in den endeldarm. De meesten lijden aan eenen ondermijnenden buikloop, door welchen bruin-gele, slijmige en zeer stinkende stoffen ontlast worden, waaronder somwijlen taaije, witte vlokken zich bevinden. Zeer dikwijls vertoont zich ook braking eener groene slijm met een, aan oliezaad gelijkend, bezinkfel.

### §. 170.

Als *Complicatiën* ontmoet men somtijds ontstekingsachtige aandoeningen, inzonderheid van het buikvlies, waardoor men dikwijls verleid is geworden, de ziekte voor eene ontsteking- of kraamvrouwenkoorts te houden. Ja, er is niet aan te twijfelen, dat men het gebrek wel gekend, doch het evenzeer, als de meerendeels doodelijke en boosaardige kraambedsziekten mede onder den algemeenen naam van kraamvrouwenkoorts begrepen heeft. Nog meer veelligt mag daartoe de bevinding der schouwing bijgedragen hebben, doordien men de zoo bekende, vlokkige, etterachtige klonters, gelijk inzonderheid na de *Febris puerperalis* in de buikholte gevonden worden, ook hier somwijlen waarnam. Hoe de *Humoraal*-ziektekunde deze dwaling begunstigde, heeft wel geene verdere verklaring noodig.

*Uitgangen en Lijkopeningen.*

## §. 171.

De gewone uitgang, welken de rotting der baarmoeder neemt, is — de dood; slechts in zeldzame gevallen slaagde men dusverre in het genezen dezer ziekte, en ook bij dit gelukkige blijft het altijd nog hoogst twijfelachtig, of men werkelijk de rotting genezen hebbe, gelijkewijze mij nooit een geval gebleken is, waarin men de uitgebrokene waterrees (*Hydrophobie*) genezen heeft. Het sterven geschiedt echter onder verschillende verhoudingen. Meestal neemt het lijden met den derden, zevenden, elfden dag des kraambeds een einde, weinigen overleven den laatsten (den elfden) dag; BOËR, welke de gelegenheid had, de meeste gevallen gade te slaan, zag nooit het gebrek tot over den twintigsten dag voortduren.

## §. 172.

Onderscheiden zijn de verschijnselen, onder welke de dood komt. Somwijlen greep hij onder stuip-trekkingen terstond na de uitdrijving des kinds, of later eerst in het kraambed plaats; of bij hevige koortsen sterven de lijderessen zonder bijkoming van krampen, met de verschijnselen van geheele uitputting; nu eens voegen de verschijnselen eener kraamvrouwenkoorts zich er bij, mitsgaders ontstekingsachtige aandoeningen der onderbuksingewanden, en het leven neemt een einde, oogenschijnlijk door de kwaad-aardige koorts; dan eens nadert de dood rustig en kalm,



kalm, en gelijk zonder voeding eene vlam uitgaat, zoo ook hier het leven, welks voedingsstof verteerd schijnt te zijn.

§. 173.

Bij de lijkopeningen vindt men den *Uterus* niet genoegzaam en regelmatig zamengesrokken, de baarmoeder is integendeel meer uitgezet, zoodat hare overlangsche middellijn nog zes en zeven duim over heeft. Uitwendig bemerkt men somwijlen wel geene meerdere onnatuurlijkheid, of het moest zijn, dat er zich eene zoogenaamde zogverplaatting in de buikholte hadde nedergezet, wier vlokken zich aan de baarmoeder vasthechtten. Meestal echter is ook de uitwendige kleur lichter, aan deze bespeurt men reeds het lijden van het prikkelbare stelsel, en de, schoon ook in zijne wanden genoegzaam dikke, doch evenwel flappe, *Uterus* is witachtig, bleek, somtijds graauw-geelachtig en morfig op het aanzien. Sommige plaatsen zijn dan wel eens bleeker van kleur, ofschoon nergens eenig spoor van eene plaats gehad hebbende ontsteking te ontdekken is, zonder hardheid, en deze vlekken zijn veelal aan de onderste affnede, of, zoodra ook aan den bodem en aan het ligchaam der baarmoeder zich dergelijke bevinden, dan daar het menigvuldigste. Bij de doorsnijding van de wanden des *Uterus* is de zelfstandigheid aanmerkelijk en duidelijk veranderd. Wit, wit geelachtig, smeurig graauw is het weeffsel van kleur, en zeer juist wordt zij door vele Schrijvers met gerookt spek vergeleken. De inwendige oppervlakte des *Uterus* blijkt dan ten zetel der ziekte

te verstrekken. In den bodem bevinden zich hier en daar meer of minder groote plaatsen, welke eene graauwe, naar het zwarte hellende massa bedekt, zonder dat die over de vlakke zich uitbreidt: zij worden door geenen kring (*Areola*) omgeven, hebben geenen verhard en of verdikten rand, zoo als anders koudvurige plekken, welke de uitgang van ontsteking waren. Duidelijk onderkent men hier de verrotte *Membrana Decidua*, en daarom is ook altoos die plaats het meeste door de ziekte aangedaan, welke tot aanhechtingspunt van den moederkoek verstrekte. Gene aan leisteen gelijkende massa, het voortbrengsel der verwoesting, is meer of minder diep tusssen het weeffel der baarmoeder ingedrongen, veelal slechts twee tot drie lijnen, zoodat ze zich gemakkelijk met het heft van den *scalpel* wegschuiven laat. Het meeste heeft het onderste gedeelte des *Uterus* geleden. De dichtst bij den baarmoedermond gelegene deelen zijn op dezelfde wijze nu eens geheel verwoest, in het bijzonder als de ziekte geen' al te snellen loop nam, en deze afgescheidene stukken in den kraamvloed opgelost zich ontlastten, dan weder loopen de bijzondere verrotte plaatsen zeer in elkander. Soms tijds is ook de scheidde van boven min of meer aangedaan, offchoon haar lijden meer door de onmiddellijke aanraking met den uitvloeienden *Ichor* schijnt veroorzaakt, zonder dat men met genoegzamen grond dezelfde ziekte vooronderstellen kan. Aan de banden der baarmoeder, de trompetten en eijerstokken ziet men somtijds geen het minste blijk eener ziekelijke aandoening, doch in de meeste

ge-



gevallen evenwel hebben zij ook geleden. De banden zijn dan flapper en fletser, miskleurig, met loodkleurige vlekken, even als de uitwendige oppervlakte des *Uterus*, bedekt, alsmede haar weeffel tot bederf overgegaan. Desgelijks is het met de trompetten gesteld, welke volgens JÖRG in het bijzonder aan hare franjes zamengekrompen, flets, miskleurig, geelachtig wit, alsmede ten deele in ontsteking worden aangetroffen. De eijerstokken vond men op gelijke wijze vernietigd in de lijken van aan rotting gestorvenen, dikwerf verhard, verkleind, of onnatuurlijk door ophooping van water vergroot. Wij herinneren ons zeer klaar een geval, in hetwelk, bij eene persoon, die met alle verschijnselen van kraamvrouwenkoorts stierf, de *Uterus* op meerdere plaatsen verrot scheen, en bij welke gelijktijdig de regter eijerstok tot de grootte van een ganzenei door eene, aan vetwas (*Adipocire*) gelijkende, gele massa gevuld was.

#### §. 174.

De longen wil JÖRG in de meeste gevallen slap, miskleurig en met verhardingen voorzien aangetroffen hebben; BOËR vond haar in een geval, waarin de lijdere onder stuipen gestorven was, met schuimend bloed gevuld. Het laatste verschijnsel zal veelligt meer, zoo als ook BOËR zelf opmerkt, het gevolg van de wijze van sterven geweest zijn; de eerstgenoemde gesteldheid der longen kan men toch slecht met de doodelijke ziekte in een zeker verband willen stellen, want men zal die verhardingen immers eerder voor blijken eener kropklierige gesteldheid

heid houden, en deze als de voorbeschikkende oorzaak beschouwen. — De in de buikholte gelegene organen vertoonen zich mede somwijlen ziekelijk, en inzonderheid vindt men ze gedeeltelijk in ontsteking, vooral het buikvlies. Deze verschijnselen zijn trouwens alles behalve bestendig, en schijnen alleen dan zich te openbaren, zoodra de ziekte trager te werk gaat en zich meer als kraamvrouwenkoorts kenschetst. Hetzelfde is ook van toepassing op de uitstorting eener *lymphatisch*-wichtige vloeistof in de buikholte, welke onder den naam van: zogverplaatfing bekend is. De roode strepen en vlekken, welke men alsdan ook op de uitwendige oppervlakte der baarmoeder gevonden heeft, zijn meer als een lijden van het haar omgevende buikvlies te beschouwen, en kunnen onmogelijk ten bewijze voor een oorspronkelijk ontstekingachtig lijden dienen.

### *Oorzaken en Wezen der ziekte.*

#### §. 175.

Reeds boven §. 165 zag men, dat er eene zekere voorbeschiktheid tot de rotting plaats kon en moest vinden, intusschen blijkt uit de gansche beschrijving van den gang dezer ziekte, dat deze en de verwijderde oorzaken, ten einde de ziekte volkomen te ontwikkelen, weinig meer behoeven, dan de zwangerschap, zoodat men, doordien al het overige en tot dusverre nog niet duidelijk genoeg geworden is, deze inderdaad alleen als de gelegenheid gevende oorzaak beschouwen moet. Want gelijk

de-



deze tot de wezenlijkheid van het *physiologische* leven der vrouw behoort, en op zich zelve niet voor eenen ziekelijken toestand kan aangemerkt worden, zoo is het evenwel duidelijk, dat in een orgaan, voorzien met een' ziekelijken aanleg, het zaad der ziekte (*Seminium Morbi*) gemakkelijk en schielijk kan en moet ontwikkeld worden, zoodra hetzelve tot meerdere werkdadigheid opgewekt wordt, deszelfs eigendommelijk leven aanmerkelijk in zijne geheele uitgebreidheid toegenomen, en zijne betrekking tot het geheele *Organismus* gansch en al veranderd moet zijn, zoo als dit in de zwangerschap met den *Uterus* het geval is. Men mag nu deze of gene vooronderstelling (*Hypothese*) over het wezen der ziekte waarschijnlijker vinden, deze zal echter op iedere kunnen toegepast worden.

#### §. 176.

LE ROY stelt de naaste oorzaak in werkeloosheid van de uitwendige spierlaag der baarmoeder en gebrek aan veerkracht. BOËR, die de rotting met versterking van bewerktuigde deelen door vergiftige *Miasmen*, of een inwendig algemeen bederf vergelijkt, vooronderstelt, dat in deze gevallen de deelen desgelijks gedood en onthonden worden, ten gevolge van een kwaadaardig iets aan en omtrent dezelve, of in het ligchaamsgestel over het algemeen; doch geenszins wegens eene eigenlijke en gewone ontsteking, en den duur en de hevigheid derzelve. — C. WENZEL, welke de rotting in het hoofdstuk: over de versterking des *Uterus*, behandelt, verklaart zich niet duidelijk, of hij dit koudvuur voor oorzaak

zaak of het uitworfel der doodelijkheid houdt, en  
 helt meer tot het gevoelen van den laafte over,  
 alhoewel hij het plaats grijpen der rotting zonder  
 voorafgegane ontsteking voor iets wezenlijks houdt.  
 Zijn gevoelen laat zich het beste met zijne eigene  
 woorden (op eene andere plaats. S. 49 und 50)  
 voordragen. „ Met alle zekerheid kan men aan-  
 „ nemen, dat in den *Uterus* alleen onder zekere  
 „ betrekkingen kort voor, hoofdzakelijk echter na  
 „ de bevalling, eene eigendommelijke en grootere  
 „ geneigdheid tot eene koudvurige verwoesting,  
 „ zonder eenige voorafgegane ontsteking ligt, dan  
 „ in eenig ander orgaan des menfchelijken ligchaams,  
 „ het darmkanaal alleen uitgezonderd, hetwelk door  
 „ dezelfde oorzaken, als de *Uterus*, dikwerf zonder  
 „ eenige voorafgegane ontsteking, of alleen ook  
 „ lichtere graden derzelve, de genoemde verfchijn-  
 „ felen van verrotting, even als de *Uterus* aan den  
 „ dag legt. Zoodra wij de holte van den onder-  
 „ buik tijdens den bezwangerden *Uterus* aandachtig  
 „ befchouwen, vinden wij den bloedsomloop in de  
 „ door de uitzetting gedrukte ingewanden voor het  
 „ minst niet zoo vrij, als hij in den onbezwanger-  
 „ den ftaat dezes werktuigs verkeert. De *Uterus*  
 „ zelf is door de ontwikkeling der vaten van zijn  
 „ weeffel een ongemeen bloedrijk ingewand gewor-  
 „ den; het grootfte getal van vaten dezes werk-  
 „ tuigs zijn aderen, wier verrigting, daar zij zelve  
 „ op een' lageren trap van leven ftaan, dan de  
 „ slagaderen, zelfs bij den minst verzwakkenden  
 „ invloed veel fpoediger geftoord wordt, dan die

IV. D. 1°. ST. R „ der



„ der flagaderen. Denken wij nu, dat met de zoo  
 „ plotselinge ontlasting der baarmoeder, zoo als bij  
 „ alle zwakke vrouwen, die volgens de ondervin-  
 „ ding bij voorkeur tot *Febris puerperalis* aanleg  
 „ hebben, dikwerf het geval is, terstond op eens  
 „ de omloop in de ingewanden van den onderbuik  
 „ zijne vorige vrijheid weder verkrijgt; dan hebben  
 „ wij de oorzaken der somwijlen doodelijke flauwten;  
 „ onmiddelijk na de verlossing. De *Uterus* zelf  
 „ biedt, door het zamenvallen zijner wanden aan  
 „ de eigene vaten van zijn weeffel, geen' weder-  
 „ stand meer, hetgeen kort te voren door de aan-  
 „ wezigheid des kinds nog geschiedde; tevens  
 „ wordt den *Uterus*, door den teruggekeerden  
 „ vrijen bloedsomloop in de vaten van de overige  
 „ ingewanden des onderbuiks, plotseling een aan-  
 „ merkelijk gedeelte bloeds onttrokken, hetgeen  
 „ kort te voren nog tot de verrigtingen van zijne  
 „ verhoogde levenswerking in zijne vaten opgeno-  
 „ men werd. Zoodra nu derhalve uit eenigerhande  
 „ zwakte des vrouwelijken ligchaams, of uit ver-  
 „ zwakkende oorzaken, de eigenaardige zamentrek-  
 „ baarheid van het weeffel des *Uterus* terstond na  
 „ de uitdrijving des kinds ook verloren gaat, dan  
 „ hebben wij inderdaad samenwerkende oorza-  
 „ ken genoeg, tot eene plotselinge verwoesting  
 „ van het leven in dit werktuig, en kunnen, bijal-  
 „ dien de lijderees slechts een' korten tijd na de-  
 „ zen toestand nog blijft leven, ook het koud-  
 „ vurige bederf van den geheelen *Uterus*, of een  
 „ groot gedeelte deszelven, zonder eenige voorafge-  
 „ ga-

„gane ontsteking, best verklaren.” — JÖRG meent, dat het wezen derzelve zich grondt op eene, door ongenoegzame vormkracht, te weeggebragte versterking van het afvallende vlies, welke (*Mortificatie*) alsdan tot in het weeffel des *Uterus* zich uitbreidt. Ook CARUS omhelst dit gevoelen, en voegt er bij, dat bij de verhoogde voedingsnatuur des *Uterus* zulk eene onmiddellijk verschijnende verrotting des te eerder mogelijk wordt, en zulk eene versterking en rotting in de, tot ontbinding bestemde, *Membrana decidua* met regt kan voorondersteld worden. SCHMIDTMÜLLER denkt, dat het eerste tijdperk der ziekte in eene zeer haastige, en in rotachtig beiderf uitloopende, *asthenische* ontsteking bestaat.

§. 177.

Het zal wel eene der moeilijkste zaken zijn, het wezen der rotting zoo te verklaren, dat er geene twijfeling over de stellingen omtrent dezelve meer overig blijve, en het is om met genoegzame zekerheid daarop te antwoorden schier onmogelijk, ten zij er op de eene of andere manier bewezen worde: of verwoesting van een werktuig door koudvurige en rottige ontbinding, zonder voorafgegane ontsteking mogelijk zij. Wij kennen geen andere ziekte, waarin dit het geval was, en al de overige gebreken, waarmede men de *rotting* vergeleken heeft, zijn altijd min of meer door ontsteking vergezeld, welker aanwezen zich in geene dezer gevallen loochenen laat. Het wegsterven



evenwel van een orgaan, zoodat deszelfs levensbetrekkingen reeds bij het bestaandes levens ophouden, gelijk het hier zijn moest, kan naauwelyks gedacht, veelmin verdedigd worden, doordien alle ondervinding en de nasporingen van alle Natuurkundigen daartegen strijden. Gelijkerwijze schijnt het gevoelen, dat het bederf van het afvallend vlies afkomstig is, minder grond te hebben, dan men wel zoude denken, doordien de versterking der *Decidua vera en reflexa* in een zeker opzigt bereids lang voor het ware eind der zwangerschap plaats grijpt, en diensvolgens eene versterking derzelve volstrekt niet als iets ziekelijks te beschouwen is. Dat de plaats van inplanting des moederkoeks meer door het bederf is aangedaan, kan daar slecht ten bewijze voor strekken, wijl men deze als de vlakte eener wond moet aanmerken, die door ziekelijke en ziekmakende invloeden over het algemeen sterker wordt aangedaan. — Reden, waarom het wel het meeste met de waarheid zal overeenkomen, als men vaststelt, dat, als in eene reeds op zich zelve zwakke, kwaadsappige vrouw, omstreeks het regelmatig einde der zwangerschap meer of min genaderd, eene ontsteking of ook slechts eene ontstekingsachtige aandoening der baarmoeder ontstaat, en zoowel door levensbetrekkingen van het voorwerp, als door de gesteldheid des weders en andere nog onbekende invloeden (die onder zekere voorwaarden een' besmettelijken aard kunnen aannemen) deze, als eene *asthenische* ziekte, tot een' hoogst kwaadaardigen form met vernietiging van het *organische weeffsel* en

en des levens overgaat, die toestand zich kan openbaren, welken wij *rotting* noemen; vooral als de fchielijke ontleding des *Uterus* van de vrucht zoowel, als van eene menigte te voren hem afzonderlijk, als het ware, toebehoorend bloeds, het boosaardige nog vermeerdert. Het blijft echter nog de vraag: of in de uitkomsten bij de lijkopeningen de dood geenen grooten rol speelt? Boër ontkent even zoo min, als CARUS na hem, geheel en al eenen, vooraf plaats gehad hebbenden, ontstekingsachtigen toestand, doch spreekt enkel over zijne onmerkbaar opkomst en verdwijning, en zoodra men in aanmerking neemt, dat de onderbuikstreek van zoodanige lijdereſſen nog voor de bevalling reeds pijnlijk bij het aanraken is, na den dood als zamengeſteldheden, ontstekingen van nabijliggende organen en uitzweeting eener *plastische lymph*a aanwezig zijn, en voorts bedenkt dat genezing der ziekte in enkele gevallen door afſtooting der aangedane deelen gelukte, dan wordt men wel gedwongen, deze mannen bij te vallen. Tevens heeft men aan den *Uterus* wel na andere oorzaken, die tot eene ontſteking der baarmoeder aanleiding gaven en dezelve verwekten, onder omſtandigheden, welke het ontſtaan van eene kwaadaardige koorts begunſtigen, dergelijke verwoestingen waargenomen. Of er echter in de gevallen, waarin de dood zoo eensklaps onder ſtuipachtige bewegingen onmiddellijk na de bevalling voorviel, niet eene andere doodelijke oorzaak medewerkte, laat zich niet met zekerheid beſliſſen; wij namen dergelijke gevallen waar, bij welke de ſchou-



wing ontsteking en ophooping van water in het kanaal van het ruggemerg opleverde; kon dan niet het, aan den *Uterus* opgemerkte, meer een gevolg eener schielijk plaats gegrepene en snelle vorderingen gemaakt hebbende verrotting zijn?

### *Voorzegging.*

#### §. 178.

Bij de voorzegging heeft men allereerst op het gestel der lijdende, hare levenswijs en levensomstandigheden, hare zielsgesteldheid en evenzeer tevens op het gelijktijdig heerschende weder te letten. *Leucophlegmatische*, reeds op zich zelve zwakke vrouwen met eene flappe vezel, zullen natuurlijk in des te grooter gevaar verkeeren, doordien zij reeds door haar gestel tot deze ziekte voorbeschikt zijn. Is het boven het bereik van den Geneeskundige, om de uitwendige betrekkingen te veranderen, leven zulke vrouwen in gebrek en armoede, hebben zij vochtige, slechte woningen, dan is de hoop op genezing, van de uitgebrokene en op haar hoogste standpunt staande ziekte, voorzeker geheel en al verloren, en die, om haar te voorkomen, al ontwaart men zelfs de eerste beginselen derzelve, zeer gering. Reeds vroeger is er gezegd, dat alle zieken van deze soort zich gewoonlijk in eene hoogst treurige gemoedsstemming bevinden en even zoo min aan de mogelijkheid van herstelling na het uitbreken der ziekte geloof hechten, als dat zij reeds

reeds in haar begin zelve den dood in het kraamb-  
 ed vooruit zagen. De invloed van de ziel op het  
 ligchaam, vooral op het ziekelijke, is op zich zel-  
 ven bereids zeer groot, nog gewigtiger echter is  
 hij bij vrouwen, en nog meer bij zulke, wier vrouwe-  
 lijke natuur tot een' aanmerkelijk hoogen trap gestegen  
 is, gelijk tijdens de zwangerschap en het kraamb-  
 ed. Hoe treuriger en bedrukter de gemoedsgesteldheid  
 is, en hoe minder men slaagt, haar van het tegen-  
 deel te overtuigen, haar te verstrooijen en op te  
 beuren, des te meer heeft men te vreezen.

### §. 179.

Zoodra zelfs tijdens de zwangerschap de krachten  
 reeds zeer verminderen, bij de geboorte des kinds  
 nog meer ondermijnd worden, en zoo allengs meer  
 en meer afnemen, dan houde men dit hier, gelijk  
 bij elke *asthenische* ziekte, voor een onheilspellend  
 teeken; en schoon ook de overige verschijnselen  
 eenen goeden uitgang schijnen te beloven, zoo zij  
 men toch nog op zijne hoede en vertrouwde ze niet  
 te veel. Over het algemeen kan men in weinige  
 ziekten op de verschijnselen minder staat maken,  
 dan bij de rotting der baarmoeder. Dikwijls liep  
 de verlossing regelmatig en spoedig af, en toch  
 gaat er slechts weinig tijd henen, of de pas ver-  
 loste wordt onder stuiptrekkingen een offer des  
 doods; of bijaldien de ziekte reeds uitgebroken  
 was, en na de voorgeschrevene middelen alles den  
 besten schijn aangenomen had, verandert de gan-  
 sche



fche toedragt der zaak, en dikwêrf onder de verzekering der lijderes, dat zij zich zeer wel gevoelt, geeft zij den geest. Ja het is voorzeker onmogelijk, de omftandigheden te bepalen, onder welke men voor het einde van den een en twintigften dag een' gunftigen uitgang met grond voorzeggen kan.

§. 180.

Mifchien zal het daarenboven niet ondoelmatig zijn, de verfchijnfelen op te geven, welke gemeenlijk den ergften uitgang vooraf gaan. Daartoe behooren alle foorten van krampen, van de ligtfte trekkingen af, tot de hoogfte graden toe. Openbaren er zich terftond na de verlosfing ftuip trekkingen, dan heeft men fpoedig het einde te wachten, doch ook later plegen zij den dood hoogstens vier en twintig uren vooraf te gaan. Vloeide reeds dadelijk na de verlosfing des kinds en tijdens de geboorte de vermelde, ftinkende, fcherpe *Ichor* uit den *Uterus*, als een blijk van den hoogen graad der ziekte, dan kan men zeer zeker vooruit zeggen, dat de dood nog vóór den zevenden dag volgen zal. Doch men veroorlof ons aan te merken, dat hier ook de overige teekenen niet over het hoofd mogen gezien worden, omdat ons vele gevallen bekend zijn, waarin het vruchtwater mifkleurig en kwalijkriekend was, de *Placenta* en navelftreng in een' ontbonden toestand zich bevonden, en desnietteenftaande het kind in den blakendften welstand verkeerde, en ook de moeder,

zon-

zonder eenigzins te fukkelen, gezond het kraambed verliet. Gevaarlijk is het, als zich terftond uitflag vertoont, en hoogst gevaarlijk, als het roode uitflag zeer fchielijk wit en doorschijnend wordt; den derden dag na de uitkoming van het eerfte openbaarde zich dan gemeenlijk op het allerlaatste de dood. Zijn *Petichiën* (blutsvlekken) aanwezig, dan behoeft men aan den ras volgenden dood niet te twifelen, en meestal komt hij reeds na verloop van weinige uren, zoodra zich aan de ledematen grootere roode en bleeke vlekken vertoonen, die met de zoogenaamde doodvlekken, een blijk der beginnende verrotting, de grootste overeenkomst hebben, rond of ook ovaal zijn, foms verdwijnen en weder terug komen. Hevige koude bij eene koortsverheffing laat aan redding naauwelijks denken, en volgens de menigvuldige waarnemingen van BOËR fterven deze meerendeels bij den derden aanval der koude. Bij zulke lijderesfen, waarbij de belette ftoelgang door klisteren enz. niet kan weggenomen worden, volgt de dood met den derden dag; een hevige buikloop nogtans, waar zich in het ontlaste vele witte, taaije vlokken bevinden, verkondigt insgelijks het naderende einde; worden er fpoelwormen tevens ontlast, dan kan men met zekerheid den nabijzijnden dood voorfpellen. Hoe meer en menigvuldiger, en hoe ligter de lijderesfen, de vermelde groene ftof, welke de ouden met den naam van *Amurca* beftempelden, door braking ontlasten, des te grooter is het gevaar, en alle hoop is geheel verloren, zoodra daarbij wormen



ontlast worden. Zwelt de buik op, dan is dit de voorbode van een' spoedig naderenden dood.

§. 181.

Bij de behandeling der rotting, kan het oogmerk van den Geneesheer niets anders zijn, dan de gezonkene levenskracht, en levenswerking te verhoo- gen en in derzelver gewonen staat terug te bren- gen, doch ook tevens de afscheiding en uitstooting van het verstorvene en vreemd geworden te be- vorderen, en de verdere uitbreiding der verwoesting te verhoeden. Daar de ondervinding intuschen bewezen heeft, dat de genezing der uitgebrokene ziekte slechts altijd als eene gelukkige, als eene uitzondering op den algemeenen regel te beschou- wen is, zal het voor den Arts van meer gewigt zijn, zoodra hij de beginfelen der ziekte ontdekt, haren voortgang te stuiten; deze voorbehoedende behandeling moet diensvolgens voor den *Practicus* van de meeste aangelegenheid zijn.

§. 182.

LE ROY liet na eene raadpleging met LAUMONIER en meer andere Geneesheeren de zwangeren, bij welke hij den aanleg en de eerste verschijnselen tot deze ziekte in den jare 1793 in het *Hospice d'hu- manité* te Rouan als algemeen (*epidemisch*), ver- bonden met de verschijnselen eener kraamvrouwen- koorts, heerschende ziekte, waarnam, een' gerui-  
men

men tijd voor de verlossing een sterk kina-aftreksel, bij hetwelk men ontlastmiddelen voegde, en eenige malen des daags eene eetlepel van een mengsel van vier tot vijf onsen eenes specerijachtigen waters en van eene halve onse *Spiritus Mindereri* met een' siroop gebruiken; trachtte de sombere en treurige gemoedsgesteldheid te doen verbeteren, en de kraamvrouwen werden in eene tegen het zuiden gelegene, zeer frische zaal gebragt. Het gevolg bekroonde al zijne wenschen en verwachtingen, en wij gelooven, dat deze geneeswijze juist diegene is, waar men zich nog het meeste van beloven kan. Boër ondervond, dat ook dan, als men iets ontstekingachtigs vermoeden konde, ontstekingwerende middelen veelal onwerkzaam waren, de aderlatingen in vele gevallen de verwachting te leur stelden, schoon hij dadelijk laat volgen, dat eene matige bloedontlasting in sommige gevallen nuttig kan zijn. Zachte ontlastmiddelen (*Eccoprotica*) deden somwijlen goede uitwerkselen, bijaldien zij niet te lang voortgezet werden; *Antiseptica* zijn nadeelig, tenzij de gegrondste aanwijzing haar gebruik billijkt. De Schrijver behandelde eene zwangere, bij welke hij grond genoeg had, om eene aanvankelijke rotting te vermoeden, met een afkooksel der kina, waarin *Cortices Aurantiorum* getrokken werden, terwijl men de kaneeltinktuur er bijvoegde. Uitwendig werd de onderbuik ingewreven met eene oplossing van den *Balsamus peruvianus* in *Spiritus Vini* met bijvoeging van *Ammonia liquida*. Tot gewonen drank kreeg zij een afkooksel van ijslandsche



fche mos, voor het overige ligt, trouwens krachtig voedsel. Hiermede stemde ook de overige leefregel overeen, en inzonderheid trachtte men haren geest kalmer te maken, haar te vervrolijken en haar het vast geloof aan haren dood uit de gedachten te brengen. De uitgang was volkomen naar wensch. Zij herhaalde zich zichtbaar, het kwaadsappige uitzigt verdween, en ten behoorlijken tijde bragt zij tweelingen ter wereld, bevindende zich in het gansche beloop des kraambeds bij uitnemendheid wel.

### §. 183.

Heeft de ziekte reeds aanmerkelijke vorderingen gemaakt, zoo schiet er niets overig dan de middelen, welke de kwaadaardige rotkoorts behoeft. Uit dien hoofde komen hier zeer te stade, de aftreksels der valeriaan, *Serpentaria*, *Angelica*, *Arnica*, *Aristolochia*, *Imperatoria*, *Contrajerva*, het aftreksel, of het afkooksel van den *Cortex peruvianus*, kleine giften der *Ipecacuanha*, des *Moschus*, de inwrijvingen van geestrijke vloeistoffen en de smeersels met *Balsamus peruvianus* voor den onderbuik, alsmede algemeene specerijachtige baden. Inwendig mogen ook daarenboven de mineraalzuren, inzonderheid het Phosphor- en zwavelzuur aangewend worden, het beste in eene der boven opgenoemde vloeistoffen. De eetregel zij ligt, doch voedend; de drank een aftreksel van een zacht, specerijachtig kruid, zoo als de *Mentha piperita*, *Melissa* en dergelijken, of ook een afkooksel van den *Lichen*

*islandicus*. Bij dat alles zorgde men voor genoegzame buiksonstlasting, zuivere lucht en linnen, en vestigde niet minder de aandacht op de behandeling van den geest.

§. 184.

Om de afstooting van het verrotte te bewerken, had BOËR plaatselijk vooreerst onderscheiden *Injections*, echter zonder uitwerking, aangewend. Later beproefde hij daarom een onbekend gebleven smeersel, dat hij met een penseel op de inwendige oppervlakte des *Uterus* bragt. Dikwerf gelukte de proef niet, uit hoofde het moeilijk was, door den baarmoedermond te komen en derhalve het smeersel niet van het penseel afging. Geschiedde dit echter, dan scheidde zich het verstorvene in 24 tot 48 uren af, zonder dat de gezonde deelen daarvan leden. Dit gaf aanleiding tot de ontdekking van een werktuig, hetwelk hij *Porte-Plumaceaux* noemde, waarvan STARK in het derde stuk van het vijfde deel zijnes Archiefs eene afbeelding gegeven heeft, en dat BOËR zelf dus beschrijft: „Het is eene kromme, „buis, bijkans als de pijp eener baarmoederspuit, „doch eenigzins langer. Door deze buis gaan een, „twee of drie zijden koordjes, van eene el lengte. „Van boven heeft de buis een deksel, aan welks „inwendige zijde, de koorden met het eene einde „op een ringetje zijn gehangen. Het deksel is in „het midden met eene ronde opening voorzien, „waarin de buis eener baarmoederspuit past. Door „de-



„ deze opening wordt in de eerste plaats bij het  
 „ verband door de ingestokene buis in den *Uterus*  
 „ gespoten. Aan het andere einde der koordjes  
 „ wordt aan ieder een plukfelwiek gehecht. Ten  
 „ einde deze inwendig tegen den *Uterus* te voeren,  
 „ behoeft men alleenlijk met de eene hand de buis  
 „ terug te houden, en met de andere het aan het  
 „ deksel vereenigd geweest zijnde einde van het  
 „ alvorens met olie of vet bestrekene koord, zoo  
 „ ver het gaat, naar zich te trekken; zoodoende  
 „ glijdt de plukfelwiek binnen de holte der baar-  
 „ moeder. Op dezelfde wijze worden ook de an-  
 „ dere plukfelwieken ingetrokken. Alsdan voert  
 „ men de buis voorzigtig over de koorden naar  
 „ buiten, en hecht deze met eene kleefpleister, tot  
 „ aan het volgende verband, aan den onderbuik der  
 „ lijderes vast.” Geëvenredigd aan de holte des  
*Uterus*, raadt BOËR, onderscheiden dikke instrumen-  
 ten in het werk te stellen. Lichtelijk begrijpt men,  
 hoe moeilijk het is, van deze uitvinding gebruik  
 te maken, en dat de aanwending derzelve dikwerf  
 niet eens mogelijk is. Bovendien heeft de uitvin-  
 der het smeersel, waarvan hij zich bediende, niet  
 publiek gemaakt; uit dien hoofde zijn wij er voor,  
 zich liever van de inspuitingen te bedienen, die,  
 op eene doelmatige wijze vervaardigd, door JÖRG zijn  
 opgegeven. Hij prijst een\*, op de wijze der klisteer-  
 spuiten bewerkte, elpenbeenen kanul, welke van  
 voren breed gevijld is, op eene veerkrachtige buis  
 te bevestigen, en den eersten in den baarmoedermond  
 te brengen, dan in te spuiten, en om het spoedig  
 af-

afloopen der ingespotene vloeistof te verhoeden, het pennetje met eene spons te omgeven, hetgeen tegen den baarmoedermond geschoven werd. Trouwens tot inspuiting prijst hij afkookfels van kina met scheerling, calmus, eikenbast, andere bittere, aromatieke kruiden, als ook met azijn of wijn, kalkwater enz. aan. Wij voor ons zullen van het houtzuur de proef nemen.

### L I T T E R A T U U R.

C. BAUHINI, *Appendix ad FRANSISCI ROUSSETI de partu caesareo tractatum.*

ALPHONSE LE ROY, *Vorlesungen über die Gebärmutterblutflüsse u. s. w. A. d. Franz. von RENARD. Leipzig 1802. 8°. S. 101.*

L. J. BOËR, *Abhandlungen und Versuche geburtshülflichen Inhalts. 3<sup>e</sup>. Th. Wien 1793. 8°. S. 73.* Uit het Hoogduitsch, met waarnemingen en aantekeningen vermeerderd door A. POTGIETER, Heel- en Vroedmeester te Leyden, bij J. W. VAN LEEUWEN. 1824. gr. 8°.

J. A. SCHMIDTMÜLLER, *Handbuch der medicinischen Geburtshülfe. Erster Theil. Frankfurt a. M. 1809. 8°. S. 352.*

C. F. G. KAISER, *Diss. de Sphacelo uteri gravidæ observationibus illustrato. Jenae 1810. 8°.*

J. E. ZIMMERMANN, *Diss. de uteri putrescentia, adjuncta morbi hujus observati historia. Lipsiae 1815. 4°.*

C. WENZEL, *über die Krankheiten des Uterus. Mit 12 kupfern und eben so viel Lienezeichnungen. Mainz 1816. gr. folio. S. 44. N°. viij.*



J. C. G. JÖRG, *Schriften zur Beförderung der Kenntniss des Weibes und Kindes im Allgemeinen und zur Bereicherung der Geburtshülfe insbesondere. Zweiter Th. Leipzig 1816. 8°. S. 1.*

J. LOCHER, *de putrescentia uteri. Berolini 1819. 8°.*

C. G. CARUS, *Lehrbuch der Gynäkologie u. s. w. Zweiter Theil. Leipzig 1820. 8°. S. 247. §. 1063.*

J. C. G. JÖRG, *Handbuch der Krankheiten des Weibes. 2°. Auflage. S. 43. N°. viij. Leipzig 1821. 8°. §. 707. S. 755.*

FR. G. LIPPICH, *Observata de metritide septica in puerperis grassante. Vindobonae 1823. 8°.*

---

H A N D B O E K  
O V E R D E  
K E N N I S E N G E N E Z I N G  
D E R  
Z I E K T E N  
V A N H E T  
V R O U W E L I J K E G E S L A C H T ;

D O O R  
E. V O N S I E B O L D,  
*Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.*

---

Uit het Hoogduitsch,  
naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave  
door

G. J. V A N E P E N,  
*Heel- en Vroedmeester te Amsterdam.*

---

VIERDEN DEELS TWEEDE STUK.

---



T E A M S T E R D A M , B I J  
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 7.



THEODORE A. H.

TO THE

LIBRARY OF THE

U.S.A.

THEODORE A. H.

TO THE

LIBRARY OF THE

U.S.A.

THEODORE A. H.

TO THE LIBRARY OF THE

U.S.A.

THEODORE A. H.

TO THE LIBRARY OF THE

U.S.A.

THEODORE A. H.

TO THE LIBRARY OF THE

THEODORE A. H.

TO THE LIBRARY OF THE

THEODORE A. H.

THEODORE A. H.

TO THE LIBRARY OF THE

U.S.A.

# I N H O U D.



## NEGENDE HOOFDSTUK.

Bladz.

OVER DE VERPLAATSINGEN DER BAARMOEDER	
IN HET KRAAMBED. . . . .	273.

A. OVER DE UITZAKKING DER BAARMOEDER	
IN HET KRAAMBED. . . . .	279.
DIAGNOSIS. . . . .	281.
GEVOLGEN EN UITGANGEN. . . . .	284.
OORZAKEN. . . . .	286.
VOORZEGGING. . . . .	291.
GENEESWIJZE. . . . .	293.
LITTERATUUR. . . . .	308.

B. VAN DE ACHTERWAARTSKANTELING DER	
BAARMOEDER IN HET KRAAMBED. . . . .	310.
DIAGNOSIS. . . . .	311.
GEVOLGEN EN UITGANGEN. . . . .	315.
OORZAKEN. . . . .	320.
VOORZEGGING. . . . .	322.
GENEESWIJZE. . . . .	324.
LITTERATUUR. . . . .	339.

C. VAN



## C. VAN DE VOORWAARTSKANTELING DER

BAARMOEDER IN HET KRAAMBED.	340.
DIAGNOSIS.	ald.
OORZAKEN EN GEVOLGEN.	341.
GENEESWIJZE.	342.
LITTERATUUR.	344.

## D. VAN DE OMBUIGING DER BAARMOEDER

IN HET KRAAMBED.	ald.
DIAGNOSIS.	346.
OORZAKEN.	350.
VOORZEGGING.	352.
GENEESWIJZE.	353.
LITTERATUUR.	356.

## E. VAN DE BINNEN-BUITENWAARTSKEERING

DER BAARMOEDER.	357.
BEGRIP.	ald.
VERSCHIJSSELEN.	358.
DIAGNOSIS.	359.
OORZAKEN.	368.
GEVOLGEN EN UITGANGEN.	372.
VOORZEGGING.	373.
GENEESWIJZE.	376.
LITTERATUUR.	389.

# T W E Ê D E   A F D E E L I N G .

## OVER DE GEBREKEN AAN DE BORSTEN DER KRAAMVROUWEN.

### E E R S T E   H O O F D S T U K .

	Bladz.
OVER DE ZWERENDE TEPELS. . . . .	391.
DIAGNOSIS. . . . .	ald.
OORZAKEN. . . . .	393.
VOORZEGGING. . . . .	395.
GENEESWIJZE. . . . .	396.
LITTERATUUR. . . . .	403.

### T W E E D E   H O O F D S T U K .

OVER DE ZIEKELIJKE VERANDERINGEN IN DE HOEDANIGHEID VAN HET ZOG. . . . .	405.
BEGRIJF. . . . .	ald.
BESTANDDEELLEN EN EIGENSCHAPPEN EENER GOEDE EN GEZONDE MELK. . . . .	—
LITTERATUUR. . . . .	407.
VERSCHIJSLEN. . . . .	ald.
OORZAKEN. . . . .	408.
GENEESWIJZE. . . . .	416.
LITTERATUUR. . . . .	422.



## D E R D E   H O O F D S T U K .

Bladz.

OVER DE ZIEKELIJKE VERANDERINGEN VAN	
HET ZOG, TEN AANZIEN VAN DESZEELFS	
HOEVEELHEID. . . . .	423.
VERSCIJNSELEN. . . . .	ald.
OORZAKEN. . . . .	424.
GENEESWIJZE. . . . .	428.
LITTERATUUR. . . . .	433.

## V I E R D E   H O O F D S T U K .

VAN DE ONTSTEKING DER BORSTEN. . . . .	434.
VERSCIJNSELEN. . . . .	ald.
KENTEEKENEN DER ONTSTEKING. . . . .	435.
OORZAKEN. . . . .	436.
GEVOLGEN EN UITGANGEN DER ONTSTEKING. . . . .	437.
KENTEEKENEN DER VERDEELING, DER ONT-	
STEKING EN DER VERETTERING. . . . .	438.
GENEESWIJZE. . . . .	439.
LITTERATUUR. . . . .	455.

## V I J F D E   H O O F D S T U K .

VAN DE ZOOGENAAMDE ZOGVERPLAATSINGEN. . . . .	456.
DIAGNOSIS. . . . .	459.
OORZAKEN. . . . .	462.
VOORZEGGING. . . . .	464.
GENEESWIJZE. . . . .	465.
LITTERATUUR. . . . .	479.

---

## NEGENDE HOOFDSTUK.

### *Over de verplaatsingen der baarmoeder in het kraambed.*

#### §. 185.

**V**eranderingen in de ligging des *Uterus*, in zoo verre men daaronder zijne regelmatigheid betrekkelijk zijne middellijn tot de as en de doormetingen des bekkens verstaat, kunnen en moeten door de geboorte menigvuldiger te weeg gebragt worden en na dezelve in het kraambed meer plaats grijpen, uit hoofde de zwangerschap en geboorte reeds op zich zelve daartoe voorbeschikken; want het dalen en klimmen van den *Uterus* in de verschillende tijdperken der zwangerheid, de veranderde rigting van deszelfs overlangsche doormeting tot den horizont tijdens dezelve, waardoor een meer scherpe hoek gevormd wordt, zijn voorbereidende oorzaken genoeg, door welke, bij de minste gelegenheid gevende oorzaak, uitzakking, voor- en achterwaartskeering en ook omkanteling der baarmoeder kan

IV. D. 2°. ST.                      S                      ver-



verwekt worden, terwijl de, ten opzichte van het meest oogenblikkelijke gevaar, meest te duchtene verplaatsing — de binnen - buitenwaartskeering — gewoonlijk niet dan in het kraambed voorvalt, de gevallen uitgezonderd, waar zij door polypen en andere vreemde deelen in den *Uterus*, of bij de vooral plotselinge afdaling in den baarmoedermond en uit de teeldeelen, of na de afbinding van een polyp ontstaat. Wij toch behandelden hier eene dame met eenen bloedvliet uit de baarmoeder, die reeds vele jaren aanhield. Wij onderzochten haar en vonden eene volslagen binnen-buitenwaartskeering des *Uterus*, zijnde aan de eene zijde de baarmoedermond volkomen met den bodem vastgegroeid. De polyp werd vroeger door een' Arts afgebonden, waarop de binnen-buitenwaartskeering duidelijk bleek ontstaan te zijn. Ons zijn, bij de wegneming der baarmoederpolypen door de affnijding met onze schaar, deze gevolgen dusverre niet gebleken, en *nooit* is mede bij onze geöpereerden de polyp teruggekomen. — Buiten de opgenoemde verplaatsingen verdient tevens de baarmoederbreuk nog vermelding, die ook bij kraamvrouwen zich pleeg op te doen.

#### §. 186.

Hierbij komt nog, dat verplaatsingen der baarmoeder tijdens het kraambed, zoo zij niet eensklaps ontstaan, of terstond met zeer hevige toevallen vergezeld gaan, niet zoo spoedig bespeurd worden, uit hoofde bij de meerdere rust de verschijnselen zelden zoo hevig zijn, en men alsdan, zoodra de kraamvrouw reeds het bed verlaat, eerder geneigd is den grond

grond der ziekelijke verschijnselen op eene, door verlossing en kraambed verwekte, zwakte te schuiven. Om deze reden verloop er dikwerf weken en maanden, eer de ware oorzaak herkend en weggenomen wordt. Ook kan het gebeuren, dat zelfs Artsen, die geene Verloskundigen zijn, door het toedienen van inwendige versterkende, en de aanwending van zamentrekkende plaatsmiddelen de zaak verergeren; reden waarom, wij zoo dringend hebben aanbevolen (\*), dat eene kraamvrouw na hare bevalling en vóór dat zij met haren echtgenoot de huwelijkspligten weder vervult, zich door eenen Verloskundige of eene verstandige Vroedvrouw mogte onderzoeken laten, ten einde te beoordeelen, of de baarmoeder hare natuurlijke ligging hebbe, om alzoo haar nog, vóór dat zij bevrucht wordt, en door den bijslaap het gebrek op nieuws toeneemt, de noodige hulp te kunnen toebrengen. De inachtneming van dit voorschrift zou vele ziekten der baarmoeder en zoo menige stoornis in de gezondheid eener verlostte voor haar geheel volgende leven verhoeden.

#### §. 187.

Alle plaatsgrijpende veranderingen in de ligging geschieden of langzaam, of zij ontstaan plotseling.

(\*) m. s. des *Verfassers Lehrbuch der praktischen Entbindungskunde, dritte verbesserte und vermehrte Ausgabe*, §. 185. Nürnberg 1821. 8°. und *DESSEN, Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen, dritte Auflage. Würzburg 1819. §. 635 und vierte Auflage. Ebend. 1822. §. 360. 8°.*



ling. Beide wijzen van oorsprong hangen, wel is waar, van de oorzaken en derzelve vermogen af; evenwel moet men toch ook in aanmerking nemen, dat eene schadelijke magt, welke bij het eene voorwerp de ziekte tot hare meeste volkomenheid brengt, bij een ander slechts de eerste aanleidende oorzaak tot dezelve wordt, zoodat zij later eerst, langzamerhand, van tijd tot tijd, meermaals eenige weken na de bevalling die hoogte bereikt. Desgelijks zal bij eene zekere voorbeschiktheid de schadelijke invloed eerder deszelfs vermogen uitoefenen en de gebrekkige ligging des te gemakkelijker en vroeger te weeg brengen.

### §. 188.

Deze afwijkingen nu zijn of zuiver werktuigelijke gebreken, of zij vereenigen zich nog met andere *dynamische*, bij lange during der ongesteldheid, zelfs met *organische*. Als *complicatiën* van de eerste foort ontmoeten wij het menigvuldigste de ontsteking in hare verschillende graden, vormen en uitgangen, menigwerf bloedvloeijingen uit de teeldeelen, nu eens als eene hoogst overvloedige, schielijke *Metrorrhagie*, dan weer als eene langdurige druppelswijze afvloeijing (*Stillicidium Sanguinis*). De baarmoeder zwelt gewoonlijk in hare zelfstandigheid, en de herstelling tot den vorm, welken zij buiten de zwangerschap hebben moet, gaat niet schielijk en regelmatig genoeg in haar werk, daardoor, en door de veranderde ligging zelve ontstaan moeilijkheden in de pislozing en stoelgang: er openbaren zich pijnen in de liezen, den onderbuik, het

het kruis en de dijen, ligt zwellen ook de beenen en voeten eenigzins op. De enkel door vermeerderde uitzetting ontstane vergrooting en omvang van het werktuig, verandert dan soms wel bij een' langen duur in eene verharding der zelfstandigheid, door de stremming der *Lympha*, en bestond er eenige voorbeschiktheid toe, dan ontstaat er in het vervolg niet zelden eene boosaardige verharding, *Scirrhus*, welke dan tot openen kanker overgaat. Doch deze uitgang grijpt zeker alleen bij de *Retroversio*, *Antroversio* en *Pronatio* plaats. Somwijlen bepaalt zich de *Complicatie* slechts tot het gevoelige gedeelte des *Uterus*, inzonderheid bij aanleg tot *Hysterie*, de *Uterus* en zijne aangrenzende deelen en *organen* worden buitengewoon gevoelig, en er vertoon en zich insgelijks terugwerkingen in verder afgelegene, en met den *Uterus* in naauw verband staande, deelen. Maagkramp, krampachtige braken, flaauwten, algemeene kramp, stuiptrekkingen enz. kunnen daarmede gepaard gaan.

### §. 189.

Over het algemeen laat zich, wel is waar, voor al deze afwijkingen geen regelmaat voor de voorzegg ing opmaken, doch bij ieder derzelve mag men een' gunstigen uitgang te gemoet zien, zoodra het geval terstond bij het begin herkend en doelmatig behandeld werd. Bijkomende toevallen, gelijk hevige bloedingen, die eensklaps gevaarlijk voor het leven zijn, flaauwten, krampen, stuiptrekkingen en ontsteking, door welke ligt aaneengroeijingen plaats grijpen, hebben natuurlijk den grootsten invloed op



de bepaling der voorzegging, waarbij men bovendien den ouderdom, de gesteldheid, de levensbetrekkingen en den aanleg tot deze of andere ziekten ook niet uit het oog mag verliezen. — De algemeene geneeskundige voorschriften zullen misfchien tot de volgende kunnen beperkt worden: 1) men trachte immer de onnatuurlijke ligging der baarmoeder op de zachtste en meest voorzigtige wijze te herstellen; gedooft het de aard des gevals, dan is het het beste alleen door de ligging der lijderes, en men onderneme slechts dan de kunstmatige herstelling, indien eene voorhanden *Complicatie*, of een voor de gevolgen te duchten onheil fchielijke hulp vereischt; in zulk een geval zij men niet fchroomvallig en handele ftoutmoedig en fpoedig; 2) onder alle omftandigheden zorg men voor eene doelmatige ligging der lijderes, uit hoofde er geen beter en zachter middel beftaat, om de natuurlijke ligging weder te herstellen en dezelve te behouden; 3) alleen in zeer dringende gevallen, en in die, waarin na den verftrekenen kraambedstijd, men de hoop op eene grondige genezing moet laten varen, wende men dadelijk een werktuigelijk middel tot ondersteuning van den *Uterus* aan; in de overige gevallen vermijde men daarvan gebruik te maken, zoo lang de kraamvloed aanhoudt, wiens onderdrukking ligt gevaarlijker konde worden, dan het eerfte gebrek; 4) de meeste zuiverheid is vooral in dit geval aan te prijzen; 5) nimmer verzuime men voor behoorlijke ontlasting der *Urin* en der drekstoffen te zorgen, en bediene zich tot verwijdering der eerfte liever van een' katheter, dan dat men in

ge-

gevaar komt van te lang gewacht te hebben; de uitwerping der laatste verkrijgt men door een' verdunnenden eetregel, zachte ontlastmiddelen, waartoe inzonderheid de vette oliën zeer geschikt zijn, en, waar het noodig is, door lavementen; 6) men wachte zich, zonder verder onderzoek, de grondige genezing te vooronderstellen op het bloote afnemen der toevallen.

A. *Over de uitzakking der baarmoeder  
in het kraambed.*

§. 190.

Gelijk de onbezwangerde en zwangere baarmoeder hare ligging in betrekking tot de hoogte des bekens veranderen, en min of meerder diep afzakken kan, zonder dat dit door de maandstonden of het regelmatig verloop der zwangerschap zelve veroorzaakt werd, even zoo kan zij ook in het kraambed en ten gevolge der verlossing verschillend afzakken, zijnde dit die ziekelijke staat, welken wij met den naam van *uitzakking*, in den uitgestrektsten zin dezes woords, bestempelen. Reeds dit alleen, dat dit gebrek door de vrouwen zelve menigmaal, kraamgebrek genoemd wordt, bewijst, hoe dikwerf hetzelfde na het kraambed zich opdoet.

§. 191.

Deze toestand heeft onderscheidene graden, al naarmate de *Uterus* meer of minder laag is afgezakt. Den minsten graad, waarbij de afzakking der baarmoeder weinig te beteekenen heeft en het



scheedegedeelte alleen de onderste engte des bekken nadert, heeten wij zakking der baarmoeder: wordt het scheedegedeelte des *Uterus* tusfchen de groote fchaamlippen eenigermate zichtbaar, dan is het eene onvolkomene uitzakking, terwijl men met regt eigenlijk alleen volkomene uitzakking, dien toestand kan heeten, waarbij de gansche baarmoeder buiten de teeldeelen zichtbaar wordt; een geval, dat gelukkig slechts zeldzaam voorkomt.

### §. 192.

Behalve de baarmoeder, en met deze te gelijk, wijkt gemeenlijk ook de vrouwelijke fcheede van hare natuurlijke plaats af, en dit wel geheel of gedeeltelijk. Menigvuldiger nog dan uitzakkingen der baarmoeder ontmoet men die der fcheede. Deze kan insgelijks onvolkomen en volkomen zijn, naar gelang de afgezakte fcheede nog binnen de teeldeelen verborgen of van buiten zichtbaar is, in sommige gevallen evenwel kan de *Prolapsus Vaginae* tot eene ongeloofelijke grootte toenemen. Dan, wij dienen hier tevens te onderscheiden, of de afwijking zich tot de gansche fcheede, of slechts tot een gedeelte derzelve uitstrekt, en hebben diensvolgens eene *Prolapsus Vaginae totalis seu partialis*. In het laatste geval is, of het gewelf der fcheede (*Laquear Vaginae*), of de eene of de andere wand derzelve, voornamelijk de voorste of achterste afgezakt; het meeste zien wij in het kraambed de uitzakking van den voorsten wand der fcheede, uit nader op te gevene gronden, ontstaan.

*Diagnosis.*

## §. 193.

De onderkenning eener uitzakking is aan geene moeilijkheid verknocht, zoödra men aandachtig het verloskundig onderzoek bewerkstelligt. Men voelt dan het scheidgedeelte meer of min lager beneden den doortogt gezakt, nabij de onderste engte, tuschen de uitwendige teeldeelen, of in den hoogsten graad ligt de, dan altoos opgezwollene, baarmoeder geheel en al buiten het bekken. Men zij nogtans omzigtig, inzonderheid in geregteijk - geneeskundige en crimineele gevallen, zich te schielijk over eene onvolkomene uitzakking, vooral voor de volkomene ophouding der kraamzuivering, te verklaren; doordien, gelijk bekend is, de baarmoeder in de eerste weken na de verlossing altoos lager staat, dan anders, gelijkerwijze ook ten tijde der maandstonden altoos lager afdaalt. Als een juist kenmerk ter onderscheiding dient de spleet van den baarmoedermond en de gevoeligheid van het scheidgedeelte; want bij eene aanmerkelijke opzwellling — wij zagen dezelve zich tot eene middellijn van twee duimen vergrooten — konde men ligt verleid worden, de uitzakking met eene polyp of eenig ander vreemd ligchaam en schijnvliezen te verwarren, welke mistasting de gevaarlijkste gevolgen zoude hebben. Dikwijls is ook de uitzakking der scheede voor den onkundige en onervarene niet zoo gemakkelijk te onderkennen, wijl het gelijkvormig ronde, roode, gladde gezwel zeer veel overeenkomst heeft met



eene binnen - buitenwaartskeering, of een vleeschgezwel. Van de eerste onderscheidt zij zich, door dat men hier, bij het naauwkeurig onderzoek het scheidgedeelte ontdekt, van het laatste door zijne aanmerkelijke weekheid, de mogelijkheid het geheel terug te brengen en de wijze van zijne ontwikkeling. Als hulpmiddelen komen bovendien de verschijnselen, waarmede beide toestanden vergezeld gaan, zeer te stade. Voor de *Diagnosis* is niet zeer gemakkelijk dat geval, waarbij het gewelf der scheede afgezakt is, het scheidgedeelte daardoor verborgen voorkomt en de baarmoedermond in dit gedeelte, wanneer het aanmerkelijk gezwollen is, slechts als eene fijne spleet zich op het gevoel voordoet. Ook neemt men dezen toestand waar, zelfs zonder eenige afzakking des *Uterus*, bij een wijd zeer hellend bekken, wijde scheede en zeer slap gestel, makende dit eene juiste oordeelvelling omtrent de verandering des *Uterus* zelven hoogst moeilijk. — Wij moeten hier nog doen opmerken, dat men onderzoekingen van dien aard, tenzij het gevaar spoedige hulp vordert, naderhand ook bij eenen opgerigten stand der lijderes, en nadat zij eenigen tijd denzelven gehouden heeft, in het werk moet stellen, doordien men dan eerst een grondig oordeel vellen kan. Om de beweeglijkheid van het uit- of afgezakte deel evenwel behoorlijk en naauwkeurig te onderzoeken, eene zaak voor de voorzorging en genezing van het hoogste belang, late men de lijderes liggen, met matig gebogene knieën, terwijl men de dijen tegen den buik laat optrekken.

## §. 194.

Zoodra klagen de kraamvrouwen niet over een gevoel van zwaarte in het bekken, over een' gedurigen aandrang op de teeldeelen, vergezeld met stekende pijnen aan de beide zijden des onderbuiks, in de rigting van de ronde banden der baarmoeder, over pijn in de heiligbeensstreek en moeilijkheden bij de pislozing en den stoelgang, of men kan de ontwikkeling eener uitzakking der baarmoeder vooronderstellen. Is de uitzakking aanmerkelijk, dan voelen zij zelfs het vreemde ligchaam in de uitwendige teeldeelen. Niet zelden gaat daarmede gepaard misfelijkheid, zelfs braking, en eene pijn in het bovenste gedeelte der dij, welke zich stekend tot aan de knie kan uitstrekken. De kraamzuivering is veelal gestoord, ontaardt in bloedvloeijing, of in verder vervolg openbaart zich eene bovenmatige slijmafscheiding. Zwelt de *Uterus* meer op, dan zullen alle toevallen in hevigheid toenemen, inzonderheid de pislozing en de stoelgang meer belemmerd worden. Licht doet zich hierbij eene ontstekingsachtige aandoening der baarmoeder op. Uitzakkingen der scheede zijn over het geheel slechts dan door dergelijke toevallen vergezeld, bijaldien zij zeer groot zijn, anderszins klagen de lijderefsen, met deze behebt, allereerst bloot over een meer lastig dan pijnlijk dringen op de schaamtestreek; het uitgezakte deel nogtans wordt in dit geval spoedig door de afvloeiende *Lochiën* en *Urin* aangedaan, uitermate pijnlijk en ontstoken.



*Gevolgen en Uitgangen.*

## §. 195.

Reeds bij de beschrijving der toevallen werden de naaste gevolgen van de uitzakking der baarmoeder, voor zoo verre zij gedeeltelijk hunnen grond in de drukking, welke de uit hare plaats getredene baarmoeder op de nabijgelegene deelen, pisblaas en endeldarm, uitoefent, en in de uitzetting der banden hebben, aangehaald. Het spreekt van zelf, dat de laatste toenemen met den hooger en graad van *Pro-lapsus*, dat trouwens de verstopping, *Dysurie*, *Strangurie* en *Ischurie* ophoudt, ten minste beter wordt, zoodra de zakking, of de onvolkomene uitzakking tot eene volkomene overgaat. Wijders worden de daarin betrokkene organen spoedig aan die uitzetting en spanning gewoon, en de daaruit aanvankelijk veroorzaakte pijnlijke verschijnselen verdwijnen gansch en al, of verminderen toch allengs aanmerkelijk. Hoe schielijker de uitzakking ontstond, des te onstuimiger openbaren zich ook de verschijnselen en des te gewigtiger zijn de gevolgen voor dien oogenblik.

## §. 196.

Stoornissen in de kraamzuivering moeten volstrekt uit zulk eene afwijking voortvloeijen, doordien de omloop des bloeds in het werktuig belemmerd wordt. Dikwerf doen zich hevige bloedingen op, die door geene andere middelen, dan door de herplaatsing, te beteugelen zijn, te weten als de *Uterus* terstond

na

na de bevalling afzakt. Desgelijks ziet men wel eens eene *Metrorrhagia lenta chronica*, die later in een' hoogst sterken witten vloed verandert. De uitgezakte deelen gaan tot ontsteking over, en uit deze ongesteldheid ontspruiten dan al die kwaad-aardige gevolgen, welke de ontsteking der baarmoeder slechts begeleiden kunnen, doch deze foort van *Metritis* is inzonderheid zeer geneigd, tot verharding, zelfs tot knoestgezwel over te gaan, doordien door de hoofdoorzaak zelve bereids aanleiding tot ophooping en gegeven werd, die dan weder als nieuwe oorzaken de ontsteking vermeerderen en onderhouden; deze foort van *Metritis* gaat tevens spoedig tot versterking over. Wijders maakt zij hoogst pijnlijke en lastige ontvellingen, het uitwendige vlies der baarmoeder, en de mede afgezakte scheede, wordt verdikt, gevoelloos, onderwijl derzelve kleur en weeffel geheel veranderen. Houdt het gebrek lang aan, keeren de ontstekingstoevallen dikwijls terug, of eindigt de ontsteking met uitzweeting, dan ontstaan er ligt aaneengroeijingen, welke alsdan de volkomene genezing onmogelijk maken. Eene volkomene uitzakking brengt onvruchtbaarheid te weeg, terwijl een geringe graad derzelve haar ten minste zeer hindert (\*).

#### §. 197.

(\*) Dat bij het dragen van een doelmatig ingebragt moedersteunfel, vrouwen met eene volkomene uitzakking zwanger worden, is te over bekend. In het kort echter heb ik zwangerheid waargenomen bij een meisje, dat eene volkomene uitzakking der baarmoeder had, zoodat het grootste gedeelte des *Uterus* buiten de teeldeelen kwam.



## §. 197.

De uitgang en genezing volgt of geheel, wanneer bij anderzins gunstige omstandigheden de pas ontstane uitzakking doelmatig behandeld wordt, of gedeeltelijk als de eene, of de andere dezer voorwaarden ontbreekt, zoodat de volkomene uitzakking in eene onvolkomene, deze in eene zakking der baarmoeder overgaat. — In de volkomene genezing eener uitzakking der scheede slaagt men alleen onder een' zamenloop van de gunstigste omstandigheden, en hoezeer zij minder gevaar insluit, wordt nogtans hare genezing ook zeldzamer en moeilijker.

*Oorzaken.*

## §. 198.

De zwangerschap zelve door den verschillende stand, welken de *Uterus* tijdens dezelve heeft, zijn vermeerderde omvang, de in alle tot de teelwerktuigen behorende deelen vermeerderde uitzetting en ontspanning, het werk der geboorte zelf, en de op verhoogd leven en buitengewone inspanning volgende verslapping, die, behalve van een' *dynamischen*,

kwam. Des nachts namelijk, op het bed liggende, ging de *Uterus* terug; zoodra zij opstond, vertoonde hij zich weder. In de tweede maand twijfelde ik nog aan de mogelijkheid, de volgende tijd heeft de zwangerschap bevestigd; zij is reeds zeven maanden zwanger en verbeidt hare bevalling in het Verlosfings-Instituut der Universiteit.

*fchen*, ook wel van een' *mechanifchen* aard tevens is, zijn als zoo vele algemeen voorbeschikkende oorzaken tot uitzakkingen der baarmoeder en der fcheede aan te merken. Vereenigen zich reeds in de zwangerschap hiermede een fterke, witte vloed, bij en na de verlosfing hevige bloedingen uit de teeldeelen, is het bekken wijd en helt het weinig, dan zien wij de *Prolapsus* ook dan zelfs ontftaan, wanneer noch groote magerheid, noch eene ziekelijke, lymphatieke, *leucophlegmatifche* gefteeldheid des voorwerps, de af- en uitzakking des *Uterus* en der fcheede begunftigen.

### §. 199.

Bij het verlosfingswerk zelf is insgelijks het volftrekt of betrekkelijk te wijde bekken menigwerf de aanleidende oorzaak tot uitzakking. De buitengewone kracht der weeën zelve heeft wel het vermoegen, de bezwangerde baarmoeder uit te drijven, hoeveel te ligter moet dan naderhand eene uitzakking ontftaan, wanneer met de fchielijke, dikwijls plotfelinge ontlediging, de werkzaamheid der weeën blijft voortduren, en de *Uterus* zelf reeds nabij den uitgang des bekkens genaderd was. Komt hierbij nog, zoo als gewoonlijk het geval is, eene hevige bloeding, tijdens het kraambed een flechte leefregel, dan zullen weinige vrouwen onder deze omftandigheden zoo gelukkig zijn, zonder uitzakking het kraambed te verlaten. — Doch ook het volftrekt of betrekkelijk te naauwe bekken heeft dergelijke gevolgen wegens de hinderpalen bij de verlosfing. Ook dan, indien de onevenredigheid tufchen de wijdte en de grootte des kinds niet zoo aanmerkelyk is,



is, dat de kunst de natuur behoeft te ondersteunen, of indien de weeën juist kracht genoeg bezitten, om het kind door het bekken te drijven, zagen wij wegens de langdurigheid der verlossing, door de heviger inspanning dikwijls zich uitzakkingen ontwikkelen. Misschien, dat bij een misvormd bekken, vooral bij een sterk vooruitstekend *Promontorium*, of een ander ziekelijk gebrek, ook de wanstaltigheid zelve medewerkt, om den *Uterus* uit deszelfs natuurlijke ligging te dringen. Na keeringen, inzonderheid als het vruchtwater alreede lang was afgevoerd, en de kunstbewerking door deze omstandigheid, of wegens de kleinte des bekken, of bijzondere grootte des kinds zeer moeilijk werd, ontstaan er meer uitzakkingen der baarmoeder, dan na verlossingen door middel der tang, na wier aanwending eerder uitzakkingen der scheede zich vertoonen; bij voorkeur zakt dan de voorste wand der scheede uit. — Het behoeft nauwelijks vermeld te worden, dat eene slechte behandeling bij de geboorte ook zeer natuurlijk tot uitzakking kan aanleiding geven. Uit dien hoofde is vooral het te vroegtijdige aanzetten der barenden, het verarbeiden der weeën, voor nog de baarmoedermond genoegzaam geopend is, vooral op een slecht vervaardigd verlossingsbed, of gebrekkig zamengestelden kraamstoel hiertoe te rekenen, en bijaldien inderdaad op sommige plaatsen scheede- en baarmoederuitzakkingen schier algemeen heerschen, dan is de soort en wijze, hoe de verlossing bestuurd werd, de voorname *causa endemica*, alhoewel daartoe ook leefwijze, klimaat en ligchaamsgesteldheid des lands, gelijk bij voorbeeld in

in vochtige, bedompte landen, zoo als in *Holland*, zeer medewerken (\*). Dat aanmerkelijke beledigingen van den bilnaad menigwerf door uitzakkingen vergezeld zijn, spreekt van zelf, doordien de scheede en de *Uterus* derzelver vereischte en gewone steunpunt ontberen.

§. 200.

Ook de wijze, hoe het vijfde tijdperk der verlossing bestuurd wordt, heeft eenen gewigtigen invloed; het veelvuldig trekken aan de navelstreng en menigerlei nuttelooze handgrepen tot dit doeleinde, kunstmatige afvoering des moederkoeks, vooral bij eene ongeregelde inplanting en eene gewelddadige aantrekking van denzelven, bij eene niet volledig verrigte, met geweld ondernomene afscheiding of sterk trekken aan de navelstreng bij beklemming van den moederkoek door algemeen, of gedeeltelijk krampachtige zamensnoeringen des *Uterus*, het vaste binden van den onderbuik in het kraambed kan ligtelijk dezelfde gevolgen hebben, en even zoo goed eene uitzakking, als eene binnenbuitenwaartskeering des *Uterus* verwekken. Worden bloedingen door drukking op de baarmoeder en de oplegging van zware lichamen gestild, dan wordt de *Uterus* ligt daardoor naar beneden gedrongen en

(\*) Dit geldt echter niet van *Nederland* in het geheel, ofschoon het niet te ontkennen is, dat in de lagere gedeelten onzes vaderlands dergelijke ziekten *endemisch* zijn.

DE VERT.



en eene uitzakking te weeg gebragt. Kraamvrouwen, die zeer aan verstopping onderhevig zijn, en uit dien hoofde genoodzaakt zijn, bij de ontlasting sterk naar beneden te persen, verkrijgen even zoo zeer eene uitzakking als dezulken, welke door overvloedige, inzonderheid met persingen op den endeldarm vereenigde, *Diarrhoeën* gekweld worden. Gingen er bloedvloeiingen vooraf, was de kraamvloed bovenmatig, vooral wanneer de vrouw zelve niet zoogt, zoodat de *Uterus* uitgezetter blijft en niet tot volkomene rust geraakt, dan is het hoogst gevaarlijk, bijaldien de kraamvrouw te vroeg het bed verlaat, geen' genoegzamen tijd eene horizontale ligging in acht neemt, maar veel staat en rondwandelt. Zou tevens de drukking der ingewanden, in het bijzonder bij eene tegennatuurlijke uitzetting derzelve door lucht, op den bodem der baarmoeder tot de ontwikkeling eener uitzakking der baarmoeder niet kunnen medewerken? Het opheffen van zware lichamen brengt dikwerf plotseling eene uitzakking te weeg. Het te vroeg verrigten van den bijslaap is geenszins eene van de minst aanleidende oorzaken tot uitzakking, welke des te nadeeliger is, naardien door de plaatshebbende indrukken het spoedigste ziekelijke veranderingen des *Uterus* en der scheede, ten gevolge der prikkeling en ophooping van vochten, veroorzaakt worden. Bij een' sterken voorwaarts gerigten stand van de onderste engte des bekkens zagen wij meer uitzakking van den achtersten, bij eene achterwaartsche rigting veelvuldiger *Prolapsus* van den voorsten wand der scheede.

*Voorzegging.*

## §. 201.

Veel hoop mag men koesteren, om het gebrek volkomen weg te nemen, indien het pas zich ontwikkeld heeft, het gestel geen' aanleg tot de vermelde uitzakking bezit, de omstandigheden der kraamvrouw het veroorloven, dat zij een' geruimen tijd de grootste rust kan in acht nemen, en vroegtijdig genoeg eene doelmatige behandeling in het werk wordt gesteld. Hoe schieplicher na derzelver ontwikkeling hulp wordt ingeroepen, des te gelukkiger zal men in deze op den duur slagen; verouderde uitzakkingen zijn, niettegenstaande alle andere gunstige betrekkingen, zelden geheel te genezen, al gelukt het ook, dezelve eenigermate te verhelpen.

## §. 202.

Bovendien lette men bij de voorzegging naauwkeurig: 1) op den graad des gebreks. Hoe minder laag de *Uterus* of de scheede afgezakt is, des te spoediger gelukt de genezing, doch ook dikwerf slaagt men niet eens, in de volkomene genezing eener eenvoudige zakking, doordien deze toestand meestal door de vrouwen verwaarloosd wordt, en zij, als het reeds te laat is, hulp inroepen, of ook de voorgeschrevene middelen niet stipt of lang genoeg gebruiken. Er bestaat schier geen andere verplaatsing, welke zoo moeilijk te herstellen is, als juist de uitzakkingen, en onder deze zijn de uitzakkingen der scheede wel de meest ongenees-



lijkste , zoodra zij op eenigerhande plaats slechts een' tijd lang bestaan hebben. Men dient derhalve ook de aandacht te vestigen 2) op de during. Versche en plotseling ontstane uitzakkingen worden veeleer en ligter genezen, dan verouderde en de zoodanige, die zich langzamerhand ontwikkeld hebben. 3) De vergezellende toevallen zijn meestentijds van dien aard, dat zij gelijktijdig met de uitzakking kunnen verholpen worden, en buitendien is, bij eene door aanmerkelijke ontsteking en beklemming te weeg gebragte versterving en de ontsteking zelve, geen gevaar voor het leven te duchten, of men moest veelligt nog den *Scirrhus* der baarmoeder, welke na een' lang verwaarloosden *Prolapsus*, bij voorbeschiktheid tot denzelven, zich ontwikkelen kan, hiertoe willen mederekenen. Hoe plotselinger en schielijker de uitzakking tot stand kwam, des te heviger zijn de toevallen van bloeding, krampen, braking en dergelijken, en verminderen in dezelfde verhouding, hoe langer zij duurt. Bestaat er 4) mogelijkheid om de oorzaken te verwijderen, dan wordt ook daardoor de voorzegging zoo veel te gunstiger, dan in het tegenovergestelde geval, en diensvolgens verlieze men bij de *Prognosis* nimmer 5) de levensbetrekkingen uit het oog. Veroorloven deze der kranke een' geruimen tijd rust en inachtneming, kan zij allen zwaren en inspannenden arbeid vermijden, vooral ook trappen klimmen, het dragen van zware lasten enz., alsdan kan men eerder een' gunstigen uitgang voorspellen, dan dat zij in een' tegenovergestelden toestand verkeert. Doch ook 6) de levenskracht van het door de ziekte

aangetaste werktuig komt bij de beoordeeling van haren uitgang zeer in aanmerking. Vrouwen, die lang te voren aan witten vloed leden, wier deelen allen meer verslapt zijn, en wier geheele gestel het beeld van prikkelbare zwakte draagt, worden zeldzaam volkomen genezen, wijl de meer door inwendige oorzaken te weeg gebragte verplaatfing slechts een' geringen, uitwendigen invloed ter harer ontwikkeling behoeft. — De uitzakking der fcheede is gewoonlijk nog moeilijker te genezen, dan die der baarmoeder, uit hoofde men niet altijd een passend en steunend werktuig uitvinden en aanwenden kan, reden waarom diegene, welke met eene bij de verlossing ontstane, aanmerkelijke scheur van den bilnaad vergezeld gaat, meestentijds ongeneeslijk is; inzonderheid als zij zich tot den achtersten wand der fcheede bepaalt.

### *Geneeswijze.*

#### §. 203.

Alhoewel bij de uitgezakte, zwangere baarmoeder de herstelling niet immer kan geschieden, is het toch ook in het kraambed menigmaal niet terstond raadzaam, eene volkomene uitzakking te herstellen, tenzij de haar vergezellende toevallen het leven der kraamvrouw mogten bedreigen, en op geen andere manier te verhelpen zijn. Niet zelden werken, inzonderheid door groote handen ondernomene pogingen ter herstelling, oneindig meer ten na-, dan ten voordeele, gesteld dat de terugvoering geoorloofd ware.



## §. 204.

Over het geheel vestige men de aandacht bij de behandeling op het volgende: 1) men trachte naauwkeurig op te sporen, of er, en in hoe verre een algemeen lijden, eene inwendige oorzaak tot de afwijking aanleiding gaf; zonder de wegneming van deze, kan men niet het geringste van de werktuigelijke herstelling verwachten; doch men zij hier omzigtig, opdat men oorzaak en uitwerksel niet verwarre. 2) Men vermijde alle pogingen tot terugbrenging des uitgezakten deels, zoo lang het orgaan aanmerkelijk gezwollen, geprikkeld en ontstoken is, en late alle handgrepen varen, zoodra zij vruchteloos geschieden, doordien deze prikkeling op zulk een teeder, en tot werktuigelijke gebreken bij uitstek geneigd, deel, oneindig gevaarlijker is, en in het kraambed dubbel gevaarlijk kan worden. Ook hier lette men bij de onderscheiding, of de tegenwoordig ziekelijke verschijnselen de gevolgen der uitzakking of der ontstekking zijn, en ga tegen deze laatste krachtadig en stoutmoedig, volgens de in het zevende Hoofdstuk opgegevene voorschriften, te werk. Algemeene aderlatingen zijn hier inzonderheid aan te wenden; bij eene aanmerkelijke zwelling, hoog roode kleur, hevige pijn, en aanhoudende, hevige koorts kunnen ook inkervingen van het scheidgedeelte, vooral dan, hoogst heilzaam zijn, bijaldien de kraamvloed onderdrukt werd. In eenige gevallen zagen wij de heerlijkste uitwerkselen van bloedzuigers. Buitendien zullen strovingen van een aftreksel van verzachtende kruiden, des lijnzaads,

zaads, bilsenkruids en fcheerling voortreffelijke diensten doen. 3) Men blijve niet in gebreken steeds voor zachte ontlasting der drekstoffen en der *Urin* te zorgen. Een langdurige stilstand dezer beide afscheidingen maakt den toestand erger, en veroorzaakt dikwerf op nieuws uitzakking, nadat men in de herstelling reeds geslaagd was. Tot dit doeleinde diene men inwendig vette oliën toe, als *Oleum Olivarum*, — *Papaveris albi*, *Amygdalarum dulcium*, *Ricini*, terwijl de eerste in alle geval vermengd met eene halve of geheele druppel der *Oleum Crotonis*, inzonderheid als men geen of slechte *Oleum Ricini* verkrijgen kan, ons met kamillenthee ingegeven, altijd de beste diensten verschaft; of men vermenege deze in den vorm eener *Emulsio spuria* met middelzouten, de *Sulphas Sodae* en *Potassae*, *Tartris Sodae*, *Potassae* of *boraxatus*; en vergete niet, gelijktijdig klisteren uit verzachtende vloeistoffen, die evenwel niet mogen prikkelen, met eene buitengewoon lange, veêrkrachtige lavementpijp behoedzaam te laten zetten, welke met meer nut, meerdere zekerheid en minder pijn kan binnengebragt worden. De ontlasting der *Urin* trachte men door warme omslagen over de schaamtestreek te bevorderen, eene ruggelingsche plaatfing met hooge billen, en des noods door het inbrengen des katheters. Ook hier verdient een veêrkrachtige de voorkeur, en men ontlaste, zoodra het vereischt wordt, de binnen de blaas begrepene *Urin*, ten minste twee malen daags. 4) Door inspuitingen, indien de uitzakking onvolkomen is, en door afwasching des uitgezakten deels met eene in laauwe



vloeistoffen natgemaakte, zachte spons, zuivere mer de deelen, zoo dikwerf mogelijk, om de zoo lastige ontvellingen voor te komen, en bestaan deze reeds, dan zal het gebruik van warm gemaakt en met melk vermengd kalk- of loodwater, hetwelk men met fijne linnen lappen er laat opleggen, zich vooral zeer heilzaam betoonen.

§. 205.

5) Men legge de lijdere in eene horizontale rigting op den rug, of op de eene of de andere zijde, met het bekken eenigzins hoog, voor de grootste rust zorg dragende. *Urin* en drekstoffen worden op een zoogenaamd ondersteekfel zonder verandering dezer ligging ontlast, en uitdrukkelijk en streng, de minste poging om zich overeind te geven, verboden. Menigmaal worden bereids hierdoor, bloot onvolkomene uitzakkingen bij anderszins gunstige omstandigheden, verholpen en wel bij geen orgaan des menschelijken ligchaams, het oog misschien uitgezonderd, zal van de werktuigelijke hulpmiddelen de zachtste immer meer te pas komen, dan bij den *Uterus*.

6) De herstelling kan, naarmate der onderscheidene omstandigheden, of dadelijk, of eerst later, nadat ten minste de bloederige *Lochiën* voorbij en de hevige toevallen bedaard zijn, ondernomen worden. Ontstond de uitzakking onmiddellijk na de geboorte of door het te vroeg verlaten des beds, eene struikeling, lichamelijke inspanning, het tillen van een' zwaren last en dergelijken, en wordt de Arts terstond geroepen, alsdan is het beter de her-  
stel-

stelling dadelijk te ondernemen, voordat er zich nog ontstekingsgevallen geopenbaard hebben. Men moet dezelve aanstonds verrigten, wanneer, ten gevolge der uitzakking, een hevige, levensgevaarlijke bloedvliet, of zeer aanmerkelijke, niet te bedarene, flauwten en stuipen zich opdoen. Kwam echter de uitzakking langzamerhand tot stand, ontmoet men reeds ontsteking, en de baarmoeder gevoelig, moeilijk beweegbaar, dan wachte men tot de *Lochiën* niet meer bloederig zijn, of tot deze toestand door geschikte middelen beteugeld of bedaard is. Zelfs dan, als er reeds ontsteking voorhanden is en men bemerken kan, dat deze door de uitzakking zelve gaande gehouden en vermeerderd werd, late men voor de terugbrenging eene ruime aderlating doen; bestond er reeds aaneengroeiing, dan bediene men zich van bloedzuigers op den onderbuik en de kruis-streek, terwijl men inwendig het zoete kwik in geringe, doch herhaalde giften toedient, alvorens men tot de kunstbewerking overgaat. 7) Men late zich niet verleiden, om vroegtijdig *adstringerende* middelen te gebruiken, en wende dezelve niet aan, zoo lang er nog eenig spoor van ontsteking en kraamvloed overig is. 8) Ook de middelen ter ondersteuning van het ingebragte deel, mag men niet vroeger, dan nadat de regelmatige afscheiding van den *Uterus* in het kraambed opgehouden heeft, en na bedaring der ontsteking, aanwenden.

#### §. 206.

De bijkomende gevallen (*Symptomata concomitantia*) verdienen insgelijks eene bijzondere oplet-

T 5

tend-



tendheid. Bloedingen worden gemeenlijk niet eerder gestild, dan na de herstelling, en zij, vooral in een' hevigen graad, zijn het bijzonder, welke eene schiekelijke terugbrenging gebieden, en de ondersteuning der baarmoeder, door middel eener in de scheede gebragte spons vorderen, zoodra de *Uterus* met een' hevigen bloedvliet op nieuws afzakt. De aanwending der spons, sluit het voordeel in zich, dat te gelijk met haar de te pas komende bloedstillende middelen kunnen aangebragt worden. Bovendien zal men hier ter beteugeling deszelfs van de zuren moeten gebruik maken, dewijl men kaneel en dergelijke verhittende middelen om der gevolgenwille niet durft toedienen. Zij vertoonen zich hoofdzakelijk ook alleen in die gevallen, waar de uitzakking terstond na de verlossing, of eensklaps zich ontwikkelde, in welk geval over het algemeen reeds de herstelling onverwijld en vaardig moet beproefd worden. Is het een *Prolapsus completus*, dan komen niet zelden in zeer dringende gevallen omslagen van koud water of sneeuw te pas. Flauwten bedwingt men het best door riekmiddelen, en slechts in eenen hoogen graad zal men inwendig opbeurende en vlug opwekkende middelen behoeven in het werk te stellen. Toevallen van een' krampachtigen aard bestrijde men immer met de allermachtigste en minst verhittende middelen, bij voorbeeld met eene *Saturatio Carbonatis Potassae cum Succo Citri*, met *Aqua Valerianae minoris* en *Extractum Hyoscyami* of *Aqua Amygdalarum amararum cohobata*, en vermijde het heulfap wegens deszelfs verhittende en verstoppende eigenschappen.

Voor

Voor het overige bedaren zelfs de hevigste toeval-  
len, indien zij alleen de gevolgen der uitzakking  
zijn, en de lijdende zich stil houdt, meestal van zelve.

§. 207.

Indien er na ontfieking der baarmoeder bij be-  
klemming niet dadelijk hulp gezocht wordt, dan  
gebeurt het zeer ligt, dat de uitgezakte *Uterus*  
tot verfterving overgaat. In dit geval handele men  
eveneens, als bij eene tot verfterving overgegangene  
ontfteking. Inwendig diene men verfterkende en  
vlug prikkelende middelen toe, kina, *Serpentaria*,  
*Arnica* enz. *Opium*, *Aether*, vlugge oliën; uitwendig  
zijn van dienst de *Mirrhe* in poeder en Tinktuur,  
het kolenpoeder, AUTENRIETH's *Unguentum Quer-*  
*cinum* (het door de indruppeling van *Acetis Plumbi*  
in een *Decoctum Corticis Quercus* (3 ij. tot 8 ij water)  
verkegene nederploffel), warme specerijachtige om-  
flagen, een afkookfel der kina en het *Acidum*  
*pyrolignosum*. Wijders make men spoedig inkervin-  
gen, die hier om bijzondere redenen niet te duchten  
zijn, vooral omdat wij gelukkige proefnemingen,  
bij voorbeeld van BOUILLET, voor ons hebben. Ge-  
lukt het niet, daardoor het gebrek te beteugelen,  
en is het baarblijkelijk, dat het rotachtige bederf alleen  
een gevolg van het plaatselijke lijden — der drukking  
door de opzwellings — zij, dan behaagt het ons niet  
in die gevallen, met gevaar voor het leven, de affnij-  
ding van het verftorvene gedeelte te ondernemen,  
gelijk in vroegere tijden WIER, FORBRIT en AMALIN  
gedaan hebben. Deelt de bodem der baarmoeder  
niet in de verwoesting, dan zal er evenwel onder  
ce-



eene doelmatige behandeling nog genezing mogelijk zijn, terwijl de daardoor veroorzaakte onvruchtbaarheid zich zeer goed met de gelukte behoudenis des levens laat verdedigen; ja zelfs zal hier bezwaarlijk eene grondige reden voor de echtscheiding bestaan. — Het is voorzeker nog schrikkelijker, wanneer door lange during des gebreks, herhaalde aanvallen eener ligte ontsteking, bij geneigdheid tot eene der vreeslijkste ziekten der teedere kunne een knoestgezwel zich ontwikkelt, hetwelk dan tot kanker overgaat. De behandeling doele hier slechts op verzachting, tenzij veelligt eene tijdige uitpelling des lijdenden deels nog redding zou kunnen te weeg brengen.

#### §. 208.

De manier van handelen bij de herstelling rigt zich naar den graad der uitzakking zelve. Afzakkingen en onvolkomene uitzakkingen zijn gemeenlijk niet moeilijk te herstellen, inzonderheid als zij nog niet lang bestaan hebben en gemakkelijk te bewegen zijn; men wachte nogtans met de herplaatsing, zoo lang de *Uterus* bij de betasting nog pijnlijk is. De lijderes late men op den rug, met de billen in de hoogte leggen, nadat alvorens de pisblaas en de endeldarm, de laatste door een verzachtend lavement, ontledigd zijn. De Operateur staat ter zijde en ligt bij eene bloote afzakking den *Uterus* in de rigting van de as des bekkens in de hoogte, waartoe meestentijds twee vingers voldoende zijn. Is de baarmoeder nu tot den doortogt, hare natuurlijke plaats, gebragt, dan gaat men met de vingeren terug, en laat nu dezelfde ligging, bij de meeste rust,

rust, gedurende eenige dagen houden, terwijl men daags eenige malen van een min of meer zamentrekkend afkookfel inspuit, of men laat in die gevallen, waarin de aanwending eener spons als steunfel geoorloofd of noodig geacht wordt, de vingers zoo lang binnen de scheede, tot dezelve ingebracht is. — De onvolkomene uitzakking veroorzaakt soms eerder eenige hindernissen, inzonderheid als de noodwendig mede afgezakte scheede zeer verslapt, of bij groote prikkelbaarheid te veel werkvermogen bezit, en alzoo door hare eigendommelijke kracht het teruggebrachte altoos weder op nieuws benedenwaarts stuwet. Tegen het eerste gebrek moeten alvorens zamentrekkende omslagen en inspuitingen, bij het laatste geval eerst bloedzuigers in den omtrek, inwendig kleine giften van het *Extractum Hyoscyami*, der *Aqua Laurocerasi*, of in bijzondere gevallen des heulsaps, het beste in den vorm van *Pulyis Doveri*, in het werk gesteld worden, middelerwijl men tot plaatsmiddelen liever de *Infusa* van het *Conium*, der *Hyoscyamus*, der *Folia Laurocerasi*, of het laauwwarme loodwater van GOULARD met bijvoeging eener geringe hoeveelheid *Tinctura Opii Simplex* verkiest. Na de, hier volstrekt vereischt wordende, ontlediging des endeldarms en der pisblaas, en in de te voren opgegevene ligging legt men den duim, wijs- en middenvinger eener hand, nadat deze, benevens het uitgezakte deel, met eene vette, zuivere olie bestreken is, onder tegen den *Uterus* en ter zijde van het scheedegedeelte, of verdeelt ook alle vijf vingeren der overigens kegelvormig gevouwene hand in deze streek, en schuift



nu den *Uterus* in de rigting van de bekkenas draaijenderwijze in de scheede en het bekken opwaarts. In deze gevallen verkeert men zeker altoos in de noodzakelijkheid, tenzij de uitzakking pas ontstond, om een werktuigelijk middel tot ondersteuning van den herplaatsten *Uterus*, mitsgaders zamentrekkende inspuitingen, in het werk te stellen.

### §. 209.

Eene volkomene uitzakking, die bij kraamvrouwen al zeer spoedig na de verlossing, of door het optillen van een' zwaren last, of eene schokking bij het te vroeg verlaten des beds kan ontstaan, vordert zoo ras mogelijk de herstelling, zoo men niet in gevaar wil komen, om de hoop op genezing gansch en al te moeten opgeven. Bovendien is dezelfde niet zelden door zulke hevige toevallen, als bloedingen, braking en krampen, vergezeld, dat het gevaar met ieder oogenblik van uitstel vermeerderd. De hinderpalen, om de herstelling te beproeven, worden hoe langer hoe onoverkomelijker, doordien de *Uterus* gemeenlijk terstond begint te zwellen, later in ontsteking overgaat, en elke poging, om hem in deszelfs natuurlijke ligging te brengen, vrijdelt. Is nogtans reeds zwellling of geneigdheid tot ontsteking voorhanden — gevallen, waarin de bloeding meestal heeft opgehouden — dan laat men, voordat men de bewerking onderneemt, eene algemeene, ruime aderlating doen, en den uitgezakten *Uterus* met verzachtende, pijnstillende stovingen omhullen. Daarenboven onderzoekt men voor de herstelling, of er niet met de binnen-buitenwaartsgekeer-

keerde scheede eenig gedeelte eenes darms mede afgezakt zij, wijl men dit dan tegelijk voorzigtig moet trachten terug te brengen. Vooraf worden de deelen met warme olie bestreken, de lijderes op den rug met de billen eenigzins hooger gelegd, (waartoe mijn ontworpen verlossingskussen zeer geschikt is) en het in blaas en endeldarm bevatte ontlast. De Operateur gaat dan met beide handen op zijde van den *Uterus* opwaarts, en schuift nu, ter regterzijde der lijderesfe staande, de handpalmsvlakte tegen het uitgezakte gedeelte geplaatst, allereerst het bovenste gedeelte der scheede omzigtig en langzaam in de holte des bekken, ondersteunt voorts den *Uterus* met ééne hand, middelerwijl hij met de andere het scheidewelf naar boven schuift, neemt de baarmoeder tuschen de vijf vingers, zoodanig, dat het scheidegedeelte in het vlakke der hand komt te liggen, en voert dezelve langzamerhand, draaijenderwijze in de rigting van de as des bekken naar boven tot aan den doortogt. Is men zoo ver gevorderd, dan laat men de hand eenigen tijd in de scheede, opdat de deelen niet dadelijk weder naar onderen worden gedreven, waarom men ook, ten einde de werking en kracht der buikspieren, die somtijds onwillekeurig in beweging komen, te beteugelen, de beenen matig in de knieën buigen en tegen het ligchaam optrekken laat. Wijders dient men nog, alvorens men de hand uit de teeldeelen neemt, eenige inspuitingen van zacht zamentrekkende middelen te laten doen, bij voorbeeld van een *Decoctum Herbae Salviae, Florum Rosarum rubrarum*, azijn, loodwater, het laatste zelfs met



met iets geestrijks vermengd. In deze gevallen zal men ook immer verplicht zijn, om den *Uterus* werktuigelijk in deszelfs ligging te ondersteunen.

§. 210.

Is de herplaatfing nu verrigt, dan moet ons doel zijn 1) den *Uterus* in de zoo even gebragte, regelmatige ligging te bepalen, en 2) de oorzaken weg te nemen, welke andermaal eene verplaatfing konden verwekken. Het eerste doel kan men alleen bereiken, door op eene werktuigelijke wijze de baarmoeder zoo lang een rustpunt te verleenen, tot zij en de in dit opzigt haar toebehoorende deelen de noodige veêrkracht terug hebben verkregen, en diensvolgens dient men dadelijk zulke middelen aan te wenden, welke de oorzaken opruimen en de deelen versterken. Vooraf evenwel moeten wij bij herhaling herinneren, dat de strengste rust, en eene langdurig inachtgenomene ligging, zoo niet op den rug, ten minste op de zijde doorgaans volstrekte vereischten zijn, wil men volkomen in de genezing flagen. — De algemeene behandeling kan en moet naar de bijzonderheid van elk geval zeer uiteen loopen, aangezien wij nu eens met ontsteking, dan weder met de hoogste zwakte te doen hebben. Zoodra het tijdperk der ontstekingachtige aandoening verstreken is, zullen wij inwendig bijzonderlijk die middelen moeten toedienen, welke de opstopping van drekstoffen verhoeden en wegnemen, derhalve *Emulsiën* uit oliën met middelzouten, het *Sal mirabile Glauberi*, *Sal seignette*, *Tartarus tartarisatus* en dergelijken meer, oplosfingen van  
zacht

zacht bittere en de ontlasting bevorderende extracten, of men moet volstrekt alles vermijden, wat eenigzins te sterk op dezelve zou kunnen werken, waarom *Jalappe*, *Aloes* en alle *Drastica* hiervan uitgesloten zijn, en te meer, omdat zij maar al te ligt tot ophooping in den *Uterus* aanleiding geven. Veel liever veroorlove men nog het herhaalde zetten van lavementen. Is de ontlasting geregeld, dan onderhoudt men dezelve het besté door een poeder, dat uit *Tartari depurati* ʒij—ʒß. *Magnesia carbonicae*, *S. ustae* ʒiß—ßvj. *Pulveris Rhadidis Rhei moscowitici* ʒi—ʒij, (*Sulphuris praecipitati* ʒi—ʒij.) *Sacchari albi* ʒß—ʒvj (*Radici Liquiritiae pulveratae* ʒij) bestaat, en waarvan men des morgens en avonds, naar omstandigheden ook wel drie malen daags, een' theelepel vol nemen laat. Wij ondervonden van dit eenvoudige middel in onze bijzondere praktijk, zoowel als in het Klinisch Instituut, in zulke gevallen, die meer van eenen slependen aard waren, en men voortdurend voor eene zachte en genoegzame buikopening zorg dragen moest, de beste diensten, en overmits het niet duur is, kan het bij armen ook voorgeschreven worden — eene bijzonderheid, die het mischien nog aanprijzenswaardiger maakt. Naderhand kan men, benevens dit laatste, ook andere middelen gebruiken laten, als de *Infusa* der *Radix Calami aromatici*, der *Herba Centaurei minoris*, van het *Trifolium aquaticum*, van het *Lignum Quassiae*, der *Radix Angelicae*, het *Decoctum Ratanhiae* en de onderscheidene bereidingen van den *Cortex peruvianus*. Op den onderbuik en de heiligbeens-



streek laat men versterkende zalven en smeersels inwrijven, ook wel den, reeds in het vierde Hoofdstuk opgegeven, kruidengordel dragen, hierbij echter tegen iedere eenigzins aanmerkelijke drukking op den buik zorgende. Aanvankelijk gebruikt men voor inspuitingen de afkookfels der salie, der roode rozenbladeren, later die van den wortel der *Bistorta*, *Tormentilla*, den granaat-, eiken- en kinabast met bijvoeging van rooden wijn (bij voorkeur *Pontak*); en eindelijk bij aanmerkelijke verslapping ook wel de oplosfingen van den aluin en andere mijnstoffelijke, zamentrekkende middelen.

#### §. 211.

Ter ondersteuning van het teruggebragte deel gebruik ik tegenwoordig uitsluitend eene cilindervormige uitgesneden spons, doordien eene menigte van gevallen mij van hare groote nuttigheid genoegzaam overtuigd heeft. De spons (*Spongia marina*), waarvan men een zoo zuiver mogelijk en gelijk stuk uitzoekt, wordt vooreerst van alle zand, kleine schelpjes en dergelijken meer zorgvuldig gezuiverd, voorts in koud regenwater geweekt, menigwerf in de schaduw gedroogd, tot zij volkomen zacht, medegevend en zonder eenige ruwheid is. Alsdan snijdt men er eenen regten, of stomp afgeronden *cilinder* af, dikker of dunner, naar gelang van de gesteldheid der scheede, en vier tot zes duimen lang. Deze wordt met een overtreksel van fijn, half versleten linnen of zijden stof omgeven, aan deszelfs benedeneinde wordt een klein gat, een weinig dieper dan de helft zijner lengte, geboord, en

en aan het overtrek van onder een bandje vastge-  
 maakt, opdat men hem weder uit de scheede zou  
 kunnen trekken. Bevorens men hem inbrengt,  
 wordt hij in eene der vermelde vloeistoffen gedoopt,  
 het omkleedsel met olie of vet bestreken, en in de  
 opening het afgeronde einde van eene acht tot  
 twaalf duimen lange, en twee tot drie lijnen dikke,  
 ronde balein gestoken. Thans laat men de lijdere  
 op haren rug gaan liggen, het bekken eenigzins  
 hooger, brengt den wijs- en middelsten vinger der  
 eene hand in de scheede, ligt den *Uterus* zoo ver  
 als hij teruggaat in de hoogte, en brengt nu behoed-  
 zaam en meer draaijende dan stootende, de aan de  
 balein vastgehechte spons binnen de scheede. Is zij nu  
 tot aan de baarmoeder genaderd, dan geeft men haar  
 door eenen druk met den vinger aan haar onderende  
 de rigting van de dwarse middellijn des bekkens,  
 terwijl men de balein met de andere hand tegelijk  
 wegneemt. Veelal legt men haar bij uitzakking  
 tusfchen het scheedegedeelte en de voorste, holle  
 vlakte des heiligbeens, vermits door de aanhoudende  
 ligging op den rug ligtelijk eene *Retroversio* ont-  
 staan kan; helt de bodem echter meer naar voren,  
 dan legt men haar tusfchen het scheedegedeelte en  
 het schaambeen. De spons laat men in dier voege twaalf  
 uren liggen, dan wordt zij voorzigtig, aan het  
 bandje trekkende, weggenomen, met eene andere  
 verwisseld, nadat men eenige malen ingespoten  
 heeft, en om de zuiverheid, in rivier- of regen-  
 water gelegd, uitgewasfchen en voorzigtig, lang-  
 zaam gedroogd, uit hoofde zij bij eene fchielijke  
 drooging hard en vast wordt. De spons laat men



vervolgens voorzigtigheidshalve nog een' geruimen tijd aanwenden.

§. 212.

De voordeelen, welke de spons boven ieder ander moedersteunfel heeft, zijn: zij oefent geen nadeelige drukking op de nabijgelegene deelen uit; hare inbrenging is gemakkelijk en onpijnlijk; de zoo noodige zindelijkheid wordt daarbij niet over het hoofd gezien, en men kan aanhoudend zamentrekende middelen plaatselijk aanwenden. Hij, die de veelvuldige bezwaren in de keuze en aanwending van een ander *Pessarium* kent, en, even als ik, de treurige gevolgen zag, welke uit het gebruik van niet passende of te lang liggen geblevene moedersteunsfels ontspruiten, zal zekerlijk met mij overeenstemmen, die hun gebruik volstrekt afkeur. Mij gelukte het, zelfs verouderde en onherstelbaar gehoudene uitzakkingen te genezen, en nog nooit zag ik, bijaldien zij op goede gronden en de regte wijze aangewend werd, nadeelige gevolgen daaruit voortkomen, hebbende de vrouwen geene hinderenissen van dezelve, zoo als liet, na gebrekkig liggende, ondoelmatige *Pessaria*, zoo menigmaal het geval is, van welke, onder anderen, het genoeg zal zijn de terughouding der drekstoffen en de ophooping der *Urin* te noemen.

L I T T E R A T U U R.

M. J. LOSSIUS, *Dissertatio de Uteri prolapsu. Lips. 1766.*

C. W. FOERSTER, *Dissertatio de procidentia Uteri. Altdorf 1695.*

E. H. WEDEL, *Dissert. de procidentia Uteri. ib. 1695.*

A. O. GOELICKE, *Disput. exhibens novum artificium curandi procidentiam Uteri veram. Halae 1710.*

CHOPART, *Dissert. de Uteri prolapsu. Paris 1722.*

J. J. HAUSMANN, *Dissert. de Uteri procidentia. Vitenberg. 1770.*

J. A. KULMUS, *de Uteri delapsu, suppressionis urinae et subsequentis mortis causa. Gedani 1732; in HALLERI, disp. chir. Tom. III. N<sup>o</sup>. 88.*

J. C. STURM, *Dissert. de procidentia Uteri. Erf. 1744.*

C. F. OTTO, *Dissert. de procidentiis uterinis. Vitenb. 1764.*

*Ontleed- en Heelkundige Verhandeling over de Uitzakkingen en Uitwassen der Lijfmoeder en Scheede. Uitgegeven door een Gezelschap van Utrechtsche Heelmeesters. Utrecht 1767. N<sup>o</sup>. 174. 8<sup>o</sup>.*

*Ueber den Prolapsus Uteri; in LOFFLER'S vermischten Aufschriften. N<sup>o</sup>. 5.*

FÖHR, *Diss. de procidentia Uteri. Stuttg. 1793.*

BACHMANN, *Dissert. de prolapsu Uteri. Duisb. 1794.*

LEVRET, *im Journal de Médecine, Tom. XL. und der auserlesenen Abhandlungen für praktische Aertze, II, III. Bd. p. 51.*

RICHTER'S *Anfangsgründe der Wundarzneykunst, vii Bd.*

J. W. KLINGE, *Commentatio de procidentia Uteri etc. Goettingae 1789. c. II. Tab. aen. 8. Ins Deutsche übersetzt. Zweite Aufl. Hannover 1822. 8<sup>o</sup>.*

*Ueber den Vorfall der Gebärmutter; in CAMPER'S vermischten Schriften. N<sup>o</sup>. 2. f. und N<sup>o</sup>. 6. g en h.*

J. FR. OSIANDER, *de fluxu menstruo et Uteri prolapsu, Goetting. 1808. 4<sup>o</sup>.*

De Schrijver in het tweede Deel II<sup>e</sup> en III<sup>e</sup> Stuk van zijn *Handboek over de Ziekten van het Vrouwelijke Geslacht.*

Der VERFASSER, *in seinem Journale für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Frankfurt a. M. III. Bd. 1e. St. S. 40.*



*Desselben Lehrbuch der praktischen Entbindungskunde.*  
3te Auflage. §. 636—688.

FR. L. MEISSNER, *der Vorfall der Gebärmutter und der Mutterscheide u. s. w., oder dessen Dislocationen der Gebärmutter und der Mutterscheide. I. Theil. Leipzig 1821.*

*Meerdere Leer- en Handboeken voor de Heel- en Verloskunde, en Ziekten des Vrouwelijken Geslachts.*

B. *Van de achterwaartskanteling der baarmoeder in het kraambed.*

§. 213.

Eens had men een' tijd, waarin de Verloskundigen de achterwaartskanteling der baarmoeder (*Retroversio Uteri*) buiten de zwangerschap in twijfel trokken; wij echter kunnen, overtuigd door de menigvuldige van ons daaromtrent gedane waarnemingen en de ondervinding in onze praktische loopbaan, met waarheid verzekeren, dat zij meer buiten de zwangerschap zich vertoont, en door de verlosfing en in het kraambed verre weg meer de grond tot haar ontstaan gelegd wordt. Vrouwen, welke tijdens hetzelfde daarmede behebt zijn, vermoeden zoo min als de Geneeskundigen dit gebrek, dat men slechts door een oplettend, verloskundig onderzoek kan onderkennen.

§. 214.

De achterwaartskanteling der baarmoeder kan reeds zeer vroeg in het kraambed, in de eerste maand, en zeker in een' onvolkomenen, doch zeldzamer in een'

een' volkomen graad zich ontwikkelen, namelijk zoodanig, dat het onderende van de middelpuntsas des *Uterus*, bijgevolg de baarmoedermond boven-, en het boveneinde — de bodem deszelven — benedenwaarts gekeerd is. Menigmaal gaat de terugbuiging tevens met onvolkomene ombuiging (*Pro-natio*) der baarmoeder te zamen; terwijl niet zelden eene uitzakking der scheidde, ten minste van haren achtersten wand, daar bij komt.

### *Diagnosis.*

#### §. 215.

Het bestaan eener achterwaartskanteling der baarmoeder in het kraambed, hetzelfde of de vrouw vóór korten of langeren tijd gebaard heeft, is zonder verloskundig onderzoek veelal volstrekt niet, of hoogst moeilijk te bepalen, en in geen geval komt het praktische onderzoek meer te pas, dan bij deze gebrekkige ligging des *Uterus* in het kraambed. In de eerste weken inzonderheid toch ontbreken die toevallen dikwerf of meerendeels geheel, die ons bij eene zwangere op het vermoeden van dit gebrek brengen; als daar zijn moeilijke en belette pislozing, onderdrukte stoelgang: aanhoudende pijnen in de heiligbeensstreek en baarmoederlijke bloedvloeijingen zijn de eenige verschijnselen, welke haar aanzijn waarschijnlijk maken, en dit krijgt des te meer zekerheid, hoe nader de kraamvrouw nog bij het tijdstip der voorafgegane verlossing zich bevindt. Evenwel neemt men de bloedvloeijing niet als een ziekte kenmerkend (*pathog-*



*nomonisch*) en bestendig toeval waar, in het bijzonder bij de later en allengs zich ontwikkelende achterwaartskanteling; ondertusfchen kunnen er ook pijnen in de heiligbeensstreek, in het geheele bekken en de nabijheid des endeldarms, vooral wanneer de bodem der baarmoeder zich naar dien kant gewend heeft, onderdrukte stoelgang, ook hindernissen in de pislozing, als pijnlijke en belette ontlasting derzelve voorhanden zijn, welke laatste, inzonderheid bij eene ziekelijk verhoogde gevoeligheid, bloot het uitwerksel eener kramp kan zijn, waarbij zich bij ziekelijke voorbeschiktheid *hysterische* aandoeningen voegen. Den buik treft men niet altoos uitgezet aan, gelijk zich dit verschijnsel in de zwangerschap ten gevolge der pisopstopping meestentijds vertoont, ten minste bij eenen gewigtigen baarmoederlijken bloedvliet, alleen in gevallen van gestoorde kraamzuivering, eener door doelstrijdige middelen onderdrukte bloedvloeijing, of eener werkelijke stoornis in de afscheiding der *Urin*, hetzij deze zich als moeilijke of belette pislozing openbare, ziet men, dat de buik meer of min opgezet en gevoelig is.

#### §. 216.

Alleen het omzigtig in het werk gestelde, verloskundige onderzoek, gelijk bereids §. 215 opgemerkt werd, is het, dat ons tot eene juiste onderscheiding brengt, kunnende daardoor de, §. 215 vermelde, uitwendige verschijnselen tot zekere teekenen gebragt worden. Bij het invoeren des vingers in de scheede ontdekt men het scheedegedeelte des *Uterus* meestal bezijden de inwendige vlakke der schaam-

fchaambeensvereeniging, tegen het eene of andere, het meest tegen het linker eironde gat; de bodem der baarmoeder ligt tegen de eene of andere heiligdarmbeensvereeniging, en, bestaat er tevens om- buiging, zeker nog dieper in de eene of andere zitbeensuitsnijding, zeldzaam ftaat hij juist onder het voorgebergte, hetgeen wel te begriipen is, ter- wijl hij dan eerst van de *Synchondrosis sacroiliaca* tegen het heiligbeen verder naar beneden wordt gedreven. De baarmoeder zelve is meestal buiten- gewoon opgezwollen, meer buikachtig op het gevoel, meer of min pijnlijk, of ten minfte gevoelig bij het aanraken; zoo doet zij zich bij het onderzoek door den endeldarm, dat men niet vergeten mag, ook voor, naardien de meerdere omvang, de toeneming in zwaarte en masfa van den achterften wand des *Uterus* af begint, en in den bodem en het ligchaam deszelven het aanmerkelfkfte is; edoch, om alle dwaling te ontgaan, moet men niet vergeten, iets van de grootte en den omvang af te rekenen, vermits zich de bodem, gelijk alle hier voelbare deelen des *Uterus*, bij het onderzoek door den endeldarm, zelfs in een' gezonden ftaat zich grooter laten aan- voelen, hetgeen den onervarene ligt tot iets ziekelijks kan doen befluiten. Voor het overige doen bij deze manier van onderzoeken, behalve zekere *dynamifche* veranderingen, ontfteking, hardheid, verhoogde gevoeligheid, pijn, beklemming, aaneen- groeiing, zich aan het zintuig des gevoels veel zekerder en duidelijker voor, dan bij het onderzoek door de fcheede; door deze echter kunnen wij veel naauwkeuriger den ftaad en de *dynamifche* veran-



deringen van het scheidgedeelte met deszelfs mond opnemen. De plaats, waar het scheidgedeelte zich bevindt, had men, wel is waar, reeds aangeraakt; intusfchen verdient het opmerking, dat het fomtijds bij de volkomene achterwaartskanteling in het geheel niet gevoeld wordt, terwijl de bodem der baarmoeder zeer laag aan het heiligbeen zich voordoet; menigmaal is het even als een *Retort* gebogen, en staat bijkans in dezelfde rigting met den bodem des *Uterus*. De uit- en inwendige baarmoedermond zijn geopend, deszelfs lippen zijn dik, als een wrong opgezwollen, zeldzamer en fomtijds alleen bij eene daarmede gepaard gaande *Pronatio Uteri* en lange during des gebreks, gelijkewijze bij magere personen, is hij kleiner, dunner en meer gefloten, doch altijd geopend en rond. Gaat zij gepaard met ombuiging, of eene uitzakking der fcheede, dan ontdekt men ter gelijkertijd de verschijnselen, die deze verplaatsingen kenschetsen.

### §. 217.

Om zeker in de onderscheiding des gebreks te zijn, moet men tevens de in- en uitwendige oorzaken gadeflaan, welke de achterwaartskanteling konden verwekt hebben, en inzonderheid ook daarop, of de kraamvrouw niet reeds voor hare zwangerschap of tijdens dezelve er door gekweld werd, en zij in de eerste maanden der zwangerschap door de kunst, of door invloed der natuur zelve met het opklimmen des *Uterus* hersteld werd; want — mogten Geneeskundigen deze waarheid toch regt ter harte nemen — zeer dikwijls zijn braking en

an-

andere medelijdende verschijnselen der zwangeren in de eerste maanden de gevolgen der achterwaartskanteling, welke de natuur wegneemt, en de zwangere zelve somwijlen als door instinct door eene doelmatige, niet zelden door eene zekere ligging op den buik opheft. Daarenboven dient men te letten op het verloop en de behandeling der geboorte, op de plaats waar de moederkoek was ingeplant en de behandeling dezer gewigtige zaak, op de leefwijze en verpleging in het kraambed, op de gesteldheid der afscheiding van de drekstoffen en *Urin*, op de behandeling des buiks, inzonderheid op het sluiten, terwijl men ook de ligchamelijke gesteldheid, ganschen vorm van het bekken der kraamvrouw, de vroegere gesteldheid der maandenstonden, den kraamvloed, vroegere ziekelijke aandoeningen van het teelstelsel en der nabijgelegene deelen niet over het hoofd mag zien; intusschen staat het verloskundige onderzoek, ter verkrijging eener juiste kennis des gebreks, altoos op den voorgrond, en dit wordt des te zekerder, indien de achterwaartskanteling plotseling met eene bloedvloeiing en de haar vergezellende, kenschetsende verschijnselen bij eene kraamvrouw zich opdoet, welke het plaatselijk lijden der baarmoeder doen vermoeden.

### *Gevolgen en Uitgangen.*

#### §. 218.

De gevolgen eener in het kraambed ontwikkelde achterwaartskanteling openbaren zich of vroegtijdig en in de eerste weken des kraambeds na de beval-  
ling,



ling, of zij vertooncn zich allengs méér en méér tot tegen het einde van de zesde en meerdere weken, en kunnen zelfs jaren lang miskend worden. In het eerste geval zijn nabloedingen, overtollige, lang vloeiende, bloederige kraamzuiveringen de gevolgen, bijzonder als de achterwaartskanteling onmiddellijk na de bevalling ontstaan, en in deze haren grond gelegen was; of er openbaart zich, nadat de roode kraamzuivering reeds lang ophield, bij eenen plotseling uitwendig werkenden, nadeeligen invloed allerschielijkst en geheel onverwacht eene bloedvloeijing uit de teeldeelen, welke men aanvankelijk voor terugkomenden kraamvloed aanziet; zij neemt echter dagelijks toe, kenmerkt zich van tijd tot tijd als werkelijke bloedstorting, in vereeniging met al de gevolgen en verschijnselen, die bloedvloeiingen vergezellen; de kraamvrouw wordt met elken dag zwakker, hare voeding is uitermate gestoord, en zoogde zij, dan wordt het zog in hoedanigheid en hoeveelheid minder, de borsten worden aanhoudend flapper, minder gevuld, en eindelijk verdwijnt hetzelfde gansch en al. Deze bloedvloeijing is het, welke door de Geneeskundigen zeer ligt miskend wordt en doorgaans voor de gewoonlijk aangewezenen in- en uitwendige bloedstillende middelen niet wijkt, ja zelfs, al staat zij ook eenigen tijd, in een' sterkeren graad en somwijlen stroomswijze terugkeert. Kwam daarentegen de achterwaartskanteling in het kraambéd langzamerhand tot stand, dan bespeurt men later bloedingen uit de teeldeelen, die echter, overmits de *Uterus* zich bereids meer heeft zamengetrokken, niet zoo hevig zijn; of vloeijen de kraam-

kraamzuiveringen buitengewoon lang en overtollig, dan verdwijnen zij, wel is waar, doch naderhand komt er eene andere ziekelijke afscheiding uit de teeldeelen in hare plaats, vooral bij eene alvorens plaats gehad hebbende ziekelijke verandering des *Uterus*, de zogaffcheiding wordt daardoor insgelijks minder, en het zog zelf, in deszelfs hoedanigheid, verandert. Wordt het kind gespeend en verschijnen de maandstonden weder, dan zijn deze met pijnen in de schaam- en heiligbeensstreek verbonden, de lijderes wordt eene hevige drukking en eene zwaarte diep in het bekken gewaar, de maandstonden komen in eene te groote hoeveelheid en te dikwijls terug, houden niet meer hunne gewone tijdorde, of de hoeveelheid des bloeds vermindert; in dien tusschentijd vertoont er zich eene gele, somtijds met bloedstrepen vermengde uitvloeijing, de lijderes lijdt veel aan hardlijvigheid, volbloedigheid (*Plethora*) in den onderbuik, opgezetheid van de lever, ophooping van bloed in deze en in het poortaderstelsel, pijn in de speenadergezwollen, welke door Artsen, die zelve het onderzoek niet verrigten, grovelijk miskend, voor de naaste oorzaak der ziekelijke verschijnselen kan gehouden worden, en wel vermindert, doch nooit volkomen nalaat, aangezien zij alleen de gevolgen der achterwaartskanteling is. — Daarenboven verdient het opmerking, dat ten gevolge eener schielijk ontwikkelde *Retroversio* in het kraambed, somwijlen ook flauwten, krampen en stuipen ontstaan, even als dezelve zich onverwacht in de zwangerschap, of ook buiten dezelve kunnen opdoen; deze verschijnselen laten zich



zich ten aanzien van derzelver oorsprong, niet wel uit een aanmerkelijk bloedverlies verklaren, hetgeen in deze gevallen zelfs ontbreken kan, maar zij zijn eer de gevolgen eener ziekelijk verhoogde gevoeligheid van den *Uterus* zelven en der terugwerking op het ganfche zenuwftelfel; ook zij kunnen daarom zeer ligt miskend worden, nemen fomwijlen, na de roediening van de meest aangewezene zenuwbedarende geneesmiddelen, weinig of in het geheel niets af, of laten eindelijk na, keeren nogtans van tijd tot tijd weder terug met elke toeneming der achterwaartskanteling, en verkrijgen eindelijk het karakter van *hysterifche* aanvallen en *Hysterie*, waarvoor de Arts de ziekte verklaart, jaren lang behandelt, evenwel niet geneest, wijl hare in de *Retroversio* gelegene oorzaak niet erkend en het, tot hare juiste onderscheiding volftrekt vereifchte, onderzoek verwaarloosd werd.

#### §. 219.

De uitgang der in het kraambed ontftane achterwaartskanteling is dus onderscheiden. Wordt de reeds vroeg in het kraambed ontwikkelde *Retroversio* terftond erkend, en is de *Uterus* bewegelijk, niet beklemd en geene verandering in de zelfftandigheid — weeffel of andere ziekelijke verfchijnselen voorhanden, dan kan het gebrek met deszelfs gevolgen zeer fchielijk weggenomen worden, en zoodra de *Uterus* door eene doelmatige hulp in deszelfs natuurlijke ligging teruggebracht is, houdt de bloedvliet fomwijlen in eens, of langzamerhand op; de krachten der lijderesse komen weder, de koorts-  
ach-

achtige bewegingen houden op, de zogaffcheiding wordt, terwijl de borsten meer en meer opzetten, ten aanzien van hare hoeveelheid en hoedanigheid eindelijk weder beter, en de lijderes herkrijgt weldra hare vorige gezondheid. Wordt daarentegen de achterwaartskanteling miskend, de bloedvloeijing, zonder alvorens plaats gegrepene herplaatfing met nuttelooze en vooral zeer prikkelende en verhittende bloedstillende, en zeer zamen-trekkende middelen behandeld, dan kan eene *Metritis* met al hare gevolgen en uitgangen zich daarnevens voegen, of de bloedvliet ftaat niet geheel ftil, verzwakt de lijdende hoe langs hoe meer, ftervende zij ten gevolge van bloed- en krachtverlies onder flauwten, krampen en ftuipen. De gevolgen eener langzaam ontftane achterwaartskanteling zijn belette bevruchting of geheele onvruchtbaarheid, vergroei-jing van den omgebogenen bodem met de plooijen van DOUGLAS, pijnlijke, te weinige of te overtollige maandftonden, aanbeijen, opzwellling en verharding des *Uterus*, vliesachtige, *scirrheufe*, fpekachtige ontaardingen van deszelfs weeffel enz. Het plotfe-ling overgaan in eene juist omgekeerde ligging, welk geval W. SCHMITT (\*) buiten de zwangerfchap en het kraambed bij eene dame is voorgeko-men, heb ik nooit bij eene kraamvrouw, wel echter reeds tijdens de zwangerschap en buiten dezelve waargenomen.

Oor-

(\*) DESSELFS *Opmerkingen en Waarnemingen van de Achterwaartsbuiging der Baarmoeder*, bl. 72.



## Oorzaken.

## §. 220.

De achterwaartskanteling der baarmoeder in het kraambed kan reeds in en buiten de zwangerschap uit eene zekere voorbeschiktheid haren oorsprong ontleenen, welke in den vorm des bekken en niet zelden in de oorspronkelijke ligging der baarmoeder ligt. Bekken, die in de bovenste engte meer eene cirkelvormige gedaante hebben, en welker bovenste gedeelte des heiligbeens bloot te vlak is, zonder dat het voorgebergte zelf te veel vooruitsteekt en alleen de uitgeholde vlakke onder hetzelfde schijnt voorwaarts te komen, bekken, welker voorgebergte te weinig hoogte heeft, doch meer uitsteekt en de zijdelingsche gedeelten des heiligbeens eenigermate teruggetrokken zijn, benevens eene oorspronkelijke ligging van den bodem der baarmoeder naar het heiligbeen, schijnen tot de ontwikkeling der *Retroversio* in het kraambed grootelijks bij te dragen, te meer daar men ze ook bij nooit bezwangerde vrouwen en meisjes met een ongeschonden maagdenvlies zag ontstaan. SCHREGER's belangrijke waarneming eener aangeborene *Retroversio Uteri* (\*), waarbij de laatste bij wijze van een *Retort* gebogen was, in het lijk van een 21 jarig, aan eene andere ziekte gestorven, en nog het maagden-

(\*) HORNS *Archiv f. m. Erfahrung*, 1817. März und April. S. 311. und W. SCHMITT, *über die Zurückbeugung der Gebärmutter*. S. 70, 71.

denvlies bezittend meisje, terwijl dit meisje noch met moeilijke waterlozing, noch met stoornissen in de maandelijksche zuiveringen gekweld werd, staat, gelijk SCHMITT zeer juist opmerkt, den invloed van den oorspronkelijken vorm op deze betrekkelijk gebrekkige ligging des *Uterus* zoo klaar, dat men met regt bij verklaring van zoo menig voorkomende helling zonder hindernissen en toevallen tot dezen invloed zou kunnen besluiten (\*). Bij eene dergelijke voorbeschiktheid tot achterwaartskanteling, gegrond op den oorspronkelijken vorm des bekkens, of eene ligging der baarmoeder zelve, welke reeds aan eene geringe achterwaartskanteling grenst, en nog eer, zoodra dezelve bereids in de eerste maanden der zwangerschap, of zonder dezelve aanwezig was, kan in het kraambed door den invloed van zekere aanleidende oorzaken, bij zulk eene verhouding der baarmoeder, als daar zijn: het tillen van eenen zwaren last, een mistred, het te vroeg verlaten des beds, val, stoot op den onderbuik of drukking op denzelfen, door een kussen met zand ter beteugeling eener bloedstorting, een zware, inzonderheid eene natte zak met kruiden ter bedaring der

(\*) Bij het door SCHREGER verhaalde geval kan ik de waarneming voegen van eene, hoezeer niet meer met het maagdenvlies versierde, trouwens toch ongehuwde persoon, die nooit zwanger geweest is; zij lijdt gelijktijdig aan eene volkomene uitzakking met volkomene achterwaartskanteling, zoodat de bodem beneden en de baarmoedermond bovenwaarts gekeerd is; de baarmoeder is zoo bewegelijk, dat zij zich heen en weder laat schuiven.



der naweeën, een strak aangelegde buiksband, of te vroeg verrigte bijslaap, de opstopping van *Urin* en drekstoffen, persing bij den stoelgang, drukking op den voorsten wand des *Uterus* bij het wrijven van denzelven ter matiging eenes bloedvliets, eene te schielijk voorvallende verlossing bij de inplanting der *Placenta* op den achtersten wand des *Uterus*, of ruwe pogingen aan de navelstreng, ten einde de afscheiding der nageboorte behulpzaam te zijn, bij een' krampachtigen toestand der baarmoeder, eene niet volkomen plaatsgegrepene afscheiding der *Placenta* of eene vastgroeiing der vliezen van het ei, eene volledige achterwaartskanteling der baarmoeder stand grijpen. Dat bovendien gezwollen aan den achtersten wand en in de nabijheid van den bodem des *Uterus*, verharding of zwellling van het eene of andere *Ovarium*, en de inplanting der *Placenta* zelve op den achtersten wand des *Uterus*, de bedoelde betrekkelijke ligging der baarmoeder ongemeen begunstigen, is ligt te bevatten.

### Voorzegging.

#### §. 221.

De *Prognosis* vloeit grootendeels reeds uit de §. 215 opgegevene gevolgen voort. Ontstond de *Retroversio* onmiddellijk na de verlossing, is de *Uterus* niet al te veel opgezwollen en deszelfs omvang ten aanzien van de ruimte des bekken niet te zeer vergroot, bestaat er overigens geene ziekte in deszelfs weeffel, of ligt de grond der achterwaartskanteling niet in eene vroeger vooraf-

gegane ziekelijke verandering van dit werktuig, — is hij niet buitengewoon gevoelig en pijnlijk, en met andere plaatselijke ongesteldheden, spanning, zwaarte en drukking in de diepte des bekken, en hoogst moeilijke of geheel belette pislozing en stoelgang vereenigd, — ontwaart men geen zekeren aanleg daartoe in den vorm van het bekken, en verkeert de lijderesse tevens in zulke omstandigheden, dat zij alle aanleidende oorzaken vermijden kan, dan zij de voorzegging hoogst gunstig; minder goed nogtans bij de vereeniging met ombuiging, en bij eene langzame in het kraambed ontwikkelde achterwaartskanteling met eene ziekelijke verandering, als zwelling, hardheid, ontsteking en pijnlijkheid dezes ingewands. Gevaarlijk is de achterwaartskanteling, bijaldien een ondermijnende bloedvliet en flauwten zich er bijvoegen, en soms kan zij doodelijk worden, indien zij krampen en stuipen in het kraambed te weeg brengt, vooral als zij miskend of te laat als oorzaak dezer hoogst gevaarlijke verschijnselen erkend werd. Was de achterwaartskanteling eerst in het kraambed ontstaan, en duurt zij voort, — veroorzaakt zij door prikkeling en drukking, ontsteking en aaneengroeijingen, — verplaatst zij te gelijk de eijerstokken, dan kunnen tevens na een wijle tijds opzwelling en verharding van het eene of andere dezer ingewanden de gevolgen zijn, hetgeen de genezing van dit gebrek onmogelijk maakt. — Twijfelachtig is de voorzegging, wanneer eenig vreemd deel, bij voorbeeld een polijp of een teruggebleven gedeelte van den, in den bodem ingeplant geweest zijnde, moederkoek de *Retroversio* ver-



oorzaakte, ten minste is de genezing, voordat men den *Uterus* van zijn inhoudende deelen ontdaan heeft, zeer te betwijfelen. Eene aaneengroeiing van den *Uterus* met de plooijen van DOUGLAS valt zeldzaam voor en is meestal ongeneeslijk.

### Geneeswijze.

#### §. 222.

De genezing berust op de herstelling van de natuurlijke ligging des *Uterus* en bedaring der toevallen, die gene, of verzwaren, of geheel onmogelijk maken, of zoo dit niet geschiedt, andermaal deze gebrekkige ligging en andere bedenkelijke gevolgen te weeg brengen.

#### §. 223.

Voordat men pogingen aanwende, om den *Uterus* in zijne natuurlijke ligging te brengen, dient men volstrekt op het volgende de aandacht te vestigen: 1) Men trachte uit te vorschen, welke uitwendige, schadelijke invloed tot de achterwaartskanteling des *Uterus* in het kraambed aanleiding gegeven, — welke gevolgen zij reeds na zich gesleept, of eene achterwaartskanteling alleen, of deze met ombuiging zich ontwikkeld hebbe, — waarhenen de bodem der baarmoeder gekeerd zij, hetzij onder het voorgebergte tegen het heiligbeen, of naar de eene of de andere heiligdarmbeensvereeniging, en welk eene rigting de baarmoedermond hebbe; 2) of de *Uterus* ook *dynamische* veranderingen ondergaan hebbe en anderzins ziekelijk op het gevoel zij; 3) of de

de achterwaartskanteling ook met het eene of andere ziekelijke toeval gepaard gaat, als daar zijn: bloedvloeijing, flauwten, moeilijke en belette pissing, stuipen enz., die het noodzakelijk maken, dat de regelmatige ligging zoo spoedig mogelijk hersteld worde; 4) of de *Retroversio* zich op eens of langzamerhand ontwikkeld hebbe; 5) welke middelen er wierden aangewend, voornamelijk ingeval van eenen aanmerkelijken bloedvliet.

### §. 224.

Heeft de *Retroversio* dadelijk na de verlossing, of vroegtijdig in het kraambed en zeer schielijk zich ontwikkeld, voornamelijk bij eene zekere voorbeschiktheid en plotselinge werking eener uitwendige oorzaak, — is er bloedvloeijing aanwezig, — zijn er flauwten en stuipen bijgekomen, en treft men den *Uterus* bewegelijk aan, dan drale men niet, om de herstelling der achterwaartskanteling onverwijld te bewerken. Bovenal late men de kraamvrouw op hare zijde in bed liggen, met het bekken hoog, en den romp eenigermate voorovergebogen naar beneden, eensdeels om de vrijwillige herplaatsing te beproeven, anderdeels als voorbereiding tot de kunstmatige herstelling te gebruiken. Zij toch werkt de pogingen van den *Uterus*, om zich met den bodem naar achteren te keeren, tegen, de sterke uitrekking en spanning der breede en ronde banden der baarmoeder wordt, volgens de juiste opmerking van W. SCHMITT, langzamerhand tot zulk eenen graad veranderd, dat hunne eigene zamentrekkingskracht zich weder als werkdadig vertoonen, het uittrekkende



geweld eindelijk meester worden en den bodem der baarmoeder trapswijze weder tot zijne regelmatige hoogte oprigten kan, terwijl deze ligging van het ligchaam tevens de hindernissen, door dit gebrek in het ligchaam verwekt, als de veelal aanwezige spanning in de heup- en schaambeensstreek, de lastige drukking op den endeldarm, en den moeilijken stoelgang en waterlozing vermindert, en de ontlasting van drekstoffen door de kunst gemakkelijker maakt. Welk eene ligging op de zijde, op de regter of de linker men moet laten houden, — welke in betrekking tot het ingewand en de omliggende deelen de doelmatigste zij, moet eigenlijk de stand van den bodem der baarmoeder beflissen; zoodra hij meer naar de regter heilig- en darmbeensvereeniging gekeerd is — volgens onze ondervinding het meest voorkomende geval — dan verdient de linkerzijdelingsche ligging de voorkeur en omgekeerd, bijaldien de bodem zich aan de linkerzijde bevindt. Zeldzaam staat hij juist onder het voorgebergte op het midden des heiligbeens; in dit geval zal de stand van den baarmoedermond, de meerdere ruimte in de eene zijde des bekkens, de neiging der lijderes, ten zij het gebrek door gewoonte dragelijk werd, toch eenigzins aanwijzen, of wel de regter of de linker zijdelingsche ligging de beste is. Ondertusfchen moet bij eene fchielijk ontstane *Retroversio*, waarbij ter gelijker tijd gevaarlijke toevallen moeten beteugeld worden, als daar zijn bloedvloelingen enz., tenzij geen ander beletfel voorhanden en de *Uterus* bewegelijk is, de herstelling in de vermelde ligging ondernomen worden. Men voert dan

dan twee met pomade of olie bestrekenen vingers, of indien de ruimte der scheede het veroorlooft en het gezwel van den afgezakten bodem het vordert, de vingertoppen der kegelwijze gevormde hand binnen, (de regter, als de bodem meer naar de linker, de linker, als hij meer naar de regter heilig-darm-beensvereeniging afgezakt is), en drukt hem tegen het voorgebergte in de hoogte; en alleen dan, wanneer de herplaatsing door de scheede mislukt, brengt men twee vingers in den endeldarm, en schuift de baarmoeder voorbij het voorgebergte des heiligbeens naar boven; waar in de opgegevene ligging de herplaatsing niet mogelijk is, daar beproeven men haar in eene ligging, bij welke de lijderes met het bovenlijf voorover, dwars over het bed op knieën en elleboogen rust; mogten de vingers of de kegelwijze gevormde hand niet toereikende zijn, den baarmoedermond ook in dit geval volkomen over het voorgebergte op te schuiven, dan bedien ik mij van eene zachte, cylindervormige en van voren afgeronde, met fijn linnen overtrokken, groote, zachte, de afvloeiing der kraamzuivering niet belemmerende spons, welke met een bandje voorzien is, doop dezelve in de vloeistof van een slijmig afkookfel van *Althaea*, kaasjesbladen of haverdegort, enz., of bestrijk haar met pomade of olie, voer ze met eene balein (\*) in de scheede en druk den

bo-

(\*) Offchoon ik eerst door de vele ondervinding in den grooteren praktischen werkkring te *Berlijn*, dan in dien te *Wurzburg*, als door de medegedeelde zoo leerrijke waarnemingen van mijn' hooggeachten vriend, den Keizerl. Oostenr. Raad en Profesfor, den heer W. G. SCHMITT, van de waarheid



bodem daarmede in de hoogte, of ik maak ook in geval van nood gebruik van de gebogene buis eener spuit, aan welke eene afgeronde spons vastgemaakt is, gelijk die, welke ik aanwend bij de onvolkomene en allengs ontstane binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder ter terughouding van den omgekeerden bodem. Doch ik verkies de eerste, bijaldien het noodig is, de afzakking van den bodem voor te komen. Moet men haar verwisfelen, of bestaat er aanwijzing, om de spons op den duur te laten dragen, dan behoeft men bloot aan het bandje te trekken, om de spons weg te nemen, en

ben overtuigd geworden, dat men niet alleen buiten de zwangerschap, maar ook in de tweede, derde en vierde maand derzelve, en in het kraambed bij eene ontwikkelde achterwaartskanteling de kunstmatige terugbrenging ontberen kan, en onlangs nog op nieuw in drie gevallen bij eene zwangere, niet zwangere en kraamvrouw de gelukkige uitwerking der vrijwillige herstelling gezien heb, zoo kan men toch niet altijd de kunstmatige terugbrenging ontberen, en deze zelfs niet bloot met de vingers bewerktelligen; alsdan gebruik ik de beschrevene spons met het baleinen staafje. Om welke reden de verdienstelijke man er een (?) bijvoegde, is mij niet gebleken. — Twijfelt hij aan de mogelijkheid, of vreest hij voor kwetsing met hetzelfde, dan moet ik aanmerken, dat ik van de bruikbaarheid in mijne praktijk zoodanig overtuigd ben, dat er geen de minste twijfel in mij zou kunnen opkomen, en voor het laatste behoeft men niet te vreezen, als de spons behoorlijk voorbereid en het staafje met het stompe einde in de spons gestoken wordt. Ik laat, namelijk, gelijk bij de herstelling van de uitzakking der baarmoeder, §. 211, sijne spons vooraf reinigen, inzonderheid

en in derzelver plaats eene andere in te brengen, en den bodem bestendig hooger te schuiven. Heeft men zich daarentegen van de buis eener baarmoederspuut bediend, dan moet de buis blijven liggen, en de lijderes zelve, of eene Vroedvrouw, moet haar vasthouden en van tijd tot tijd in de hoogte drukken. Der spons geef ik de voorkeur, daar zij die naauwkeurige oppassing niet behoeft, en ik heb haar deswege ook in mijn *Handboek der Verloskunde voor Vroedvrouwen*, zoowel bij den derden als vierden druk (*Würzburg* 1819 en 1822. §. 635. S. 331.) aan de Vroedvrouwen bij de achterwaartskanteling der

heid van koralen, schelpjes, steenen enz., in koud regenwater, geenszins in warm leggen, en zoo lang uitwaschen, tot het water niet meer troebel wordt. dan de spons in de lucht hangen en in de schaduw droog worden, en geef haar dien cylindrischen vorm en lengte, welken ik tot mijn oogmerk noodig acht; het bovenende afgerond en het onderste met de schar regt afgesneden. Met het baleinen staafje, dat een spits en sondevormig uiteinde heeft, steke ik eerst met gene de spons tot op een derde duim door en verwijde de opening door heen en weder draaijen met het staafje, vervolgens voer ik het sondevormige uiteinde door, insgelijks tot aan het bovenste afgeronde einde der spons, een derde duim daarvan verwijderd, overtrek haar met oud, fijn linnen, loop de spons in de opgegevene vloeistof en bestrijk haar met pomade of olie. Op twee vingeren der linker- of regterhand, al naardat men aanwijzing heeft, voer ik de spons door de scheede tot aan den bodem en druk haar langzamerhand al sterker en sterker in de hoogte, en trek het staafje, middelerwijl ik twee vingeren voor het ondereinde plaats, draaijenderwijze uit.



der baarmoeder, met inachtneming der in dit geval vereischte ligging, nadrukkelijk aanbevolen.

§. 225.

Al is men in de terugbrenging ook volkomen geslaagd, en zijn gevaarlijke toevallen, bij voorbeeld bloedvloeijingen, flauwten, stuipen en moeilijke waterlozing verminderd of zelfs geheel verdwenen, dan is het noodig, dat de lijderes de, in ons *Handboek der Praktische Verloskunde*, derde druk. 1822. §. 291. en in ons *Handboek voor Vroedvrouwen* op eene andere plaats opgegevene ligging gedurende de gansche behandeling en ook nog lang daarna in acht neme; hoe lang, valt moeilijk te bepalen; bij een' zekeren aanleg, bewegelijkheid des *Uterus*, bij het hebbelijk geworden gebrek, en waar de achterwaartskanteling duidelijk het gevolg is eener ziekelijke verandering, welke met opzwellings en toeneming in zwaarte van den achtersten wand en den bodem vergezeld gaat, meent, wel is waar, SCHMITT, dat men over het algemeen enkel met de ligging genoeg doen kan, ter verhoeding van de wederkomst des gebreks, en dat de lijdende jaren lang de ligging op den rug vermijden en de zijdelingsche moet in acht nemen. Alhoewel ik insgelijks de overtuiging heb, dat in de meeste gevallen de ligging genoegzaam is, zoo moet ik toch aanmerken, dat vele vrouwen, inzonderheid der geringe en arbeidende klasse, deze ligging niet altijd kunnen houden, vooral wanneer zij zelfs des nachts verplicht zijn, voor haar brood te werken, en dat men niet altijd zeker kan zijn, of de ligging trouw na-

nagekomen wordt; om deze reden laat ik in zulke gevallen eené spons dragen, welke inderdaad niet alleen Vroedvrouwen en bekwame Bakers, welke ik tot deze of dergelijke verrigtingen in mijne verloskundige praktijk alhier opgeleid heb, maar zelfs vrouwen zeer goed leeren inbrengen, zoodra zij eenigermate daarin onderwezen zijn geworden. Gedurende de maandstonden late men de spons weg, en enkel voor rust en de zijdelingsche ligging in bed zorgen. SCHMITT prijst het dragen van een ringvormig *Pessarium*, volgens den ouden vorm van LEVRET, hetgeen men niet behoeft weg te nemen.

#### §. 226.

Na de terugbrenging eener in het kraambed ontstane achterwaartskanteling der baarmoeder houdt wel de bloedvliet in eens of van lieverlede op, doch buiten de opgegevene voorschriften, §. 225, ter voorkoming van eene op nieuws zich ontwikkelende achterwaartskanteling moet men tevens trachten, om de, ten gevolge der bloedvloeijing, verminderde voeding, door een gepast diët en hiermede overeenstemmende geneesmiddelen, als: saleb, fago, kina enz. op allerhande manieren te bevorderen, vooral wanneer de zogaffscheiding in hoeveelheid en hoedanigheid aanmerkelijk verminderd is. Vlug prikkelende, de gezonkene levenskracht schielijk opwekkende, en het zenuwgestel bedarende, de zoogenaamde krampwerende middelen, mogen niet dan in geval van zware flauwten en bij krampachtige verschijnselen toegediend worden. Zoo ook  
moet



moet men bij eene aanwezige opstopping van drekstoffen zacht afvoerende middelen geven, waartoe de *Oleum Ricini* tot drie eijerlepels vol in een half kopje kamillenthee, in welk mengsel het niet zoo ligt krimpelingen in den buik veroorzaakt, eene *Mixt. oleosa* en zacht ontlasting verwekkende klisteren van een afkookfel van garst- of graswortel met bijvoeging van zeep, zout en olie, de meeste aanprijzing verdienen. Het beste doet men, de laven-  
 menten voor de toediening van ontlastmiddelen te zetten, en inzonderheid daar, waar de te digtbij liggende bodem des *Uterus* het binnenbrengen der buis bezwaarlijk maakt, veêrkrachtige gombuizen, gelijkerwijze zij ook §. 205 bij de uitzakking der baarmoeder aanprezen werden, vooral volgens PICKEL te gebruiken, welke men bij het inbrengen gemakkelijker de vereischte rigting geven kan. Is er ontlasting gevolgd, dan kan men met des te meer voordeel van de olieachtige mixturen of melken met middelzouten zich bedienen, waartoe het *Glauber-* en *Polychrestzout* bij voorkeur geschikt is, of het moest zijn, dat de pijnen in den onderbuik en in het bekken aanhoudend en hevig, de gevoeligheid des buiks en der baarmoeder zeer groot, koorts en andere gevaarlijke toevallen daarmede verbonden waren, als wanneer de *Oleum Ricini* met kamillenthee, de voorkeur verdient.

#### §. 227.

De terugbrenging gelukt ook in het kraambed niet altijd, noch door inachtneming der ligging, noch door de herplaatsing met de handgreep; in dit

geval moet men naauwkeurig opsporen, welke oorzaken dezelve verhinderen. Wordt de achterwaarts-kanteling bij aanwezige bloedvloeijingen miskend, en in dit misverstand bij de behandeling enkel de aandacht bepaald, om deze door bloedstelpende middelen, vooral van de hevig prikkelende, verhittende en te zamentrekkende klasfe, bij voorbeeld kaneel- en *Ratanhiatinktuur*, *Opium*, aluin enz. te beteugelen, dan is veelal zwelling der baarmoeder met hevige pijnen, geneigdheid tot ontsteking of werkelijke ontsteking van den verplaatsten en beklemden *Uterus* oorzaak, dat de terugbrenging niet gelukt, en elke met geweld ondernomene poging, moet ook bij zulk eene door ongeschikte behandeling verwekte, opvolgende ziekelijke verandering, niet alleen nutteloos, maar zelfs hoogst gevaarlijk worden. In dit geval is het pligt eerst den ziekelijken toestand der baarmoeder te verbeteren, alles wat prikkelt en de reeds aanwezige prikkeling vermeerdert, te vermijden, terwijl het hoofdzakelijke der genezing op vermindering van de ontstekingachtige geprikkelde gesteldheid en bedaring der toevallen berusten moet. Tot dat einde zijn bloedzuigers in den omtrek der schaamte- en heiligbeensstreek, algemeene bloedontlasting bij een' hevigen graad van ontstekingskoorts, van aanmerkelijke zwelling, beklemming en ontsteking des *Uterus* met hevige pijnen en geneigdheid tot braken of werkelijk braken, olieachtige melkdranken met salpeter, *Oleum Ricini*, vooral bij gestoorde ontlasting, inspuitingen in de scheede van bedarende en verzachtende middelen der *Herba Malyae* — *Cicutae* en dergelijke, verzachtende om-

lla-



slagen op den onderbuik en de uitwendige teeldeel-  
 len, lenigmakende waterdampen door middel van  
 eene groote, voor de teeldeelen gelegde spons, en,  
 waar deze niet helpen, dikwijls herhaalde, doch  
 met behoedzaamheid aangewende laauwwarme baden,  
 dienstig. Zoodra de zwelling en pijn nalaten en de  
*Uterus* bewegelijk wordt, laat men de zijdelingsche  
 ligging op den buik houden, en onderneme de  
 terugbrenging door de scheede, en zoo dit niets  
 vermag, door den endeldarm, waarop de §. 225  
 opgegevene behandeling dient gevolgd te worden.  
 Wij merken slechts hierbij aan, dat somwijlen onder,  
 of na de pogingen ter opheffing der bloedophoo-  
 pingen, der ontstekingachtige gesteldheid, zwelling  
 en beklemming des *Uterus*, een bloedvliet ontstaat,  
 welke veelal allergunstigst is, wijl hij de zwelling  
 en den geprikkelden toestand des *Uterus* bij uitstek  
 vermindert en de terugbrenging veel gemakkelijker  
 maakt. Met de herstelling der natuurlijke ligging  
 verdwijnt de bloedvliet geheel en al, of in deszelfs  
 plaats vertoont zich de kraamzuivering, hetgeen  
 hoogst wenschelijk is; en vooral, indien zij na den  
 tijd des kraambeds nog dient te verschijnen en de  
 kraamvrouw niet zoogt, handelt men goed, dezelve  
 door voortzetting der vermelde inspuitingen of an-  
 dere doelmatige middelen te bevorderen.

#### §. 228.

Door den bodem wordt somtijds ook de terug-  
 brenging verhinderd, vermits, ten gevolge der pis-  
 opstopping, de pisblaas buitengewoon opgezet is.  
 Nog vóór men den katheter inbrengt, moet men  
 de



de herstelling door de ligging op de zijde of kunstmatig trachten te bewerken. Slaagt men om den afgezakten bodem eenigzins op te ligten, dan vloeit de *Urin* van zelve af, zoo niet, dan beproeven men hetzelfde in eene ligging, waarbij de lijderes dwars over het bed op knieën en ellebogen rust, of poge van voren aan de schaambeensstreek den hals en de baarmoeder met de vingers voorzigtig in de hoogte drukkende, eenigermate te verwijderen, waarop de *Urin* afvloeit, of ten minste naderhand de katheter met zekerheid en zonder groote pijnen kan ingebracht worden. Desgelijks ga men bij hardnekkige opstopping der drekstoffen te werk; zij houdt gemeenlijk met inachtneming der buikligging van zelve op, als ook met opheffing van den bodem der baarmoeder met de vingers, terwijl men dan inwendig zacht ontlastende middelen toediene en lavementen voorschrijve. — Dikwerf zijn de pijnen, vooral bij zeer gevoelige gestellen, zeer hevig en menig ziekelijk verschijnsel kan zich daarbij vertoonen. In dit geval trachte men het ontstelde zenuwgestel te bedaren, door geneesmiddelen, die met de gevoeligheid overeenstemmen. Bedarende *Emulsiones* met bijvoeging van bilfenkruidextract of laurierkerswater, verzachtende lavementen of inspuitingen in de scheede van een aftreksel der *Herb. Hyoscyami* — *Cicutae* en dergelijken, ten einde ook de overgroote gevoeligheid dezer deelen en het medegevoel van het aangrenzende ingewand — der blaas — eenigermate te verminderen, en poge, indien de terugbrenging wegens de groote gevoeligheid der lijderes nog niet geschieden kan, zij zeer over hevige druk-



drukking in de schaamstreek klaagt, op deze plaats insgelijks den hals der baarmoeder te verwijderen en eene in het genoemde kruidenaftreksel gedoopte of als het scheidgedeelte buitengewoon gevoelig is, met *Hyoscyamus*, of *Opiaatolie* bestreken spons, voorzien van een overtreksel en een doorgestoken snoer, achter de schaambeenderen door de scheede voor den baarmoedermond te schuiven, en deze eene dwarse rigting te geven, om alzoo de drukking ter zijde door het onderste segment der baarmoeder te verminderen, tot de herstelling met de handgreep door de scheede of den endeldarm mogelijk is.

#### §. 229.

Eene achterwaartskanteling der baarmoeder, die in het kraambed allengs en zonder zeer in het oog loopende ziekelijke verschijnselen ontstaat, kan in de gevolgen, zoodra zij niet vroeg genoeg beteugeld wordt, door de bewerking met de vingers hoogst moeilijk te verhelpen zijn, aangezien de *Uterus* bestendig lager afzakt, zich ombuigt en in het bekken beklemmt, of dezelve gelukt in het geheel niet, wijl ten gevolge van hoogst schadelijke oorzaken, de prikkeling van den te vroegen bijslaap, door drukking, zwellings en ophooping inzonderheid bij bol opgeblazene en tot aanbeijen geneigde personen, de aaneengroeiing van de terug- en omgebogene baarmoeder van achteren met de plooiën van DOUGLAS plaats grijpt. Hoezeer Verloskundigen, wel is waar, in het eerste geval, indien de herstelling niet geschieden kan wegens de kortheid der

vin-

vingeren , zekere kunstgrepen met instrumenten , wijlen BENJAMIN OSIANDER zijn uitzettend werktuig , hetgeen hij op eene , niet regt te bevattene , wijze van boven naar beneden tot aan den bodem van den achterwaartsgekeerden bodem invoerde en op eens omdraaide , en daardoor de plotselinge opheffing van den baarmoedermond bewerkte , hoezeer VOGEL (\*) in een geval den hefboom bezigde en W. M. RICHTER (†) zijn' herstellingshefboom (*Hysteromochlion*) aanprijst , desniettemin zijn wij verplicht aan te merken , dat wij in alle gevallen de terugbrenging , bij verouderde achterwaartskantelingen buiten de zwangerschap zonder nadeelige aanraking en belediging des deels mogelijk vonden , en altijd met de , door de balein ingevoerde , spons ons oogmerk bereikten , wijl wij haar zoo hoog tegen den bodem konden opschuiven , als maar eenigzins mogelijk was ; wij willen ons echter niet aankanten tegen de waarneming van SCHMITT , dat , wel is waar , niet bij den beklemden , maar toch bij den bewegelijken *Uterus* het na benedendrukken des baarmoedermonds met den vinger of eene achter de schaambeenderen ingebragte spons tevens tot voorbereiding en begin van het eigenlijke werk der terugbrenging zich heilzaam konde betoonen , wel te verstaan , dat hierbij geen ondragelijk geweld op den baarmoedermond en deszelfs aanhorige deelen geschiede , en houden deze bewerking ook voor

mo-

(\*) *Salzburg. medic. chirurg. Zeitung.* 1791. I. p. 20.

(†) W. M. RICHTER , *Synopsis praxeos medico-obstetriciae.* Mosquoe 1810. 4. p. 69.



mogelijk en nuttig, doch voor ondoelmatig, gelijk hij zelf aanmerkt, zoodra men ontwaart, dat alle pogingen, om den bodem der baarmoeder in beweging te brengen, in het geheel niets vermogen, en de hals des *Uterus* buiten dat retortvormig zich omkromt. LOHMEIJER prijst, in zijne voortreffelijke beschrijving der achterwaartskanteling (\*), aan, om tijdens de herstelling de linkerhand digt over de schaambeenderen op den buik te leggen en te gelijk door eenige drukking op deze plaats ruimte te erlangen (door bovenwaartschuiving der darmen) en daarbij met de toppen der vingers eenigzins op den baarmoedermond te werken, of denzelven ten minste te bepalen.

#### §. 230.

In geval de nog achterwaartsgekantelde baarmoeder in het kraambed niet alleen aanmerkelijk gezwollen, maar tevens haar bodem met de plooijen van DOUGLAS aaneengegroeid is, dan baat noch ligging, noch terugbrenging met de hand of instrumenten. Was het gebrek niet te zeer verouderd, en de *Uterus* zelve tot eene knoest-, vleesch- en spekachtige hoedanigheid overgegaan, dan gelukte het ons nog, dergelijke achterwaartskeeringen, die voorzeker altijd met onvolkomene achteroverbuiging vergezeld zijn, te genezen en bewegelijk te maken, door het inwendig gebruik des kwiks met het vingerhoedkruid of de *Cicuta*, door inwrijvingen van het

(\*) S. THEDENS *neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneikunst* 3ter Theil. S. 144.

het *Ung. Nitrat, Hydrargyri* in de heilig- en schaambeensstreek, door verzachtende inspuitingen van *Herb. Cicutae — Malvae — Hyoscyami* in de scheede en verzachtende lavementen, door laauw-warme baden, waar het aftreksel der vermelde kruiden onder gemengd werd, alsdan de ligging op de zijde latende in acht nemen, de herstelling door de, in de scheede allengs hooger gebragte, spons en bovenwaartsstuwung van den bodem der baarmoeder te bewerken, en zelfs in een geval, waar de bevruchtiging eenige jaren verhinderd was, deze mogelijk te maken.

#### L I T T E R A T U U R.

Dr. BRUNNINGHAUSEN, *von der Zurückbeugung der Gebärmutter im Ungeschwängerten Zustande in des Verfassers Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. III. B. N<sup>o</sup>. II. p. 59.*

W. J. SCHMITT's *Bemerkungen und Erfahrungen über die Zurückbeugung der Gebärmutter bei Nichtschwängern, nebst einigen Beobachtungen über die Vorwärtsbeugung. Wien 1820.*

F. L. MEISSNER, *die Dislocationen der Gebärmutter. 2ter Theil. Die Schiefslagen und die Zurückbeugung der Gebärmutter. Leipzig 1822. 8<sup>o</sup>.*

De Schrijver in *seinem Lehrbuche der Geburtshülfe für Hebammen. 4te Aufl. §. 635.*

*Die ausführliche Literatur über die Zurückbeugung der Gebärmutter findet man in des Schrijvers Lehrbuch der Theoretischen Entbindungskunde. 3te Ausg. p. 490—10. und in MEISSNER's Dislocationen der Gebärmutter. II. Theil. Die Schiefslagen und die Zurückbeugung der Gebärmutter. S. 65—69.*



A. L. MENDE, *von der Zurückbeugung der Gebärmutter in Ungeschwängerten Zustande, in dessen Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und gerichtlichen Medicin u. s. w. 2ter Bändchen, m. kupfern. Goettingen 1825. S. 150—215. 8°.*

C. *Van de voorwaartskanteling der baarmoeder in het kraambed.*

§. 231.

De voorwaartskanteling der baarmoeder (*Versio Uteri antrorsum, Antroversio*) komt in het kraambed zeldzamer voor, dan de achterwaartskanteling, voornamelijk omdat de vorm des bekkens, aan de schaambeenderen, het veelvuldig ontstaan meer verhindert, gelijkewijze de ligging op den rug en de rust, welke de kraamvrouwen houden, haar zelfs eerder verhoeden, zoo dikwerf als ze ook anderszins zich bij een' zekeren aanleg en voorbeschikkende oorzaken kan ontwikkelen. Bij het te vroeg verlaten des kraambeds wordt, door het staan en gaan, de oorsprong dezer gebrekkige ligging zeer bevorderd.

*Diagnosis.*

§. 232.

De kraamvrouw heeft veelal een' bestendigen aandrang om haar water te lozen, ontwaart pijnen boven de schaambeenderen bij betasting des onderbuiks, die eenigzins opgezet is, terwijl zij, zoodra zij overeind staat, gevoelt, dat er haar een hard ligchaam van voren op de schaambeenderen ligt, het-

hetwelk zich met vermindering van pijn weder terug begeeft, als ook, bijaldien zij op den rug zich plaatst. De bodem der baarmoeder wordt van voren aan de schaambeenderen op den bodem der pisblaas, de mond der baarmoeder achter aan het heiligbeen op het middelste gedeelte des endeldarms somwijlen zoo hoog gevoeld, dat hij naauwelijs met de vingers bereikbaar is; evenwel kan de baarmoedermond ook in het midden des bekkens staan, namelijk als het scheidegedeelte retortvormig gebogen is; dit is meestentijds gezwollen, de lippen zijn zeer opgezet, en de uit- en inwendige baarmoedermond gemeenlijk open op het gevoel. Ook bij de voorwaartskanteling des *Uterus* in het kraambed kan een aanmerkelijke bloedvliet zich openbaren; behandelt men denzelven louter met bloedstelpende, zeer prikkelende en tezamentrekkende middelen, dan heeft men dezelfde gevolgen als bij de achterwaartskanteling der baarmoeder te duchten; de bloedvloeijing kan; wel is waar, ophouden, doch ook de *Uterus* zeer opzwellen en tot een' geprikkelden, ontstekingachtigen toestand overgaan.

### *Oorzaken en Gevolgen,*

#### §. 233.

Verlossing en kraambed beide kunnen zeer ligt aanleiding geven tot voorwaartskanteling des *Uterus*, vooral, wanneer te voren in de zwangerschap een hangbuik bestaan had, en het bekken te veel op den horizon helt. Al te schiele zamentrekkingen der baarmoeder, inplanting der *Placenta* aan haren



voorsten wand, eene te ruwe afscheiding der nageboorte door trekken aan de navelstreng, het te vroeg verlaten des kraambeds, staan en overeind gaan, trappen klimmen, het optillen van zware lasten, kunnen, inzonderheid bij de vermelde voorbeschiktheid, des te gemakkelijker het gebrek doen ontstaan. — De gevolgen zijn bloedvloeijingen uit de baarmoeder, te overvloedige kraamzuiveringen, opstopping der drekstoffen, en voornamelijk van de *Urin*, overgang in vooroverbuiging, ontsteking en zwelling des *Uterus* bij eene verkeerde behandeling, verhinderde bevruchting, stoornissen in de maandstonden, vergroeiing van het scheidegedeelte met den endeldarm, pijn in de speenaderen, verettering van den endeldarm en der scheede, en verhardingen der baarmoeder.

### Geneeswijze.

#### §. 234.

De voorwaartskanteling der baarmoeder, bijzonder als dezelve, gelijk de achterwaartskanteling in het kraambed, met een' aanmerkelijken bloedvliet vergezeld gaat, vereischt de dadelijke terugbrenging des *Uterus* in deszelfs natuurlijke ligging. Dit geschiedt gemakkelijker, dan bij de achterwaartskanteling, mits de *Uterus* bewegelijk en niet gezwollen is. Dikwijls heeft de enkele ligging op den rug, des noodts met het bekken eenigzins hooger, en rust de herstelling ten gevolge; somtijds echter moet men de handen te baat nemen, welke men op den onderbuik boven de schaambeenderen legt, daar-

daarmede de baarmoeder voorzigtig terug drukkende. Waar ligging, noch drukking van buiten iets vermogen, en overigens geene ziekelijke veranderingen voorhanden zijn, brengt men eene spons door middel eener balein achter de schaambeenderen binnen, en tracht den *Uterus* in de hoogte en naar achteren te drukken; deze evenwel betoont zich ter herstelling alleen dan nuttig, als de *Uterus* achter de schaambeenderen ligt en vooroverbuiging zich daarbij gevoegd heeft, anders is zij eerst later in het kraambed of na hetzelfde van dienst, waar de *Uterus* bereids zich meer heeft zamengesrokken. Ontmoet men hinderpalen of ziekelijke veranderingen, gelijkerwijze men deze onder zekere betrekkingen bij de achterwaartskanteling der baarmoeder, §. 227, vindt opgeteekend, bij voorbeeld zwelling, ontsteking des *Uterus*, verhoogde gevoeligheid enz., dan gedrage men zich daaromtrent, even als bij de achterwaartskanteling der baarmoeder:

#### §. 235.

Slaagde men in de terugbrenging, dan bevele men altoos de grootste rust, en eene eenige dagen, weken en langer gerekte waterpasse ligging op den rug aan; late vooral, wanneer de kraamvrouw het bed verlaat, een' buikband dragen; brenge met het baleintje ter plaatse, waartegen de baarmoedermond steunt, eene spons binnen, welke men eene dwarse rigting geeft, en ingeval het gebrek na het kraambed blijft bestaan, alsdan geve men den raad, een ringvormig of veêrkrachtig moedersteunsel te dragen, mits, dat hetzelfde de lijderes, geen



pijn aandoet, om het scheidegedeelte en het on-  
derste segment des *Uterus* tot steun te verstreken.

#### L I T T E R A T U U R.

A. F. NOLDE, *Beiträge zur Geburtshülfe. Erfurt 1811.*

MEISSNER, *a. a. O. II. Theil. S. 65.*

De Schrijver in *seinem Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen. 4te Auflage. S. 635.*

#### D. *Van de ombuiging der baarmoeder in het kraambed.*

##### §. 236.

Ombuiging der baarmoeder, welke men noch met de schuinsche en scheeve ligging, noch met de voor- en achterwaartskanteling verwarren moet, noemt men die verandering in de natuurlijke ligging en vorm der baarmoeder, waarin zich haar bodem zoodanig over den voor- of achterwand van haar ligchaam naar beneden buigt, dat het bovenste einde van hare middelpuntas aan de onderste nabij komt, middelerwijl de anderszins verst van elkander gelegene deelen, bodem en baarmoedermond, als het ware, bij elkander liggen; de gedaante der baarmoeder kan men met een hoefijzer (MEISSNER) vergelijken, hebbende zij het eigenaardige, dat het ligchaam der baarmoeder gebogen of gekromd wordt, waardoor het alleen mogelijk is, dat de bovenste helft van den voorsten of achtersten wand de onderste helft van dezen of genen aanraakt.

De ombuiging der baarmoeder kan bij kraamvrouwen naar voren tegen de schaambeensvereening (*Pronatio Uteri*), of naar achteren tegen het heiligbeen (*Supinatio Uteri*) plaats grijpen, al naar gelang de bodem der baarmoeder, naar voren of naar achteren, tot den mond derzelve zich verhoudt. De eerste treft men het minste aan en wordt dikwijls miskend, terwijl de laatste, uit hoofde van den vorm des bekken en bijzonderheden bij de geboorte en in het kraambed, menigvuldiger voorvalt. Bij de vooroverbuiging is de voorste wand, — bij de achteroverbuiging de achterste wand te zamengevouwd; bij de eerste openbaren zich de ziekelijke verschijnselen meer in de pisblaas, — bij de laatste daarentegen, ontstaan er meer stoornissen in de verrigtingen van den endeldarm, waaruit het gebrek zich kennen doet. Daarenboven kan de ombuiging der baarmoeder in een' volkomen of onvolkomen' graad zich ontwikkelen; hare volkomene ontwikkeling naar voren onder tegen de schaambeenderen, gelijk MÖLLER haar bij de lijkopening eener kraamvrouw heeft aangetroffen, komt, wel is waar, zelden voor, doch het is niet te loochenen, dat zij wegens hare zeldzaamheid eerder over het hoofd gezien wordt; in een' onvolkomen' graad echter doet zij zich in het kraambed menigvuldiger voor, dan men haar wel herkent, kunnende deze, in vervolg van tijd, tot eene volkomene ombuiging overgaan, gelijk wij daarvan door menigvuldige waarnemingen overtuigd zijn. De achteroverbuiging tegen het heiligbeen openbaart



zich meer na de bevalling, en ontwikkelt zich, alhoewel aanvankelijk slechts onvolkomen, naderhand evenzeer volkomen; beide kunnen intusfchen, zoolang zij in een' onvolkomen' graad aanwezig zijn, miskend worden en tot verwisseling derzelve met oorspronkelijke ziekten van de blaas en den endeldarm veeleer aanleiding geven dan de volkomene ombuiging, vermits bij deze de verrigtingen dezer organen meer onmiddellijk gestoord en regtstreeks in het gebrek betrokken worden.

### *Diagnosis.*

#### §. 238.

De vooroverbuiging tegen de schaambeenderen (*Pronatio Uteri*), welke ik aanstonds na de verlossing nooit volkomen, wel echter meermalen later bij eene trapswijze ontwikkeling heb waargenomen, erkent men uit eene voorhanden zijnde ledigheid des onderbuiks, een' bloedvliet, en de hevige pijnen boven de schaambeensstreek, de moeilijke of belette pislozing, den sterk naar het heiligbeen gekeerden mond der baarmoeder, en het achter de schaambeenderen voor den baarmoedermond te ontdekken gezwel, hetgeen bij de aanraking pijnlijk en bij eene opgerigte, ligter te voelen is, dan in eene liggende houding der lijdende. De ledigheid des buiks, die wel niet altoos bestaat, en zeer spoedig zelfs in opgezetheid veranderen wil, kan zeer ligt te weeg brengen, dat men de verschijning des bloedvliets aan eene uitzakking, eene achterwaarts- of binnenbuitenwaartskeering toeschrijft; het naauwkeurig onder-

derzoek echter kan in dezen over het gebrek het noodige licht verspreiden. In het door MÖLLER verhaalde en in des Schrijvers *Lucina* V. Bd. I St. pag. 55, in een uittreksel, medegedeelde geval moet de ombuiging na de verlossing volkomen hebben plaats gegrepen. De Vroedvrouw had onder de geboorte eene in het oog loopende, ongewone opzetting des onderbuiks, vooral echter telkens onder de weeën, bespeurd, hetgeen duidelijk reeds eene onevenredige zamentrekking van de wanden der baarmoeder, en in dit geval voornamelijk eene sterke zamentrekking van den voorsten wand, scheen te kennen te geven. De nageboorte viel kort na de verlossing des kinds uit de teeldeelen; er kwam weinig bloed, en zoo scheen alles, of was het aanvankelijk inderdaad, gelukkig afgedaan en overgebracht. Met den derden dag na de verlossing deed zich een pijnlijk gevoel in den onderbuik op, vergezeld door eene zachte koorts, dat met de naweeën (die anderszins gemeenlijk met den derden dag nalaten, zelden eerst zoo laat beginnen) veel overeenkomst had; koorts en pijn namen tot den avond van dien dag toe, zoo, dat de kraamvrouw de laatste weldra bepaald boven en achter de schaambeenderen beschrijven kon en iets later ook de uitbreiding derzelve tot de dijen te kennen gaf. De aanhouding en klimming dezer toevallen, benevens het wegblijven der kraamzuivering en van het zog, deden dus de Geneesheeren wel dadelijk op een gebrek in den buik zelve (*imo ventre*) denken, doch daar men dit gebrek niet vermoedde, beantwoordde ook de behandeling niet aan het doel; verergerende de lijderes van dag tot dag. Allereerst ver-



vertoonde zich reeds buikloop, die weldra zoo hevig werd, dat eenige malen twaalf stoelgangen binnen het uur plaats hadden. — Den elfden dag na de verlossing maakte de dood een einde aan haar lijden. — De lijkopening leverde gewigtige, ten deele reeds vermelde, verschijnselen op. De buik was buitengemeen opgezet, de baarmoeder ver-  
toonde, volgens hare gedaante van boven en voren, eene breedte, welke met hare kortheid niet overeenstemde. Deze onevenredigheid, deze afwijking werd na eenig onderzoek klaar genoeg; de ligging en vorm der baarmoeder waren namelijk zoo, als zij boven, bij de beschrijving dezer foort van ombuiging, bepaald werden. Die gedaante der baarmoeder, in welke de veelal verst verwijderde deelen, baarmoederbodem en mond het dichtst bij elkander komen te liggen, kon zekerlijk slechts onder begunstiging van eenen zekeren toestand der baarmoeder zelve, namelijk de uitzetting en verslapping, ontstaan. De lengte der uitgenomene en uitgerekte baarmoeder, die elf en een half duim bedroeg, deed in dit geval den overgang in den vermeldden vorm naar genoegen zien.

#### §. 239.

De achteroverbuiging der baarmoeder tegen het heiligbeen (*Supinatio Uteri*) is veelal het spade gevolg der achterwaartskanteling, voornamelijk als zich deze langzamerhand in het kraambed ontwikkelt, of zij kan ook te gelijk ontstaan. Van de vooroverbuiging onderscheidt zij zich, zoodat, in plaats van de gebreken in de pisblaas, deze meer  
in

in den endeldarm zich vertoonen, als daar zijn moeilijke en belette stoelgang, en aanmerkelijke opzwellings der speenvaten, die sterk te voorschijn komen en met een brandend en een persend gevoel vergezeld gaan, hetwelk zich ook bij voorkeur aan den achtersten wand der scheede openbaart. Bij het verloskundig onderzoek verhoudt zich de stand van den bodem en den hals der baarmoeder juist omgekeerd; gene, welke zich als een pijnlijk, rond gezwel laat aanvoelen, is meer naar het heiligbeen, somtijds digt aan den endeldarm en naar beneden staande, de baarmoedermond daarentegen aan de schaambeenderen, en in een' volkomen graad dermate tegen dezelve aangedrongen, dat men bij het onderzoek door de scheede tusschen den hals en den bodem der baarmoeder komt. Bij de achteroverbuiging volgt insgelijks een baarmoederlijke bloedvliet, die heviger is, naar gelang het gebrek zich in het kraambed vroeger ontwikkelde; bij de later zich instellende echter kan hij wel eens van geene beteekenis zijn, en weldra ophouden; alsdan openbaren zich ligt pijnen, inzonderheid in de heiligbeensstreek en boven de schaambeenderen, terwijl de ligging op den rug voor de lijdende ondragelijk is, daarenboven ontstekingsachtige geneigdheid, ontsteking, en velerlei medelijdende toevallen, vooral bij zeer gevoelige voorwerpen en waar het gebrek miskend, en ondoelmatig door geneesmiddelen behandeld werd.



## Oorzaken.

## §. 240.

Ingevolge alle dusver in het werk gestelde waarnemingen, neemt men de volkomene ombuiging der baarmoeder, welke eensklaps ontstaat, en vooral die naar voren, eeniglijk bij kraamvrouwen waar, doch de onvolkomene en de allengs tot volkomene overgaande kan ook zwangere in de eerste maanden en tevens onbezwangerde overvallen, eene waarheid, die wij nimmer zouden te boek stellen, ware het niet, dat wij daarvan door gewigtige gevallen overtuigd waren geworden (\*). Zoo hebben wij dezelve drie malen bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap zien plaats grijpen, en in twee gevallen door de ontleedkundige beschouwing bewaardheid gevonden, gelijk de praeparaten, door ons bewaard, staven kunnen. Uit dien hoofde ben ik het met MEISSNER niet eens, die beweert, dat dit gebrek alleen bij kraamvrouwen zich voordoet; trouwens

(\*) Bij eene dame zag ik — het moge den schijn van het onmogelijke dragen — tegen het einde der tweede maand harer zwangerschap eene volkomene achteroverbuiging; dermate, dat de achter den schaambeensboog (*Arcus Ossium Pubis*) zichtbare mond der baarmoeder schier met den bodem derzelve gelijk stond; miskraam had ik gelukkig, door het slagen in de terugbrenging dezer merkwaardige, mij nog zoo niet voorgekomene ombuiging, verhoed, en een meer dan voldragen, zeer groot kind ongeschonden verlost, hetwelk, vermits hetzelfde met het zijdelingsche gedeelte der borst en

wens daarmede wel, dat degene, welke zich onmiddellijk na de ontlediging des *Uterus*, derhalve na de geboorte des kinds, ontwikkelt, het uitwerksel eener onregelmatige, allerwaarschijnlijkst ziekelijke, meer of min hevig werkende zamentrekking der baarmoeder is, die, grijpt zij in den voorsten wand plaats, vooroverbuiging (*Pronatio*) en bij de aan-doening des achtersten wand gene naar achteren (*Supinatio*), ten gevolge heeft, gelijkewijze door denzelfden invloed op den bodem des *Uterus* in de rigting van zijne as naar beneden eene binnenbuitenwaartskeering (*Inversio*) alleen kan gegrond zijn. Een te sterk hellend bekken, mitsgaders een te sterk overhangende buik kunnen evenzeer de aanleidende oorzaken eener ombuiging worden, als de inplanting des moederkoeks op den voor- of achterwand der baarmoeder en eene zekere week- en slapheid van haar weeffel. Beide soorten brengen bij zekere aanleidende oorzaken, als daar zijn ondoelmatige pogingen bij het werk der nageboorte, door met geweld aan de navelstreng te trekken, lig-

en de navelstreng ingedrongen was, door mij niet zonder veel krachtingspanning door middel van de keering ter wereld werd gebragt. Het leeft nog tot groote blijdschap der ouderen. Opmerkenswaardig is het tevens, dat dezelfde dame een jaar vroeger in de tweede maand harer dragt *aborteerde*; daar zij toen ter tijd mijne hulpe niet had ingeroepen, is het echter hoogst waarschijnlijk, dat de oorzaak dezer misgeboorte in de niet tijdig genoeg erkende achteroverbuiging des *Uterus* haren grond heeft gehad.



ligchamelijke inspanningen na de verlosfing en voor behoorlijke zamentrekking des *Uterus*, gelijk het te vroege bedverlaten, trappen klimmen, het opheffen van een' zwaren last. Overigens valt nog aan te merken, dat eene *Retroversio Uteri*, zoowel als *Antroversio* met der tijd in eene ombuiging (*Supinatio* en *Pronatio*) kan overgaan, waarbij de *Uterus* jaren lang, en zelfs voor altijd, deze gedaante behoudt, even als eene in het kraambed plotseling of allengs ontwikkelde *Inversio Uteri* gedurende het gansche leven eener vrouw kan blijven bestaan.

### Voorzegging.

#### §. 241.

De vooroverbuiging der baarmoeder (*Pronatio Uteri*), die eensklaps na de verlosfing ontstaat, is altijd eene hoogst gevaarlijke ziekte, wijl zij gemeenlijk aanmerkelijken bloedvliet, ontsteking, stuipen en den dood ten gevolge heeft. Wordt de deskundige tijdig geroepen, dan is er eerder aan hulp en redding der kranke te denken, voornamelijk als nog geene stuipen en zamentrekking van den baarmoedermond zich hebben ingesteld. De uit haar oorspronkelijke ontsteking is doodelijk, indien de herstelling vroeger reeds niet mogelijk was. — Hoe algemeener de ontsteking is, des te ongunstiger voorzegging, en doodelijk wordt zij, zoodra zij onder den vorm van kraamvrouwenkoorts zich vertoont, en uitzweeting, of ten gevolge der plaatselijke prikkeling in het bekken zelve, eene zogverplaatfing voortgebragt heeft. De achteroverbuiging  
is

is minder gevaarlijk, ten minste onder gelijke omstandigheden niet zoo spoedig doodelijk, naardien de *Uterus*, uit hoofde van den vorm des bekken aan het heiligbeen, niet zoo schielijk beklemd raakt, de ontsteking niet zoo dadelijk toeneemt, en minder stuipen zich opdoen. De bloedvliet kan, wel is waar, heviger te voorschijn komen, doch hij is ook eerder tot bedaring te brengen en het gebrek zelf gemakkelijker te verhelpen. — Eene ombuiging, die langzamerhand en later in het kraambed zich ontwikkelt, of de achter- of voorwaartskanteling tot gezellin heeft, sluit minder gevaar in zich; zij kan echter ligter over het hoofd gezien worden, middelerwijl de gevolgen dezelfde als bij deze zijn, en ook de voorzegging zich hiernaar rigt.

### *Geneeswijze.*

#### §. 242.

De genezing berust op verwijdering der gelegenheidgevende oorzaken der ombuiging; op herstelling derzelve; de mogelijke bepaling des *Uterus* in deszelfs natuurlijke plaats en verhoeding van de terugkomst des gebreks.

#### §. 243.

De eerste aanwijzing, om het ontstaan en de volkomene ontwikkeling van zulk een gevaarlijk gebrek te voorkomen, zou hoogst gewigtig zijn, zoodra slechts oorzaken en verschijnselen, welke zelfs in het geval van MÖLLER, volgens berigt der Vroedvrouw, voorafgegaan zijn, ziektekenetschetsend



(*pathognomonisch*) waren en in elk geval zich bevestigden; nogtans kunnen zij zich vertoonen, zonder dat men eenige de minste verandering in vorm of ligging des *Uterus* ontdekt. Heeft men voor het overige bij zeer hevige en pijnlijke naweeën of bij doelftrijdige en onregelmatige zamentrekkingen vrees voor dit gebrek, dan zullen de §. 124 en de §. 126 aangeprezene in- en uitwendige middelen ter beteugeling der kramp van dienst kunnen zijn. Zelden echter zal men flagen in het verhoeden der ombuiging; in dit geval nu was de tweede en dringendste aanwijzing, de herstelling te ondernemen; geenszins echter eerst door middel van de balein, welke bij zulk eene gewigtige, ziekelijke *organische* verandering des *Uterus*, die op kramp berust, niet alleen onzeker, maar ook gevaarlijk zou zijn. Men moet daarom op de volgende wijze te werk gaan: de krampachtige gesteldheid vereischt dringend de aanwending van krampwerende geneesmiddelen, tot welk einde het bilsenkruidextract, het *Opium*, het *Aq. Amygdalarum amararum cohobata*, de *Sp. Cornu Cervi succinatus*, het bevergeil tot inwendig gebruik, omflagen over den onderbuik, inspuitingen in de baarmoeder en lavementen van krampwerende kruidenaftreksels dienstig zijn, terwijl men, ingeval de kramp in de baarmoeder nagelaten heeft, bij de vooroverbuiging eene volstrekte ligging op den rug en bij de achteroverbuiging eene zijdelingsche op den buik kan laten in acht nemen. Slaagt men dusdoende niet in de vrijwillige herplaatfing, dan kan men dezelve met eene balein en eene spons beproeven, ten einde den voor- of achterovergebogenen

bodem der baarmoeder op te voeren, zonder dat het noodig is, de balein zelve dadelijk door den baarmoedermond in te brengen en daarmede de baarmoeder aan te raken. Ondertusfchen zal men bij de, terftond na de verlosfing des kinds ontftane, ombuiging wel degelijk de aandacht op den moekoek vestigen, en bijaldien dezelve geheel en al afgefcheiden in de fcheede ligt, met behoorlijke omzigtigheid en door de bekende handgreep wegneemen moeten; heeft echter de affcheiding nog geen plaats, dan bewerke men deze niet kunstmatig, integendeel, blijft de ombuiging bestaan, zoo bringe men de kegelvormig gevouwene, en met heulfap-olie beftrekene, hand door den baarmoedermond binnen de holte derzelve, rake daarmede de wanden des *Uterus* en voornamelijk diengenen aan, welke zich niet genoegzaam zamentrekt, trachte tevens door eene voorzigtige wrijving van buiten de regelmatige zamentrekking der baarmoeder te bewerken, en late de afzondering der *Placenta* aan de eigen krachten der natuur over, waarop men haar volgens de verloskundige regelen uit de fcheede poge te verwijderen.

#### §. 244.

Een hevige bloedvliet vermindert, zoodra de herftelling gefchied is, terwijl de aanwending van in- zoowel als van uitwendige bloedftelpende middelen ter bereiking van dit doel meer fchadelijk dan nuttig zal zijn, naardien zij de plaatselijke prikkeling des *Uterus* en de kramp vermeederen. — Andere, met de ombuiging verwante, ziekelijke toefstanden en ver-



andering des *Uterus*, ontstekingsachtige geneigdheid, ontsteking, opzetting, verharding en dergelijken, welke laatste meer bij verouderde en ten gevolge eener verwaarloosde voor- en achteroverbuiging in het kraambed voorvallen, vorderen de §. 226 opgegevene behandeling. — Ten einde den *Uterus* in deszelfs regelmatige ligging te behouden en het op nieuws ontstaan eener ombuiging te voorkomen, zullen de aanhoudend voortgezette liggingen op den rug en de zijde de vermogendste middelen zijn; met wezenlijk nut bedien ik mij tevens van eene spons, welke ik bij achteroverbuiging (*Supinatio*) voor tegen het heiligbeen en bij de vooroverbuiging (*Pronatio*) achter de schaambeenderen met mijne balein opvoer en eene dwarse rigting geef. Ik acht het *Pessarium* overbodig, onzeker en, bij sommige gevoelige voorwerpen, eerder schadelijk. Daarenboven moet men voor genoegzame ontlasting, zoo der *Urin* als drekstoffen, zorgen, allen moeilijken arbeid en verkeerde standen van het ligchaam verbieden, en bij overgeblevene zwakte der deelen, inzonderheid van de banden en den *Uterus* zelven, versterkende middelen en dergelijken, gelijk ook zamentrekkende baden en inwrijvingen, in het werk stellen.

#### L I T T E R A T U U R.

Dr. MÖLLER, *Diss. de pronationi Uteri post partum, morbo atroci, nondum descripto. Marburgi 1803.*

*Ueber Umbeugung der Gebärmutter nach der Geburt, als einem wichtigen und der allgemeinen Aufmerksamkeit würdigen Gegenstande, der die Möllersche Probe-schrift*

schrift veranlasst hat in v. SIEBOLD's *Lucina*. IV. Bd.  
I St. No. IV. pag. 55—64.

De Schrijver in *seinem Lehrbuche der theoret. Entbindungskunde*. 4te Aufl. §. 623 und in deszelfs *Lehrbuch der practischen Entbindungskunde*. 3te Aufl. §. 313.

BRÜNNINGHAUSEN, a. a. O.

CARUS, *Lehrbuch der Gynäkologie*. 2ter Theil. Leipzig 1820. S. 551. sq.

JÖRG, *Handbuch der Krankheiten des Weibes etc.* 2te Aufl. Leipz. 1821. p. 704. S. 651. sq.

MEISSNER, *die Dislocationen der Gebärmutter*. II. Theil. p. 179—211.

### E. *Van de binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder.*

*Begrip.*

§. 245.

Omkeering of binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder (*Inversio Uteri*) noemt men dien toestand des *Uterus*, waarin deszelfs bodem en ligchaam door den openen baarmoedermond afzakken, zijnde zij die verplaatfing des *Uterus*, welke gemeenlijk alleen bij barenden en verlost en voorvalt, alhoewel zij toch somwijlen ook bij jonge meisjes, onbezwan-gerden en zulke vrouwen aangetroffen wordt, wier leven reeds afneemt. Voor het tegenwoordige moeten wij alleen over die in het kraambed handelen, voor zoo verre zij als gevolg der verlossing zich vertoont,



*Verschijselen.*

## §. 246.

De omkeering is of volkomen (*Inversio Uteri completa*) als de baarmoeder ten volle binnenbuitenwaarts zich omkeert, geheel door den baarmoedermond naar buiten hangt, zijnde deze dan bovenwaarts gerigt, terwijl in een' hoogen graad eene uitzakking des *Uterus* en eene omkeering der scheede veelal zamen gaan, als wanneer de baarmoeder tusschen de dijen, gelijk een vleezig ligchaam nederhangt; of zij is onvolkomen, als de inwendige vlakke van den bodem derzelve bloot tot haren mond afdaalt; deze onvolkomen graad kan mede allengs in den volkomenen overgaan, en dus de bodem of een gedeelte van het ligchaam des *Uterus* nederwaarts gestuwd worden. In dit geval **vertoont** zich tusschen de, van elkander gewekene, schaamlippen een rond, oneffen, glibberig, bloederig gezwel, niet ongelijk aan een in de doorsnede komend kindshoofd, om het even of de nageboorte nog vastzit, welke geheel naar voren zich bevindt. Opmerkenswaardig is het tevens, dat bij de volkomene omkeering veelal de inwendige oppervlakte van den bodem der baarmoeder afdaalt, bij de onvolkomene nogtans zal men buiten gene meermalen de eene of de andere vlakke des ligchaams, en somwijlen slechts een gedeelte van het inwendig afgescheiden vlies der baarmoeder, op, of in den mond derzelve bij het onderzoek aantreffen, gelijk ik zulk een geval in de kraaminrigting te *Wurzburg* waargenomen en behandeld heb.

*Dis.*

*Diagnosis.*

## §. 247.

Ontwikkelt zich de omkeering der baarmoeder tot eenen volkomen' graad, dan erkent men haar uit de ledigheid des onderbuiks, waarin men de kegelvormige baarmoeder niet meer ontwaart; de verlostte verliest eene buitengewone hoeveelheid bloeds, en er komt een week, rond, bloedend, vleeschachtig ligchaam in de scheede tot aan de onderste opening des bekkens voor de uitwendige teeldeelen, en bij eene gelijktijdig aanwezig zijnde uitzakking, uit dezelve tusfchen de dijen, te voorschijn, hetwelk de binnen-buitenwaartsgekeerde bodem der baarmoeder is, waarbij men den mond derzelve niet bereiken kan. Zoodra de nageboorte nog niet afgescheiden is, dan voelt en ziet men dezelve voor het vermelde ligchaam liggen. Daarbij klaagt de lijderes over hevige pijnen met perlingen op het lijf, die aanhoudender en heviger worden; de vrouw wordt bestendig zwakker, het gezigt is bleek en ingevalen, de pols klein, hoogst zwak en dikwerf ter naauwernood voelbaar, meestentijds komen er flauwten en stuiptrekkingen bij, ondanks het luttele bloedverlies; of eene plotseling na de verlossing en in het kraambed ontwikkelde binnen-buitenwaartskeering, volgens HAMILTON (*Med. Comment.* vol. VI. pag. 315), zonder bloedverlies mogelijk zij, kan ik uit eigene ervaring niet beslissen, hoe dikwijls ik ook in de gelegenheid was dit gebrek waar te nemen. Stuipen zag ik zelden, en waar zij zich openbaarden, verschenen zij ten gevolge van bloedverlies



of van de hevige spanning en rekking der banden en der veranderde ligging der eijerstokken en *Fallopiaansche* buizen en het afzakken der darmen, door het ledig geworden bekken, in de, na de omkeering gevormde, holte des *Uterus*, waarbij de naast hem loopende zenuwen en vaten aan eene dergelijke rekking blootgesteld worden.

§. 248.

De onvolkomene omkeering der baarmoeder wordt, inzonderheid als zij niet dadelijk na de verlosfing, maar later in het kraambed, en dan eerst ontstaat, wanneer de *Lochiën* niet meer bloederig zijn, zeer ligt over het hoofd gezien. De lijderes gevoelt, wel is waar, ook pijnen, aandrang en persing in de diepte des onderbuiks en in het bekken, doch de pijnen zijn niet zoo hevig; gemeenlijk echter is ook deze graad van omkeering met eene aanmerkelijke bloedvloeijing vergezeld, die, als zij later in het kraambed er bijkomt, zwakte, bleek en ingevallen gezigt, vermindering der zogaffscheidung, kleine, zwakke pols, vele flauwten, niet zelden stuiptrekkingen en later alle gevolgen van uitputting te weeg brengt. Meestal helpen de in het werk gestelde uit- en inwendige bloedstelpende, of de bloedige kraamzuivering (*Menorrhoea lochialis*) bedarende middelen niets, zij vermeederen haar zelfs, of hebben ontfieking der baarmoeder, des onderbuiks en aanmerkelijke koorts ten gevolge. Het ondernomen verloskundig onderzoek kan alleen over deze zaak het noodige licht verspreiden; men ontdekt voor, of ook slechts inwendig tegenover den

ge-

geopenden ring- of spleetvormigen mond der baarmoeder een week, bij de aanraking der vingers ligt bloedend en pijnlijk ligchaam, hetgeen op het gevoel van een' vleeschachtigen aard is en juist in het middelpunt des monds ligt, wanneer het de bodem der baarmoeder is; het te voelen ligchaam laat somwijlen eene tusfchenruimte naar de eene of andere zijde, voor- of achterwaarts, over; en is het bloot het inwendige vlies des bodems, of een gedeelte van het ligchaam, hetwelk van het weeffel der baarmoeder afgescheiden en nedergezakt is, dan doet het zich zeer week en vleeschachtig op het gevoel voor. Onderzoekt men te gelijker tijd den onderbuik met de andere hand boven de fchaambeenderen, dan mist men de baarmoeder geheel en al, of men ontdekt, bij het in de hoogte fchuiven derzelve, met de onderzoekende vingeren eene aanmerkelijke holte ter plaatfe van den bodem of het ligchaam des *Uterus*; deze diepte befpeurt men minder bij de onvolkomene; de bodem der baarmoeder is flechts eenigzins naar binnen gebogen, of van boven naar beneden matig ingedrukt; dit verfchijnsel ontbreekt geheel, of is bijkans niet te bemerken, zoodra enkel een gedeelte van het inwendige vlies afgezakt is. — Wordt de onvolkomene omkeering niet erkend en verholpen, dan kan zij tot den volkomen graad overgaan, de baarmoedermond door zamentrekking zijner vezelen zich vernauwen, den bodem derzelve beklemmen, middelertwjl hevige, naar naweeën gelijkende pijnen zich openbaren; het gebrek wordt ligtelijk van een' ftependen aard, en velerlei floorniffen in de pisa-



scheiding, moeilijke, belette pislozing, niet zelden onwillekeurige afvloeiing der *Urin*, voornamelijk bij het staan en gaan, en overtollige, langer en veelvuldiger dan te voren verschijnende maandstonden zijn de gewone gevolgen.

§. 249.

De binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder kan met een kinderhoofd, met *Mola's*, polypen, uitzakking der baarmoeder en met scheidereuken verward worden. — De verwisseling met een kinderhoofd (\*) zal buiten grove onkunde eener Vroedvrouw of Verloskundige niet ligt mogelijk zijn; want men voelt den onderbuik boven de schaambeenderen ledig en nergens het kogelvormige ligchaam der baarmoeder, het kinderhoofd is zoo hard, als het zelfs bij de hevigste zamentrekkingen der baarmoeder niet worden kan; men ontdekt naden en fontenellen, die aan den nedergezakten bodem ontbreken, welken men nog minder voor een hoofdgezwel kan houden, wijl in zulk een' korten tijd, als de omkeering ontstaat, zich geen hoofdgezwel aan het zich aanbiedende hoofd kan gevormd hebben; de omgekeerde bodem of het ligchaam van den *Uterus* is gevoelig of hoogst pijnlijk, de betasting van het kinderhoofd wordt, zelfs ondanks eene aanmerkelijke drukking door de bevallene, niet ontwaard, en de verder naar boven

tus-

(\*) Men zie JOHN BURNS *Grundsätze der Geburtshilfe*, uit het Engelsch van KOLPIN, p. 563, de door MANGETUS medegedeelde waarneming en die in het *Journal de Médecine* (Tome XLI. pag. 40.)

tusschen bodem en mond der baarmoeder opgevoerde vinger komt weldra aan de plaats, waar de *Uterus* zich binnen-buitenwaarts gekeerd heeft. — Eene *Mola* kan zoo gemakkelijk niet met eene omkeering verward worden, aangezien dezelve gemeenlijk eerst door de verlossing des kinds moet voorafgegaan worden, en *Mola's* in het gemeen reeds vroegtijdig in de eerste drie of vier maanden afgedreven worden. Intusschen kunnen er ook andere vreemde, in den *Uterus* gevormde deelen terug zijn gebleven, welke aanleiding konden geven ter verwisfeling derzelve met eene omkeering (\*). BARTHOLIN (*Histor. anatom. Cent. III. obs. 91*) en RUISCH hebben de verwisfeling der binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder met *Mola's* vermeld en plaats zien grijpen. Bij het aanraken der *Mola* voelt

(\*) Wij bewaren in onze verzameling nog zulk een, op eene Vleeschmola gelijkend, deel van eene buitengewone grootte, hetwelk wij bij eene dame, eenige weken nadat zij van een voldragen kind bevallen was, hebben weggenomen. Alle kenteekenen eener omkeering deden zich op, de bloedvliet bestond reeds sedert lang en de lijderes was zeer verzwakt; de afwezigheid van het pijnlijk gevoel bij de aanraking en de revens ongewoon uitgezette *Uterus* pleitten alles behalve voor eene omkeering. De lijderes herstelden wij volkomen, doch zij kreeg spoedig daarop in de derde maand miskraam. — Eenige *Mola's*, die op het gevoel even als de omgekeerde bodem der baarmoeder zich voordeden, hebben wij na verlossingen waargenomen, en derzelver afscheiding door middel eener binnengevoerde spons en van inspuitingen bevorderd, en met OSLANDER's kleine tang vóór de nageboorte weggenomen.



voelt de kraamvrouw geene pijnen, de *Uterus* is boven de schaambeenderen gewelfd, buitengewoon uitgezet en gevoelig; tusfchen eene *Mola* en de baarmoeder kan men bij het onderzoek den vinger of eene *Sonde* mede in de hoogte voeren, hetgeen bij eene omkeering niet mogelijk is, enz.

### §. 250.

Een Polyp der baarmoeder zal met eene omkeering derzelve, die onmiddellijk na de verlossing of in het kraambed ontstaat, niet zoo gemakkelijk verwisfeld worden; doch bij verouderde omkeeringen, waar de bloedvliet ophoudt, en de baarmoeder zich verkleint en de mond derzelve zich spleet- of ringvormig om den omgekeerden bodem heeft zamengetrokken, kan men ligt misleid worden, inzonderheid als de bodem eene peervormige gedaante verkrijgt, en in dit geval heb ik dikwijls met ervarenen mannen mij bedrogen gevonden (*RUST's Magazin für die gesammte Heilkunde. 4ter Bd. 3tes Stück*), nimmer echter bij twijfeling omtrent het gebrek de afbinding of *Extirpatie* ondernomen, gelijk *PETIT* (*Recueil des actes de la Société de Santé de Lyon*, pag. 103) een geval verhaalt; ook wordt er een afgebonden *Uterus* bewaard in de verzameling van *RIBKES*, zich bevindende in het Verlossings-Instituut der Koninklijke Universiteit. De onderscheidingsteekenen zijn de volgende: polypen kunnen in ieder levenstijdperk plaats grijpen; eene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder ontwikkelt zich alleen bij de geboorte of terstond na dezelve in het kraambed; polypen echter zelden ge-

gedurende hetzelfde (\*); de baarmoeder treft men na de verlossing, ter grootte van een kinderhoofd, hard en tezamengetrokken boven de schaambeenderen aan, bij de omkeering vindt men den buik boven die beenderen ledig, en tevens ontbreekt het vermelde gezwel; de vorm van den polyp is van boven dun en van onderen breed, bij de binnen-buitenwaartsgekeerde baarmoeder heeft het tegendeel plaats, bij eene verouderde omkeering nogtans, waar de baarmoedermond zich te voren om den binnen-buitenwaartsgekeerden bodem heeft zamengetrokken, ontmoet men het juist geheel anders om; dan toch is de omgekeerde bodem van onderen breed, gelijk eene peer gewelfd en van boven dun; bij een' zeer grooten polyp in de scheede voelt men altoos slechts weinig van den baarmoedermond, bij de omkeering zonder uitzakking der baarmoeder van eene geringe grootte, is het *Ostium Uteri* zeer uitgezet en geopend; bij de terugbrenging der omgekeerde baarmoeder neemt men ver-

min-

(\*) Beginnenden Verloskundigen kunnen wij niet genoeg aanbevelen, bij twijfeling in de onderscheiding van eenen Polyp of eene binnen-buitenwaartsgekeerde baarmoeder, alvorens het verloskundig onderzoek in het werk te stellen, zich bekend te maken met de levensgeschiedenis der lijdende, als ook hoe zich alles bij de voorafgegane verlossing heeft toegedragen, opdat het hun niet gelijk ons ga, wien men alles met opzet verzweg en dadelijk bij de lijderes bragt, ten einde haar met de hand op te nemen: het voorafgegane is tot eene nauwkeurige onderscheiding van ongemeen veel belang.



mindering van toevallen, bij die des polyps daarentegen vermeerdering derzelve waar. Krabt men met den nagel des wijsvingers aan de omgekeerde baarmoeder of raakt men haar met eene binnengebrachte, spitse sonde aan, dan is dit der lijderes in het eerste geval gevoelig, in het tweede geval echter ontwaart zij eene stekende pijn; de polyp verwekt bij de opgegevene proef pijn noch steking, trouwens, wij herinneren ons een geval van eene dame, die, bij de in het werk gestelde proef, steken en pijnen ontwaarde, desniettemin was het een polyp, dien wij voor vier jaren met gelukkig gevolg wegnamen, en evenmin, als in al die gevallen, waar wij de uitpelling met onze schar ten uitvoer bragten, op nieuws zich ontwikkelde. Zelfs kan men de *Inversio Uteri* buiten de scheidde, met eenen buiten dezelve hangenden polyp verwisselen, nademaal de vorm van de omgekeerde baarmoeder met dien van den polyp veel overeenkomst heeft, — beide zijn van onderen dik en van boven dun — en men aan het onderste gedeelte des polyps zoo min eene opening kan ontdekken, als aan de binnenbuitenwaartsgekeerde baarmoeder. Het nauwkeurigst onderzoek alleen kan ons hier in de onderscheiding des gebreks tot zekerheid geleiden; men vindt namelijk, allereerst dat de binnen-buitenwaartsgekeerde baarmoeder boven, in de scheidde, door den baarmoedermond in den vorm van eene plooi, of liever van een' ring omgeven is, door welken hare bodem afgezakt is; deze plooi mist men bij den polyp; bij een' polyp kan men den vinger of eene *Sonde* in de scheidde hoog opvoeren,

doch

doch dit is geenszins het geval bij de omgekeerde baarmoeder; de steel of het bovenste dunnere gedeelte van den polyp is hard en vast op het gevoel, dat der baarmoeder integendeel week, medegevend en flap, wijl het hol is; tot de *Inversio Uteri* gaf eene voorafgegane verlossing aanleiding; de omgekeerde baarmoeder is bij de betasting pijnlijk, de polyp niet.

### §. 251.

Eene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder kan men allerzeldzaamst of nimmer met de enkele uitzakking verwarren, naardien men het scheidegedeelte in deszelfs natuurlijke gedaante en stand vindt, waardoor de baarmoeder niet afzakken kan. Eer is het mogelijk, dat men in de *Diagnosis* des gebreks faalt, wanneer eene uitzakking der baarmoeder met eene binnen-buitenwaartskeering der scheidde verzeld is, vermits deze ook bij eene aanwezige *Inversio Uteri* wordt waargenomen; doch ter onderscheiding heeft men niets zekerder, dan den, aan het uiteinde zichtbaren, baarmoederhals. Bovendien is de uitwendige vlakke der uitgezette baarmoeder volkomen glad, die der binnen-buitenwaartsgekeerde echter raauw, oneffen, bloederig en dikwijls met overblijffels der nageboorte bedekt; de warmtegraad des *Uterus* is bij de omkeering, ten minste bij de, na de bevalling en vroeg in het kraambed ontwikkelde, nogtans niet bij de verouderde, verhoogd, bij de uitzakking verminderd; bij de omkeering is de baarmoeder met bloed, bij de uitzakking met slijm bedekt; bij de onvolkomene omkeering der baarmoeder is de holte des bekvens

door



door een' evenredigen, bollen, halven kogel gevuld, bij de uitzakking der baarmoeder treft men dezen vorm niet aan; eene omkeering der baarmoeder is pijnlijk, eene uitzakking oneindig veel minder, dikwerf alleen gevoelig; de *Inversio Uteri* openbaart zich in vereeniging met algemeene, hoogst gevaarlijke, onrustbarende verschijnselen, de uitzakking der baarmoeder heeft slechts weinigbeteekenende verschijnselen tot gezellen.

### Oorzaken.

#### §. 252.

Vele vrouwen, bij welke geene zeer hevig werkende oorzaken de omkeering der baarmoeder tijdens of na de verlossing verwekten, schijnen eene zekere voorbeschiktheid daartoe te hebben; MEISSNER (\*) meent deze te vinden in de lichaamsgesteldheid zelve bij voorwerpen van een *phlegmatisch* temperament, slappe vezel en teeder lichaamsgestel, of in de levensmanier der zwangeren, wanneer deze door het aanhoudend gebruik van slijmige en meelachtige spijsen, van warme, verflappende dranken, te langen slaap en dergelijken tot de kwaadsappigheid medewerkt; wijders het misbruik van te warme en verflappende baden kort voor de bevalling, het inbinden van den buik tijdens de zwangerschap tot de bevalling, gebrek aan lichaamsbeweging, vrijsterziekte (*Hysterie*) enz. Eindelijk ligt deze aanleg in slapheid der banden, waterzucht,

wit-

(\*) a. a. O. *Th.* pag. 20—21.

witten vloed, verzwering van den *Uterus*, te overtollige maandstonden, langdurige *Diarrhoeën*, buikloop, het te lange zogen en dergelijke verzwakkende dingen meer. Bij zulk eene voorbeschiktheid kan, vooral bij krachtige en schielijk op elkander volgende weeën, bij eene krampachtige, in het bijzonder op den bodem der baarmoeder en naar het middelpunt werkende zamentrekking, of reeds bij eene tot perfsing gedwongen barende, na de verlosfing des kinds bij de afdrijving der nageboorte of na dezelve, ja zelfs later in het kraambed, eene binnen-buitenwaartskeering zich ontwikkelen. In diervoege zagen wij haar tweemaal in een' volkomen graad ontstaan, zoodat de omgekeerde baarmoeder, als een gewoon vleeschgezwel, tusfchen de dijen lag; in een geval werden wij geroepen, waar wij de barende, ter oorzake van bloedverlies, zieltogende vonden; haar Verloskundige had haar verlaten, en zonder nader onderzoek, en zonder zich van het, tusfchen de dijen liggende, gezwel te overtuigen, kaneeltinktuur en omslagen van azijn en water voorgeschreven; nog even kon ik de bevallene door de dadelijke terugbrenging van den binnen-buitenwaartsgekeerden en uitgedreven' *Uterus* redden. In meer dan zes gevallen zag ik in het kraambed de binnen-buitenwaartskeering zich onvolkomen ontwikkelen, zonder dat bij de bevalling eene hevig werkende oorzaak daartoe aanleiding had gegeven. FRIEDR. MEISSNER t. a. p. en RUISCH (*Advers. anatom. Dec. II. pag. 31*) verhalen dergelijke gevallen van vrijwillige binnen-buitenwaartskeeringen, en gelijk deze enkel en alleen door eene



willekeurige werking der buikspieren en des middelfrifs, door drukking of de natuurlijke zwaarte der ingewanden in een' onvolkomen graad kan veroorzaakt worden, desgelijks kan zij ook het gevolg zijn van buikwaterzucht der zwangeren, en *organische*, ziekelijke veranderingen van den onderbuik, die met een' vermeerderden omvang der ziekelijke deelen gepaard gaan, en dienswege door hunne zwaarte en drukking op den bodem der baarmoeder werken; wij zijn op grond onzer ondervinding het hiermede volkomen eens. HENKEL geeft, als oorzaken van de wording dezes gebreks, naweeën, kramp en stuipen, op, die toch slechts onder zekere voorwaarden hetzelfde kunnen verwekken. — Bij te groote zwakte der baarmoeder en bij een' te wijd bekken, kan, ingeval eener schielijke ontlasting der baarmoeder van vruchtwater en kind, inzonderheid bij eene te hooge ligging van het bovenste gedeelte des ligchaams, mitsgaders door opgevolde darmen en eene gelijktijdige medeperfing, eene binnen-buitenwaartskeering des *Uterus* ontstaan. Desgelijks bij eene te vaste aaneengroeiing des moederkoeks met de baarmoeder, of van het vaatvlies met haren voorsten wand (\*). Dat het gebrek bij vrouwen, welke de terugbrenging van hetzelfde, bereids eenmaal ondergaan hebben, in een volgend kraambed, schoon niet in volkomen, toch in een' onvolkomen graad zich weder kan openbaren, daarvan zijn wij door

(\*) Men zie des Schrijvers waarneming eener opmerkingswaardige oorzaak van baarmoederlijken bloedvliet in zijne *Lucina*, II. Bd. 1 St. N°. 6.

door twee gevallen in onze praktijk overtuigd. Bij eene vermelde voorbeschiktheid kunnen, wel is waar, hevig werkende invloeden als gelegenheid-gevende oorzaken, des te ligter de binnen-buitenwaartskeering te weeg brengen; is echter het werkend geweld van eenige beteekenis, dan is de opgegevene voorbeschiktheid altijd niet noodig, zijnde de volgende alleen vermogend genoeg haar te doen ontstaan, als daar zijn: drukking van buiten op den bodem der baarmoeder met de handen tijdens de geboorte, des kinds of de afdrijving der nageboorte, het gebruik van zware zandkussens of van te sterk inbindende buikgordels, het geweldige persen, hoesten of blazen in de handen, ten einde de afzondering der nageboorte te bespoedigen, de ruwe poging om door rukken aan de navelstreng den moederkoek af te halen, te schielijke of overeind staande verlossing, vooral bij eene op zich zelve te korte, of door omstrengeling verkorte navelstreng, of dat het kind op den grond valt, te spoedige afhaling des kinds met de tang, of te plotseling plaatsgrijpende verlossing van hetzelfde met ingescheurde vliezen van het ei, waaruit wij in de zevende maand der zwangerschap eene volkomene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder zagen geboren worden; eene met de baarmoeder vergroeide *Mola*, die na de geboorte des kinds terugblijft, en of tot aanhoudend persen, of tot afhaling van den kant des Verloskundigen of der Vroedvrouw aanleiding gaf.



*Gevolgen en Uitgangen.*

## §. 253.

De gevolgen van eene *Inversio Uteri* na de geboorte zijn, vooral bij eene groote zwakte der baarmoeder, of voorafgegane hevig werkende oorzaken, hoogst gevaarlijke bloedvliet met al deszelfs gevaarlijke verschijnselen, met name duizeling, duisternis voor het gezigt, oorensuizing, geeuwen, zuchten, steenen, flauwten en menigmaal ook stuipen, ten gevolge van het ondergane geweld. Eene volkomene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder, vooral met eene uitzakking, kan plotseling door den dood achtervolgd worden, hetzij door bloedstorting of door doodelijke flauwten en stuipen, ook kan zij langzamerhand, ontsteking of uitzetting der blaas verwekken; met de ontsteking openbaart zich koorts, verhoogde pijn, moeilijke ademhaling, braking, stuipen en ijling. De *Uterus* zwelt op, en wordt nu dit verschijnsel als ook de ontsteking niet spoedig weggenomen, dan is heetvuur het onvermijdelijke gevolg; of de lijderes herstelt, na hevige pijn en perfsingen geleden te hebben, onderwijl de baarmoeder zich allengs tot haren natuurlijken omvang verkleint, klagende de vrouw in het vervolg over weinig hindernissen. LA MOTTE haalt bl. 383. eene vrouw aan, die mischien dertig jaren met eene omkeering der baarmoeder behebt was, en hiervan hebben wij twee voorbeelden, en inzonderheid in het *Julius*-hospitaal te *Wurzburg*, in het *Leprozenhuis*, bij meer oude vrouwen binnen-buitenwaartskeeringen aange-

trof-

troffen, die een' zeventig- tot tachtigjarigen ouderdom bereikten, en, behalve een' onbeduidenden witten vloed, anderszins geen ongemak hadden. Ondertusfchen is de uitgang niet altijd zoo gelukkig; de onvruchtbaarheid nu nog eens ter zijde gezet, dan kunnen toch zulke vrouwen bestendig aan overtollige en verzwakkende maandftonden lijden; de baarmoedermond kan met den binnen-buitenwaartsgekeerden bodem aaneengroeijen en tot knoestgezwel overgaan, en is eene onvolkomene omkeering der baarmoeder in het kraambed met een aanhoudend bloedverlies tot ftand gekomen, dan kan in dit, even als in het andere geval, eene uitteerende koorts het doodelijke gevolg zijn.

### *Voorzegging.*

#### §. 254.

De voorzegging is gunftig, zoodra het gebrek flechts vroegtijdig erkend en de noodige doelmatige hulp, vooral bij eene bloedftorting, fchielijk wordt toegebracht; wij, die dit gebrek zoo menigmaal in alle graden hebben waargenomen, verloren nog nooit eene kraamvrouw, doch twifelen niet, dat bij eene hevig werkende oorzaak, door welke bij eene aaneengroeijing van den moederkoek en deze met geweld wordt uitgetrokken en afgefcheiden, de bloeding zelfs bij de tijdigfte en doelmatigfte hulp doodelijk kan worden, zoodra er een gedeelte van den *Uterus* mede afgefcheurd is. Eene onvolkomene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder in het kraambed is niet zoo fchielijk doodelijk,



schoon zij ook miskend wordt, zij kan nogtans, ten  
 gevolge van aanhoudend bloedverlies en der omkee-  
 ring zelve, nog andere gewigtige ziekten veroor-  
 zaken, welke de herstelling der lijderes moeilijk  
 maken. MAURICEAU (*Observ.* 355.) verhaalt van  
 eene vrouw, die bij eene miskende binnen-buiten-  
 waartskeering en verwaarloosde hulp eerst na een  
 lijden van acht maanden overleed. HENKEL (*Nov.*  
*Act. phys. med. Acad. Nat. Curios. Tom. III.*  
*Observ. XI.*) zag in een geval den dood met acht da-  
 gen volgen. Buitendien zijn nog de volgende voorzeg-  
 gingsregelen onder de aandacht te houden. Zwakke,  
 kwaadfappige en tot flauwten en stuipen geneigde  
 gestellen zijn ten aanzien van den baarmoederlijken  
 bloedvliet bij eene binnen-buitenwaartskeering dezes  
 ingewands aan grooter gevaar onderhevig, dan vol-  
 bloedige, anderszins gezonde vrouwen, wier her-  
 stellingsvermogen inzonderheid op een' hoogen trap  
 staat. — Hoe schielijker bij eene binnen-buiten-  
 waartskeering de *Uterus*, zich zamentrekkende, in  
 omvang afneemt, des te onbeduidender is het bloed-  
 verlies en des te minder gevaar heeft men te dach-  
 ten. Eene binnen-buitenwaartskeering zonder uit-  
 zakking der baarmoeder buiten de teeldeelen fluit  
 minder gevaar in zich, dan die, waar zulks het  
 geval is, desgelijks de onvolkomene minder,  
 dan de volkomene *Inversio*. — Hoe vroeger en  
 hoe meer ter regter tijd de hulp verleend wordt, des te  
 meer hoop op genezing der kraamvrouw; — hoe later,  
 des te gevaarlijker is zij en des te minder hoop op  
 redding der lijderes, inzonderheid als de herstelling  
 niet meer gelukt; intusschen is het door CARL

CASPAR SIEBOLD (den vader des Schrijvers) vermeldde, en door ARMBRÜSTER medegedeelde geval opmerkenswaardig (\*), wyl gene, eerst na achttien uren met alle inspanning in het werk gesteld, toch nog gelukte, en onaangezien het aanmerkelijke bloedverlies de lijderes binnen zes weken tijds genezen is. — Eene binnen-buitenwaartskeering, ten gevolge van hevige rukken aan de navelstreng, is het allergevaarlijkste en menigwerf terstond dooddelijk. — Een hooge graad van ontsteking en koudvuur heeft, zoodra hij zich bij eene binnen-buitenwaartskeering voegt, gemeenlijk den dood ten gevolge; een door CUMPARDONI (*Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie etc.* Tom. IX. pag. 436) bekend gemaakt geval van een' binnen-buitenwaartsgekeerden, reeds in koudvuur vervallen en gelukkig teruggebragten *Uterus*, met den gelukkigen uitgang van vier later plaats gehad hebbende, voorspoedige verlosfingen, behoort tot de zeldzaamste bijzonderheden. — Bij een te wijd bekken is de omkeering minder gevaarlijk, dan omgekeerd, vermits de *Uterus* ligt bij eene hevig werkende oorzaak in hetzelfde beklemd en niet terug gebragt kan worden. In een door WILMER (*Cases and Remarks in Surgery etc.* London 1779) waargenomen geval van een' beklemden, binnen-buitenwaartsgekeerden, en bij het leven niet terug te brengen *Uterus* was na den dood de schaambeenssede nog noodig, om de herstelling te bewerken.

Ge-

(\*) F. J. ARMBRUSTER, *Dissert. sistens felicem uteri post partum inversi repositionem.* Argentorati 1776.



*Geneeswijze.*

## §. 255.

De eerste en gewigtigste aanwijzing ter genezing is, de binnen-buitenwaartsgekeerde baarmoeder zoo schielijk mogelijk terug te brengen, hetgeen ligt te doen is, als het gebrek slechts tijdig genoeg herkend wordt. Te dien einde geve men eene doelmatige ligging, overeenkomende met de, bij de uitzakking der baarmoeder, §. 209 opgegevene. Wordt de binnen-buitenwaartskeering van eene volkomene uitzakking begeleid, is alzoo de bodem zoo ver uit de teeldeelen afgezakt, dat hij tusschen de dijen ligt, dan moet men eerst, met eene of met beide handen, den voorliggenden met olie bestrekenen vleeschklomp voorzigtig in de scheede terugbrengen; is dit het geval niet, of heeft men den bodem in de scheede terug gebragt, dan vat men het gezwel met de hand, drukt hetzelfde eenigzins zamen en schuift het behoedzaam opwaarts, in de rigting van de bekkenas, tot binnen den baarmoedermond, plaatst dan de vingertoppen der kegelvormig gevouwene hand tegen het midden van den omgekeerden bodem, en stuwt hem in de rigting van de overlangsche middellijn der baarmoeder zoo ver naar boven, tot de afgezakte baarmoeder geheel binnen zich zelve teruggekeerd is, waarbij de vingers des noods den mond der baarmoeder verwijden. Is men in de herstelling volkomen geslaagd, dan laat men de hand nog binnen de baarmoeder, tot zij zich volkomen en regelmatig heeft zamengetrokken, en men voor eene nieuwe

afzakking der baarmoeder beveiligd meent te zijn. Mogten de zamentrekkingen niet sterk genoeg en spoedig volgen, dan betaste men, ter opwekking van deze, de inwendige vlakke der baarmoeder met de vingers van alle kanten, terwijl de andere ter terugbrenging niet gebezigde hand, den buik van buiten zachtens wrijft. Ontstaan hierop nog geene krachtige zamentrekkingen, dan verdienen inwrijvingen van zwavelaether (*Aether sulphuricus*) op den onderbuik, inwendig kaneeltinktuur, Phospherzuur, en, volgens BENJAMIN OSIANDER, de *Borax* aanprijzing. Na de kunstbewerking verbiede men der lijderes alle perſing, ſchrijve rust, en eene zijdelingsche ligging in het bed, met het bekken zeer hoog, voor. Wijders verlate men de kraamvrouw niet te vroeg, en geve acht, of zich niet andermaal eene binnen - buitenwaartskeering ontwikkelde, alſdan ontwaart de lijderes veelal, met perſingen vergezelde, pijnen, en openbaart er zich op nieuws bloedvliet; in dit geval moet men de terugbrenging andermaal met de hand en de vingers, volgens de opgegevene manier, hervatten, en bij een aanmerkelyk verlies van krachten, en flauwten der bevallene, gepaste, de levenskrachten ſpoedig opwekkende, middelen toedienen. Heeft zich enkel eene onvolkomene uitzakking tot dien graad ontwikkeld, dat daarbij de baarmoedermond verwijd en alleen voorbij denzelven een gedeelte van den omgekeerden bodem of het ligchaam der baarmoeder kan gevoeld worden, en de bloedvliet aanhoudt, dan gebruik ik met bewezen nut eene afgeronde, op het voorſte uiteinde van eene, op de wijze der



*Porte - Plumaceau* van BOËR gekromde, horen baarmoederbuis bevestigde, spons, welke ik door de scheede tot aan den baarmoedermond breng, daarmede den omgekeerden bodem terug drukkende, en laat denzelfven zekerheidshalve door eene andere, daaromtrent onderrigte vrouw zoo lang aandrukken, tot de baarmoedermond zich meer begint zamen te trekken en men van een' bloedvliet niets meer te duchten heeft. Vele Verloskundigen, en vooral FRIES, prijzen een houtje of staafje, van boven met een rond knopje voorzien, aan; BURNS geeft de voorkeur aan den vinger; want drukt men enkel op het gezwel, zonder het tevens zamen te drukken, dan verwekt men hevige, naar onderen dringende, pijnen, zijnde deze menigwerf met vermeerdering of terugkeering der bloeding vergezeld, en drukt men onder alle omstandigheden op de baarmoeder, dan spuit uit de kleine aderen bloed, even als uit eene slagader, bij eene bloedige kunstbewerking. Deze gevolgen staan wij toe bij de volkomene binnen-buitenwaartskeering, voornamelijk met eene uitzakking, en zoo lang de voorgedrongen *Uterus* niet binnen den baarmoedermond gebragt is; heeft men dit evenwel met de hand en de vingertoppen bewerkt, dan hebben wij, die bereids in acht gevallen van de genoemde drukking door middel van eene, op eene baarmoederbuis bevestigde, spons gebruik maakten, nooit eene terugkomende bloeding en binnen-buitenwaartskeering waargenomen.

#### §. 256.

Is de moederkoek nog met den binnen-buitenwaarts-

waartsgekeerden bodem der baarmoeder verbonden, dan moet men denzelven niet dadelijk afscheiden, maar wel overwegen, of het niet beter zij, denzelven met de baarmoeder terug te voeren; dit is het geval, als de baarmoedermond open en deze afscheiding des moederkoeks nog nergens begonnen is; de grootere verwijding van den baarmoedermond laat de terugbrenging van den binnen-buitenwaartsgekeerden *Uterus* met de *Placenta* in dit geval wel toe, terwijl men, nadat de terugbrenging geschied is, de zamentrekking der baarmoeder bevordert, als wanneer de moederkoek van zelven los en uitgedreven wordt. Of evenwel de terugbrenging des *Uterus* met de *Placenta* dan nog mogelijk is, als de omkeering met eene aanmerkelijke uitzakking der baarmoeder vereenigd en de moederkoek grootendeels afgescheiden is, trekken wij zeer in twijfel, daar in dit geval de baarmoedermond veelal zamengetrokken is en dus ruimte voor de *Placenta* gemist zal worden. Ook heb ik eenmaal de binnen-buitenwaartskeering van den voorsten wand des *Uterus* door de onnatuurlijke zamengroeiing van het vaatrijk vlies (*Chorion*) zien ontstaan: de moederkoek was voor het grootste gedeelte los; ik scheidde het vaatrijk vlies omzigtig af, nam den schier losgeworden moederkoek weg, en ondernam terstond daarop de terugbrenging, ten gevolge waarvan de sterke bloedvliet ophield.

#### §. 257.

Bij wijlen is echter de baarmoedermond over den binnen-buitenwaartsgekeerden bodem der baarmoeder  
zeer



zeer krampachtig zamengetrokken, waardoor de terugbrenging hoogst bezwaarlijk of geheel onmogelijk wordt. In dit geval heeft de bloedvliet afgenomen of gansch en al opgehouden, de afgezakte *Uterus* is meer gezwollen en droog, desgelijks de scheede; de baarmoedermond is hoogst gevoelig bij de aanraking, knelt den binnen-buitenwaartsgekeerden bodem, als eene gespannen dikke darmsnaar, te zamen, de lijderees gevoelt de hevigste, persende pijnen, de pols is rad en krampachtig, de ledematen zijn meer koud op het gevoel, de tong is droog, het gezigt bleek, hierbij voegen zich flauwten, algemeene kramp en bij wijlen stuipen, welke vermeederen, zoodra men de terugbrenging beproeft. In dit geval stake men iedere poging; daarentegen schrijve men krampwerende, zenuwbedarende middelen voor, als *Extractum Hyoscyami*, *Aq. Amygdalarum cohobata*, *Liquor Ammonii succinatus*, *Castoreum* en bij voorkeur *Opium* met vluchtige middelen, en krampwerende, laauwwarme inspuitingen in de scheede van een afkooksel der *Herba Cicutae*, — *Hyoscyami*, — *Belladonnae*, van een kamillenaftrekfel met heulsap, het inwrijven van den baarmoedermond met opiaatzalf, en bij eene aanmerkelijke zwelling van den binnen-buitenwaartsgekeerden en uitgezakten *Uterus* koude omslagen van water of loodwater; laat de kramp na, dan beproeve men eerst, de uitgezakte baarmoeder, al ware het slechts, tot binnen de scheede terug te brengen; later en zoodra de lijderees weder eenigzins beter wordt, kan men de terugbrenging verder ondernemen, en indien de zamengetrokken baarmoedermond nog hinderpalen mogt in den

den weg zetten, dan trachte men denzelven, vooral ingeval van een' nieuwen bloedvliet met de vingers te verwijderen, en den binnen-buitenwaartsgekeerden bodem geheel binnen den baarmoedermond terug te schuiven, voorts handelende gelijk §. 255 is opgegeven.

### §. 258.

Ten gevolge eener verwaarloosde binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder in het kraambed, ondoelmatige behandeling van handgrepen en de aanwending van hevig prikkelende en zamentrekkende bloedstelpende middelen, kan, inzonderheid bij eene miskende omkeering, ter oorzaak van bloedvliet, eene aanmerkelijke ontsteking en zwelling daarbij komen, die ook ligt in heetvuur overgaat. De ontsteking en het, ten gevolge derzelve, gevormde gezwel van den binnen-buitenwaartsgekeerden bodem der baarmoeder maakt de terugbrenging onmogelijk, terwijl alle geweldige pogingen daartoe doodelijk kunnen zijn. In dit geval moet men vooraf de ontsteking beteugelen; te dien einde diene men inwendig verkoelende middelzouten, *Emulsiën* met salpeter toe, doe in geval van hoogen nood en als de lijderes niet reeds te veel bloed verloren heeft, en de binnen-buitenwaartsgekeerde baarmoeder zeer droog, heet, hard en pijnlijk is, eene aderlating op den arm, late haar het bed houden, en de omgekeerde en uitgezakte baarmoeder met verzachtende en verdeelende kruidenaftreksels van *Flor. Malvae*, *Sambuci*, *Chamomillae*, *Herba Cicutae*, *Hyoscyami*, *Rad. Althaeae*, *Farina Semin. Lini*,  
war-



warme melk en dergelijke baden of stoven. Of  
 bloedzuigers of inkervingen van nut of nadeelig  
 kunnen zijn, uit hoofde van verbloeding uit eenig  
 gewigtig vat, kan ik, op grond van ondervinding,  
 niet bevestigen; de onschadelijke en heilzame uit-  
 werking der eerste zag ik in eenige gevallen bij de  
 volkomene uitzakking der baarmoeder zonder binnen-  
 buitenwaartskeering buiten het kraambed; bij de  
 binnen- buitenwaartskeering zou ik, indien het noodig  
 ware, en de opgegevene middelen op de zwelling en  
 hardheid niets vermogten, noch de terugbrenging  
 toelieten, voorzigtig in het werk gestelde inkervingen  
 boven de bloedzuigers verkiezen, gelijk bij het, uit  
 het *Med. Journaal*. vj. 367 medegedeelde, geval,  
 waar, ten gevolge der beklemming, heetvuur dreigde  
 te ontstaan, en men de baarmoeder met de beste  
 uitkomst *scarificeerde*; het gezwel verdween dadelijk  
 en de lijderes werd geheel hersteld. — Is de ont-  
 steking bereids tot heetvuur overgegaan, dan doe  
 men insgelijks inkervingen, poge het koudvuur door  
 uitwendig aangelegde *Antiseptica*, als daar zijn kina,  
 tinktuur van *Mirrhe*, terpentijnolie, kamferbrande-  
 wijn met water verdund, tegen te gaan en de af-  
 scheiding van het verstorvene te bewerken, en  
 schrijve inwendig, overmits het gebrek in dezen  
 graad veelal met eene slepende zenuw- of rotkoorts  
 zamengaat, voedende en versterkende middelen voor,  
 bij voorbeeld *Lichen islandicus*, *China*, *Serpentaria*,  
 kamfer, wijn en dergelijken, en onderneeme nader-  
 hand de terugbrenging van het nog overige gedeelte  
 des omgekeerden *Uterus*; is deze nu gelukt, dan  
 kan zich nog het overige verstorvene, door inspui-  
 tin-

tingen en het aanhoudend gebruik der opgegeven voedende en versterkende middelen afscheiden. Uit dien hoofde zij men niet te haastig met de afbinding, die men anders als het eenige middel heeft aangeprezen, vooral omdat zij, te vroeg ondernomen, hoogst gevaarlijke gevolgen kan naar zich slepen. Slechts dan, wanneer het koudvuur zich over de gansche baarmoeder heeft uitgebreid, kan de wegneming door middel der afbinding aangewezen zijn (\*). Alvorens men deze onderneemt, moet men vroeger de baarmoeder op hare meest verhevene plaats, zoo ver, als even ter inbrenging eener hand vereischt wordt, openen, en met deze nauwkeurig onderzoeken, of er geene darmen, of een gedeelte van het net in den, door den *Uterus* gevormden, zak zich bevinden. Een met was, of nog beter met pik overtogen draad wordt, voort in den beginne, alvorens men den bodem der baarmoeder opent, zoo hoog mogelijk tegen het gewelf der scheede opgebragt, het bindsel aanvankelijk los aangelegd, en, ingeval er darmen in den zak liggen, de-

(\*) Onlangs is deze voor het eerst zeer gelukkig in het werk gesteld geworden; men zie des Schrijvers *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*. V. Bd. 2. St. Uitpelling van eenen binnenbuitenwaartsgekeerden, heetvurigen *Uterus* door WEBER en V. Bd. 3. St. Waarneming en gelukkige genezing eener volkomen omgekeerde, met *Fungus haematodes* bezetten en koudvurig gewordene baarmoeder, benevens de afbeelding, door RHEINECK. Men zie FRIES, t. a. p. bl. 156, en MEISSNER, t. a. p. bl. 143.



deze eerst met de hand teruggeschoven, en dan eerst de draden zoo vast en sterk toegetrokken, als ter afbinding der baarmoeder zelve, en ter stelping van een' veeltijds onbeduidenden bloedvliet uit een schier verstorven deel, noodig is. Zijn net, noch darmen in den zak voorhanden, dan kan men het bindsel terstond strak en zoo sterk aanhalen, als de verlostte verdragen kan; daarop vereenigt men van voren de einden der draden, schuift ze door een kanul, en bevestigt ze aan de op beide zijden des handvatfels zittende haken; naderhand kan men het bindsel sterker toehalen. RHEINECK maakte voorzigtigheidshalve nog van den polyp-onderbinder van BOUCHER gebruik, dien hij achter den knoop en door een zeer voordeelig *Mechanismus* zoo vast mogelijk aanlegde. De opvolgende overgroote zwakte der lijderes en de geneigdheid tot rotkoorts gaat men met de boven opgegeven geneesmiddelen tegen, en bijaldien de afscheiding niet spoedig geschiedt, en de bodem der baarmoeder grootendeels door het koudvuur verwoest is; dan kan men ook, inzonderheid om den ondragelijken stank, denzelven met het mes afsnijden, zoo als ik dit om dezelfde reden na de onderbinding van eenen baarmoederpolyp gewoon ben te doen (\*); daarop doe men inspuitingen van salie, garstenwater met tinctuur van *Mirrhe*, een afkooksel der kina met wijnazijn, of verdunden kamferbrandewijn, ten einde de

(\*) Men zie des Schrijvers *Handboek voor de Kennis en Genezing der Ziekten van het Vrouwelijke Geslacht*. 1ste deel.

de scheede en de holte der baarmoeder van den stinkenden en kwaadaardigen *Ichor* te bevrijden; gaat men met dezelve en dergelijke waschingen, ook vervolgens met de vermelde inwendige middelen voort, haalt het bindsel dagelijks vaster aan, en roeft de noodige afscheiding en uitwerping der afgebondene baarmoeder. Daarop schrijve men tevens een versterkend en voedend diët voor, vereenigd met de opgenoemde middelen, de inspuitingen zoo lang voortzettende, tot de wonde genezen en alle uitvloeijing van etter verdwenen is.

### §. 259.

Of in het geval §. 258, hetwelk de wegneming met de onderbinding gebiedt, ook niet de uitpelling met het mes kan ondernomen worden, kunnen wij, uit gebrek aan ervaring hierin, niet beslissen, doch gelooven, dat eene vroeg in het kraambed ontwikkelde, niet meer terug te brengen en in heetvuur overgegane, volkomene binnen-buitenwaartskeering wel zonder gevaar ten aanzien der kunstbewerking zelve met het mes kan weggenomen worden, overmits genoeg waarnemingen van de affnijding der miskende, volkomen omgekeerde baarmoeder, welke men voor een uitwas hield, bekend geworden zijn, gelijk de, door WRISBERG en HUNTER vermelde, gevallen staven; de eerste vrouw heb ik zelf in *Göttingen* onderzocht (\*). Intusschen kunnen deze

ge

(\*) Men zie ook het, in het derde stuk van het eerste deel van de, door den Schrijver, uitgegevene *Lucina*, medegedeelde geval van eene wegneming der



gevallen niet genoegzaam de geneeswijze voor de in koudvuur overgegane, binnen-buitenwaartsgekeerde baarmoeder bepalen, overmits zij onmiddellijk na de verlossing, zijnde het orgaan nog gezond, ondernomen werden; bestaat er echter koudvuur, dan zal het moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn, om de juiste grenzen tusschen het verstorvene en levende te bepalen, en dien ten gevolge de kunstbewerking, te vroeg in het werk gesteld, gevaarlijk worden; eene verder zich uitbreidende ontsteking en *Gangraena* der baarmoeder zullen de uitwerkselen zijn, en dus zouden wij, ten minste voor als nog, aan de onderbinding de voorkeur geven.

#### §. 260.

De onvolkomene binnen-buitenwaartskeering, dat is diegene, bij welke de bodem, slechts een gedeelte des ligchaams, of alleen het inwendige vlies der baarmoeder afzakt, is, of het gevolg eener volkomene *Inversio*, of zij ontstaat somwijlen eenige da-

baarmoeder, door onkunde eener Vroedvrouw veroorzaakt, ingezonden door Dr. BERNHARD. Ook Dr. CLARKE brengt een gelukkig voorbeeld bij in het *Edinb. med. and Surgic. Journal*. Vol. II. p. 419. — Een ander geval is in *Recueil des actes de la Société de Lyon* vermeld. Voorbeelden van de afsnijding der binnen-buitenwaartsgekeerde en uitpelling eener koudvurig geworden baarmoeder kan men vinden in des Schrijvers beschrijving eener geheele uitpelling van den knoestachtigen, niet uitgezakten *Uterus* in IV. B. 3. St. van zijn *Journal für Geburtshülfe u. s. w.* bl. 521—523.

dagen en later na de verlossing in het kraambed, en kondigt zich door de §. 248 opgegevene verschijnselen aan; deze is het, welke zeer ligt over het hoofd gezien en enkel door het naauwkeurigst verloskundig onderzoek onderscheiden kan worden. Het gebruik van een moedersteunfel of het fleschje van veêrkrachtige hars naar FRIES, hetgeen in den *Uterus* gebragt en door water, met eene ingestokene en af te fluitene spuit, uitgezet en door een T-verband bevestigd wordt, verdient geene aanprijzing; want eerstelijk zal het eene zamentrekking des *Uterus*, stoornis van zijne gewigtige verrigtingen, maandelijksche zuivering en ontvanging, prikkeling, ontvellingen, eene ziekelijke afscheiding en knoestachtige verharding verwekken, terwijl men dikwijls niet in staat zal zijn hetzelve weg te nemen; ten andere zal het ook aan de verkleining der baarmoeder en den overgang tot haren natuurlijken vorm hinderlijk zijn. De door JÖRG aangeprezene, in rooden wijn gedoopte kleine, spons, in vereeniging met bederfwerende inspuitingen, voldeed mij even zoo min als de, met linnen overtrokkene, en de door mijne balein in den baarmoedermond gevoerde, cilindervormige spons. Altoos echter slaagde ik bij het gebruik van de §. 255 opgegevene baarmoederbuis, aan wier voorste gedeelte eene fijne spons, geëvenredigd aan de grootte van den baarmoedermond, vastgemaakt werd; daarmede druk ik het in den baarmoedermond voelbare, omgekeerde gedeelte des bodems, des ligchaams of van het inwendige vlies des *Uterus* terug, laat de buis dag en nacht door eene goed onderrigte vrouw vasthouden, en



van tijd tot tijd aandrukken en wegnemen, om eenige malen daags inspuitingen te doen van een aftreksel der rozenbladen, der salie, der kina of van den eikenbast; spoel de buis met de spons in water om haar te reinigen, en verwissel dezelve des noods met eene nieuwe en kleinere, zoodra zich de mond der baarmoeder eenigzins meer heeft samengetrokken; is deze zamentrekking zoo ver gevorderd, dat men met den top des vingers het omgekeerde gedeelte van den *Uterus* niet meer ontdekken kan, dan laat men de buis weg, gebruikende nu alleen nog slechts zamentrekkende inspuitingen. Met waarheid kan ik de verzekering geven, dat mij dit geneesplan nog nooit bij eene onvolkomene binnen-buitenwaartskeering der baarmoeder in het kraambed mislukt is, en dat ik mij van gezegde buis reeds bediende, voor zij onder den naam van baarmoedersteunsel, in HUFELANDS *Journal* (*für die praktische Heilkunde*. xvj Bd. 4. St. S. 51) beschreven en afgebeelden toestel van LÖFFLER, bekend werd. Acht gevallen, waarin ik mijn oogmerk bereikte, om den teruggebragten *Uterus* na volkomene binnen-buitenwaartskeering terug te houden en zelfs het op nieuws ontstaan eener onvolkomene te verhinderen, doen mij geen ander middel wenschen. Of ook in het kraambed nog eene vastgroeiing van den baarmoedermond kan plaats vinden, die de terugbrenging verhindert, is mij in de uitoefening mijner praktijk niet gebleken; alleen heb ik bij eene na de afbinding eenes polyps ontwikkelde, zeer verouderde *Inversio* dit waargenomen, de vaneenscheiding echter op geenerlei wijze meer kunnen

verkrijgen. In het kraambed kan zij ligter plaats grijpen, te meer omdat de aaneengroeiing veelal door de aaneenkleving van uitgezweete *Lympha*, of een dun vlies geschiedt, welke vasthechting gemakkelijk met den *Hysterotomus* van OSIANDER kan weggenomen worden. Waar het enkel eene aaneenkleving door uitgezweete *Lympha* is, daar prijst MEISSNER (t. a. p. III. Th. S. 119), ten einde de kwetsing der scheede en des *Uterus* voor te komen, dunne, breede, van boven, zoo veel mogelijk, afgeronde baleinen, aan, brengt ze tusschen de scheede en den bodem der baarmoeder, ter plaatse der vereeniging in de hoogte, en beweegt ze naar voren en achteren, waardoor deze losfere aaneengroeiing wordt opgeheven.

#### L I T T E R A T U U R.

ARMBRÜSTER, *α. n.*

CAMPER, in zijne Mengelschriften.

WEISSENBORN, *von der Umkehrung der Gebärmutter. Erfurt 1788.*

DETHARDING, *Dissert. de Utero inverso. Rostock 1788.*

VAN WIJ, *Nieuwe Manier van Cataract- of Staarsnijding, Heel- en Vroedmeester te Arnhem. 1792.*

FRIES, *Abhandlung von der Umkehrung oder eigentlichen Inversion der Gebärmutter, m. k. Munster 1804. 8<sup>e</sup>.*

KOEPPEN, *de inversione Uteri. Rostock 1806.*

RICHTER'S *Anfangsgründe der Wundarzneikunst. vii Bd. S. 33.*

HEUSINGER, in STARK'S *Archiv für die Geburtshülfe. II. Bd. 3. St. 1790. — Neues Archiv. II. Bd. Juni 1798—1803.*

LÖFFLER, in HUFELAND'S *Journal. XVI. Bd. 4te St. p. 45.*



- A. J. DAILLET, *précis des leçons de Mr. BAUDELLOCQUE sur le renversement de la matrice. Paris 1803. 8°.*
- SAXTORPH, *gesammelte Schriften geburtsh. Inhalts. Herausgegeben von D. P. SCHEEL. Kopenhagen 1803. m. k. Act. Reg. Societ. Med. Hadn. Vol. IV. N°. 27.*
- OSIANDER'S *neue Denkwürdigkeiten. I. Bd. 2tes St. pag. 307. und dessen Lehrbuch der Hebammenkunst. Göttingen 1796. 8°.*
- COLLUMBE'S *medic. chir. Werke. Observ. 2.*
- G. V. HERDER, *diagnostisch - praktische Beiträge zur Erweiterung der Geburtshülfe. Leipzig 1803. 8. St. 119.*
- Des Schrijvers *Lehrbuch der theoretisch - practischen Entbindungskunde. I. Th. 4te Auflage. §. 622. II. Th. 3te Auflage. §. 306 - 312.*
- Des Schrijvers *Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen. 4te Auflage. §. 630 - 634.*
- ASTLEY COOPER, *in Medical - chirurgical Transactions. Vol. X. London 1819. pag. 358. — Conf. Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte. Bd. 229. — Neue Sammlung. 5ter Bd. 1. St. Leipzig 1821.*
- C. G. CARUS, *Lehrbuch der Gynäkologie u. s. w. Leipzig 1820. I. Th. §. 303. Seq. II. Th. §. 1398. sq.*
- J. CHR. JÖRG, *Handbuch der Geburtshülfe. 2te Auflage. Leipzig 1820. §. 303. und desselben Handbuch der Krankheiten des Weibes. 2te Auflage. Leipzig 1821. §. 382. sqq. und §. 644. sqq.*
- JOHN BURNS, *Grundsätze der Geburtshülfe. Aus dem Englisch von KÖLPIN. Stettin 1820. S. 563.*
- FR. A. MEISSNER, *die Umstülpung der Gebärmutter in 3ten Theile der Dislocationen der Gebärmutter u. s. w. Leipzig und Sorau 1822.*
- (Bevat eene zeer volledige Litteratuur, waarnaar wij den lezer ten opzigte der hier niet opgeteekende geschriften, verwijzen.)

---

## TWEEDE AFDEELING.

### OVER DE GEBREKEN AAN DE BORSTEN DER KRAAMVROUWEN.

---

#### EERSTE HOOFDSTUK.

##### *Over de zwerende tepels.*

##### §. 261.

Een veelvuldig voorkomend gebrek bij de zogende kraamvrouwen is het gewond zijn der tepels; tevens onder den naam van zweren, kloven der tepels, stuk gezogene tepels (*Papillae excoriatae, fissae*) bekend.

##### *Diagnosis.*

##### §. 262.

Men bespeurt, of in den ganschen omtrek der tepels, doch slechts oppervlakkig tot aan de huid, dat de tepels buitengewoon rood, ontstoken en zeer gevoelig zijn, en een' goedaardigen etter voortbrengen; of het gebrek is meer bepaald ter zijde, of grondvlakte der tepels, echter zoo diep, dat er



spleten bestaan, welke den tepel in twee tot drie  
 stukken scheiden. Zoodra het kind zuigt, gevoelt  
 de kraamvrouw eene hevige, dikwerf onlijdelijke  
 pijn, welke bij zeer gevoelige gestellen niet zelden  
 overluid weenen, hoofdpijn, tandenknerfing en kramp-  
 achtige toevallen te weeg brengt, zoo menigwerf zij  
 het kind aan de borst leggen. Soms vloeit er  
 eene aanmerkelijke hoeveelheid bloeds uit de gewonde  
 plaats, en de melk, welke het kind in den mond  
 krijgt, is daarmede vermengd, of zij zuigen, in  
 plaats van zog, slechts bloed. Met de opene  
 tepels is somwijlen eene bijzondere zamengesteldheid  
 verbonden, uit *venerische* besmetting, schurft of  
 huidgebreken voortvloeiende, dan is de zweer van  
 den tepel of de kring van denzelven niet zoo zui-  
 ver; zij heeft dikwerf het eigenaardig karakter dezer  
 zweren, en bij *venerischen* een spekachtig aanzien,  
 gepaard met andere verschijnselen van het *venerische*  
 gebrek der kraamvrouwen, terwijl het kind opge-  
 zwollen okselklieren en een' ongestelden mond heeft.  
 Op de borsten der zogenden zelve vertoonen zich  
 niet zelden kleine vlekken, die somwijlen hooggeel,  
 ook bruinachtig zijn, korsten vormen, die weder  
 afvallen, op nieuws ontstaan, droog en hard blij-  
 ven, of in spekachtige huidzweren overgaan. Bij  
 eene schurftachtige zamengesteldheid ontdekt men  
 vroeger, dan de tepels opengezogen worden en zwe-  
 ren, kleine witte puistjes, welke eene roodachtige  
 grondvlakte hebben, *Lympha* bevatten en aan de  
 moeders bereids voor de bevalling, als ook, voor  
 de volkomen aan den gang zijnde zogafscheiding, der  
 zogende spanning, branding en jeuking veroorzaken,

bij het zuigen des kinds evenwel zeer spoedig worden opgezogen en etteren; de zweren zelve scheiden een' donker gelen, somwijlen bruinachtigen etter af; op het overige gedeelte des ligchaams doen zich sporen van een schurftig uitflag op; trouwens, deze kunnen ontbreken, wanneer de schurft nog niet grondig genezen, maar slechts door ondoelmatige middelen teruggedreven was. Aan het kind neemt men bij wijlen insgelijks een dergelijk uitflag waar. De haarwormige (*herpetische*) zamengesteldheid is reeds moeilijker te onderkennen, indien men niet op de huid der borsten zelve, of aan het overige gedeelte van het ligchaam der kraamvrouw sporen van dit uitflag ontdekt, of ten minste zekere berigten van het vroeger bestaan eener vurigheid van de huid krijgt, die, op ervaring gegrond, juist in het kraambed kan verdwenen zijn. De zweren der tepels en van den kring zelven hebben veel gelijkenis met die, welke uit *venerische* besmetting haren oorsprong ontleenen.

#### Oorzaken.

##### §. 263.

Het menigvuldigste zijn voor de eerste maal zogende kraamvrouwen, en voornamelijk zulke, wier tepels de noodige verzorging in de zwangerschap ontbeerden en de vethuid (*cuticula sebacea*) behielden, met stukkende tepels behebt; buitendien hebben daartoe een' bijzonderen aanleg voorwerpen met eene zeer fijne, zachte opperhuid; vooral blonden en roodharigen, gepaard met een zeer gevoelig gestel,



huidziekten, inzonderheid langdurige, *venerifche* en fchurftige befmetting, te kleine tepels, welke het kind niet gemakkelijk, maar alleen met geweld vatten kan, en te ongelijke, misvormde, fcheef gegroeide tepels, welke bij het zuigen door het kind ligt geprikkeld worden, en verftopping der zogvaten, waardoor het kind te fterk trekken moet.

§. 264.

Aanleidende oorzaken zijn beleedigingen, bij voorbeeld met eene fpeld aan den doek, of het keurslijf, door fchuring des hemds, inzonderheid van grof linnen; door het bijten des kinds, dat overrijp en van een te fterk maakfel is, of reeds uitftekende tanden heeft; de affcheuring van de opperhuid; geweldig trekken des kinds; ontfteking der tepels door inwendige oorzaken, daartoe behooren onzuiverheden in de eerfte wegen, ophooping van gal, rozige ontfteking, vurige fcherpten; *venerifche* befmetting en fcherp zog; fcherpe prikkels van des kinds zijde, als daar zijn: fprouw, fcheurbuik en *venerifche* huiduitslagen des kinds, fcherpe zalven, voornamelijk van bedorvene, ranzige oliën en vet, waarmede de borsten ingewreven worden, prikkelende pleisters, of tepelkransen, die te naauw in betrekking tot de grootte des tepels, of met een bijtend vernis overtogen zijn; in het eerfte geval kwetsen zij de tepels, zij zwellen op en bij de wegneming fcheurt de huid af, in het tweede geval veroorzaken zij door de prikkeling des vernis ontfteking, zweren enz.

De gevolgen der stuk gezogene tepels zijn, schoon het gebrek weinig schijnt te beteekenen, dikwijls treurig en verschrikkelijk. 1) Ontstaat er hevige pijn, benevens knerfing op de tanden, welke flauwten, somtijds krampen en stuipen te weeg brengen kan. De pijn is menigwerf zoo hevig, dat de vrouwen liever de pijnlijkste verlossing nog eenmaal ondergaan willen. 2) Kramp in de zogvaten, welke de melk opstopt. 3) Ontsteking der borsten. 4) Volflagen onvermogen om te zogen; en, overwint al de kraamvrouw, uit liefde tot haar kind, de pijn, dan zuigt het, ten gevolge des gewelds, in plaats van zog, bloed uit de tepels. 5) Verettering der tepels. 6) Vereelting en ongeschiktheid tot verder zogen. 7) Het geheele verlies der tepels, vooral als de kloof aan de grondvlakte, in plaats van loodlijnig te loopen, eene dwarse rigting heeft. 8) Zogklonters, ontsteking en abscesfen der borsten zelve. 9) Zoogenaamde zogverplaatsingen, voortvloeiende uit de hevige prikkeling, waardoor kramp en koorts geboren wordt, en doordien de kraamvrouw niet meer zogen kan en de melk met geweld onderdrukt wordt.

*Voorzegging.*

De voorzegging laat zich reeds ten deele uit de gevolgen opmaken. Het gebrek, hoe onbeduidend ook, is voor de kraamvrouw altoos een onaangenaam toeval, zoodra het een<sup>o</sup> hoogen graad bereikt heeft,



heeft, en een verdrietig ding voor den Geneeskundige. Bij een' bijzonderen aanleg door eene zachte opperhuid en verhoogde gevoeligheid, gelukt de genezing moeilijk of in het geheel niet, en er kunnen, vooral bij de aanwending van ongepaste middelen, vele weken verlopen, eer men in de genezing slaagt. Stelt men dadelijk bij het begin des gebreks geschikte middelen in het werk, dan wil de genezing wel eens vroeger volgen, voornamelijk als de tepel niet oorspronkelijk misvormd en geene der §. 268 opgegevene ongesteldheden voorhanden is. Menigmaal verkrijgt men de genezing volstrekt niet, en de kraamvrouw moet eensdeels door misvorming van den tepel zelven, of om gevaarlijker gevolgen voor te komen, met zogen ophouden, als wanneer de genezing dikwerf allergemakkelijkst en door de eigene krachten der natuur binnen weinige dagen geschiedt.

#### *Geneeswijze.*

##### §. 267.

De aanwijzing ter genezing grondt zich op 1) beteugeling der ontsteking, 2) het tegengaan der verettering en 3) bedaring der daarmede gepaard gaande toevallen.

##### §. 268.

De eerste aanwijzing, de beteugeling der ontsteking, is inzonderheid bij deze ongesteldheid der tepels de gewigtigste, en men moet deze terstond te keer gaan, eer zich pijn, verettering of ontvel-

lin-

lingen openbaren. De ontsteking vermindert men door het kind van den ontstoken tepel, ten minste des nachts, af te houden, ook mag het niet te lang aan de borst blijven liggen, daar anders de ontsteking toeneemt; men bedekke in dien tusschen-tijd de borst met een' veêrkrachtigen tepelkrans, opdat de tepel niet vastkleve en de melk uitvloeije; bij te overtollige zogaffcheiding make men van een zogglas, doch niet van een zuigglas, noch een zogpomp gebruik, als die te hevig werken en de ontsteking vermeederen. Den tepel zelven late men, bijaldien geene der vermelde zamengesteldheden aanwezig is, en de ontsteking slechts ten gevolge eener werktuigelijke oorzaak na kwetsing door het sterke zuigen, ontstaan is, met een zacht lapje linnen, natgemaakt met koud water, rozenwater, verdund wondwater van THEDEN, of met een mengsel van *Aq. Rosarum*, *Aq. saturnina*, *Spiritus camphoratus* en *Mucilago Seminis Cydoniorum* bedekken, wel te verstaan, nadat men alvorens door eene gepaste weeking en zuivering, de veelligt nog aanwezige vethuid weggenomen, en den tepel met water en melk gebaad en schoongemaakt heeft. De vrouwen geven dikwerf den raad, om stuk gezogene tepels met ringvormige wortelschijven te bedekken, die, als tepelkransen en te voren in warm water geweekt, heilzaam zijn; wijders vestige men de aandacht op vermindering van den veelal te sterken toevoer van zog, en trachte dit door een' gepasten, verdunnenden, ontstekingwerenden eetregel, en door warme baden met een aftreksel van vlierbloemen in melk, de uitvloeiing van het zog en de verslapping der



der borsten te bewerken. Mogten zich evenwel door de prikkeling der borst koortsachtige bewegingen openbaren, deze door gepaste middelen te bedaren en te beteugelen. Voor het overige bedenken, dat de Geneeskundige in de particuliere praktijk zelden in het tijdperk der ontsteking geraadpleegd wordt; gemeenlijk is de tepel reeds stuk gezogen, ettert of hebben er zich scheuren of zweren gevormd.

### §. 269.

Is reeds het tweede tijdperk der verettering ingetreden en hebben er zich spleten, ontvellingen of zweren gevormd, dan blijft het, wanneer het kind nog voortgaat met zuigen, altijd eene hoogst moeilijke zaak het gebrek te genezen, nademaal juist het zuigen aan de tepels, de prikkeling, ontsteking en verettering vermeerdert. Het plan ter genezing grondt zich hier op beteugeling der verettering, en genezing der zweer. Ten einde dit oogmerk te bereiken, moet men vooraf nog op de aanwezige ontsteking en de mogelijk te overtollige plaatshebbende zogaffscheidung de aandacht vestigen, haar door de §. 267 opgegevene middelen verminderende. Ten einde de affscheidung van etter te bedaren, heeft men eene menigte middelen aangeprezen, en zelfs de vrouwen weten daarvoor vele, dikwijls zeer ongepaste, middelen aan de hand te doen, waartoe in het bijzonder de vette oliën, zalven en de rozenhoning behooren. Deze en dergelijke middelen maken, wel is waar, de pijnen in korten tijd dragelijker, doch zij verhoogen de gevoeligheid der tepels en de pijn bij het zuigen; bedaren niet alleen

de

de ettering geheel niet, maar vermeederen dezelve verre weg meer, en deze werkt dan zoo verwoestend, dat de tepel verloren gaat en wanvormige lidteekenen overblijven. Tot de middelen, welke de kunst voorschrijft, brengt men de kweepittenslijm, de slijm van arabische gom ter besmeering en het drooge poeder ter bestrooijing, den rozenhonig, het witte van het ei met kamferbrandewijn, de doijer van hetzelfde, het afkooksel van salie enkel of volgens KLUGE'S voorschrift, in de *Charité* te *Berlin*; R. *Hb. Salviae*. Zij infunde c. *Aqua fontana* q. s. ad colat. ℥iiij. adde *Syrup. communis* ℥i. M. D., den *Copaiven* en Peruviaanschen balssem, het *Unguentum de Sperma ceti*. De zalf uit witte was met verschen boter en gesmolten merg, en den spijkerbalssem. Uit het delfstoffelijk rijk priist men het zwavelzure zink, opgelost in rozenwater (vijftien greinen in vier oncen van dit water), eene oplossing van witte vitriool, van aluin, azijnzuur lood, zwavelzuur koper, salpeterzuur zilver, het *Unguentum Nitratis Hydrargyri* in den vorm eener zalf, den gebranden aluin en het zoete kwik, als poeder ter bestrooijing. Bij het gebruik der uitwendige middelen uit het mineraalrijk, welke zoo sterk worden aangewend, totdat de kraamvrouw luttele pijn ontwaart, moet men vooral toezien, dat, voor het kind aangelegd wordt, de tepels behoorlijk met melk en water worden schoongemaakt, opdat er niets terugblijve, en door het zuigende kind worde ingeslikt. Velen dezer middelen helpen slechts een' tijd lang en vereischen de afwisseling met anderen, of alle helpen somwijlen ook geheel niet,



niet, inzonderheid als het kind bij voortduring zuigt, de aanvankelijke genezing altoos op nieuws vertraagt en andermaal tot verettering aanleiding geeft.

§. 270.

Wij voor ons vonden nog het meest baat bij de, bloot, ten gevolge der werktuigelijke belediging door het sterke zuigen des kinds, veroorzaakte spleten, ontvellingen of zweren der tepels, van het poeder der arabische gom, de slijm derzelve en rozenwater, of ook R. *Pulv. gumm. Memos.* ʒij., *Balsam. Peruv.* ʒj, *Ol. amygdal. dulcium recent.* ʒi ʒ *Aquae Rosarum.* ʒi. M. D. S. ter bestrijking der tepels. Somwijlen echter slaagden wij met deze middelen even min, en dan bleef ons, wel te verstaan, als er geene andere ongesteldheid bij plaats vond, het aanstippen met den helschen steen (*Nitras Argenti fusum*) de eenige toevlugt. Zeker veroorzaakt, vooral bij zeer gevoelige kraamvrouwen, de aanwending, aanvankelijk brandende pijnen, en deswege is het raadzaam, dat men telkens slechts eene kleine plaats daarmede aanrake; doch de pijn gaat spoedig over, de genezing volgt in veel korter' tijd en des te zekerder; dit middel toch, welks naam, wel is waar, voor de vrouwen iets afschrikkends bevat, verdient, boven alle andere aangeprezene, de voorkeur, vermits zich eene korst vormt, welke de gewonde en etterende plaats zoo bedekt, dat met het zogen des kinds kan voortgegaan worden, zonder gevaar voor nieuwe verwonding; buitendien beteugelt het de verettering, en de herstelling der verloren zelfstandigheid, zoowel als de genezing, gaat on-

onder de roof vooruit, en deze valt zelfs niet eerder af, dan na de volkomene genezing. Het branden kan men door bestrijking des tepels met de opgegevene arabische gomslijm en rozenwater zeer veel verzachten, en daardoor komt men de ligt opkomende bezorgdheid, als of dit middel den zuigeling tot nadeel zou kunnen verstrekken, wanneer hij de roof inslikte of deze zijne lippen of tong kwetste, voor. Voor dit alles behoeft men geheel geene vrees te hebben; daarentegen alles van de bemoeijng van aanwezige vrouwen, of gebrek aan moed en geduld der zogende kraamvrouw. Inmiddels heb ik juist bij verstandige en met ware moederlijke liefde bezielde kraamvrouwen geleerd, wat een stout besluit, onderwerping en vertrouwen vermogten, en hoe ras zij zich van de hevigste pijnen bevrijd zagen. Ernstig evenwel raden wij aan, dat de aanwending des middels door vrouwen noch vroedvrouwen, maar door Genees-, Heel- of Verloskundigen zelven gedeeltelijk geschiede, en dat men niet alleen den tepel zelven, maar ook zijne grondvlakte van alle zijden naauwkeurig onderzoeke; doordien hier dikwerf de etterende plaatsen zich bevinden, welke eene aanmerkelijke diepte kunnen hebben. Daarenboven geve men acht, dat de hellsche steen van het zuiverste zilver, in de Apotheek bereid en aan het eene einde eenigermate langwerpig en zeer spits toeloope, ten einde alleen de stuk gezogene, etterende of gespletene plaats des tepels daarmede aan te raken. Hellsche steen, welke slecht vervaardigd, te week en met andere metalen vermengd is, heeft het nadeel, dat bij het aanstippen te veel



aan den tepel zitten blijft, hetgeen alsdan ontsteking en pijn van het naastliggende gezonde deel des tepels veroorzaakt. Zoodra de roof afgevallen is, laat men den tepel met rozenwater, een afkooksel van salie, en in vervolg van tijd met rooden wijn, bij voorbeeld goeden *Medoc*, door middel van een teekenpenseel besfrijken, hetwelk telkenmale, nadat het kind de borst gehad heeft, geschieden moet. Zijn de tepels en borsten door langdurige ettering zeer verzwakt, dan verdient ter versterking een aftreksel der kina, met wijn vermengd, alle aanprijzing, waarmede de tepels met een zacht linnen lapje gestoofd worden.

§. 271.

Wordt de Arts te laat geraadpleegd, zijn de ontvellingen en kloven zeer diep, worden zij veronachtzaamd en door het gebruik van ongepaste geneesmiddelen verergerd, heeft de kraamvrouw vrij wat koorts, klaagt zij over hitte, zware hoofdpijn, onrust en slapeloosheid, of zijn bovendien beide tepels in een' hoogen graad raauw gezogen, zoo schiet er niets over, dan het kind te spenen, en de zogaffscheiding eerst tegen te gaan, daarna geheel te beteugelen. In dit geval schrijft men een zeer verdunnend diët voor, terwijl men zachte, ontlastingwekkende zouten in kleine giften toedient, bij voorbeeld *Sulphas Sodae*, *Sulphas Potassae*, *Tartris Potassae* enz. De borsten zelve late men schorten, met watten of vlas, tusfchen zacht linnen gelegd, bedekken, en zoo de borsten nog te vol en gespannen zijn, dan moet men van tijd tot tijd het zog ont-

las-

lasting bezorgen, door de geheel gestremde uitvloei-  
 jing met baden van een vlier-aftreksel door middel  
 eener spons of het borstbad van STEIN te bevor-  
 deren, of door het opzetten van eene glazen klok  
 van STEIN zoo veel melk ontlasten, als noodig is,  
 om het gevoel van pijn en de spanning te vermin-  
 deren; het in den wind slaan dezer voorschriften  
 kan ligtelijk ontsteking en ettering ten gevolge  
 hebben.

### §. 272.

De derde aanwijzing ter genezing komt alleen  
 bij de §. 262 vermelde zamengesteldheden te pas.  
 Heeft de verettering der tepels en derzelver omge-  
 vende kring een *venerisch* karakter, dan moet het  
 kind van de borst verwijderd, het zog volgens §. 275  
 weggemaakt en een *antivenerisch* geneesplan inge-  
 slagen worden; de, met raauw gezogene tepels ge-  
 paarde, haarvormige en schurftige *Complicatie* behoeft  
 de aanwending der middelen tegen deze ongesteld-  
 heid, en zijn de ontvellingen gevolgen van de spruw  
 des kinds, dan late men de tepels met eene oplos-  
 sing van *Borax*, en vervolgens met een afkooksel  
 van salie waschen, en volge ook bij het kind het  
 bij de spruw aangewezene geneesplan.

### L I T T E R A T U U R.

MUS, *Dissert. sistens rationalem methodum curandi et  
 praecavendi quosdam muliebrium laesam lactationem  
 concernentes morbos. Duisb. 1770.*

GRUNER, *Diss. de statu sano et morboſo mammarum in  
 gravidis et puerperis. Jenae 1792.*



STARK'S *Archiv.* IV. Bd. p. 738.

RUST, *de nonnullis mammarum et lactis vitiis post puerperium.* Götting. 1784.

L. J. BOËR, *über die Säugung neugeborner Kinder und Behandlung der Brüste bey Kindbetterinnen, in dessen Abhandlungen geburtshülfflichen Inhaltes und a. b. abgedr.* Wien. Wappler 1808. gr. 8°.

OSIANDER, *Denkwürdigkeiten für Heilkunde und Geburtshülff. etc.* S. 225. sq.

J. CAPURON, *Traité de maladies des femmes etc. à Paris* 1817. XXX. Part. les accidens qui arrivent au mamelon pendant l'allaitement. p. 592.

BURNS, *a. a. O.* III. Bd. Cap. XXII. pag. 618.

## T W E E D E   H O O F D S T U K .

*Over de ziekelijke veranderingen in de  
hoedanigheid van het zog.*

*Begrip.*

§. 273.

Onder ziekelijke veranderingen in de hoedanigheid van het zog verstaat men de ziekelijke verandering van zijne bestanddeelen; het verliest dan deszelfs heldere, natuurlijke en deugdelijke menging, en erlangt eene, den zuigeling nadeelige, eigenschap.

*Bestanddeelen en eigenschappen eener goede  
en gezonde melk.*

§. 274.

De melk is eene vloeistof, die, ten aanzien van de zamenstelling harer bestanddeelen, eene buitengewone gelijkenis heeft met die des bloeds, komende deze volkomen met de melk der dieren overeen. Zij zijn na afscheiding van den room, water, kaas, melksuiker, zoutzure *Soda*, phospherzure *Soda*, melkzuur, azijnzure *Soda*, met een bewijs van melkzuur ijzer, phospherzure aardzouten. De room bestaat uit boter, kaas en hui. Het



verdient opmerking, dat zich fchier geen andere loogzoutige ftof, dan de *Soda* in de melk bevindt. Het zog onderscheidt zich van de melk van alle diersoorten daardoor, dat het de meeste melkfuiker en room bevat. Betreffende deszelfs lijvigheid, fmaak, reuk en het bevatten van melkfuiker, komt hetzelfde het naast aan de ezelinnemelk; doch deze bezit minder room, in plaats daarvoor echter meer kaas dan het zog. Gezond, goed zog behoort de volgende eigenschappen te hebben:

Het moet eene doffe, eer eene gele, dan blaauwachtige kleur bezitten; het moet zoet, zuiver, zonder walgelijken reuk of fmaak, te dik, noch te dun zijn; het moet, op een glas gedruppeld, ligt afvloeijen, zonder door het trekken van draden taaiheid aan den dag te leggen; of laat men een' druppel in een glas water vallen, dan moet deze niet oogenblikkelijk, maar gaandeweg naar den bodem zinken en eene fchoone wolk vormen; zinkt hij dadelijk naar den bodem, dan is het zog te dik en moeilijk te verteren; blijft hij op het water liggen, dan is het te dun; laat men het zog ftaan, dan moet er van boven een geelachtige, zoete room opkomen, en onder denzelven zich eene zoete, ongeronnen melk bevinden. Het zog ftremt niet gemakkelijk, geen zwavel- of citroenzuur kan het doen hotten; falpeterzuur alleen heeft, en nog niet zonder warmte, dit vermogen, mitsgaders het maagfap des kinds, wanneer het ziekelijk gefield is.

## L I T T E R A T U U R.

Dr. J. BERZELIUS, *Ueberblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten. Aus dem Schwed. übersetzt vom Dr. J. S. SCHWEIGER. Nürnberg 1814. 8°.*

*Verschijsfelen.*

§. 275.

De ziekelijke veranderingen van het zog, ten aanzien van deszelfs hoedanigheid, zijn de volgende: het kan te dik, te slijmachtig, te vet, te waterig, te zout, te ligt zuur wordend, te bitter en galachtig zijn, het kan riekende, loogzoutig stinkende deelen bevatten, met bloed en etter vermengd zijn, of eene zoodanige verandering in deszelfs hoedanigheid ondergaan, dat geen der zintuigen, de in hetzelfde huisvestende stof, ontdekken kan. Deze ziekelijke veranderingen hebben niet enkel invloed op de moeder zelve, maar vooral op het kind; die, welken zij op de moeder uitoefenen, openbaart zich in dier voege, dat zulk zog, of ontsteking in de borsten verwekt, of deze ten gevolge eener verplaatsing van ziektestof op eene andere plaats en in een ander orgaan zich ontwikkelt. Op den zuigeling echter heeft zulk zog den gewigtigsten invloed: hij wordt slecht gevoed, en vermagert bij zulk eene gesteldheid van het zog, of hij krijgt braking, buikloop, huiduitslagen, kramp en stuip-trekkingen of sterft plotseling, nadat hij de borst gehad heeft.



## Oorzaken.

## §. 276.

Een te dik, slijmerig zog verkrijgt deze schadelijke eigenschappen, of door te veel slijm, of door de bevatting van te veel aardachtige bestanddeelen; de blijken daarvan zijn, dat het zich in draden laat trekken, en in een glas water gedroppeld, geene wolk vormt, maar schielijk naar den bodem zinkt, aan alles vastkleeft, bij voorbeeld aan den top des nagels, aan den rand van een glas. Gemeenlijk ligt de oorzaak in kwaadsappigheid (*Cachexie*), *Dispositio chlorotica*, die reeds voor de zwangerschap bestond, of in eene ophooping van slijm in de eerste wegen, veroorzaakt door het gebruik van vele taaije spijsen, door aanleg tot wormen, of door eene slechte spijsvertering, waardoor vele klevrige bestanddeelen te lang teruggehouden en alzoo in het bloed en het zog opgenomen worden. — Is het zog te vet, dan ontleent dit zijnen oorsprong uit een te overvloedig genot van te voedende spijsen, eene te geringe beweging en te lang voortgezet zogen bij eene goede voeding. De kenteekenen zijn, dat op het uitgemelkte zog, eenigen tijd staande, zeer veel gele room komt, of versch ontlast, voortelijk oneindig veel ligter is. De uitwerkselen daarvan op het kind zijn braking, het zuur en later, bij voortgezet zogen, geneigdheid tot daauwworm. Een te waterig zog herkent men daaraan, dat hetzelfde het voorkomen van hui heeft, geen' room afscheidt, of indien zulks geschiedt, slechts

slechts kleine eilandjes op de gele vloeistof rond-drijven. De oorzaken zijn : slechte voeding , slechte spijsvertering , kramp in de melkvoerende vaten , of onderdrukte uitwaseming met eene *cathe-rale* gesteldheid en hoofdzakelijk eene zekere kwaad-sappige , ziekelijke gesteldheid der zogende. Bovendien kan het tevens eene waterachtige hoedanigheid verkrijgen bij zulken , die haren kraamvloed te sterk hebben , slecht , of schraal voedsel genieten , of onder het zogen op nieuws kraamzuivering of de maandstonden krijgen , of zwanger worden. Zulk eene ziekelijk veranderde , waterachtige melk heeft , vooral ten aanzien der beide laatste oorzaken , op de moeder zoowel als op den zuigeling , de nadeeligste uitwerkselen. De moeder wordt daardoor buitengewoon verzwakt , en kan zich bij voorhanden zijnde voorbeschiktheid eene uittering op den hals halen , ingeval eener nieuwe zwangerschap , mis-kraam krijgen en de zuigeling vermageren , braking , buikloop en uitlagen bekomen ; en in een geval zag ik , bij eene moeder , die onder het zogen de maandstonden had en te gelijker tijd zwanger werd , dat haar kind , telkenmale als de maandstonden verschenen , door de hevigste krampen , mondklem (*Trismus*) en stuiptrekkingen overvallen werd , die zich integendeel niet meer openbaarden , zoodra het kind gespeend werd. De uitwerkselen van een te waterig zog op de moeder zijn , dat zij vermagert en het kind ziekelijk wordt , nademaal het geen genoegzame voeding erlangt. Een te scherp , brak zog laat zich niet alleen door den smaak onderkennen , ofschoon het overigens het aanzien eener goede



melk hebben kan, maar het is veelal ook waterig, de zuigeling wil de borst niet vatten, laat den tepel terstond los, of als hij slikt, weent hij, of spuwt het zog uit, of geeft door de beweging van het hoofd zijnen afkeer, en door die der voeten, krimpen in den buik te kennen. Onderzoekt en proeft men zoodanig zog, dan is het dikwerf zeer scherp, niet ongelijk aan *Salammoniac*, welke in melk opgelost is. Deze walgelijke, of ziltige smaak des zogs kan of in eene, of in beide borsten zich bevinden; in het eerste geval heeft de zogende meestal een gebrek in de borst gehad, of is tijdens de zwangerschap, of in het kraambed ongeschied geweest; bij voorbeeld uitslag, eene langdurige verettering enz., waardoor alsdan de aanleg tot afscheiding eener scherpe melk bij de aanstaande baring overblijft, welken men niet in staat is, weg te nemen. Vindt men deze ontaarding van het zog in beide borsten, dan ontleent deze haren oorsprong uit eene vurigheid der huid, bij voorbeeld haarwurm (*Herpes*), schurft enz., welke door eene ongeschikte behandeling, of anderzins schadelijken invloed onderdrukt werd, en daarop de afscheiding van het scherpe zog ten gevolge had; of het uitslag bestaat nog, hetwelk zich dadelijk, in der voege eener ziektestof, over de borst verspreid heeft en het zog eene ziekelijke verandering doet ondergaan. Eene der gemeenzaamste oorzaken eener te scherpe, loogzoutige zogafscheiding is de geneigdheid tot scherpe uitwasemingen, onder anderen bij vrouwen, die tot vlug riekend zweeten, bij voorbeeld stinkend oksel of voetenzweet geneigd zijn; den gewigtigsten in-

invloed heeft het okfelzweet; want, wordt dit onderdrukt, dan moet zich de loogzoutige stof wegens de naauwe vereeniging en gelijke bewerktuiging het eerste aan het klierachtige gedeelte der borsten mededeelen; weshalve minnen met rood haar, die veel onder de okfelen zweeten, niet te verkiezen zijn; en die, gelijk wij een' enkelen keer waarnamen, aan het haar der zuigelingen de roode kleur mededeelen. Gelijkerwijze zijn voorwerpen met vurigheid der huid of levervlekken, als minnen niet aan te bevelen, zoo min als eene Negerin in ons klimaat, dewijl hare uitwaseming ligtelijk onderdrukt wordt, en alsdan een allermisfelijkste reuk met een ziekelijk veranderd zog geboren wordt. Wijders kan het genot van zeer scherpe spijsen aanleiding geven tot de afscheiding van scherp zog; zonder daarmede te willen beweren, dat de kraamvrouw in het geheel geen zout onder haar voedsel mag gebruiken, immers dit bevordert de spijsvertering en schielijker gelijkmaking der genotene voedselen; slechts het genot van te veel gezouten spijsen, en hoofdzakelijk scherpe kaas, brengt zulk eene verandering in de melk eener zogende te weeg, dat de zuigeling dadelijk de gevolgen daarvan ondervindt, bij voorbeeld onrustig wordt, sterk schreit en buikloop, knepen en krimpelingen in den buik krijgt. Desgelijks ontaardt het zog door het eten van gerookt vleesch, of visch, van scherpe met haringen, karpers of uijen toebeide soepen. Eindelijk kan de veranderde afscheiding en lozing der *Urin* aan het zog zulk eene scherpe eigenschap mededeelen, voornamelijk omdat de *Urin* bij vrouwen buitendien on-



oneindig meer aan in het oog loopende veranderingen onderhevig is, dan bij mannen, nademaal zij een' langer' tijd in de blaas vertoeft.

§. 277.

Eene der menigvuldigste ziekelijke veranderingen in de hoedanigheid van het zog is deszelfs neiging tot verzuring. Deze hoedanigheid herkent men, wanneer het zog, bij eenen gematigden warmtegraad der lucht stilstaande, ras kleine klonters afzet, en na eenige uren een' zuren reuk van zich geeft. Het gevolg daarvan is, dat het kind spoedig en ligt braakt, en wel het zog in den vorm van geronnen kaas of klonters overgeeft; of onderwijl het braakt, een' sterk zuurriekenden buikloop en spruw in den mond krijgt, die zich gaandeweg tot in de maag en het darmkanaal, en zelfs tot aan den aars uitstrekt; de drekstoffen zijn bij de ontlasting terstond groen, gescheiden, en met slijm en een waterachtig vocht vermengd, of waren zij geel, dan verkrijgen zij na de ontlasting schiekelijk een groenachtig aanzien. De oorzaken zijn aanleg tot zuur, oprispingen, genot van te veel zoete, ligt gistende voedselen, het te overdadig genot van bier, voornamelijk jong bier, wijnsoepen, ooft, haverdegort-pap en der plantenvoedselen in het geheel. De kenteekenen van een galachtig, bitter zog zijn: de bittere smaak, de hooggele saffraankleur, doch dit zijn beide geen vaste kenteekenen, daar een geel zog niet altijd bitter is en zelfs zoet van smaak kan wezen, en een bitter niet altoos geel gekleurd is. — De oorzaken zijn: belemmerde afscheiding der gal  
in

in het darmkanaal, bij voorbeeld ingevolge hevige aandoeningen en hartstogten door ergernis, toorn, gramfchap enz., vorming van te veel gal door het gebruik van te vette voedselen, opstopping des zogs in de zogvoerende vaten; gelijk bij ongestelde borsten. Menigmaal is geen bepaalde oorzaak op te sporen en waarschijnlijk deze ziekelijke verandering in de hoedanigheid op eene ziekelijke bewerktuiging der borst gegrond, bij voorbeeld na eene vroeger plaats gehad hebbende verzwering der borst. De gevolgen zijn, dat het kind de borst in het geheel niet vatten wil.

§. 278.

De veranderde hoedanigheid, ten aanzien van den kwaden reuk, kan het zog door het eten van zekere voedselen, gelijk bij de dieren door zekere planten verkrijgen, en alsdan is het gevolg daarvan, dat het kind het zog niet lust, of ingeval het zuigt en het inslikt, ziekten en uitflag bekomt. De oorzaken kunnen zijn, het genot van veel knoflook, het gebruiken van fcherp riekende geneesmiddelen, bij voorbeeld der stinkende asant (*Asa foetida*) en dergelijken, van ranzigen boter, vette, bedorvene visch en gerookt vleesch; onderdrukt voet- en okselzweet, stinkende witte vloed, langdurige, stinkende kraamzuiveringen, ontaarding der baarmoeder, eene zich pas ontwikkelende, knoestachtige verharding, zweren in den *Uterus* en in de scheede, *venerifche* besmetting, dergelijke zweren in de scheede, uitwendig gebruik van stinkende zalven enz. — Is het zog met bloed vermengd, dan



dan onderkent men zulk eene ziekelijke verandering niet alleen daaraan, dat het uit de borst vloeit, maar tevens dat het kind dit dikwerf overgeeft. De oorzaken zijn: geweldig trekken aan de borst, wordende daardoor vaten verscheurd, inzonderheid bij zogenden, wier borsten zeer klein zijn en wier mamklieren dicht op de borstspieren liggen; ontvelingen en kloven der tepels, ontsteking in de borst, voornamelijk in de diepte der borstklier, zoo als men ook bij koeijen, ingevolge steken van vliegen en insekten op het uijer en daaruit voortvloeiende ontsteking, roode melk aantreft. Is er etter onder het zog, dan onderkent men dit aan de ettervlokken, welke zich in hetzelfde vormen, als het stilstaat. Zoo lang de etter zuiver en zoet van smaak is, heeft zulk zog geen' nadeeligen invloed op het kind. De oorzaken zijn etter of een *Absces* in de borst, hetwelk bij wijlen zeer diep in de borstklier zit, en buiten eenig uiterlijk blijk van verzwering, miskend wordt; menigmaal verzwijgen de minnen, uit vreeze van haren dienst te verliezen, deszelfs aanwezen, of de moeders leggen het kind eigenzinnig aan de borst. Het inslikken van een' goeden etter evenwel, is, gelijk wij reeds opmerkten, voor het kind niet nadeelig, en het zogen zelf voor de moeder, tot schielijker genezing van het *Absces* en ontlasting van het toevloeiende zog, gunstig en voordelig. Is, trouwens, de etter slecht, dun en *ichoreus*, of komt hij, ten gevolge eener *fistuleuze* verzwering, uit de borstholte eener teringachtige, dan heeft het schadelijke uitwerkselen op het kind.

## §. 279.

Het zog nogtans kan ten aanzien van deszelfs hoedanigheid eene ziekelijke verandering ondergaan, zonder dat dezelve zintuigelijk kan ontdekt worden. Als oorzaken daarvan moeten hoofdzakelijk gerekend worden; hevige gemoedsaandoeningen, inzonderheid toorn, ergernis, schrik, vrees, gramfchap enz. — Al reeds te dikwerf zijn kinderen door het zuigen van een door dusdanige invloeden veranderd zog, ten gevolge van krampen en ftuiptrekkingen, gestorven. Niet alleen aandoeningen, maar zelfs natuurlijke liefde kunnen het zog fpoedig eene ziekelijke verandering doen ondergaan; zoo ontdekt men dergelijke verfchijnselen aan het kind, indien het terftond na den bijflaap de borst wordt gegeven; deswege is het van zoo veel aanbelang, dat de moeder na zulk eene verrigting de melk laat uithalen, alvorens het kind weder te zogen. — De melk kan ook nog op eene andere wijze eene, voor den zuigeling, verderfelijke eigenfchap erlangen, zoodra de moeder een huiduitflag onder de leden heeft, dat zich van lieverlede ontwikkelt. Zoo nam ik eens deze gevaarlijke gevolgen waar bij eene vrouw, die eindelijk fcharlakenkoorts kreeg; hetzelfde heeft men bij mazelen, pokken, alsmede bij den beet van dolle honden zien gebeuren. Niet minder verdient hier vermelding de invloed van met vallende ziekte (*Epilepsie*), met ftuiptrekkingen, kramp en andere zenuwziekten, behepte zogende vrouwen op het zog, ten bewijze voor de, door de zinnen niet waar te nemen, ziekelijke verandering



ring van het zog, overmits het zoo ligt krampen, zenuwtrekkingen en stuipen ook bij het kind te weeg brengt. — Bovendien kan ook de melk eene schadelijke en verderfelijke eigenschap aannemen door het inwendig toedienen van verdoovende middelen, of door de uitwendige aanlegging van vergiftige geneesmiddelen, bij voorbeeld door omslagen of stovingen van het *Herba Hyoscyami*, *Cicutae*, door zalven met Sublimaat, reden waarom de meeste omzigtigheid bij zogenden of het spenen, vooral bij schurftige, met *Arsenicum*, het *Cosmische* bijtmiddel en dergelijke behandelde, zweren, in het oog gehouden moet worden.

### Geneeswijze.

#### §. 280.

De geneeskundige behandeling moet naar de oorzaak, die het zog deed ontaarden, ingerigt worden. Is het te dik en te slijmachtig, dan moet men de opgehoopte slijm door zacht ontlastende, zuiverende middelen, en de verminderde werkzaamheid der spijsvertering door zoogenaamde versterkende middelen (*Roborantia*) trachten te verbeteren. Ten einde het eerste oogmerk te bereiken, diene men middelzouten, *Sulphas Potassae*, *Tartris Potassae*, *Sulphas Sodae*, *Tartris Potassae stibiata* in kleine giften, in vereeniging met het eene of andere middelzout, een afkooksel van *Manna*, *Manna*- of rhabarbersiroop, de *Tinctura Rhei aquosa* en dergelyken toe. Ook het gebruik van *Seltzer* en andere minerale wateren mag hier tot het oogmerk dien-

dienstig geacht worden. Zijn deze in eene genoegzame hoeveelheid ontlast, zoo komen ter verhoeding van nieuwe ophooping en ter bereiking van de tweede aanwijzing te stude, de aftreksels van het *Herba Trifol. fibr.*, de *Cortex Aurant.*, *Rad. Gentianae*, *Lignum Quassiae*, bittere extracten, gelijk *Extractum Graminis — Taraxaci — Trifol. fibr.* met *Aq. Foeniculi*, *Aether nitric. alcoh.*, of zoodra men zeker is, dat de ziekelijke slijmafscheiding heeft opgehouden, het in andere gevallen door mij aangeprezene poeder uit *Tartarus depuratus*, *Magnesia carbonica*, *Rad. Rhei*, *Cortex peruvianus* en *Elaeosaccharum Foeniculi*, drie tot vier malen daags een' eijerlepel vol. Bij het regelen der diët verkieze men de meest geschikte voedselen en dranken, en drage men zorg van beide geene op te geven, welke de afscheiding en ophooping der slijm vermeederen. — Is het zog te vet, dan moet de zogende aanhoudend in beweging zijn en over het geheel een meer werkzaam leven leiden, schraal, dun voedsel, bij voorkeur uit het plantenrijk en vele verdunnende dranken, veel water of slechts dun bier gebruiken, en van tijd tot tijd open lijf houden. Ligt de grond der ziekelijke verandering van een te waterig zog louter in het schrale diët der moeder of minne, gelijk men dit vooral onder de arme klasse aantreft, dan moet men eenen beteren, meer voedzamen eetregel voorschrijven, en bij een' te overtolligen kraamvloed of wederkeerende maandelijksche zuivering beide trachten weg te nemen. Wat echter de terugkomende maandstonden aanbelangt, dient men te bedenken, dat vrouwen of

IV. D. 2<sup>e</sup>. ST.                      Dd                      min-



minnen, die zeer volsappig zijn en te voren maandelijks veel bloed verloren, somwijlen zonder deze ziekelijke verandering der melk, het kind zogen en zich zelve daarbij uitnemend wel gevoelen. In die gevallen, waar zich werkelijk nadeelige uitwerkselen op het kind openbaren, moet men de *Menstruatie* pogen tegen te gaan, waartegen het gebruik der hui door aluin verkregen, met een weinig kaneel, ook gedurende haar afwezen, zeer veel vermag. Is intusschen eene ziekelijke gesteldheid van aanbelang oorzaak, bij voorbeeld bloedspuwing (*Haemoptysis*, aanleg tot longtering, of bestaat zij reeds, dan moet het zogen voor altoos gestaakt worden, anderszins wordt de longtering ongeneeslijk, neemt toe en het kind erft den aanleg daartoe. Onderdrukte huiduitwaseming, verkoudheid, *Rheumatismen* behoeven zweetdrijvende middelen (*Diaphoretica*); zwakte der spijsverteringwerktuigen, versterkende (*Roborantia*) en de bovengenoemde geneesmiddelen. De ziekelijke verandering van een te scherp, met te veel zouten bedeed zog vordert inzonderheid een' doelmatigen eetregel en vermindering van alle scherpe spijsen en dranken; ingeval er zich verschijnselen van onzuiverheden in de maag opdoen en de zogende zelf een' scherpen smaak heeft, waarbij de tanden niet zelden aangedaan worden, dan konit een braakmiddel te pas; onderdrukte uitwaseming vereischt *Diaphoretica*; scherpe uitslagen zulke middelen, welke het zog verbeteren, en pisdrijvende (*Diuretica*); ter bereiking van het eerste oogmerk verdient een *Decoctum Rasurae Lign. Guajaci, Rad. Bardanae, Graminis*, van het tweede een drank

drank van *Juniper.*, *Ononid.* en buitendien zulke geneesmiddelen, welke tegen het uitslag, door de ondervinding beproefd zijn, aanprijzing.

§. 281.

Bij geneigdheid van het zog tot zuurwording, schrijve men zuurbrekende, opflorpemde middelen voor, het fijne poeder der *Carb. Magnesiae*, *Rheum*, en *Cortex Aurantiorum* met anijszaad, eene oplossing van *Carbonas Potassae* in een specerijachtig aftreksel, bij voorbeeld van *Melisse* en dergelijken. Zoodra echter het zuur en deszelfs verschijnselen, als daar zijn branding in de maag, zure oprispingen, zure smaak enz. verdwenen, en de stoffelijke oorzaken verwijderd zijn, of eene zwakte der maag en eene gestoorde spijsvertering met geneigdheid tot verzuring de oorzaak is, dan trachte men de spijsvertering weder tot haren natuurlijken staat op te wekken door bittere en zoogenoemde maagversterkende middelen, als de aftreksels of bittere extracten van *Herba Absinthii*, *Trifolii fibrini*, *Centaurei minoris*, *Lignum Quassiae*, vermengd met eenig specerijachtig water, de *Essentia Corticum aurantiorum*, *Tinctura aromatica*, of het *Elixir rob. WHYTT.* en dergelijken. Ook betoonen pillen van *Pulv. Rad. Rhei* ʒj. *Sapon. venet.* *Extracti Absinthii vel amari* aa ʒiij. *Syrupus Aurant.* q. s. ut f. pil. pond. gr. ij. conspergend. *Pulv. Cortic. Cinnamomi*, D. S. 'smorgens en 'savonds twaalf tot vijftien in te nemen, of in plaats van deze: *Extract. Trifol. fibrin. v. amari* ʒij. *Tr. Rhei aquosae* ʒij vel *Aquae menth. crisp.* ʒiij. M. D. S.



Dagelijks alle uren een' eetlepel vol, goede diensten. Bij eene galachtige, bittere melk is een braakmiddel aangewezen; inzonderheid als aan-  
doeningen en hartstogten, razernij, gramschap of toorn de terughouding der gal bewerkt hebben, zorg men voor zachte buikontlasting, doch niet te sterk, daar zij den toevloed van het zog onderdrukt; bijzondere aanprijzing verdienen de *Tartarus depuratus* met *Manna*, hui met *Tamarinde* gemaakt, of eene oplossing van *Pulpa Tamarindorum*, in geval van nood, en als geene ontlasting volgt, met bijvoeging van *Tartris Sodae*. Tevens vergete men niet, het zog, alvorens men het kind aan de borst legt, zachtken te laten uithalen en een' doelmatigen eetregel voor te schrijven, met uitsluiting van alle spijzen en dranken, die gal kunnen verwekken. Het spreekt van zelf, dat ook andere schadelijke invloeden, gelijk ergernis, toorn enz. vermijd moeten worden.

#### §. 282.

Het in hoedanigheid ziekelijk veranderde, stinkende zog vereischt, indien bedorvene, loogzoutige, vlugge spijzen of planten dit te weeg bragten, onthouding derzelve, en het gebruik van geschikte, gezonde en frische voedselen en onbedorvene dranken. Onderdrukt voetzweet trachte men door voetbaden met mostaardmeel weder te voorschijn te brengen, en waren stinkende zalven daarvan oorzaak, dan moeten de borsten met zemelwater lenig gemaakt, met zuiver water afgewaschen en gezuiverd worden. Kwalijkriekende kraamzuiveringen

worden met de §. 108 vermelde middelen bestreden, gelijk bij de genezing van den witten vloed en eene aanvankelijke ziekelijke verandering zoodanige, welke elders in dit werk zijn opgegeven. Het, bij een absces, met etter vermengde zog vereischt de rijpmaking en schiele ontlasting des etters, waarbij men dient te bedenken, dat, ingeval deze slecht en meer den aard van *Ichor* heeft, het kind niet gezoogd mag worden; indien echter de toevoer van zog, ondanks de verettering, te sterk, de etter goed-aardig en lijvig is, geene bijzondere ziekte daarmede vereenigd is, de tepel bestendig wel gevormd blijft, ingetrokken noch ontveld is, en het zogen zelf geene pijnen verwekt, dan kan het kind toch aan de borst worden gelegd; wij ten minste zagen nooit nog eenig nadeel voor het kind daaruit ontspruiten, en op de moeder heeft het de gunstigste uitwerking, daar de verettering beteugeld en het absces spoediger genezen wordt; het uithalen van de borsten door eene zuigster of eene zogpomp werkt altijd geweldiger, dan het zuigen des kinds. Heeft er geen sterke aandrang van zog naar de ongestelde borst plaats, en is er toevoer genoeg naar de gezonde tot voeding des kinds, dan behoeft men de ziekelijke borst niets te vergen, voor het minst niet eerder, dan na de volkomene genezing van het absces.

### §. 283.

Ontleent de ziekelijke verandering van het zog haren oorsprong uit zulke oorzaken, welke haar voor de zintuigen onnaspeurbaar maken, maar zich



bloot door de schadelijke uitwerkselen op het kind openbaart, dan moet men de opgenoemde geneesmiddelen laten varen, en alles, wat schaden kan, ontzien. Het kind moet eenigen tijd van de borst verwijderd, het zog uitgehaald en het zogen niet eerder veroorloofd worden, dan tot men van die schadelijke invloeden niets meer te duchten heeft.

#### L I T T E R A T U U R.

GÖBEL, *de lacte ejusque vitiis. Lugdun. Batav. 1684.*

ZELLER, *Dissert de mammis et lacte. Tubing. 1727.*

JUCH, *Dissert. de lactis vitiis et inde prognatis lactantium incommodis. Erfurt 1731.*

HILSCHER, *Diss. de vitiis lactis humani eorumque medela. Jenae 1746.*

SCHEINHARDT, *Diss. de vitiis lactis lactantium. Argent. 1762.*

LUTHER, *Diss. de lactis humani statu naturali ac praeternaturali, hujusque therapia. Erfurt 1772.*

F. B. OSIANDER, *Denkwürdigkeiten f. d. Heilkunde und Geburtshülfe. II. Bd. 2. St. Götting. 1795. p. 419.*

WIGAND, *Beytrage. II. Heft. p. 144.*

OSTHOFF, *über das Selbststillen. Lemgo. 1802. Salzbr. med. chir. Zeitung 1803. II. p. 353. — HUFELAND'S Bibliothek der prakt. Heilkunde. XIII. Bd. 2. St.*

---

 D E R D E   H O O F D S T U K .

*Over de ziekelijke veranderingen van het zog ,  
ten aanzien van deszelfs hoeveelheid.*

*Verschijselen.*

§. 284.

Ten aanzien van de hoeveelheid des zogs neemt men bij zogenden die ziekelijke afwijking waar, dat de afscheiding te overtollig, of te weinig is. Eene te sterke zogafscheiding (*Polygalia*) noemt men dien ziekelijken toestand, waarbij het zog in eene te groote hoeveelheid wordt gevormd, zoo, dat het ter onderhouding van den zuigeling niet alleen overbodig is, maar tevens de krachten der moeder ondermijnd worden. Dikwerf gaat met haar een ander gebrek gepaard, te weten het loopen en bestendig uitvloeijen van het te overbodige zog (*Galactorrhoea*); hiervoor staan zoowel eerstbarenden, als meer gebaard hebbenden bloot, eerstbarenden evenwel oneindig meer; menigmaal bepaalt zich dit overtollige enkel tot eene borst, waartoe misschien het te dikwijls herhaalde aan eene borst leggen van het kind de oorzaak uitmaakt. Van dit gebrek, hetwelk uit eene ziekelijke en te overtollige zogafscheiding voortvloeit, dient men datgene te onder-



scheiden, bij hetwelk deze niet bovenmatig geschiedt, maar het zog ten gevolge eener aanmerkelijke verzwakking van de zogvoerende vaten in den tepel en van dezen zelve, zich ontlast.

### §. 285.

De hoeveelheid van het zog kan ook te gering zijn: zoo noemt men die ongesteldheid, indien de zogafscheiding eener kraamvrouw te gering en ontoereikend is tot onderhouding des kinds. Deze ongenoegzaamheid aan zog kan in den beginne des kraambeds alreede voorhanden zijn, of eerst onder het zogen zich ontwikkelen.

### Oorzaken.

### §. 286.

De oorzaken van eene te overvloedige voortbrenging van zog, zijn: het te dikwerf herhaald geven van de borst, en bij eene buitendien te hoog gestegen gelijkmaking (*Assimilatie*) en voeding, goede, voedzame kost bij rust en eene onwerkzame leefwijze. Wijders kan, bij eene te overgroote gezondheid der borsten, het aangenaam gevoel, waarmede het zogen geschiedt, door den veelvuldigen en aanhoudenden prikkel, den toevoer vermeederen; behalve het te veelvuldig, aanhoudend en aan geen bepaalden tijd verbonden zuigen des kinds, het te lange zogen, waardoor van lieverlede de zogafscheiding hebbelijk wordt; te groote prikkelbaarheid, saprijkheid en wijde zogvaten, in het bijzonder als prikkelbaarheid met zwakte der zogvaten zamengaat.

### §. 287.

## §. 287.

De oorzaken eener te geringe zogaffcheiding kunnen in *organische* gebreken liggen, als daar zijn: te kleine borsten ten gevolge van haren oorspronkelijken vorm, niet zoo zeer uit gemis aan vet, als wel uit eene gebrekkige bewerktuiging der mamklier, waartoe menigmaal reeds in den kindschen leeftijd, en later door jeugdige meisjes en vrouwen met het inprangen der borsten de grond gelegd wordt; verder gebrekkelijke, kleine borsten door verzwering, verzwakking derzelve, ten gevolge van den gevorderden leeftijd, een losbandig leven, menigvuldige betastingen, waardoor de borsten te slap worden; te enge zogvaten, hetzij ingevolge van den oorspronkelijken vorm, of door het vele gebruik van zamentrekkende middelen, vooral zalven en pleisters met lood, knoestachtige verhardingen. Andere oorzaken nog zijn krampen, door hartstogten, aandoeningen en aanleg tot *Hysterie* veroorzaakt, ontbering van behoorlijk voedsel, veel nachtbraken, verkoudingen der borsten, hoofdzakelijk onder het zogen; door den indruk eener te koude lucht, of togt; vermagering des ligchaams, vermindering der vochten door ziekten, als daar zijn: tering, waterzucht, koorts, etterende zweren aan andere deelen, of de bestendige vergrooting van een gezwel, bij voorbeeld in het net, de baarmoeder; afnemning der levenskrachten door aandoeningen en hartstogten, bij voorbeeld schrik, kommer, toorn, vrees enz., gestoorde en zwakke spijsvertering, *Diarrhoeën*, roering en allerhande soorten van buikloopen,



prikkeling door wormen in het darmkanaal, vermeerderde pisafscheiding, speekselvloed, te sterke uitwaseming, te lang durende kraamzuivering, de in te groote hoeveelheid terugkomende maandstonden, aanbeijenvloed, menigvuldige neusbloedingen, bloedspuwing, te drukke bijslaap, die, ofschoon ook door geene zwangerschap achtervolgd wordende, ophooping van bloed naar den buik te weeg brengt, zwangerheid, zoogenaamde zogverplaattingen; de aanwending van uit-, zoowel als van inwendige zogverdrijvende middelen, waartoe inzonderheid de kamfer (\*) en kwikzilver, het misbruik van sterk ontlastende en pisdrijvende middelen behoort.

§. 288.

(\*) Een treffend bewijs voor het zogverdrijvende vermogen des kamfers, heb ik nog tijdens mijn verblijf in mijne geboortestad *Würzburg* gezien. Eene dame, welke gemakshalve niet zogen wilde, bezorgde ik eene goede minne, wier borst het kind terstond vatte, vooral daar de borsten overheerlijk zog bevatteden en eene genoegzame hoeveelheid afzonderden. Ik behandelde de kraamvrouw, gelijk men in dergelijke omstandigheden gewoon is te doen. Op zekeren dag haar bezoevende, hoorde ik, dat bij de minne het zog eensklaps uit de borsten verdwenen was, en het kind niet meer zoog. Eene kamferlucht in het kraamvertrek, waar tevens de minne met haar kind vernachtte, bevreedde mij; te meer, omdat ik geen' kamfer had voorgeschreven. Een nader onderzoek verklaarde mij dit onaangename toeval. Eene bemoeiällige vrouw had, ter verdrijving van het zog, aan de borsten der kraamvrouw kamfer, aan draden geregen, gehangen; op deze echter had het

niet

De gevolgen eener te overvloedige zogaffscheidung zijn menigmaal hoogst nadeelig en verderfelijk voor de gezondheid der moeder, zoowel als voor het kind; gene verliest daardoor hare krachten, vooral lijdt hare voeding ongemeen, hare zintuigen worden aanmerkelijk verzwakt; van daar zwakte des gezichts, hardhoorendheid, gevoelloosheid en dergelijken, zoo ook de verrigtingen van den geest, mijmering (*Dementia*), waanzinnigheid (*Fatuitas*), wezenloosheid (*Stupiditas*); zij wordt met elken dag gevoeliger op haar zenuwgestel, van daar de geneigdheid tot krampen, tot *Hysterie*, tot langdurige hoofdpijn, tot aangezigtspijn, tot krampachtige uitstortingen van het zog, koorts, meestal van een' slependen aard, en zelfs bij aanleg daartoe heeft men longtering, indrooging en inkrimping van het geheele ligchaam en uittering zien ontstaan, bijaldien het gebrek, ondanks het kind reeds lang van de borst was, of eene kraamvrouw in het geheel niet gezoogd had, hebbelijk is geworden, als wanneer het som-

niet die schielijke uitwerking; de minne daarentegen verloor louter door de kamferlucht reeds op eenmaal haar zog, hetgeen niet terug kwam, terwijl het kind niet meer zoog. Eene andere, goede minne kon ik niet bezorgen; ik overreedde derhalve de kraamvrouw, om eene regtgeëarde moeder voor haar kind te zijn, en zelve het zogen te beproeven, overmits zij nog zog in de borsten had. De proef gelukte en het kind zoog bij zijne moeder, waarbij het zeer wel voer.



somtijds jaren en nog langer tijd kan blijven bestaan; gelijk wij het twee malen waarnamen. Voor het kind heeft deze ongesteldheid het nadeel, dat het ligtelijk overvoed wordt, wijl het te veel zog krijgt; uit dien hoofde ontstaan er menigerlei ongeregelheden in de spijsvertering, braking, winden, krimpelingen in den buik, buikloop, rusteloosheid, aanhoudend schreien en slapeloosheid des kinds. Tevens dient men niet uit het oog te verliezen, dat somwijlen bij hoogst gevoelige vrouwen eene krampachtige uitvloeijing van het zog of werkelijk eene krampachtige uitspuiting onder het zogen in den mond des kinds plaats grijpt, hetgeen kramp, toevallen van stikking of werkelijke stikking van hetzelfde ten gevolge kan hebben. De gevolgen eener te geringe vorming en afscheiding van zog of geheel gemis van hetzelfde zijn ten aanzien van het kind allernadeeligst, overmits het zog niet ligt, tenzij men het eene goede en gezonde minne geve, door andere spijszen en dranken vervangen kan worden; menige zuigeling vermagert zoodoende, tot hij gaandeweg aan uittering sterft.

### *Geneeswijze.*

#### §. 289.

Is de zogafschieding te overvloedig, zoodat niet alleen deszelfs hoeveelheid tot onderhouding des kinds overtollig is, maar daardoor ook de moeder zeer verzwakt wordt, dan moet men de toestrooming van zog zoo spoedig mogelijk trachten te ver-

verminderen; dit oogmerk bereikt men, door het kind alleen op bepaalde tijden te laten zuigen, voor de trouwe nakoming zorg dragende, door een spaarzamer genot van voedende spijsen, en meerdere beweging, door afleiding van den te sterken toevoer van vochten en door beteugeling van der borsten verhoogde levenswerking en der afgedwaalde herstellingskracht door *Diaphoretica*, *Diuretica*, en zachte ontlastingen door *Tartarus depuratus* met *Manna*, *Sulphas Potassae*, *Sulphas Sodae*, *Tartris Sodae* en de *Acetis Potassae* met *Aq. Petroselini*, de laatste verbinding werkt niet bloot als zacht ontlastingwekkend, maar bevordert tevens de pisafscheiding. Bovendien moet men op versterking van het lymphatiek en zogvaatgestel de aandacht vestigen; ter bereiking van dit inzicht, zijn tot inwendig gebruik aangewezen hui, door aluin verkregen, met kaneel, een afkookfel van den kinabast, der *Quassia*, *Rad. Gentianae rubrae* — *Tormentillae* en dergelijken. De borsten zelve worden met een afkookfel van zamentrekkende middelen gestoofd, als: van de *Flores Rosarum rubrarum*, *Ligustri*, van het *Herba Salviae*, *Prunellae*, der *Gallarum turcicarum*, der *Radix Ratanhiae*, *Radix Granati*, *Rad. Tormentillae* enz. Ook verdient het koude aftreksel dezer middelen met rooden wijn, in den vorm van stoving of bad, aanprijzing. Een goede roode wijn, *Medoc* of *Pontac*, enkel aangewend, heeft somwijlen de beste uitwerkselen; ook heeft men het opleggen van versche peterseliebladen op de borsten aangeraden; en mij verschaften in een zeer hardnekkig geval omslagen van GOULARD's lood-



water de heilrijkste dienſten. Tegen aanmerkelyke ſlapheid en zwakte der zogvaten en der tepels hebben omſlagen van wijngeeſt, rum en arak zich niet onheilzaam betoond, gelijkerwyze tot inwendig gebruik bij algemeene ſlapheid der vezel, zwakte, en eenen *cachectiſchen* of *chlorotiſchen* aanleg, behalve de kina, ſtaalmiddelen (*Martialia*), als de *Limatura Martis* met *Carbonas Magnesia*, het *Ferrum oxydulatum nigrum*, de ſtaaltinkturen, de *Sulphas Ferri* met kaneel en zelfs de, uit hun' aard ſtaalhoudende mineraalwateren, als daar zijn: het *Spa-*, *Driburger-*, *Schwalbacher-* en *Pyrmontwater*, vooral ook het *Kiſfinger Ragozi* in kleine hoeveelheden, een overheerlijk water, dat, behalve het koolſtofzure ijzer, ongemeen veel *Glauber-keukenzout* en bitteraarde bevat. Het meest hier nabijkomende, doch verre weg moeilijker te verteren (*assimiliren*) en meer benaauwdheid en opgezetheid in de maag verwekkende, is het *Egerwater*. Bij wijlen wordt de te ſterke zogaffcheiding zoo hebbelyk, dat de *Galactirrhoe*, ondanks het ſpenen, nog voortgaat. In dit geval houde men de borſten en de bovenſte ledematen koel, door waſchingen met koud water, omſlagen met Franſchen of gewonen brandewijn, met *Rum*, *Arak* of het *Aqua Goulardi* op de borſten, koppen, of zuurdeeg op den opperarm; zachte buikopenende en piſafdrijvende middelen, bevordering van den ſtondenvloed, inzonderheid als hij in eene te geringe hoeveelheid zich vertoont, moeten hier in het werk geſteld worden; en bij zeer vocht- en bloedrijke vrouwen hebben zelfs algemeene aderlatingen op den arm, in vereeni-

niging met een' schralen eetregel, goede diensten bewezen.

A. C. NOLDE, *über die Anwendung der trocknen Schröpfköpfe zur Verminderung der Milch*; in Dr. J. J. GUMPRECHT und Dr. J. H. WIGAND *Hamburgischen Magazin* I. 2. St. S. 133. 8°. Hamburg 1808.

### §. 290.

Is de hoeveelheid van het zog te gering, dan moet de geneeswijze naar de oorzaak ingerigt worden. Ligt zij in den oorspronkelijken vorm, en in de §. 287 vermelde, schadelijke indrukken, gebrekkelijke of gestoorde bewerktuiging der borsten, zoo schiet er niets anders over, dan dat de moeder met zogen ophoude. Heeft er echter geene stoornis in de bewerktuiging van het klierachtige gedeelte der schijf, of in de borst in het geheel plaats, en ontleent de geringe vorming en afscheiding des zogs haren oorsprong bloot uit gewone oorzaken, dan is dit eerder te verhelpen. Slapheid, gezonkene levenskracht en zwakte van de vormende kracht der zogklier en het gansche *Organismus*, vordert versterkende artzenijen, de zoogenaamde toongevende middelen (*Tonica*), die het herstellingsvermogen aanzetten, terwijl al de §. 287 opgegevene verzwakkende invloeden vermijd, de veelligt weder voor den dag gekomene maandstonden, te overtollige kraamvloed, *Menorrhoea lochialis*, sterk zweeten, buikloopen, speekselvloed, en al die oorzaken, welke den aanvoer van zog verminderen, verwijderd moeten worden; ook verordene men een' gepasten, voedenden eetregel, en prijze, in geval van nood, de uit de

er-



ervaring bekende, zogvoortbrengende middelen aan, bovenal *Herba*, *Radix* en *Semina Foeniculi*, waarvan men het aftreksel drinken laat, *Species Dya-cristallis.*, *Oleum Radicis Dauci cretici*, *Carvum*; behalve dit, behooren hier te huis de amandelmelk, eijerdoren, bier en brood, fago, faleb en de versch verkregene koemelk. Tot de uitwendige middelen brengt men het warme bad en de verwarming der borsten, en het bestendig op zekere tijden aan de borst leggen van het kind. — Is zwakte der borsten en der zogvaten met verhoogde gevoeligheid en prikkelbaarheid der zenuwen, *hysterische* aandoeningen en kramp in de borsten zelve vergezeld, dan komen die middelen, welke deze verhoogde zenuwwerking bedaren, en de kramp verminderen, de zoogenaamde *Antispasmodica*, als daar zijn: het *Extractum Hyoscyami* in het *Mixtura Riverii*, het *Castoreum*, de *Spiritus Cornu Cervi succinatus*, het *Aqua Amygdalarum amararum cohobata* in eene amandeldrank, te stude. Met het in- en uitwendig gebruik des heulsaps, zoowel als alle andere krampwerende, verdoovende middelen, zij mogen in den vorm van omslagen, zalven of pleisters aangewend worden, zij men hoogst omzigtig, daar zij ligtelijk de hoedanigheid van het zog veranderen, en deze op het kind, wanneer het de borst krijgt, nadeelig werkt. Ingeval de maandstonden zich weder vertoonen, gevaarlijke, aanmerkelijke stoornissen van organen met ziekte dreigen en zoo vele oorzaken uitmaken, of eene nieuwe zwangerschap bewezen is, zuime men niet, het zogen dadelijk te verbieden.

## L I T T E R A T U R.

- BOHN, *Dissert. de lactis defectu. Lipsiae 1764.*
- KNIPHOF, *de lactis discussione. Erford 1749.*
- BÜCHNER, *Diss. de secretione lactis muliebris, et praecipuis ab ea impedita praecedentibus morbis. Hal. 1764.*
- THORWAIT, *Diss. de lactis defectu. Lugd. Bat. 1764.*
- LEVRET, in *Journal de Médecine. T. xxxvij. p. 46. sq.*
- *auserlesene Abhandlungen. I. Bd. IV. St. S. 74.*
- Von der vertreibung der Milch aus den Brüsten. — In*
- THEDEN'S *neuen Bemerkungen. II. Bd.*
- DAVID, *Dissert. sur ce, qu'il convient de faire pour diminuer ou supprimer le lait des femmes. Ouvrage, couronné par la Société de Science à Harlem. à Paris 1763. und übers. in d. auserlesene Abhandl. für prakt. Aerzte. I. Bd. 1. St. S. 87.*
- P. J. BERGH, *de remediis galactophorosis observationes, in Nov. Act. Sol. Upsal. Vol. I.*
- DETHARDING, *Diss. scrutinium operationis medicamentorum — lac imminuentium. Rostock 1715.*
- HUFELAND, *Journal der praktische Heilkunde. V. Bd. p. 663.*
- MELITSCH, in STARK'S *Archiv. III. Bd. 1. St. N<sup>o</sup>. 5.*
- REIL, *Fieberlehre. III. Bd. pag. 355.*
- J. CHR. STARK'S, *Handbuch zur Kenntniss und Heilung innerer Krankheiten des menschlichen Körpers. — Zu starke Milchabsonderung, Galacttirrhoea.*
- P. FRANK, *de curandis hominum morbis. Lib. 17.*
- in den *Act. institut. clinic. caesar. Universitatis Vilmensis. Ann. II. S. 86.*
- JÖRG, *Krankheiten des Weibes. II. Bd. 2te Auflage. §. 804—805.*
- CAPURON, *a. a. O. pag. 594—607.*





## VIERDE HOOFDSTUK.

*Van de ontsteking der borsten.**Verschijselen.*

## §. 291.

De ontsteking der borsten kan, of bloot aan eene, of aan beide te gelijk, vroeger of later, in het kraambed, op ieder tijdstip van het zogen, of ook dan zich opdoen, wanneer eene kraamvrouw zelfs het kind niet eens aan de borst heeft gelegd; mees- tentijds bepaalt zij aanvankelijk zich slechts tot een klein gedeelte, en beslaat later eerst eene meerdere uitgebreidheid; zij is, gelijk men ze ook reeds in de zwangerschap ziet ontstaan, of eene uitwendig zichtbare, veelal roosachtige ontsteking, die naderhand echter, voornamelijk bij verwaarloozing, of bij de aanwending van ongepaste middelen, in eene slechts in het celweeffel alleen zich bepalende, of in het klierachtig ligchaam zelf dieper indringende, wezen- lijke ontsteking overgaat; of zij kenmerkt zich da- delijk bij hare wording als eene, in de diepte van het klierachtige ligchaam zetelende, ontsteking, welke later eerst uitwendig zichtbaar wordt. De ontsteking kan met aanmerkelijke zwelling van de borst zamen- gaan, of het gezwel is omschreven; zij kan zeer  
schie-

ſchielijk en langzaam in haar verloop zijn, en bijaldien zij tot *Absces* overgaat en de huid zich opent, dan ontlast de etter zich ſpoedig; ook ontmoet men, dat in het *Absces* een prop van eene aanmerkelijke grootte zich bevindt; deze wordt geboren uit de verwoesting van het celweeffel en eene of meerdere klieren, die, ingeval van een' hoogen graad van ontſteking, niet alleen veretteren, maar vernietigd worden.

*Kenteekenen der ontſteking.*

§. 292.

De teekenen dezer ontſteking zijn koude en hitte, ſtekende en ſpannende pijn bij het zogen, roodheid van eene plaats, die gaandeweg de geheele borst beſlaat, zwelling en hardheid, welke hoogst pijnlijk bij de aanraking is, gelijk de gansche borst in een' hoogen graad van gevoeligheid deelt en de pijn te heviger is, wanneer de borst in haren geheelen omvang lijdt; belemmerde uitvloeijing van het zog, pijn bij het zogen des kinds, moeilijk liggen en ademhalen. De aanvankelijk roosachtige ontſteking, die ſoms in ware (*phlegmoneuſe*) overgaat, wordt daaruit herkend, dat men terſtond eene zeer hooge, naar rozenrood zweemende, kleur ontdekt, en de pijn van een' ſpannenden aard is; de ware ontſteking daarentegen geeft zich louter door de meestentijds kloppende en dieper te voelene pijn, en de later eerst volgende zwelling, te kennen; in het begin neemt men tevens niet altoos terſtond roodheid waar, maar deze verſchijnt eerst later, zoo de



ware ontsteking, bij haar ontstaan, in het binnenste van het klierachtige ligchaam zich zetelde; beide nogtans gaan met koorts verzeld, welke het karakter van *Synocha* of *Synochus* (zuivere of vermengde ontstekingskoorts) draagt, en tot een' hoogen graad kan stijgen, inzonderheid als de ontsteking zich over de gansche borst heeft uitgebreid.

### Oorzaken.

#### §. 293.

Zoodra de borsten alreede in de zwangerschap, aangezien haar verhoogde leven en vormkracht, op zich zelve bereids voorbeschiktheid tot ontsteking hebben, hoeveel te meer in het kraambed, waar beide vereischten, nadat zij in de baarmoeder na de bevalling afnemen, in haar met de zogaffcheiding nog sterker worden, vooral omdat zij te gelijk een' hooger en graad van vatbaarheid verkrijgen, die haar meer tot ontsteking doet overhellen; komen hierbij nu nog vol- en dikbloedigheid, des te eerder zal zij dan door schadelijke invloeden of gelegenheid-gevende oorzaken ontstaan, die prikkeling en plotselinge zamentrekking in de vaten te weeg brengen, de affcheiding belemmeren, en ophooping ten gevolge hebben. Eene der menigvuldigste oorzaken is evenwel het vatten van koude, hoofdzakelijk onder het zogen, en als de borsten of de kraamvrouw over het geheele ligchaam sterk zweet, en koude in het vertrek of togt derzelve invloed op haar uitoefenen; buitendien zijn de gewone oorzaken verhitting door inwendige middelen, sterk gekruide  
spij-

spijzen en dranken, terughouding van het zog, ten gevolge van gewonde tepels of eene snelverloopende (*ephemerische*) koorts, zogophooping, hetzij door te schielijke spening des kinds, hetzij door werktuigelijke belediging, bij voorbeeld door uitwendige drukking, vast binden en inprangen, om het zog te onderdrukken, zogophooping door verzuim van het kind de borst te geven, door invloed van hevige aandoeningen en hartstogten, als daar zijn: schrik, kommer, gramschap, of door den bijslaap (*Coitus*), het genot van zure spijzen, gestoorde spijsvertering, door taaije, vette, zwaar verteerbare voedfelen, bij voorbeeld koeken, gebak enz., onderdrukte kraamzuiveringen en aanbeijen, te drukke bijslaap, het te dikwijls aan de borst leggen des kinds, te sterk trekken aan de borst van de zijde des kinds, of door zuigsters en hoofdzakelijk door zogpompen, bijten op de tepels, ontstekings door ontvellingen, *rheumatische* of jichtige ongesteldheden, *venerische* besmetting, kropklierigen aanleg, schurftige of haarwormige uitflagen enz.

### *Gevolgen en Uitgangen der ontsteking.*

#### §. 294.

De uitgang eener ontsteking der borst in het kraambed is, in verdeeling, — de gunstigste uitgang en diegene, welke de natuurlijke verrigting dezes orgaans spoedig geheel herstelt; — de verdeeling echter valt zelden voor, uit hoofde de ontsteking veelal te laat ontdekt, en vroeger door vrouwen of bakkers met ondoelmatige middelen be-



handeld werd, of de oorzaak zelve der ontsteking in een' te hevigen graad heeft opgewekt, zoodat de verdeeling niet verwacht kan worden. De meest gewone uitgang is verettering, waarvan de gevolgen zijn: onvermogen om het kind te zogen, en gevaar om voor immer hiertoe ongeschikt te worden, van wege de verwoesting in het orgaan, wanvormigheid der borst door naden en verkleiningen, somwijlen schier geheele verdwijning der borst ten gevolge der verettering, borstklonters, gevaar voor knoest- en kreeftgezwel; somtijds, wel is waar, zelden, heeft men insgelijks, voornamelijk bij eene ongepaste behandeling, de ontsteking tot versterking zien overgaan.

*Kenteekenen der verdeeling, der ontsteking  
en der verettering.*

§. 295.

Gaat de ontsteking tot verdeeling over, dan ziet men de koorts weldra aflaten of geheel verdwijnen, de roodheid minder en meer omschreven worden, de pijn, zwelling en hardheid van het ontstoken gedeelte der borst afnemen, onbelemmerden voortgang van het zogen zonder pijnen en vrijwillige uitvloeijing van het zog uit de tepels, al wordt het kind ook niet aan de borst gelegd. Helt echter de ontsteking tot verettering over, dan verandert de spannende, brandende pijn in eene kloppende; zwelling en omvang nemen toe, de borst wordt bij de betasting gevoeliger, geen zog vloeit naar buiten ten gevolge der toenemende ophooping, de koorts wordt hevi-  
ger,

ger, de kraamvrouw ontwaart dikwerf terugkeerende huiveringen; pijn, onrust en slapeloosheid worden erger, de hardheid begint te verminderen, zij wordt week; te dezer plaatse verdwijnt ook de hoog roode kleur, en er wordt op de opperhuid eene witte vlek geboren, die van lieverlede meer uitgebreidheid verkrijgt, waaronder men duidelijk vochtgolving voelt.

### *Geneeswijze.*

#### §. 296.

De geneeskundige behandeling moet louter daarenen gerigt worden, om zoo spoedig mogelijk de verdeeling der ontstokene borst te bewerken; want daardoor alleen kan de regelmatige verrigting van het orgaan in het geheel, en de veelligt ontstane ophouding met zogen spoedig weder aan den gang gebragt en kunnen de §. 294 vermelde nadeelige gevolgen voorkomen worden. Zal trouwens de verdeeling gelukken, dan moet de noodige hulp tijdig genoeg in het werk gesteld worden, en de ontsteking nog niet tot verharding of verettering zijn overgegaan, of de aanval der uit haar ontstane koorts niet in die mate hebben plaats gehad, dat de verdeeling niet meer mogelijk is. Ziet men daarom, dat de koorts het karakter van *Synocha* heeft, is de kraamvrouw buitendien van een vol-dikbloedig, prikkelbaar gestel, de pols vol en hard, klaagt de zieke over hitte en dorst, na alvorens koud geweest te zijn, en heeft zich vooral de pijn, de zwelling en uitwendige roodheid onmiddellijk na deze over de gansche borst verspreid, wordt het zog terugge-



houden, en zuigt het kind met moeite, in het geheel niet, of niet dan met de hevigste pijnen voor de moeder, dan is eene algemeene bloedontlasting op den arm en wel aan den kant der ontstokene borst, en de ontstekingswerende geneeswijze in het geheel, dringende behoefte; het verzuimen of het verrigten daarvan ten behoorlijken tijde is meerendeels oorzaak, dat de verdeeling volstrekt niet, of nog met groote moeite geschiedt, en dat eerst aanwezige vrouwen of bakers, even alsof haar een zeker voorregt geschiedde, al hare huismiddelen, pleisters en zalven beproefd moeten hebben, voor en aleer zij verstandige, geneeskundige hulp inroepen. Waar de koorts niet te veelbeteekenend en de spanning en pijn in de borst niet te hevig is en meer tot eene kleine plaats zich bepaalt, of na de algemeene aderlating nog slechts een geringe graad van ontsteking met die der plaatselijk opgegevene verschijnselen overblijft, late men op het pijnlijkste en meest ontstokene gedeelte door een' deskundige bloedzuigers zetten; wij immers hebben ons van hun nut te menigmaal overtuigd, dan dat ons de in zwang zijnde stelregel: een klierachtig ligchaam verdraagt geene bloedzuigers — van eene ervaring zou kunnen afbrengen, die ons zoo dikwerf het tegendeel leerde. Immers heeft men in den laatsten tijd zelfs zeer groote knoestachtige verhardingen alleen door bloedzuigers genezen, en hoe nuttig betoonen zich deze niet bij den *Scirrhus*, wanneer hevige steken en pijnen dat tijdperk van ontsteking aankondigen, ingevolge waarvan, de knoestachtige verharding tot het verborgene kreeftgezwel poogt over te gaan! Wijders

schrij-

schrijve men tot gebruik voor: de *Nitras Potassae*, klisteren, ontstekingswerende middelzouten, in die mate, als toereikend is tot eenige stoelgangen; een' ontstekingswerenden leefregel (*Regimen*), dun, schraal voedsel (*Diät*), bevordering der kraamzuivering, door voor de teeldeelen eene in vlierafstreksel natgemaakte spons te leggen, of door inspuitingen in de scheede; bovenal bevele men, dat de kraamvrouw zich stil te bed houde, de ongefelde borst niet late hangen, maar doelmatig ondersteune, de huid-uitwafeming niet store, die der gezonde borst door bedekking met bij den kagchel uitgewafemde boomwol, of watten aan den gang houde, en met deze vlijtig het kind zoge. Ingeval de ontsteking en zwelling niet bedaren, en er echter nog geene blijken van verettering daar zijn, maak ik van den *Mercurius dulcis* met *Carbonas Magnesia* gebruik, en bij eene aanmerkelijke ophooping van zog en hardheid wel in zulk eene hoeveelheid, dat er eenige stoelgangen op volgen.

#### §. 297.

Heeft de ontsteking aanvankelijk meer het roosachtige karakter, en de koorts geen te hevig aanzien, dan zijn een gematigde, verwarmende leefregel en zweetdrijvende middelen, de *Potio Riveri*, eene oplossing van braakwijnsteen, en bij vermindering der koorts bij voorkeur *Spiritus Mindereri* aangewezen; draagt de koorts het karakter van *Synochus* en gingen er te gelijk invloeden vooraf, die de geregelde werking der spijsverteringswerktuigen in wanorde bragten, dan moeten des noods, en vooral



als de ontsteking in den vorm van *Erysipelas* zich voordoet, braakmiddelen, zachte ontlastmiddelen uit Tamarinde, Manna, de bitteraarde, wijnsteenroom, *Tartris Potassae* enz. worden voorgeschreven, waarbij echter, indien de hevige pijnen in de diepte knagen, bloedzuigers op de lijdende borst gezet, zeer zijn aan te prijzen, ten einde de verdeeling te gemoet te komen. Is de ontsteking der borst het uitwerksel eener te overtollige zogafscheiding en daaruit voortvloeiende ophooping, dan komt de §. 289 opgegevene behandeling te pas, waarbij men tevens door het zetten van bloedige koppen op den opperarm zeer veel ter beteugeling der ontsteking en van den bovenmatigen toevoer van zog kan toebrengen, hetgeen slechts bij vrouwen, die zeer gevoelig zijn, ten opzichte der aanwending, zwarigheden ontmoet.

#### §. 298.

Ten einde de verdeeling te bewerken, roemt men meerdere middelen, als: omslagen, inwrijvingen, oliën, zalven en pleisters, bij voorbeeld eene sterke oplossing van azijnzuur lood in azijn, of GOULARD's loodwater met bijvoeging van twee tot drie drachmen *Acetum saturninum*, niet koud, maar matig warm, met kompresen over de ontstokene borst geslagen, naardien de koude ligt huivering verwekt; of eene warme, gedekte pap met loodwater toe bereid; bij eene geringe, doch algemeene opgezetheid der borst met eenige pijn, de inwrijvingen van oliën, bij voorbeeld amandelolie; bij hevige pijn een smeersel uit *Ung. saturnin.*, *Liniment. volatile camphoratum* en *Tr. Opii*, of bij kraam-

kraamvrouwen, welke niet zogen, eene zalf van amandelolie met venetiaansche zeep en kamfer, gedekte pappen van verdeelende kruiden, rijst, haverdegort, stukgewrevene aardappelen, drooge kruidenzakjes enz. Uitwendige middelen trouwens, en zelfs de meeste der pas genoemde, zijn bij de §. 296 tot 297 vermelde algemeene behandeling, en indien men tijdig genoeg geroepen wordt, in het geheel geene behoefte; ja, men kan zich verzekerd houden, dat derzelver aanwending groote omzigtigheid vereischt, en in plaats dat men de verdeeling bevordert, de overgang tot verettering verhaast wordt; in het bijzonder geldt dit van de zalven, pleisters, kruidenpappen, en drooge, warme, kruidenzakjes; minder schade doet de zachte inwrijving van amandelolie en eene matig warme pap van gekookte rijst of haverdegort, ingeval van aanmerkelijke spanning, hardheid en pijnlijkheid der borst, ter *momentele* verligting; doch men mag met deze, als ook met het inwrijven van olie niet te lang aanhouden, vooral omdat het laatste de, ter verdeeling dikwijls zoo vereischt wordende, uitwaseming der borst sloort. Men late de borst met eenen zachten, gebruikten, matig warmen linnen doek, met boomwol, op den oven goed gedroogd zijnde, of tusschen linnen gelegde flanel of watten bedekken, de borst door een' schortband ondersteunen; bevele eene rustige, waterpasse ligging in bed of op de *Sopha*, en bescherm de borst voor elke werktuigelijke belediging door drukking of binding, voor verkouding en het gebruik van al te prikkelende middelen, natte omslagen, pleisters, zalven en dergelijken, voor-



vooral als de ontsteking van een' roosachtigen aard is. Bij eene diep zittende, zuivere ontsteking nogtans, heeft zich na aanwending der bloedontlastingen en der overige, ontstekingswerende geneeswijze, de stoving, met eene niet te vochtige en matig warme pap uit rijst of haverdegort, steeds het heilzaamste betoond. Is de borst zeer door het zog uitgezet, en vloeit dit uit zich zelven niet naar buiten, maar hoopt het op, dan late men, indien het gemakkelijk en zonder vermeerdering der pijn geschieden kan, van tijd tot tijd een weinig daarvan met een zuigglas zachtens uithalen, geenszins echter met een' zogpomp, welke te hevig werkt; eer zou het uitzuigen door een' jongen hond aanprijzing verdienen, indien het niet walgelijk ware, — het dier de borst met zijne pooten niet openkrabde en de tepels ligt door te sterk zuigen en bijten ontveld raakten. Even zoo veel behoedzaamheid vordert ook het uitdampen van het zog met een heet ijzer, waarop men water giet, of een kopje met heet water of brandewijn, welken men aansteekt; deze dampen hebben het nadeel, dat zij de ontsteking en ophooping des zogs vermeerderen. De door wijlen STEIN geprezene, warme baden van een vlierafstreksel, door middel van het door hem uitgevondene borstbad-vat aan de borst gelegd, achten wij voor oneindig veel beter. Het allernadeeligste zijn nogtans, het zog opgehoopt zijnde, het sineeren met heet vet, bij voorbeeld heeten boter, het uitdrukken des zogs met de handen, harsachtige en zamentrekkende pleisters en het al te voorbarig weekmaken met pappen. Eer nog kan ter vermin-

de-

dering der ophooping en ter verligting van de ontlasting des zogs, het wasfchen of ftoven met dik, laauwwarm zeepwater van dienst zijn.

### §. 299.

Is de ontsteking niet meer te verdeelen en openbaren zich de §. 295 genoemde verschijnselen der verettering, dan trachte men de ettervorming op alle mogelijke wijzen te bevorderen; te dien einde verdienen, inzonderheid als de pijn hevig en kloppende is, eene warme pap van brood en melk, met bijvoeging van faffraan, of van lijnzaad, hennipzaad met melk, mostaard, melk en faffraan, waarmede men het borstbad van een vlieraftreksel met melk pare, aanprijzing. Stovingen en baden van *Herba Cicutae*, *Hyoscyami* zijn schadelijk, vooral als het kind nog aan de borst blijft, wijl de opfiorping der verdoovende ftof invloed op het kind heeft. Wijders late men de borsten matig ondersteunen en de lijdende meer zitten in het bed, dan liggen, om te verhoe-den, dat het *Absces* deszelfs punt van verettering niet in den omtrek van den tepel of nabij denzelven vorme, vermits anderzins bij het doorbreken of het openen van het *Absces*, ligt een lidteeken geboren wordt, dat alsdan voor immer het zogen onmogelijk maakt. Pleisters zijn niet zoo goed als de vermelde stovingen en borstbaden, of het moest zijn, dat men de zorg voor de omslagen der op-pasfers niet vertrouwen kan. Het *Emplastrum Ma-tris*, — *Diachylon Simplex* — *noricum* en de in *Berlijn* bekende *Jordansche* en door STEIN zeer geroemde, pleister bereiken in dezen het beste het doel.



doel. Voor het overige verbeide men de ontlasting des etters liefst van de eigene werkzaamheid der natuur; dan, indien zich een verheven, week, vochtgolvend punt opdoet, trachte men de spoedige ontlasting des etters te bewerken; met dit inzicht leggen men op de meest verhevene plaats een *Emplastrum gummosum* of een ander weekmakend middel ter grootte van een gulden- of drie guldenstuk, zoo ver doenlijk, van den tepel; opent zich het *Absces* niet spoedig van zelf, is de huid dun, heeft de ontsteking opgehouden, en klaagt de lijdèressen enkel over eene hevige, voor haar ondragelijke spannende pijn, ten gevolge des vergaderden etters onder de huid, dan kan men door eene genoegzaam groote insnijding met een *Lancet*, dat men schuins van beneden naar boven voert, en met hetwelk men meer snijdt, dan steekt, den etter vroeger ontlasten; nimmer echter neme men het mes te vroeg te baat, waardoor het klierachtige ligchaam zelf kan gekwetst worden; want vermeerdering der ontsteking, vertraging der verettering, verwoesting van het *Orgaan*, mismaakte nablijvende lidteekens en geheele ongeschiktheid tot zogen zullen de gevolgen zijn. Is evenwel de golving des etters duidelijk te voelen, en draalt men om den etter te ontlasten, hetzij door weekmakende middelen (*Maturantia*) of bij de opgegevene aanwijzing, door het *Lancet*, dan zal door het te lang verblijf des etters, door de voortdurende spanning en de hevige pijn, de slapeloosheid en koorts onderhouden, en bij vrouwen van een zwakkelijk gestel, geneigdheid tot tering geboren worden; de vorming van etter verspreidt zich

zich over den ganschen omvang der borst, en ondermijnt zelfs al het celweeffel; de etter baant zich een' weg tusfchen de borstklieren, vormt pijpzwerrige kanalen, en wordt zonder noodzaak vergroot. Bij de fteek met het *Lancet* ontftaat fomwijlen eene bloeding, die, als zij niet te fterk is, niet beletten kan, de infnijding grooter te maken; mogt zij evenwel te aanmerkelyk zijn, dan komen kompresfen van droog linnen te ftade. BURNS (t. a. p. pag. 620) verhaalt een geval, waar zulk een bloedvliet doodelijk werd. De koorts, de onaffcheidelyke gezellin der ettervorming, kan aanvankelyk inderdaad het karakter van *Synocha* hebben en de ontftekingwerende geneeswijze behoeven; in het vervolg echter, de ettervorming aanhoudende en toenemende, van een' zenuwachtigen of uitterenden (*hectifchen*) aard worden, als wanneer de krachten en voeding der lijdende afnemen. In dit geval is men gehouden, de koorts naar haren aard te behandelen, en der verettering paal en perk te ftellen; zoodra nogtans de koorts vermindert, en vooral de pijn in de borst heeft nagelaten, moet men tot verfterkende en zacht voedende middelen overgaan, ten einde de geftoorde voeding der lijderes te verbeteren.

### §. 300.

Na de ontlasting des etters, hetzij deze louter door de eigene krachten der natuur, of door middel des *Lancets* plaats had, late men den etter van zelven uitvloeijen, en ontzie alle fterke drukking, nademaal daardoor nieuwe ontfteking en fluiting der opening ont-



ontstaat. Deze dekke men alleen met eenig zuiver, zacht linnen, luchtig en niet te vast, opdat de ontlasting des etters niet gestoord worde, daarover een lapje met *Emplastrum Matris* of *Sperma ceti*-zalf leggende; men drage zorg voor de ontlasting des etters, en inzonderheid daarvoor, dat er zich geen pijpzwerige holten vormen en tijdens het verband de borst niet te veel der lucht en verkouding worde blootgesteld. Het is hoogst heilzaam, als na het openbreken, of kunstmatige openen van het *Absces*, een' tijd lang de etter blijft uitvloeijen, welke dikwijls met zog vermengd is, want daardoor verdwijnt van lieverlede de omschrevene hardheid. Indien deze nog blijft en pijn verwekt, en de vrijwillige ontlasting niet plaats grijpt, is het raadzaam, met de §. 299 vermelde pap van zemelen en melk, of haverdegort nog aan te houden. Bijaldien zij echter de huid aandoet, en eene zekere ontvelling te weeg brengt, late men haar weg en verwisfele dezelve met het opgegevene, luchtige verband van zacht linnen enz. Menigwerf wordt er na het openen, ten gevolge der aandoening, of der verkouding, nieuwe ontsteking geboren, alsdan bedekke men de plaats met *Unguentum saturninum*; en ingeval de wonde met harde randen omgeven is, voege men bij de genoemde zalf een weinig *Unguent. Hydrargyri cinereum*. Vertoont zich trouwens onder het verbinden een door celweeffel gevormde prop in de wonde, die zich nog niet geheel heeft afgescheiden, dan trekke men denzelven toch niet met het *Pincet* uit, wijl hieruit ligtelijk nieuwe ontsteking en verettering geboren wordt,

wordt, maar bade de borst bloot met zuivere, zoete melk, met een weinig honig vermengd.

§. 301.

De uitgang der in verettering overgegane ontsteking is diensvolgens zeer onderscheiden; door deze gaat alle zwelling en hardheid te niet, en de borst wordt, mits de klier zelve niet te veel geleden heeft, geene fistelopeningen zich opdeden, en de ettervorming niet te lang aanhield, geene der §. 293 opgeteekende zamengesteldheden plaats heeft, zoo volkomen hersteld, dat somwijlen bij zogenden zelfs het zog op nieuws te voorschijn komt, en de lijdende dra weder het kind met de ongesteld geweest zijnde borst voeden kan; veelvuldiger nogtans gebeurt het niet, zoodat het kind met eene borst zich moet vergenoegen; soms blijven enkele klonten of verhardingen, stâge zwelling der borst, tegen den avond, met koorts, eene uitgestrekte verettering met eene uitterende koorts, versterking en uitslag na.

§. 302.

Blijven, na volkomene bedaring der ontsteking en verettering, klonters of verhardingen over, zoo zijn deze niet altijd gevaarlijk, en men ontmoet ze somtijds, offchoon het *Absces* gemakkelijk genas en metterdaad weinig beteekende; zij ontleenen dikwerf alleen hunnen oorsprong uit het meer zamenhangende en vaster gewordene celweeffsel; daar dit nu ten gevolge der verettering vaneen gegaan en gescheiden is, zijn de klieren meer tot elkander ge-



komen en doen zich daardoor meer ineengedrongen voor. Werkelijke verhardingen nogtans eener aanmerkelijke uitgestrektheid van de eene of andere borstklier blijven menigmaal lang onpijnlijk, en zelfs lang in denzelfden toestand, veroorzaken intusschen toch bezorgdheid voor toekomstige gevolgen, of eene nieuwe ontsteking en verettering. Bij teruggeblevene klonters, uit de vermelde naaste oorzaak ontstaan, verbiede men na de genezing des *Absces* alle drukking, verordene het menigvuldig baden der borst met warm zeepwater, of matig warme stovingen eener oplossing van gezuiverde potasch of *Tartaris Potassae*, of de inwrijving eener zalf van *Hb. Cicutae* met honig, en verbiede het zogen, indien de melk niet gewillig zich laat uithalen. Mogten evenwel de vermelde klonters lang blijven bestaan en schijnen zij gaandeweg harder te worden, of zijn er werkelijke verhardingen met aanwas van het klierligchaam overgebleven, zoo zorg men voor afleiding door zachte ontlastmiddelen (§. 297) en wende zachte inwrijvingen aan van den *Spiritus Mindereri*, of dien des kamfers drie malen daags, of van de zalf uit het *Ung. saturninum* met *Lin. volatile camphoratum*, stovingen met kamferbrandewijn, waarbij men nog een tiende gedeelte *Acetis Plumbi liq.* mengen kan. Ondertusschen, deze middelen niet spoedig hunne werking toonende, maak ik van de meermalen door mij aanbevolene kwikkuur, zoowel in- als uitwendig, gebruik; daartoe is de zoete kwik (*Murias Hydrargyri oxydul.*), in alle geval met *Carbonas Magnesiae* en de *Herb. digitalis* vermengd, uitnemend geschikt, hiertoe

het

het *Ung. Nitratis Hydrargyri* met bijvoeging tevens van de *Digitalis purpurea*.

§. 303.

Is het *Absces*, in zekeren zin, volkomen genezen, maar doet zich tegen den avond immer eenige zwelling op, en wel ten gevolge van zwakte, dan is er ligt vorming van een zuiver ettergezwel op handen. In dit geval komen algemeen versterkende middelen, de zoogenaamde *Tonica*, te pas, en onder deze, vooral de kinabast; wijders late men de borst nog eenige weken, zorgvuldiger dan ooit, warm houden, verbiede iedere ontblooting, drukking, betasting en verkouding, en late het kind de borst geven. Openbaren zich verschijnselen van nieuwe ettervorming, inzonderheid als de kraamvrouw zelve niet zoogt, dan zit het gezwel soms zeer diep en is onpijnlijk, langen tijd tevens hard op het gevoel, en strekt zich gaandeweg tot zulk een' omvang uit, dat het eener *scirrheuse* of *scrofuleuse* verharding evenaart. De ettervorming gaat evenwel onmerkbaar voort, ofschoon ook slechts weinig pijn verwekkende. Eindelijk echter gaat het gebrek met raspe schreden voorwaarts, de pijn neemt toe, wordt kloppende, de huid rood en ten langenlaatste breekt het *Absces* open. In deze omstandigheden moet men het *Absces* met weekmakende, warme pappen en stovingen in dier voege behandelen, als §. 299 staat opgeteekend.

§. 304.

Is trouwens de wederinstorting van dien aard,  
 Ff 2 dat



dat de verettering wijd en zijd zich uitbreidt, verdeeld in bijzondere *Abscesfen*, vergezeld met groote zwakte, en uitterende koortfen, zoo is zij, of het gevolg eener achtelooze behandeling, of eener ziekelijke gesteldheid. De borst wordt in haren geheel omvang hevig aangetast, en de uitvloeiende stof is gemeenlijk zeer stinkende. In dit geval trachte men de levenskracht, derhalve ook de voeding, op alle mogelijke wijze te versterken: door het genot van eene zuivere lucht en hoofdzakelijk het verblijf op het land in een gezond oord; door het gebruik van saleb, IJslandsche mos, de kina en andere versterkende middelen, vereenigd met een' voedenden eetregel en wijn. Pijpzwerige kanalen vereischen zeer diepe openingen, of tegenopeningen en de behandeling volgens de algemeene regelen der Heelkunde. Zelfs als er geen sterke verettering, of zweem van kropklierige verharding bestaat, kunnen toch ten gevolge van een zeer uitgebreid ettergezwel, of eener langdurige verzwering, de krachten zeer gezonken zijn, en de lijderes in een' uitterenden staat verkeeren, die de aangevoerde en andere, in dezen dienftige, middelen vordert.

### §. 305.

Zeldzaam, en meestal slechts ten gevolge eener veronachtzaamde behandeling door vele scherpe zalven, of heete omslagen en dergelijken, en daardoor onderdrukte ettervorming gebeurt het, dat een *Absces* van de borst in verfterving overgaat; mogt dit onverhoopt het geval zijn, zoo wordt de bijkans vernietigde huid, waaronder de etter in de diepte zit, zwartbruin

bruin en de, zich ontlastende, stof stinkende; inmiddels klaagt de lijderes over groote zwakte, de pols wordt al minder en minder, is klein en staat dikwijls, de huid is droog; de tong bruin beslagen, terwijl ook het zog in de gezonde borst minder wordt, en het aanwezige in hoedanigheid verandert, te weten dun, waterig; het kind, bijaldien het nog aan deze borst wordt gelegd, zuigt niet, of het binnengekregene zog berokkent hetzelfde onrust, krimpelingen en buikloop. Bij zoodanigen uitgang der ontsteking trachte men ijlings der versterking paal en perk te stellen; te dien einde wende men inkervingen in de borst aan, de *gescarrificeerde* vlakke late men met eene zalf, uit honig met kamfer en kinapoeder vervaardigd, verbinden, en eerst dan, als de verstorvene korst loslaat, kan men haar langzamerhand met de schaar wegsnijden. De aangedane plaats late men met een kina- of wilgenbast-afkooksel, *Salammoniac* of kamfer er bijmengende, stoven; tot inwendig gebruik schrijft men mede een sterk kina-afkooksel, geruggesteund door een' voedenden eet-regel en wijn, voor; en indien de koorts een rotachtig aanzien verkrijgt, kamfer met *Serpentaria*, en tot drank het *Acidum sulphuricum* met *Syrupus Rubi Idaci* in water, of bij voorkeur nog het *Mixtura sulphurica acida*.

§. 306.

Somwijlen is met de ontsteking en verettering der borst eene schurftige, *venerische*, haarwormige, kropklierige, *rheumatische* of jichtige zamengesteldheid verbonden. Alsdan is men verpligt, bij de



genezing op deze *Complicatie* te letten en haar naar de voorschriften der bijzondere Geneeskunde (*Therapia specialis*) te behandelen, voornamelijk omdat meestentijds ontsteking en verettering, zonder deze oplettendheid niet genezen, en zelfs eene overgeblevene verharding of zwelling nimmer verdwijnt. Bij de vereeniging met een huiduitslag, ziet men, dat na de genezing van het *Absces*, uitslag of bloedzweren zich vertoonen. Zoo ontmoet men soms een schurftig uitslag aan de borst, of naar bloedvinnen gelijkende zweren, ten gevolge van den opgeslorpten etter; of de ontsteking der borst ontstaat als ziektestof op eene andere plaats; in dit geval moet men zulke middelen toedienen, die voor den aard van het schurftige uitslag gepast zijn, en bij eene *metastatische* ontsteking trachte men onverwijld de afleiding, inzonderheid van een voornaam *Orgaan* door blaarpleisters en ontlastingen door middel des kwiks te beproeven. Heeft het uitslag een *venerisch* karakter, bevestigen een vroeger bestaan hebbende, *venerische* witte vloed, of nog andere deels verdwenen, deels voorhandene verschijnselen de *venerische* ongesteldheid, zoo komen de kwikmiddelen, als het *Murias Hydrargyri oxydulat.*, het *Plumersche* poeder, met een afkooksel van *Salsaparilla* wortel inwendig, en baden of waschingen, waarin Sublimaat opgelost, uitwendig te stude. Zuivere bloedzweren brengt men in verettering door er een *Empl. gummosum* op te leggen; bij eene *venerische* zamengesteldheid evenwel vermene men haar met *digestiefzalf*, met *Merc. praecipitat rubr.* bedeed.

## L I T T E R A T U R.

CHAPELLE, *Dissert. de inflammatione mammarum. Leid.*  
1670.

A. DE TRIBOLET, *Dissert. de mammarum cura in puer-*  
*perio. Goettingae 1797. 4<sup>o</sup>. S. 47—57.*

F. B. OSIANDER, *Denkw. II. Bd. 2. St. S. 436—441.*

SPONITZER, *über Entzündung, Eiterung und Verhartung*  
*der Brust vorzüglich der Wöchnerinnen; in HUFELAND'S*  
*Journal der praktischen Arzneikunde. VII. Bd. 3. St.*  
*Jen. 1799. 8<sup>o</sup>.*

CARUS, *Gynäkologie. II. Bd. §. 1590—1593.*

BURNS, *a. a. O. S. 618—621.*



## V I J F D E H O O F D S T U K.

*Van de zoogenaamde zogverplaatfingen.*

## §. 307.

Onder zogverplaatfingen, zogafdwalingen (*Metastasis lactis, aberratio humoris lactei*) verstaan wij in het algemeen eene, op onnatuurlijke plaatfen te voorschijn komende, afscheiding van melkachtige vloeistoffen, zoodat, of het zog volftrekt nog niet in de borsten gevormd was, of uit dezelve weder in het bloed en van daar weder in verschillende deelen des ligchaams ter nedergezet is. De vroegste Artsen waren met deze ziekten in het geheel niet bekend; Fransche Geneesheeren bepaalden allereerst daarop de aandacht, Duitfche en Engelsche loochenden haar. Onderzoeken wij de onderscheidene berigten der bijzondere fchrijvers, dan blijkt het, dat de zogverplaatfing van een' zeer verschillende aard kan/zijn, dat zij zich plotseling op de inwendige holten des ligchaams werpt en gevaarlijke, zelfs ras doodelijke ziekten te weeg brengt, of dat zij uitwendig meer of min uitgebreide gezwellen vormt, welke men zoggezwollen genoemd heeft, overmits men bij het openen, of natuurlijk openbreken derzelve eene melkaardige vloeistof ontdekt heeft. VAN SWIETEN, LEVRET,

SELLE, DOUBLET en anderen hebben ons wijdloopig verklaard, op welke verschillende wijzen zich eene zogverplaatsing kan voordoen, en volgens deze geschieden de verplaatsingen 1) naar de huid. Hier meent men verscheiden huiduitslagen waargenomen te hebben, zoguitslag, zogkoortsen, bloedvinnen, *Abscesfen*, zogzweet en dergelijken; 2) door den stoelgang en de Urin, zogontlasting, zogUrin; 3) naar den mond, zogophoesting, zogkwijling; 4) naar den navel; 5) naar den Uterus; 6) naar de hersenen, waarvan dan hersenontsteking, razernij, *Melancholie* haren oorsprong ontleenen; 7) naar de borstholte: *Angina pectoris*; 8) menigvuldiger naar het bekken, tusfchen de spieren van het bekken, of op het buikvlies; 9) naar de ledematen; eindelijk 11) naar de buikholte zelve, waardoor volgens velen de grond tot kraamvrouwenkoorts gelegd wordt. Offchoon het nu wel van weêrskanten niet ontkend kan worden, dat men aan al de genoemde plaatsen eene melkachtige vloeistof kan aantreffen en inderdaad gevonden heeft, is het evenwel nog hoogst twijfelachtig, of men dit verschijnsel werkelijk met regt eene zogverplaatsing heeten kan. Wel is waar, heeft de gevondene vloeistof dikwerf veel van zog, hetzelfde aanzien en schier dezelfde scheikundige bestanddeelen, wij vinden nogtans ook zulke zoogenoemde zogverplaatsingen of zogophoopingten bij mannen, — of bij vrouwen in zulke betrekkingen, waar op geene zogverplaatsingen kan gezinspeeld worden. Hoezeer wij daarom ook niet ontkennen kunnen,



dat de *Metastasis Lactis Puerperarum* met de zog-  
 afscheiding en de verrigting van het zogen in naauwe  
 betrekking, en, in zekeren zin, in een oorzakelijk  
 verband staat, zoo schijnt ons echter reeds zoo  
 veel bewezen te zijn, dat de, op onnatuurlijke  
 plaatsen nedergezette, vloeistof geen waar zog is.  
 Dusdanig kan eeniglijk in de borsten zelve, als  
 de door natuur tot deszelfs vorming en afscheiding  
 bestemde werktuigen, voortgebragt worden. De op  
 andere plaatsen ziekelijk gevormde vloeistof heeft  
 natuurlijk veel overeenkomst met zog, zoo veel te  
 meer, als de zoogenaamde verplaatsingen eerst dan  
 ontstaan, nadat het zog reeds in de borsten was  
 afgezet geworden; en zij bevat toch altoos de stof  
 die de bestanddeelen van goed zog behoort uit te  
 maken. *Practisch* beschouwd, is eigenlijk deze ge-  
 heele strijd ook voor den Arts van zoo veel aanbelang  
 niet; *theoretisch* echter is zij van meerdere waarde  
 en gewigt; de reden, waarom men omtrent dit  
 punt inzonderheid verschillend bleef denken, is, dat  
 de scheikundige proeven zelfs nog geen genoeg-  
 zame bewijzen hebben opgeleverd. MECKEL, *de*  
*oude*, STOLL, FRANK en anderen hebben de ver-  
 plaatsing van zog als oorzaak van de hier bedoelde  
 ziekelijke verschijnselen volstrekt ontkend, en zij  
 hebben in zoo verre gelijk, als men aan het zog  
 alleen dit niet kan toeschrijven, en nog andere  
 oorzaken ten grondslag moeten liggen; inmiddels  
 kan men den eenmaal aangenomen' naam blijven  
 behouden, terwijl men tevens de ongeregeldheid in  
 de zogafscheiding als de hoofdzaak moet aanzien.  
 Nimmer zullen er zogverplaatsingen geschieden,

zonder door eene zogkoorts voorafgegaan te zijn. Met deze en gene naaste oorzaak staan zij in een oorzakelijk verband, en schijnen het gewrocht derzelve te zijn, waarbij altoos een stoffelijke prikkel ten grondslag moet liggen, die juist dezen uitgang te weeg brengt.

### *Diagnosis.*

#### §. 308.

Uit de bijzondere omstandigheden en de aanwezige verschijnselen leeren wij dit gebrek kennen. De koorts, die de zogaffscheidung voorafgaat, is ongeregeld, waarop het zog van plaats verandert, of naar inwendige deelen, die zich dan menigmaal door zogwaardige afscheidingen te kennen geven en onderscheiden, of bijaldien dit ook het geval niet is, dan zijn de veranderde verrigtingen van het aangedane deel in vereeniging met de bijzondere omstandigheden, of de vorming van eene, onder de huid zich uitbreidende zuchtige, onpijnlijke, soms pijnlijke zwelling, met vermagering van hetzelve bij hare ontwikkeling — de algemeene teekenen, welke eene zoogenaamde zogverplaatfing doen vermoeden. De bijzondere en zekere teekenen zijn de volgende: begon alreede, of was de zogaffscheidung even te voren volkomen tot stand gekomen, dan verdwijnt van lieverlede of eensklaps het zog uit de borsten der bevallene; de borsten worden slap, en de zogvaten zijn niet duidelijk meer te voelen. Onmiddellijk na de verdwijning des zogs wordt de lijdere onrustig en angstig,



er vertoont zich koorts, met de zogkoorts het meeste overeenkomende, hitte, drooge huid, en dorst, benevens een volle, harde, radde pols, en plaatst zich het zog op eenigerhande deel van het ligchaam, hetgeen in het gezigt valt, dan ontwaart men teekenen van ontsteking aan dit deel; neemt het de armen of beenen in, dan doet zich eene aan roos evenarende zwelling op, waarin men nogtans vroegtijdig vochtgolving ontdekt; verhuist het naar de hersenen, hetgeen vooral na hartstogten en gemoedsaandoeningen ligtelijk geschiedt, dan openbaart zich hoofdpijn, zinneloosheid, duisternis voor de oogen, zwarte staar, oorensuizing, slaapzucht, kaakkramp, razernij, voortdurende onzinnigheid en dikwerf plotselinge beroerte (*Paralysis lactea*, *Apoplexia lactea*, *Hemiplegia lactea*); de hersenen zijn de gevaarlijkste plaats dezer *metastatische* ontsteking. Na den dood vindt men, volgens onze eigene bevinding, bij de lijkopeningen, eene naar zog zweemende, witte vloeistof, tusschen den schedel en de *dura Mater*, en dikwijls in de diepte onder de *pia Mater* tusschen de hersenholligheden. Verstrekken de longen, het borstvlies (*Pleura*), of de buikholte ten zetel der *metastatische* ontsteking, dan ontstaat in het eerste geval *Peripneumonia*, in het tweede *Pleuritis* en in het derde onderbuiksonsteking, hetzij in de darmen (*Enteritis*) of in het buikvlies, (*Peritonitis*) en indien de verdubbeling van het buikvlies (*Duplicatura Peritonaei* (*Mesenterium*)) aangedaan wordt, brengt zij somtijds de nederzetting in den omtrek des navels te weeg, hetgeen *Absces* vormt en zich door den navel een' weg baant,

baant, gelijk ik dit meermalen te *Berlijn* heb waargenomen; in twee gevallen bestond het gebrek reeds eenige jaren; ook wordt het celweeffel der spieren, voornamelijk der bekken-, dij- en darmbeenspiieren, zeldzamer dat der spieren van het been, de borst, den arm, den schouder en den rug door deze *metastatische* ontsteking aangedaan; alsdan volgen heuppijn, moêheid in de lendenpiieren en *Abscesfen*, die later openbreken en beenzweer (*Caries*) verwekken. Uit deze deelen gaat de *Metastasis*, indien de zogaardige etter geen' uitweg kan vinden, tot de afscheidingsorganen over, en nu wordt er eene fcheidende (*kritische*) ontlasting geboren, bij voorbeeld uit de speekfelklieren, in den mond speekfelvloed, in het darmkanaal een groene, zuurriekende, zeldzamer een witte buikloop; uit de piswerktuigen, eene witte *Urin*. Neemt zij de huid in, dan vertoont zich een zuur, naar hui riekend zweet en uitflag, de afdwaling naar de baarmoeder geeft zich door een' zogaardigen kraamvloed te kennen, welken wij eenige malen waarnamen. In de borsten zelve kan zij het celweeffel, of de opgerolde klieren (*Glandulae conglomeratae*), of okfelklieren aandoen. Voor het overige ziet men, dat deze verplaatsingen zich eer in zulke *organen* en deelen des ligchaams zetelen, welke vooraf reeds in een ziekelijken staat verkeerden. Bij kraamvrouwen, die aan hoofdpijn lijden, naar het hoofd; bij menigvuldig hoesten en aanleg tot toring, naar de longen; bij *Rheumatismen* in den opperarm, of den schouder, naar deze; bij ziekelijke nieren, naar deze enz., waarvan ik door mijne ondervinding overtuigd werd.

Soms



Soms gebeurt het ook, dat, wanneer bereids het *Absces* op eene plaats genezen is, het na korter of langer tijdsverloop op eene andere plaats, en later nog op eene derde te voorschijn treedt. Zoo zag ik hetzelfde eerst aan den arm in de nabijheid des gewrichts, voorts aan den schouder, en toen het ook hier genezen was, onverwachts onder de darmbeenspieren ontflaan en zich ontwikkelen.

### *Oorzaken.*

#### §. 309.

Ten aanzien der *Aetiologie*, hebben wij reeds aangemerkt, dat de zogverplaatfingen gemeenlijk na eene koorts zich ontwikkelen, die met de zogkoorts, wat hare verschijnselen aanbelangt, overeenkomt, — en hieruit vloeit natuurlijk van zelve voort, dat alles wat der zoting hinderlijk is en stoort, ook middellijk tot zogverplaatfing aanleiding geven kan. Ondertusfchen bezitten kraamvrouwen, boven andere tot deze ziekelijke, en in zeker opzigt hoogst gevaarlijke en doodelijke ziekte, eenen bijzonderen aanleg. Dusdanige voorbeschikkende oorzaken zijn verstopping der zogvaten, of uitwendige toefluiting derzelve door verdikte wei, door geronnen zog, voornamelijk door het ophouden met zogen, de met geweld onderdrukte toevoer van zog, wanvormigheid der borsten, en vooral gebrekkelijke tepels, waardoor het zogen onmogelijk wordt; ongesteld, te dik zog, te overgroote gevoeligheid en prikkelbaarheid der kraamvrouw. Tot de gelegenheidgevende oorzaken, die hier voornamelijk in aanmerking

king komen, behooren dienvolgens: te groote rijkdom aan melkstof (*Polygalacie*), waarbij zij niet alleen in eene te groote hoeveelheid wordt afgescheiden, maar ook het zog zelf te dik en vet is, zoodat hetzelfde niet behoorlijk in de borsten afgezet en afgezonderd wordt; voorts verwaarloozing der borsten, zoodat zij tot zogen ongeschikt zijn; de op eenigerhande wijze gestoorde afscheiding van zog, door beletfelen in het zogen bij pijnlijke, opene tepels, door zielsaandoeningen, als daar zijn: toorn, schrik, ergernis, te groote vreugde, vrees voor het zuigen en pijn bij stuk gezogene tepels; zoo heb ik eens eene dame gezien, die telkenmale reeds een half uur vroeger, uit vreeze voor de pijn, door kramp en huiveringen overvallen werd, ingevolge waarvan het zog eensklaps uit de eene borst verdween, en in de andere verminderde, en alle teekenen eener zogverplaatfing naar het hoofd zich openbaarden; wijders verkouding; misflagen in den eetregel, vooral door het gebruik van te voedende, verhittende spijsen en dranken; te heet weder, een van de gewigtigste, schadelijke invloeden, en onlangs in het jaar 1825 bij kraamvrouwen in *Berlijn* zeer merkbaar, — *Diarrhoeën* en voornamelijk het gebruik van te sterke, en geweldige (*drastische*) ontlastingwekkende middelen, uitoefening van den bijlaap tijdens het zogen, hevige ontsteking der borst, die ophooping van het zog veroorzaakt en deszelfs afscheiding stoort, hevige ontsteking in een van de borsten verwijderd deel, en elke afgelegene prikkel. Overigens staan zulke kraamvrouwen het menigvuldigst voor eene zogverplaatfing bloot, die zelve

niet



niet zogen en, ofschoon zog genoeg hebbende en volkomen daartoe in staat zijnde, zich aan dezen moederlijken pligt onttrekken, of zeer gevoelige en te gelijk saprijke vrouwen, die, wel is waar, haren moederlijken pligt niet verzaken, maar bij welke, indien het kind niet behoorlijk zuigt, en de borsten ledig maakt, het zog ophoopt en, die bij het aanleggen des kinds aan de borst, hevige pijn en kramp ontwaren. Voor het overige ontstaan de zogverplaatfingen, wel is waar, over het algemeen vroeger of later in het kraambed; zij kunnen evenwel ook in vervolg van tijd bij eene zogende zich opdoen; wij zagen ze eenige malen na de negen maanden bij het spenen des kinds.

### *Voorzegging.*

#### §. 310.

De voorzegging (*Prognosis*) is naar gelang van de zitplaats des gebreks verschillende, over het algemeen echter niet slecht. Eene zogverplaatfing naar het binnenste gedeelte des ligchaams is altijd gevaarlijker, dan een eenvoudig zoggezwel, en is in haar verloop gemeenlijk ook veel langzamer; men slaagt nogtans zeker altijd in de herstelling der kraamvrouw. Trouwens, men kan toch gevallen aantreffen, waar de ziekte of schielijk doodt, of doodelijke ziekten naar zich sleept. Beroerten, hersenontsteking, longtering, kraamvrouwenkoorts ontleenen somwijlen haren oorsprong hoofdzakelijk van eene zogverplaatfing, en zijn alsdan gevaarlijk; de *metastatische* ontstekingen der hersenen, der longen en van het hart

hart sluiten, vooral bij ziekelijke voorbeschiktheid wegens de ligt daaruit voortvloeiende uitzweeting, het meeste gevaar in zich. Meermalen heb ik borst- en hartenzakwaterzucht, en in een geval ontsteking van het hart waargenomen, eenmaal met de geweldigste hartkloppingen, opgezetten pols, met flauwten en gelijk aanwezige, buitengewoon sterke klopping der *Aorta descendens*, bijna ter plaatse waar zij zich in de *Arteriae iliacae* splitst.

### Geneeswijze.

#### §. 311.

Het wezenlijke doel der genezing berust, indien het mogelijk is, op verwijdering der aanleidende oorzaken en hare gevolgen, met terugzien op het *orgaan* of de plaats, waar het zog zich nedergezet heeft, en dan de natuurlijke in het kraambed plaats grijpende verrigtingen, voornamelijk echter de zog-afscheiding in de borsten weder aan den gang te brengen. Daarom is — bovenal en zoodra de veel- ligt nog weg te nemene oorzaken, bij voorbeeld verkouding, verhitting, ongeschikte eetregel, gemoedsbewegingen, ziekelijke of gebrekkige gesteldheid der borsten en tepels enz. verwijderd zijn, — de gewigtigste aanwijzing ter genezing, het zog naar de borsten terug te leiden door zuigglazen; door kinderen, die men aan de borst legt; door vrouwen, of jonge honden, die zuigen; door lenigmakende omslagen; door borstbaden; door middel van het koperen vat van STEIN; door zuurdeeg en drooge koppen, welke op de borsten gezet worden. De



zogpompen werken altijd zeer geweldig; ondertus-  
schen dient men bij zulk een gevaarlijk geval, en  
inzonderheid bij verplaatfing des zogs naar de her-  
fenen, ieder middel in het werk ftellen, en kan  
men de, na de aanwending der zogpomp, volgende  
toevallen niet in aanmerking nemen, vooral als er  
geene kinderen, of jonge honden te bekomen zijn.  
Wij moeten hier nog aanmerken, dat de echtge-  
nooten zelve ook de tepels opzuigen, doch dit  
verdient in ieder geval geene aanprijzing, daar we-  
gens het wellustige gevoel en de opgewekte teel-  
drift ligtelijk den grond tot ontfteking (*Erethismus*)  
gelegd wordt, en waar koorts en ontfteking beftaat,  
het oogmerk niet immer bereikt, koorts en ontfte-  
king vermeerderd en de *Metastasis* niet weggeno-  
men wordt.

### §. 312.

De gewigtigfte en meest gewone gevolgen der  
*Metastasis* is de ontfteking van het *orgaan* of deel,  
waarin gene zich nederzet; deswege is de tweede  
en dringende aanwijzing ter genezing, de wegne-  
ming der ontfteking; dus komt het ontftekingwerende  
geneesplan, middelerwijl men op de koorts en het  
aangedane werktuig zelve de aandacht vestigt, te  
ftade. Gefchiedde de *Metastasis* vooral zeer fchie-  
lijk naar de herfenen, was de zogaffcheiding in de  
borften zeer aanmerkelijk, en is het tevens een  
zeer fterk, robust, volbloedig, jeugdig en prikkel-  
baar voorwerp, en hebben de koorts (*Synocha*),  
de pijnen en hitte in het hoofd, bedwelming of  
ijling eenen hoogen graad bereikt, dan drale men  
niet,

niet, dadelijk eene aderlating op den arm voor te schrijven; bij een' minder' graad van ontsteking, en der genoemde verschijnselen bij gevoeliger en minder saprijke gestellen, en waar het zog niet ten eenemale uit de borsten geweken is, zijn bloedzuigers aan het hoofd, en bloedige koppen op hetzelfde, op de armen en de schouders, koude omflagen, bij voorkeur de *Fomentatiën* van SCHMUCKER om het hoofd, koude voet- of halve baden aangewezen. Met de algemeene bloedontlasting pare men het salpeter, opgelost in eenigerhande water met *Syrypus Rubi Idaei*, of *Mororum*, of in eene *Emulsio oleosa*, zachte ontlastmiddelen uit de middelzouten, *Sulphas Sodae*, *Tartris Potassae*, Tamarinde en *Manna*, zachte ontlastingwekkende lavementen, verdunnende dranken met plantenzuren, bijzonderlijk het wijnsteen zuur (*Acidum tartaricum*). Onder de zouten, tot inwendig gebruik dienstig, heeft de *Sulphas Potassae* (*Arcanum duplicatum*) bijzonderen roem verworven, dien zij nogtans niet altoos verdient, wijl het soms in het geheel geene werking doet. Dit zout werkt in zekeren zin minder door de bedaring van de verhoogde prikkelbaarheid van het vaatgestel bij ontstekingen, dan wel door zijne verzwakkende eigenschappen voor de spijsvertering en de gelijkmaking. Reden, waarom het zoo sterk in ontstekingachtige ziekten met overvloed aan *plastische*, voedende stoffen, als een uitmuntend middel wordt aangeprezen, en daarop is ook deszelfs roem gevestigd in ontstekingachtige ziekten der kraamvrouwen, in zoogenaamde zogverplaattingen, bij eene overtollige vorming van zog. Men geeft het



hier in zulke giften, dat het matige ontlasting te weeg brengt. Bij sterke gestellen prijst men dit zout ook als een middel, de spijsvertering bevorderende. Teedere, gevoelige gestellen, voornamelijk echter zwakte van de maag en het darmkanaal, vorderen omzigtigheid bij de toediening, of verdragen hetzelfde volstrekt niet. Als middel ter bevordering der spijsvertering geeft men het van een half tot een geheel scrupel, en als ontlastmiddel, inzonderheid bij de vermelde zogverplaatsing naar de hersenen, laat men alle twee tot drie uren eene halve, geheele, tot anderhalve drachma nemen, hetzij in den vorm van poeijer alleen, ter verbetering van den smaak een weinig *P. Radic. Liquiritiae* er bijvoegende, in vereeniging met *Tartarus depuratus*, of in den vorm eener oplossing, bij voorkeur met een omwindend bijmiddel, bij voorbeeld een half ons tot zes drachmen in acht oncen heet water opgelost, waarbij men een tot anderhalf ons *Syrupus Liquiritiae*, of *Syrupus Mororum*, of *Extractum Graminis* voegt, zoodat men de lijderes om de twee uren een' eetlepel vol nemen laat. Is de koorts van weinig aanbelang, of de zogophooping in de borsten niet beduidende, dan kan men het ook als een, de spijsvertering bevorderend, middel tot twee drachmen toedienen, vereenigd met *Tartarus depuratus*, gelijke deelen, *Carbon. Magnesiae* eene drachma en *Elaeosaccharum Foeniculi* Zij innemen laten. Anderen (SPONITZER, *a. a. O.*) gebruiken de zwavel met den wijnsteenroom, ten einde afleidend te werken en de melkstof langs het darmkanaal weg te voeren; hoezeer ook de zwavel zich in

in vele gestoorde afzonderingen, afscheiding en uitwerping, zelfs in de *Metastasen*, welke dikwerf de moeilijkste en de hardnekkigste zenuwtoevallen en ziekten, krampen, aandoeningen van de borst enz. te weeg brengen, aanbeveelt, zijn wij echter van meening, dat het als een werkzaam, prikkelend, het leven en de werkdadigheid der grootere en kleinere slagaderlijke vaten aanzettend middel bij eene zogverplaatsing met aanmerkelijke slagaderlijke ontsteking der hersenen, der longen, van den onderbuik enz. niet kan aangewend worden, maar wel bij meer aderlijke ontstekingen, of na behoorlijk in het werk gestelde algemeene, of plaatselijke bloedontlastingen en de overige ontstekingwerende geneeswijze. Men dient de zwavelbloemen (*Flores Sulphuris*, *Sulphur depuratum*) in vereeniging met den *Tartarus depuratus* toe, of waar men vroeger aanwijzing heeft tot ontlasting des darmkanaals, de nedergeplofte zwavel (*Sulphur praecipitatum*, *Lac Sulphuris*), in giften van vijf tot vijftien greinen eenige malen daags, tevens vermengd met *Tartarus depuratus*, *Magnesia carbonica* enz. Geen middel evenwel verdient meer aanprijzing bij eene *metastatische* hersenontsteking, dan het zoete kwik (*Murias Hydrargyri oxydulat.*) of *Calomel*, na alvorens ontstekingwerende middelen en bloedontlastingen, in behoorlijke mate, ter vermindering van de *plasticiteit* des bloeds in het werk gesteld te hebben, ten einde door deszelfs prikkelende eigenschap op het opslorpende vaatgestel, de uitzweeting der zogstof te voorkomen, en in groote giften, haar langs het darmkanaal af te drijven, aangezien het deszelfs afschei-



dingen vermindert en meer of minder den stoelgang bevordert. Ter bereiking van het eerste doelwit geeft men het in kleine giften van een half tot een geheel grein enkel, of vereenigd met het vingerhoedkruid (*Herba digitalis purpurea*); bestaat er echter aanwijzing, vooral bij eene plotseling ontwikkelde zogverplaatsing naar de hersenen, om dadelijk op het darmkanaal te werken, dan moet men het in grootere giften van twee, drie tot vier greinen, en opdat het schielijke ontlasting veroorzake, met bijvoeging van *Carbonas Magnesiac* toedienen. Bij eene zeer hardnekkige verstopping kan met hetzelfde ook met de *Jalappe* vermengen.

§. 313.

Bij de toepassing van het §. 312 opgegevene geneesplan is de uitgang gelukkig, als de ontsteking en koorts afnemen, de aandoeningen van het hoofd verminderen en het zog weder in de borsten verschijnt. Wordt echter de koorts van een' zenuwachtigen aard, de pols gaandeweg kleiner en sneller, blijft de huid brandende, de tong droog, bespeurt de lijdende eene toenemende zwaarte des hoofds, blijft zij bepaald op eene zijde liggen, en blijven de oogappels strak openstaan, openbaart zich de gestoorde zenuwwerking over het gansche ligchaam (*Status nervosus*), als ook in de pols, benevens eene algemeene levenszwakte (*Debilitas vitalis*), en heeft er eene gestadige afwisseling van verschijnselen plaats, vertoont het zog zich niet weder in de borsten, dan hebben men alle vrees voor eene uitzweeting van stof in de hersenen, of zij is alreede voorgevallen; het juiste tijdstip laat zich trouwens bij de afwisseling der

der verschijnselen, menigwerf 'hoogst moeilijk bepalen. In dit geval, en voornamelijk bij eene aanmerkelijk toegenomene zwakte, is de voorzegging allerongunstigst, en bij werkelijk plaats gegrepene uitzweeting, volgens onze ervaring, volstrekt aan geene hulp meer te denken. Daar het echter in ieder geval niet zeker te bepalen is, of de uitzweeting werkelijk hebbe plaats gehad, moet men haar toch nog trachten te verhoeden, en zulke middelen gebruiken, die naar den aard der aanwezige koorts, intuschen altijd denkende om de werkzaamheid des watervaatgestels door vermogende middelen aan te zetten, aangewezen zijn; daartoe behooren de *Arnica*, de *Senega*, de *Valeriana*, de *Serpentaria*, de *Acetis Ammoniae liquida* (*Spiritus Mindereri*), de kamfer, de muskus, vereenigd met *Sulph. auratum antom*, *Spirit. Cornu Cervi succinatus*, het vlugge loogzout, het *Acidum sulphuricum dilutum*, het *Elixir acidum Halleri*, het *Acidum muriaticum oxygenatum* en het Phospherzuur. Wijders late men het hoofd kaal scheren en aanhoudend met koude of *Schmuckersche* omslagen, of ijs, in eene blaas aan te wenden, voorzien, Spaansche vliegpleisters in den nek en op den opperarm leggen. Een laauwwarm bad en tevens koude stortbaden in het werk te stellen, vordert de grootste omzigtigheid, wij ten minste, die bereids meermalen daarvan gebruik maakten, hebben spaarzaam eenig nut daarvan ondervonden, en eenmaal gezien, dat door aanverwanten de dood der lijderes al zeer ligt aan de aanwending van dit geruchtmakend (*heroisch*) middel toegeschreven wordt, welks toepassing in ziekten



(over het geheel genomen), alles behalve nog juist door de Geneeskunde opgegeven is.

§. 314.

Bij verplaatfingen van het zog naar het borstvlies (*Pleura*) en inzonderheid naar de longen, die zich als eene *metastatische Pleuritis*, of *Peripneumonia* doen kennen, en des te eerder ontstaan, als er eenige aanleg tot dezen ziektevorm in de kraamvrouw huisvest, of nadeelige, gelegenheidgevende oorzaken op de longen en het borstvlies in het bijzonder haren invloed uitoefenen, bij voorbeeld verkouding, drok spreken, het gebruik van te verkoe-lende dranken, vroeger reeds plaats gehad hebbende verkoudheidsaandoeningen, verkoudheid (*Catharrus*), *catarrhale* weêrsgesteldheid en dergelijken, vordert evenzeer het ontstekingswerende geneesplan, algemeene bloedontlastingen, bloedzuigers tusfchen, of bezijden de borsten, het falfpeter, de §. 212 aangeprezene ontlastingsbevorderende middelzouten, de *Calomel* met *Sulph. aurat. ant.*, veel laauwwarme dranken, zuurdeeg op de borst, en de ter terugbrenging van het zog in de borsten dienftige mid-delen. — De verplaatfing naar den onderbuik en daaruit voortvloeiende, *metastatische* ontsteking van het darmkanaal, of het buikvlies vereischt insgelijks toereikende, algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, het *Nitrum* in eene *Mixtura oleosa* en de geheele behandeling dezer ziektenvormen, volgens de voorschriften der Geneeskunde, daarbij de onderdrukte zogaffcheiding in de borsten, en de terugbrenging van hetzelfde in deze organen voor oogen hou-

houdende. Doet zich de *metastatische* ontsteking in de nieren, en over het geheel in de piswerktuigen op, zoodat men eene melkachtige *Urin*. aantreft, dan zijn tot inwendig gebruik hoofdzakelijk aangewezen *Emulsiën* met salpeter en kamfer; inwrijvingen van een *Liniment. Ammoniae camphoratum* in de streek der nieren en bij hevige pijnen, in vereeniging met *Opium*, en zoodra de ontsteking verdwenen is, eene *Infusio Chinac* en *Herb. Uvae Ursi*. — Verhuist het zog naar de huid, en komt er een overtollig, zuurriekend zweet te voorschijn, dan zijn de *Spiritus Mindereri* en de kamfer met *Nitrum* aanprijzenswaardig, waarmede men zacht ontlastende middelen uit de *Sulphas Potassae* en laauw-warme baden vereenige. Naderhand, en als het zog in de borsten teruggekomen is, kan men een kina-afkooksel gebruiken laten.

### §. 315.

Bij verplaatsingen naar de ledematen, of de uitwendige deelen openbaart zich in den beginne eene naar roos gelijkende roodheid, dan eerst, of dadelijk pijn zonder roodheid, welke dikwerf zeer diep gevoeld wordt, gestoorde verrigting des deels, en later vormt zich een gezwel, waarin men vochtgolving ontdekken kan. Is bloot pijn en ontsteking voorhanden en nog geen etter gevormd, dan zal de verdeeling kunnen gelukken; te dien einde stelle men het ontstekingwerende geneesplan in werking, algemeene bloedontlasting bij hevige koorts en pijn, salpeter, de §. 312 opgeteekende ontlastmiddelen met *Sulphas Potassae* enz., het zoete kwik (*Mer-*



*curius dulcis*, *Calomel*) vermengd met *Carbonas Magnesiae*; men beproeve de terugleiding des zogs naar de borsten door het vlijtig aan de borst leggen des kinds, en waar dit niet zuigt, door de overige hiertoe aangeprezene middelen; mogt de kraamvrouw niet zogen, dan komen de ontstekingswerende en ontlastende middelen des te dringender te stade. Het aangedane deel late men stil in het bed houden, en dekke hetzelfde enkel met zacht, half versleten linnen, of indien de lijderes dezelve kan verdragen, met fijne, Engelsche flanel, ter bevordering der huiduitwaseming. Het is niet geraten, vele plaatsmiddelen, bijzonderlijk prikkelende zalven en dergelijke stovingen in het werk te stellen, inzonderheid als het deel hoogst pijnlijk en zoo gevoelig is, dat de lijderesse de betasting en de wrijving niet verdragen kan; hoogstens kan men bij hevige pijn, ontsteking, en waar geene ettervorming reeds heeft plaats gehad, het ziekelijke deel met *Aqua saturnina* stoven. Het wezenlijke ter verdeeling blijft immer de §. 312 vermelde, algemeen ontstekingswerende behandeling, waarbij men der terugleiding van het zog naar de borsten gedachtig is. In alle gevallen kan men nog, en vooral bij vrouwen, welke niet zogen, geene vergaringen en onzuiverheden in de eerste wegen voorhanden zijnde, zweet- en pisdrijvende middelen (*Diaphoretica* en *Diuretica*) toedienen, inzonderheid als de koorts, pijn en zwelling hebben opgehouden. Om de *Diaphoresis* te bespoedigen, zijn eerst de *Mixtura Riverii* (*Carb. potass. ʒj. succi citri ad saturationem cum Aq. Florum Sambuci vel Tiliae ʒiv*), dan de *Salammoniac*, vereenigd

nigd met den spiesglaswijn , de *Spiritus Mindereri* , en bij een' aanmerkelijk gezonken' pols , gebrek aan uitwaseming van het aangedane deel en droogte van de huid des geheelen ligchaams verdient bovenal de kamfer aanprijzing , uit hoofde zij de algemeene levenswerkdadigheid verhoogt en de huiduitwaseming sterk aanzet. Bij de keuze der pisdrijvende middelen , moet men steeds nog op de koorts en den algemeenen , ziekelijken staat der kraamvrouw de aandacht vestigen. Draagt de koorts bij voortduring nog een ontstekingsachtig , of daartoe overhellend karakter , en is het ziekelijke deel pijnlijk en rood , dan komen de *Tartarus depuratus* , — *boraxatus* , de salpeterzure *Ammonia* , en voornamelijk de *Ace-tis Potassae* opgelost in *Aq. Petroselini* te pas. Bij een' zekeren graad van opgewektheid in het slagaderlijk , met zwakte van het opflorpend en aderlijk vaatgestel diene men *Digitalis purpurea* toe , en bijaldien het gansche vaatgestel in een' verzwakten toestand verkeert , geve men dezelve in vereeniging met de *Squilla* en meer prikkelende middelen , de *Radix Calomi aromatici* , de *Rob Juniperi* en de kamfer. Sterker prikkelende , opwekkende en verhittende , pisdrijvende middelen , als daar zijn : de *Aether nitricus alcoholicus* , de *Tinctura Cantharidum* enz. dan alleen , als er onwerkdadigheid en zwakte in het gansche vaatgestel , als ook in het bijzonder in de pisafscheidende werktuigen voorhanden is ; in dit geval kan de melkstof in het bloed begrepen zijn , doch wegens de werkeloosheid der nieren niet afgescheiden worden ; de opgegevene , sterker werkende *Diuretica* , zullen deze niet alleen ,

maar



maar tevens de werkdadigheid van het gansche opflorpend vaatgestel verhoogen.

§. 316.

Indien de verdeeling niet gelukt, en de zwelling toeneemt, of onveranderd blijft, dan moet men de aanvankelijke verettering bevorderen en den etter een uitweg trachten te banen. Tot dit oogmerk wende men pappen en pleisters aan, als: het *Empl. Diachylon c. Gummi, de Galbano crocato ammoniaco* en dergelijken, gelijkewijze de meeste van die middelen, die tot rijpmaking van een *Absces* in de borsten opgegeven worden. Men bedenke hier alleen, dat men, de vochtgolving duidelijk te ontwaaren zijnde, met het kunstmatige openen van het *Absces* niet zoo lang mag wachten, aangezien ligtelijk *Caries* ontstaan kan, die, als het *Absces* zich digt bij het gewricht van eenig lid, of in de nabijheid van het bekken bevindt, hoogst gevaarlijk en doodelijk kan worden. Het openen zelf kan met een groot *Lancet* geschieden, als het *Absces* zich alleenlijk onder de zeer dunne huid bepaalt, maar zetelt hetzelfde dieper onder eenigerhande peesvliesachtige uitbreiding, of spier, gelijk ik dergelijke zoggezwellen onder de spieren van den schouder en het zitbeen waargenomen en geopend heb, dan heeft men de *Bistouri* noodig, inzonderheid als men genoodzaakt is, om tegenopeningen te maken, daarbij tevens van de *Sonde* gebruik makende. Daar, waar men, om *Caries* te voorkomen, bij het openen van het *Absces* nog de grootste omzigtigheid moet in acht nemen, opdat er geene lucht indringe, moet men de huid eenigermate ter zijde van de te ma-

ke-

kene insnijding trekken, ten einde zij naderhand over de opening heên kome te liggen. Ook roemt men een haarfnoer, of een bijtmiddel, bij voorbeeld eene oplossing van den helschen steen, met welke men met een penseel eenige plaatsen der huid be-  
 strijken laat. Het verdient opmerking, dat de uit-  
 vloeiende etter een uitstekend witte kleur heeft, hetgeen ten bewijze strekt, dat de in het bloed  
 vervatte melkstof daarhenen gezet werd, zonder te  
 beweren, dat de etter zelf zog zij, hetwelk vol-  
 strekt niet anders, dan in de borsten, als de daartoe  
 bestemde organen, gelijk §. 307 bereids aangemerkt  
 werd, kan afgescheiden worden. De verdere be-  
 handeling van grootere *Abscesen* regelt men naar  
 de voorschriften der *Chirurgie*, tevens bij het ver-  
 band steeds de meeste omzigtigheid in acht nemende,  
 om, inzonderheid bij eene gemaakte opening, het on-  
 gestelde deel voor den invloed der lucht te vrijwaren;  
 wijders schrijve men nog aanvankelijk, om het bloed  
 van de melkstof te ontdoen, de §. 312 aangepre-  
 zene ontlastmiddelen voor van *Sulphas Potassae*,  
*Tartarus natronatus* enz., en slechts dan, wanneer  
 men van hare ontlasting overtuigd is, de ontste-  
 kings-, of daartoe overhellende gesteldheid van het  
 vaatgestel, pijn, hardheid en zwelling geheel heb-  
 ben nagelaten, de krachten en voeding der lijderesse  
 allengs minder worden, trachte men deze door  
 het gebruik van *kina* te verbeteren, zoo veel te  
 meer als zonder ondersteuning derzelve de genezing  
 van het *Absces* niet bereikt en de overgang tot  
*Caries* niet verhinderd kan worden. — Soms be-  
 vindt men, dat de zwelling des aangedanen deels



uitermate hardnekkig is, er volgt verdeeling, noch verettering; in dit geval ga men even zoo te werk, als bij teruggeblevene gezwellen en verhardingen na borstabscesen; stovingen van den scheerling, *Hyoscyamus*, verder pleisters uit zulke *Narcotica* te zamengesteld, of het *Emplastrum ammoniacum c. Aceto squillitico*, *Emplastr. mercuriale, resolvens foetidum* enkel, of met *hydrargyrum cinereum* (*Empl. nitratis Hydrargyri*); inwrijvingen met *Ung. Nitratis Hydrargyri* en *digitalis purpurea*, en dergelijken aanwendende. Somwijlen bewijzen ook bij algemeene zwakte van het bloedvaatgestel, en werkeloosheid der opslorpande vaten, de braakmiddelen nog goede diensten ter verdeeling dezer gezwellen; zij schijnen door de door hen te weeg gebragte schudding van het geheele ligchaam zich heilzaam te betoonen, de werking van het vaatgestel in het algemeen en der opslorpande vaten in het bijzonder opwekkende, en de veelligt nog aanwezige melkstof door de verhooging van de verrigtingen der huid nog door middel eener vermeederde huiduitwaseming afzonderende; uit dien hoofde zullen na het gebruik derzelve laauwwarme baden ter ondersteuning dezer verrigting zeer dienstig zijn. Ook daar, waar de koorts meer van een' onzuiveren aard (*Synochus*) is, door mislagen van de lijderes in de diët veroorzaakt, en dus der ontwikkeling van de melkstof in het bloed nieuw voedsel verschaft wordt, of nederzetting en ophooping van onzuiverheden in de maag en het darmkanaal plaats hebben, heb ik ter verdeeling van pas ontstane en verouderde zoggezwellen zeer veel goeds van dezelve gezien.

## L I T T E R A T U R.

- VAN SWIETEN, *Comment. in Boerhav. Aphorism. T. IV. p. 1329.*
- ASTRUC, *Traité des Maladies des femmes. T. 5. p. 450.*
- NIC. PUZOS, *Abhandlung von den Milchversetzungen, in d. Samml. auserl. Abh. f. pr. A. I. Bd. 1. St. S. 3—103.*
- A. LEVRET, *von den Krankheiten die von Zurückgetretener Milch entstehen, in Samml. auserlesener Abh. f. p. A. I. Bd. 1. St. S. 141.*
- J. CHR. WILLIARDTS, *de Metastasi Lactis. 4º. 1770.*
- JAEGER, *Dissert. de Metastasi lactis. Tub. 1770.*
- J. CHR. STURM, *Diss. de metastasi lactea. Argentorati. 4º. 1773.*
- FR. A. DELEURYE, *von den Krankheiten die von den Zurückgetretenen Milch entstehen, in d. Samml. auserl. Abh. f. pr. A. I. Bd. 1. St. S. 167.*
- N. BERENDT, *de lactis Metastasisibus. Goetting. 4º. 1780.*
- V. WEIZ, *Neue Ausz. XIV. Bd. p. 7.*
- *Abhandlung von den Versetzungen der Milch. Leipzig. 8º. 1784.*
- JAC. VAN DER HAAR, *über die Versetzung der Milch, in Samml. auserl. Abhandl. f. pr. A. II. Bd. 1. St. S. 135.*
- J. A. GOTTL. SCHÄFFER, *Versuche. II. 406. 411.*
- J. J. EMBRER, *Diss. de Metastasi lactea. Argentorati. 4º. 1781.*
- DE LA ROCHE'S *Untersuchung über d. Natur und Behandl. d. Kindbetterinnen-Fiebers, oder d. Entzündung d. Eingeweide b. Wochnerinnen. A. d. Franz. 1783. m. Anmerk. von SELLE. Berlin. 4º. 1785.*
- DOUBLET, *neue Untersuchung über das Kindbetterinnen-Fieber, a. d. Franz. 8º. 1785.*
- L. J. HIRSCHMANN, *de Lactis Metastasi ad uterum artus-que. Trajecti ad Viadrum. 4º. 1786.*



J. C. FR. RÜST, *de Metastasi lactis*. 4°. 1794. v. GÖTTINGER  
*Anzeigen*. 1794. p. 2050.

J. D. BRANDIS, *Versuch über die Metastasen*. Hannover.  
 8°. 1798.

————— *Versuch über die Lebenskraft*.

SELLE, *med. clinic*.

————— *N. Beiträge*. I. p. 68. II. p. 73.

SOEMMERING, *de morbis vasorum absorbentium*. p. 173.

BURSERII, *institut. med. pract.* Tom. II.

P. FRANK, *Epitome*. Tom. II. *Peritonitis*.

JÖRG, *Handbuch*, p. 807. II. Bd.

CARUS, *Gynäkologie*. Th. II. p. 1583.

Des Schrijvers *Beobachtung und Heilung einer merkwür-  
 digen Milchversetzung oder eines Abscesses in Wochen-  
 bette*, in deszelfs *Journal f. Geburtshülf. Frauenz. u.  
 Kinderkrankheiten*. V. Bd. 2. St. N°. XI. p. 274.  
 Frankfurt a. M. 1825. 8°.

H A N D B O E K  
O V E R D E  
K E N N I S E N G E N E Z I N G  
V A N D E  
Z I E K T E N  
D E R  
K R A A M V R O U W E N ;

D O O R  
E. V O N S I E B O L D,  
*Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.*

---

Uit het Hoogduitsch,  
door  
G. J. V A N E P E N,  
*Heel- en Vroedmeester te Amsterdam.*

---

DERDE EN VIERDE STUK.

---



T E A M S T E R D A M , B I J  
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 7.





H A N D B O E K

O V E R   D E

K E N N I S   E N   G E N E Z I N G

V A N   D E

Z I E K T E N

D E R

K R A A M V R O U W E N .



WILLIAM

OF

REYNOLDS

AND

INTER

OF

REYNOLDS

H A N D B O E K

O V E R   D E

K E N N I S   E N   G E N E Z I N G

D E R

Z I E K T E N

V A N   H E T

V R O U W E L I J K E   G E S L A C H T .

I V .



M A D D O E K

1814

5218225 1814-15

1814

N I P H A I N

1814

Y B O U N D E D 1814-15

1814

H A N D B O E K

O V E R D E

K E N N I S E N G E N E Z I N G

D E R

Z I E K T E N

V A N H E T

V R O U W E L I J K E G E S L A C H T ;

D O O R

E. V O N S I E B O L D ,

*Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.*

---

Uit het Hoogduitsch,

door

G. J. V A N E P E N ,

*Heel- en Vroedmeester te Amsterdam.*

---

V I E R D E D E E L .

---



T E A M S T E R D A M , B I J

C. L. S C H L E I J E R .

1 8 2 7 .



ИЗДАНИЕ

1880

ВЫПУСК

№ 1

ИЗДАНИЕ

1880

ВЫПУСК

№ 1

ИЗДАНИЕ

ВЫПУСК

№ 1

ИЗДАНИЕ

№ 1

ИЗДАНИЕ

ВЫПУСК

ИЗДАНИЕ

№ 1

ИЗДАНИЕ

ВЫПУСК

№ 1

H A N D B O E K  
O V E R D E  
K E N N I S E N G E N E Z I N G  
V A N D E  
Z I E K T E N  
D E R  
K R A A M V R O U W E N ;

D O O R  
E. V O N S I E B O L D,  
*Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.*

---

Uit het Hoogduitsch,  
naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave  
door

G. J. V A N E P E N,  
*Heel- en Vroedmeester te Amsterdam.*



T E A M S T E R D A M , B I J  
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 7.





# H A N D B O E K

O V E R   D E

K E N N I S   E N   G E N E Z I N G

D E R

Z I E K T E N

V A N   H E T

V R O U W E L I J K E   G E S L A C H T ;

D O O R

E.   V O N   S I E B O L D,

*Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.*

---

Uit het Hoogduitsch,

naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave

door

G.   J.   V A N   E P E N,

*Heel- en Vroedmeester te Amsterdam.*

---

VIERDEN DEELS DERDE EN VIERDE STUK.

---



T E   A M S T E R D A M ,   B I J

C.   L.   S C H L E I J E R.

1 8 2 7.





# B E R I G T

V A N   D E N

## V E R T A L E R

B I J   H E T

### DERDE EN VIERDE STUK.

---

*Met dit derde en vierde stuk is nu het Handboek voor de Ziekten des Vrouwelijken Geslachts, van den beroemden SIEBOLD, in zijn geheel. Beloofde ik bij den aanvang dit belangrijk gedeelte spoedig in het licht te geven; mijns erachtens ben ik dit nagekomen.*

*Wijders hoop ik, dat ik in de overzetting wel geslaagd ben, althans ik heb daartoe alle moeite gedaan en menig uur mijner gewone bezigheden derzelve toegewijd. Bij de nalezing vond ik geen zinstorende feilen, en de nog aanwezige, zoo ik mij vleije weinige, zullen den welwillenden lezer gereedelijk in het oog val-*



vallen, en zijn niet van dien aard, dat ze onder eene bijzondere rubriek van Errata behoeven geplaatst te worden.

Mogt dan dit werk, zoo uitnemend geschikt voor Genees- en Verloskundigen ten platten lande, die bij menige gewigtige ziekte van het vrouwelijke geslacht alleen op zich zelve moeten vertrouwen, en geen andere toevlugt hebben, dan deze of dergelijke werken, even zoo gretig, als in des Schrijvers vaderland, Italië en elders ontvangen worden, en mijn arbeid tot heil der lijdende menschheid strekken, dan waren mijn wenschen en oogmerken daarmede vervuld.

G. J. VAN EPEN.

Amsterdam,  
16 Aug. 1827.

# I N H O U D.

---

## DERDE AFDEELING.

Bladz.

VAN DE KOORTSEN DER KRAAMVROUWEN. 481.

---

### EERSTE GEDEELTE.

VAN DE KOORTSEN, DIE DER KRAAMVROUWEN  
ALLEEN EIGEN ZIJN.

---

#### EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE ZOGKOORTS. . . . .	483.
BEGRIIP EN BESCHRIJVING DER ZIEKTE.	ald.
DIAGNOSIS. . . . .	487.
OOZAKEN. . . . .	490.
VOORZEGGING EN UITGANGEN. . .	496.
GENEESWIJZE. . . . .	497.
LITTERATUUR. . . . .	503.

#### TWEDE HOOFDSTUK.

VAN DE KRAAMVROUWENKOORTS. . .	505.
VOORBERIGT. . . . .	ald.
BEGRIIP EN GESCHIEDENIS DER ZIEKTE.	506.
DIAGNOSIS. . . . .	510.

VER-



VERGELIJKINGEN DER KRAAMVROUWENKOORTS	
MET EENIGE ANDERE ZIEKTEN. . . . .	517.
VERLOOP EN UITGANGEN DER KKAAMVROU-	
WENKOORTS. . . . .	519.
UITKOMSTEN DER LIJKOPENINGEN. . . . .	530.
OORZAKEN. . . . .	541.
VOORZEGGING. . . . .	552.
GENEESWIJZE. . . . .	554.
LITTERATUUR. . . . .	574.

## TWEDE GEDEELTE.

VAN EENIGE IN HET [KRAAMBED VEELVULDIGER  
VOORKOMENDE, DER KRAAMVROUWEN ECHTER  
NIET ALLEEN TOEBEHOORENDE KOORTSEN.

577.

### EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE WONDKOORTS. . . . .

578.

### TWEDE HOOFDSTUK.

VAN DE RHEUMATISCHE KOORTS. . . . .

583.

### DERDE HOOFDSTUK.

VAN DE GASTRISCHE KOORTS. . . . .

586.

### VIERDE HOOFDSTUK.

VAN DE KOORTS MET GIERSTUITSLAG. . . . .

588.

### VIJFDE HOOFDSTUK.

VAN DE ROOSKOORTS. . . . .

593.

LITTERATUUR. . . . .

595.

VIER-

## VIERDE AFDEELING.

### VAN VERSCHILLENDE ANDERE ONGESTELDHEDEN DER KRAAMVROUWEN.

#### EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE FLAAUWTEN, KRAMPEN EN ZENUW- AANDOENINGEN DER KRAAMVROUWEN.	Bladz. 596.
---	----------------

#### TWEDE HOOFDSTUK.

VAN DE STUIPTREKKINGEN DER KRAAM- VROUWEN. . . . .	603.
OORZAKEN. . . . .	ald.
VOORZEGGING. . . . .	610.
GENEESWIJZE. . . . .	ald.
LITTERATUUR. . . . .	612.

#### DERDE HOOFDSTUK.

VAN DE MANIE EN MELANCHOLIE DER KRAAM- VROUWEN. . . . .	613.
BEGRIP. . . . .	ald.
DIAGNOSIS EN VERLOOP. . . . .	—
OORZAKEN. . . . .	617.
VOORZEGGING. . . . .	619.
GENEESWIJZE. . . . .	ald.
LITTERATUUR. . . . .	623.



## VIERDE HOOFDSTUK.

Bladz.

VAN DE BUIKVLIESONTSTEKING DER KRAAM-	
VROUWEN. . . . .	625.
BEGRIIP EN GESCHIEDENIS DER ZIEKTE.	ald.
DIAGNOSIS. . . . .	628.
OORZAKEN. . . . .	633.
UITGANGEN. . . . .	635.
UITKOMSTEN DER LIJKOPENINGEN.	637.
VOORZEGGING. . . . .	643.
GENEESWIJZE. . . . .	644.
LITTERATUUR. . . . .	653.

## VIJFDE HOOFDSTUK.

VAN DE PSOITIS EN HET ETTERGEZWEL IN	
HET BEKKEN BIJ KRAAMVROUWEN. .	654.
BEGRIIP DER ZIEKTE. . . . .	ald.
DIAGNOSIS EN VERLOOP. . . . .	655.
OORZAKEN. . . . .	658.
UITGANGEN. . . . .	660.
VOORZEGGING. . . . .	662.
GENEESWIJZE. . . . .	ald.
LITTERATUUR. . . . .	669.

## ZESDE HOOFDSTUK.

VAN DE WITTE ZWELLING VAN HET BEEN	
BIJ KRAAMVROUWEN. . . . .	670.
BEGRIIP EN GESCHIEDENIS DER ZIEKTE.	ald.
DIAGNOSIS. . . . .	673.
OOR-	

	IX Bladz.
OORZAKEN EN WEZEN DER ZIEKTE. . . . .	682.
GEVOLGEN EN UITGANGEN. . . . .	696.
UITKOMST DER LIJKOPENINGEN. . . . .	698.
VOORZEGGING. . . . .	699.
GENEESWIJZE. . . . .	701.
LITTERATUUR. . . . .	714.

## Z E V E N D E   H O O F D S T U K .

VAN DE VERLAMMING DER KRAAMVROUWEN.	716.
-------------------------------------	------

## A C H T S T E   H O O F D S T U K .

VAN DEN DIKKEN BUIK DER KRAAMVROUWEN.	719.
OORZAKEN. . . . .	720.

## N E G E N D E   H O O F D S T U K .

VAN DE ZIEKELIJKE VERANDERINGEN DER PISAFSCHEIDING BIJ KRAAMVROUWEN.	726.
A) BELETTE PISLOZING, <i>Retentio Urinae</i> .	ald.
DIAGNOSIS. . . . .	728.
OORZAKEN. . . . .	729.
UITGANGEN. . . . .	732.
VOORZEGGING. . . . .	733.
GENEESWIJZE. . . . .	ald.
B) MOEIJELIJKE PISLOZING, <i>Dysuria</i> , DRUP- PELSWIJZE AFVLOEIJING, <i>Stranguria</i> .	734.
C) ONWILLEKEURIGE AFVLOEIJING DER URIN, <i>Enuresis s. Incontinentia Urinae</i> .	736.
OORZAKEN. . . . .	ald.
VOORZEGGING. . . . .	738.

GE-



GENEESWIJZE. . . . .	739.
HEELKUNDIGE KUNSTHULP BIJ DE ONDER- SCHEIDENE GEBREKEN IN DE PISAFZONDE- RING BIJ KRAAMVROUWEN. . . . .	740.
LITTERATUUR. . . . .	750.

TIENDE HOOFDSTUK.

VAN DE ZIEKTEN VAN DEN ENDELDARM EN DESZELFS VERRIGTINGEN. . . . .	752.
A) SPEENADERGEZWELLEN. . . . .	ald.
B) INSCHEURING VAN DEN ENDELDARM. . . . .	754.
C) VERLAMMING VAN DEN ENDELDARM. . . . .	755.
D) DIARRHOE. . . . .	ald.
E) BELETTE STOELGANG. . . . .	757.
LITTERATUUR. . . . .	758.

## DERDE AFDEELING.

VAN DE KOORTSEN DER KRAAMVROUWEN.

§. 317.

**K**raamvrouwen kunnen in een' zekeren zin door alle bekende koortsen overvallen worden, en ik zou werkelijk, indien ik hier dit Hoofdstuk volledig wilde behandelen, eene geheele koortsleer moeten daarstellen. Dit kan evenwel onmogelijk mijne bedoeling zijn. Daar er nogtans sommige koortsen bestaan, die, wel is waar, niet bij uitsluiting in het kraambed zich vertoonen, maar toch vaker na de verlossing worden aangetroffen, moet de behandeling dezer afdeeling in twee voorname gedeelten gesplitst worden; het eerste zal die koortsen bevatten, welke in den wezenlijken zin des woords alleen kraamkoortsen (*Febres Puerperarum*) verdienen genoemd te worden, aangezien zij alleen in het kraambed zich opdoen, of uit zulke omstandigheden haren oorsprong ontleenen, die met de baring en de daaruit voort-

IV. D. 3<sup>e</sup>. en 4<sup>e</sup>. st.                      Hh                      vloeit



vloeiende verrigtingen in een naauwer verband staan; het tweede diegene, welke, volgens de ervaring, van alle nog overige koortsen het menigvuldigste in het kraambed voorkomen. Tot de eersten breng ik uitsluitend de zogkoorts, de kraamkoorts; tot de laatsten reken ik: de wondkoorts, de *rheumatische*, *gastrische*, *gierst* en rooskoorts.

## E E R S T E   G E D E E L T E .

VAN DE KOORTSEN, DIE DER KRAAMVROUWEN  
ALLEEN EIGEN ZIJN.

## E E R S T E   H O O F D S T U K .

*Van de zogkoorts.*

*Begrip en beschrijving der ziekte.*

§. 318.

Onder zogkoorts (*Febris lactea, Ephemera lactea, Febris lactis vulgo a mulieribus nominata, milk fever*) verstaat men eene, in de gunstigste gevallen onder den vorm eener *Ephemera* (eene koorts, die slechts een' dag aanhoudt) twee of drie dagen na de verlossing, intredende, goedaardige koorts, die met eene ligte huivering aanvangt, allengskens in hitte overgaat, en meestentijds onder zweet en *critische* afscheiding des zogs in de eenigzins gespannene, pijnlijke borsten, reeds binnen de twaalf, vier en twintig tot zes en dertig uren ophoudt. — Bereids in de zwangerschap komt er zog in de borsten, vooral in de zevende en achtste maand, en veroorzaakt in dezelve dikwijls steking en spanning met koortsachtige bewegingen, of zonder koorts. De eigenlijke zogafscheiding nogtans heeft eerst na



de verlossing plaats, als wanneer het vroeger in de zwangerschap zoo zeer verhoogde leven en de voedende kracht des *Uterus* tot de borsten overgaat en bij de vorming van zog zich werkzaam betoont. Het tijdstip, wanneer dat vereischte ophoudt en dit begint, is veelal door eene koorts — de zogkoorts, kenbaar. Hoe schielijker en sterker de vorming van zog in de borsten in haar werk gaat, des te aanmerkelijker is de koorts; hoe langzamer en gematigder dit geschiedt, des te minder koorts; dikwerf in het geheel geene, ten minste zonder koude, hoezeer de pols wel eenigermate voller is. Overigens zijn eerstbarenden meer aan deze koorts onderhevig. — De goedaardigheid, die gezegde koorts meestal aan den dag legt, en die menigmaal iedere ernstige behandeling onnoodig maakt, is wellicht ook de aanleidende oorzaak geweest, dat de Ouden minder de aandacht op haar gevestigd hebben, en zij zelfs door vele, latere Schrijvers geheel niet, of slechts zeer kort behandeld werd. Volgens ASTRUC is REINERUS SOLANDER de eerste geweest, die van de zogkoorts als eene eigenaardige ziekte, in een werk, dat onder den titel: *Consilia medicinalia*, 1569 te *Frankfurt* het licht zag, gewaagt, en TH. WILLIS is wel de eerste, die in zijn' *Tractatus de febribus*, 1659, in *Cap. de puerperarum febr.* haar grondiger verklaart. De gevoelens van latere Artsen omtrent deze koorts liepen zeer uiteen, en gelijk het bij zulke geleerde geschilpunten gemeenlijk het geval is, zoo was het ook hier: men verloor dikwerf de trouwe beschouwing der natuur uit het oog en verviel in twee uitersten, en van

daar,

daar, dat sommigen het bestaan dezer koorts als eene eigenaardige ongesteldheid geheel en al ontken- den; anderen daarentegen haar voor eene ziekte hielden, waardoor *alle* kraamvrouwen volstrekt moes- ten worden aangedaan. Zonder hier lang bij stil te staan, de gevoelens van sommige beroemde Artsen te overwegen en hunne gronden voor en tegen op te sommen, merken wij alleenlijk aan, dat, vol- gens ons gevoelen, ook hier de waarheid in het midden ligt. Deze koorts grijpt in geenén deele bij alle kraamvrouwen zonder uitzondering plaats, en is derhalve noch eene bestendige, noch noodza- kelijke gezellin des kraambeds; veeleer kan zij in vele gevallen verhoed worden, gelijk de ervaring zulks een' slechts eenigzins bekwamen *Practicus* voor- zeker alreede dikwijls geleerd zal hebben. Kraam- vrouwen, die volkomen gezond en niet te prikkelbaar zijn, en, de borsten benevens de tepels natuurlijk gevormd zijnde, den nieuwgeborene vroeg genoeg aan de borst leggen; vrouwen, die niet te saprijk zijn, worden, gelijk wij zoo dikwijls hebben waar- genomen, in het geheel door geene zogkoorts aan- gedaan; en het zog schiet ook zonder eenige de minste, pijnlijke gewaarwordingen toe; doch, het is ook aan den anderen kant niet te ontkennen, dat zij bij de meeste kraamvrouwen in een oorzakelijk verband met de verrigting der zogaffcheiding, als eene eigenaardige ziekte en als eigenlijk gezegde *zogkoorts* zich opdoet, die zich juist daardoor als zoodanig kenschetst, omdat de zogaffcheiding de *crisis* uitmaakt; dat de Arts bij hare behandeling deze verrigting vooral in het oog houden moet, en



hij dikwijls door regeling dezer laatste voor de bevalling, en onmiddellijk na dezelve, de koorts verhinderen kan.

§. 319.

Wat derzelve benoeming aanbelangt, dan is, streng genomen, de naam *Ephamera lactea* voor den zachten, en *protacta* voor den aanhoudenden vorm, ongepast. De koorts is altijd eene *Continua remittens*, geene *Ephamera*, en schoon zij ook in vele gevallen haren loopkring binnen de vier en twintig uren volbrengt en den vorm eener *Ephamera* aanneemt, houdt zij echter vaak vele dagen achter elkander aan, en treedt alsdan steeds met eenen nieuwen aanval van koude te voorschijn, zonder in dien tusschentijd volkomen na te laten. JÖRG nu keurt den naam van zogkoorts af, en wil als zoodanig alleen die koorts gehouden hebben, die, uit eene ongesteldheid der borsten ontspringende, of bij verwonde tepels, of bij te sterken aandrang van zog naar de borsten en daaruit voortvloeienden ontstekingsstoestand der zogvaten, zich ontwikkelt. Wij kunnen hem daarin evenwel niet gelijk geven; deze koorts immers behoort tot de wondkoortsen (waaronder hij zelf haar rangschikt), en is eene zuivere, toevallige (*symptomatische*) koorts, in gevolge den ontstekingsstoestand, die zich bij de oorspronkelijke ongesteldheid gevoegd heeft, doch geenszins de hoofdzaak uitmaakt; die de eigenlijke ziekte slechts volgt, doch niet voorafgaat, niet eigenlijk de ziekte zelve is, gelijk de onderhavige zogkoorts. Offchoon wij alzoo ook den naam van zogkoorts voor gene medelijdende (*sympatische*)

sandoening niet volstrekt verwerpen willen, zoo meenen wij toch er eene verschillende beteekenis en daardoor onderscheiding aan te moeten geven. Ik wilde daarom de hier te beschouwene koorts, met den naam van eigenlijdige of wezenlijke zogkoorts bestempelen (*Febris lactea stricte sic dicta*) en gene, welke eensdeels bij de wondkoorts, anderdeels bij de gebreken der borsten te huis behoort, de afhankelijke of toevallige (*Febris lactea secundaria*) noemen. Eindelijk moeten wij nog doen opmerken, dat deze ongesteldheid menigmaal met andere verwisseld geworden is, en men namelijk het aanwezen van zogkoorts dikwerf voorondersteld heeft, waar andere koortsen bestonden, hetwelk ten opzichte der genezing in die gevallen het ergste was, waar men de kraamvrouwenkoorts met de zogkoorts verwarde. Wij zullen later, de kraamkoorts zelve eerst eene nadere beschouwing ondergaan hebbende, hierop terugkomen.

### *Diagnosis.*

#### §. 320.

Bijkans alle kraamvrouwen, maar vooral voor de eerstemaal bevallene en dezulken, die zeer volsappig, prikkelbaar en gevoelig zijn, en die bij eene volkomene geschiktheid, zich aan het zogen onttrekken, zich daartoe of in de laatste maanden harer zwangerschap niet behoorlijk voorbereid hebben, of met opzet hetzelfde verwaarloozen, bekomen tegen den tweeden of derden dag na de



bevalling, of tegen den avond, of wel na een' onrustigen, met veelvuldige droomen doorgebragten nacht tegen den morgen eene ligte huivering, of eene hevige koude, die aldra door een' versnelden en ingetrokkenen pols en vermeerderde warmte achtervolgd wordt. De koude bestaat, in de goedaardigste gevallen, in eene ligte rilling, die zich inzonderheid tusfchen de fchouderbladen langs den rug uitstrekt, of zij wordt fterker en verspreidt zich meer algemeen. De huid is droog, het aangezigt bleek; de lijderes klaagt over hoofdpijn en trekkingen in de ledematen. Na eenige uren ontwikkelt zich dan de hitte; de zieke wordt onrustig, het aangezigt rood, eenigzins opgezet, de pols wordt nu voller en fnellet. Naar den pols te rekenen, zou men zeggen, dat de hevigfte ontstekingskoorts (*Synocha*) aanwezig was; menigeen begint te ijlen (*Deliriën*), voornamelijk jonge, prikkelbare, voor de eerfte maal bevallene vrouwen. De warmtegraad der huid is aanmerkelyk verhoogd; de kraamvrouw heeft dorst; de borsten worden meer gefpannen, pijnliker en zetten op; daardoor wordt de beweging der armen, inzonderheid naar voren, eenigermate moeyelyk. De kraamzuivering blijft soms met het opkomen der koude en tot de nalating der koorts een of twee dagen geheel weg, of is, of terftond in den beginne verminderd, of wordt het nu eerst, en is ook in hoedanigheid veranderd, niet zoo rood, als gewoonlyk, maar witachtig, fchier etterachtig; de tepels komen meer uit, worden ftijver, de kring (*Arcola*) wordt donkerder; daarbij openbaren zich prikkeling en fleken in de borsten, die zich soms

over

over het gansche ligchaam verspreiden. Men bespeurt spoedig eenige ongelijke, gevoelige gezwollen in de borsten, en van lieverlede worden zij met zog gevuld. De ademhaling gaat met meerdere inspanning vergezeld. Eindelijk breekt een gelijkmatig, over het geheele ligchaam rijkelijk verbreid zweet uit, dat gemeenlijk een' zuurachtigen reuk heeft, met verligting van alle toevallen. De kraamzuivering vloeit weder in grootere mate; de pijn in de borsten neemt af; zij zijn nu door het toegeschotene zog bloot nog eenigzins gespannen. Doch dit bedaart schielijk door het vlijtige zogen des kinds, of door op eene andere wijze de borsten van het zog te ontlasten, door middel van een zuigglas, enz., zoodat nu de koorts haren loop volbragt heeft. Somwijlen is de zogkoorts nog zachter, voornamelijk als het kind reeds kort na de bevalling de borst wordt gegeven; als het zog bereids van lieverlede voor dezelve in de borsten begon te vloeijen, of ten minste reeds geneigdheid tot vorming van hetzelfde voorhanden was. De lijderessen hebben dan dikwerf een' enkelen onrustigen nacht, en de wezenlijke koorts schijnt, strikt genomen, geheel en al te ontbreken. In andere gevallen daarentegen, vooral bij zeer gevoelige eerstbarenden; bij verzuimde voorbereiding tot het zogen; als de borsten door eene te angstvallige verwarming verward worden, of als zij tijdens de opgekome ne koorts koude vatten; als de kraamvrouw zich niet ontziet, en zich niet voor algemeene verkouding en voor het genot van voedende en verhittende spijszen en dranken in acht neemt; als de *Lochiën*



geheellijk onderdrukt worden, bereikt de koorts een hooger en graad, wordt van een ontstekingsachtig karakter en gaat alsdan niet zoo schielijk voorbij; maar verheft zich tegen, twee, drie, vier dagen achter elkander met koude en hitte, die gewoonlijk omtrent middernacht nalaten, tot eindelijk de zogenaamde afscheiding onder eene behoorlijke behandeling geregeld haren gang gaat, en onder een rijkelijk, onaangenaam zuurriekend zweet, over het gansche ligchaam zich verspreidende, met de terugkoming der onderdrukte kraamzuiveringen, de koorts haar afscheid neemt. Zij onderscheidt zich van alle andere heete koortsen daardoor, dat bij de zogenaamde koorts het zog in de borsten vermeerderd, de borsten opzetten en pijnlijk worden, middelerwijl bij andere heete koortsen het zog zeer vermindert, geheel wegblijft; dat het zich bij de onderhavige koorts met den tweeden of derden dag vertoont, waarbij de *Lochiën* soms enkel voor korten tijd geheel, gemeenlijk echter slechts ten deele onderdrukt worden, bevindende zich de kraamvrouw, behalve de spanning in de borsten, zoodra de koortsverheffing voorbij is, overigens zeer wel.

### *Oorzaken.*

#### §. 321.

Boven hebben wij reeds aangemerkt, dat, ten aanzien van de grondoorzaak dezer koorts, zeer veel oneenigheid onder de Geneeskundigen bestaat, en dat men tot op den huidige dag in geenen deele nog tot een gevoelen over het wezen, of de naas-

naaste oorzaak dezer koorts heeft kunnen komen; naardien men nu eens haren grond in de zogaf-scheiding, dan weder in de borsten, nu in den *Uterus*, dan in eene prikkeling der zenuwen meende te vinden. ASTRUC, die drie graden van deze koorts aanneemt, en tevens hare verschijnselen en grond-oorzaken naauwkeuriger dan anderen beschrijft, zoekt het ontstaan dezer koorts voornamelijk uit de hoedanige gesteldheid van het zog af te leiden, dat of zuiver en zoet kan zijn, en dan noch koude, noch koorts verwekt, of eene meer- of mindere scherpte verkrijgt, en dan eene zachter of heviger koorts veroorzaakt; een gevoelen, dat thans wel geene wederlegging meer noodig heeft. Even zoo min behoeft in onzen tijd, het *Browniaansche* stelsel, God lof, lang in vergetelheid zijnde, eene ernstige wederlegging, hetgeen WINIKER (\*) en anderen beweren, name-lijk, dat het wezen dezer koorts zich op (*directe*) volstrekte zwakte grondt, en immer uit volstrekt verzwakkende invloeden deszelfs grond ontleent. — Nadat nu WILLIS het eerste, aan de, tot dier tijd vrij algemeen aangenomene, stelling twijfelde, alsof de koorts, ingevolge de zich opdoende zogafschei-ding ontstond en GÖLIKE in eene minder bekend gewordene verhandeling deze oorzaak volstrekt loo-chende, overwoog VAN SWIETEN het allereerste dit gevoelen openlijk en breedvoerig, en hij hecht na-melijk bij de overweging van dit onderwerp ook een groot gewigt, aan de, door de baring te weeg gebragte, ontstekingachtige aandoening van de in-  
wen-

(\*) HORN'S *Archiv m. z. v. o. Litteratuur.* l. c.



wendige vlakke der baarmoeder. Doch men ziet uit zijne geheele, zeer breedvoerige beschrijving der zogkoorts, dat hij in allen gevalle aan de zogaf-scheiding zelve een gewigtig aandeel in het ontstaan dezer ongesteldheid toeschrijft, en nergens verwerpt de geleerde man deze oorzaak der zogkoorts geheel en al, gelijk sommigen schijnen te vooronderstellen. Doch, wij gelooven, dat deze de zogverplaatsingen en de, uit de prikkeling der baarmoeder geboren wordende, wondkoorts, in zijne op zich zelve keurige beschrijving, al te veel verward, en niet genoeg onderling vergeleken en van de eigenlijke zogkoorts onderscheiden hebben. — FRIEDR. HOFFMAN stelt daarentegen den grond dezer koorts in eene prikkeling der vaten en zenuwen, die ontstaat uit de terugkeering der vochten, na de beval-ling, van den *Uterus* naar de borsten. SAUVAGES houdt het er voor, dat de natuur met opzet zulk eene koorts verwekt, ten einde door eene vermeerderde rondvoering der vochten, de vaten in de borsten te verwijden en den toevloeienden, tot zog bestemden, chijl een' vrijeren weg te banen. BURSEL meent den grond derzelve te vinden in eene onge-regeldheid van den bloedsomloop, welke de vroeger of later plaatsgrijpende zamentrekking des *Uterus* veroorzaakt, waarbij de kraamzuivering of uitblijft of trager vloeit. Wanneer derhalve de *Uterus* zich zeer langzaam zamentrekt, zonder den omloop aan-merkelijk te storen, dan ontwikkelt zich geene koorts enz. VOGEL eindelijk vooronderstelt, dat de zogaf-scheiding een werkelijk aandeel in de koorts heeft, dat echter toch de, door de terugkeering van het  
bloed

bloed uit den *Uterus*, te weeg gebragte omstemming in den bloedsomloop niet geheel en al over het hoofd te zien zij. Overwegen wij nu deze verschillende gevoelens eenigzins nader, dan is het niet te ontkennen, dat de meeste derzelve eenige waarheid bevatten, en wij gelooven louter, dat de door ons zoogenaamde zogkoorts (*Febr. lactea stricte sic dicta*) daarbij niet altijd genoeg van andere zamengesteldheden (*Complicatiën*) en foorten van koortsen onderscheiden werd, terwijl wij meest geneigd zijn, om vogel's gevoelens te omhelzen, die, gelijk gezegd is, de naaste oorzaak der zogkoorts hoofdzakelijk in de zogaffscheidung zelve stelt. Want het is toch opmerkelijk, dat altoos met het zweet de zogaffscheidung *critisch* werkt; dat wijders, als de vorming van zog spoedig na de verlossing geschiedt, als de vrouwen reeds vroegtijdig haar kind aan de borst leggen, of ook als zij niet zeer vochtrijk zijn en slechts weinig zog hebben, de koorts of in het geheel niet, of alleenlijk flauw zich openbaart; dat men derhalve de koorts dikmaals verhoe-den kan, wanneer men bij voorbeeld, voor de bevalling, de werktuigen tot de zogbereiding behoorlijk voorbereidt; dat men verder, als zij reeds aanwezig is, immer denken moet, om de zogaffscheidung gaande te maken. Staven al deze, uit de ervaring geputte, bewijsgronden niet, hoezeer hier het zog en de vorming van hetzelfde de hoofdrol spelen. Maakten prikkelingen van den *Uterus* de naaste oorzaken der zogkoorts uit, dan zoude men immers naauwelijks gelooven, dat een eenige kraamvrouw dezelve ontgaan kon, en de koorts moest ook veel

vroee-



vroeger zich ontwikkelen; dat het zog menigwerf reeds voor de verlossing zonder koortsachtige beweging komt, werpt het zoo even door ons geuite gevoelen alles behalve omver; doch deze ontwikkeling van zog geschiedt veel langzamer en zachter, niet zoo overvloedig, noch overhaastig. De zogvaten worden van lieverlede tot het bevatten van de voor hen bestemde vochten geschikt gemaakt, en de gansche verrigting neemt zoo onmerkbaar haren aanvang, dat het gestel daardoor niet mede aangedaan kan worden. Dit zal des te meer in het oog vallen, indien men overweegt, dat de zogkoorts geen volstrekt vereischte ziekte van alle kraamvrouwen is, en ook in enkele gevallen daar gemist wordt, waar de zogaffcheiding eerst na de baring tot stand kwam. Intusschen ziet men ditzelfde ook in verschillende tijdperken van ontwikkeling, bij de tandwording, bij de verschijning der maandstonden. Ook hier lijdt, in de meeste gevallen, het gansche bewerktuiggestel (*Organismus*) in eene meer of mindere mate, doch het ontbreekt ook niet aan voorbeelden, dat een kind het tijdperk der tandwording ongemerkt doorkwam; dat de jonge dochter zonder eenige de minste hindernis dat belangrijk tijdperk achter den rug kreeg. — Belangende de verwijderde oorzaken, verdeelt men dezelve het beste in voorbeschikkende en gelegenheidgevende oorzaken. Ten aanzien der eerste, is het niet te loochenen, dat saprijke, zeer gevoelige en prikkelbare vrouwen, voorts zulke, die zich aan het zogen, schoon alle geschiktheid daartoe bezittende, geheel en al onttrekken; die gedurende de zwangerschap niet be-

hoor-

hoorlijk daartoe voorbereid, het kind niet vroegtijdig genoeg aan de borst gelegd, of zich ergens aan een' schadelijken invloed blootgesteld hebben, der zogkoorts eerder en in een' sterker' graad onderworpen zijn, dan waar al deze schadelijke aanleidingen ontbreken, hoezeer ook dan niet altoos de koorts geheel wegblijft. Tot de gelegenheidgevende oorzaken behooren inzonderheid mislagen in den eetregel, ongeregelde kraamzuiveringen, bij voorbeeld volslagene onderdrukking, of te geringe afvloeijing derzelve, vooral ten gevolge eener koudevatting, of koude omslagen op den buik, te warme toestopping der borsten, verwaarloozing van het telkens aan de borst leggen des kinds, het gebruiken van verhittende dranken onder de bevalling, bovenal heete, sterke wijnen, het gebruiken van vele prikkelende, verhittende geneesmiddelen ter bevordering der weeën, bij voorbeeld der kaneeltinktuur en dergelijken. Andere zamengesteldheden en verergerende oorzaken zijn: verkouding, of verhitting; kamers te sterk door kagchels of ovens verwarmd, of waar de zon op staat, vooral in heete zomerdagen; uit dien hoofde is het ook, dat kraamvrouwen, die in de heete hondsdagen baren, meer door zogkoorts overvallen worden; wijders gemoedsaandoeningen, die te gelijker tijd galkoorts hebben doen ontstaan; te vroegtijdige, te sterk doorgezette onderdrukking van het zog door inpranging der borsten, de aanwending van zalven en heete doeken, die het zog doet hotten; gebrekkelijke tepels.



*Voorzegging en Uitgangen.*

## §. 322.

Over het algemeen en in de meeste gevallen is de zogkoorts eene zeer zachte en goedaardige, voor het leven der bevallene niet gevaarlijke ongesteldheid, die menigwerf reeds binnen de twaalf tot zestien uren onder de vermelde verschijnselen in gezondheid overgaat. Soms duurt zij, wel is waar, langer; zij neemt nogtans dan ook meest na den tweeden, derden, hoogstens vierden dag onder een scheidend (*kritisch*) zweet, *critische* zogvorming, door de *Urin*, door middel van eenen buikloop enz. haar afscheid. Bij wijlen echter neemt de ziekte een ernstiger karakter aan, inzonderheid als de *Lochiën* geheel onderdrukt zijn, indien eene verkeerde manier van behandelen de koorts verergert, indien er bereids ziektestoffen in het ligchaam bestonden, en vele andere ongesteldheden zich daarbij ontwikkelen. Er ontstaan dan niet zelden zogverplaatsingen naar onderscheiden deelen des ligchaams, die gevaarlijke ontstekingen, veretteringen, stuipen, ijling, waterzuchtige toevallen naar zich slepen kunnen. De anderzins zoo goedaardige, onbeduidende koorts is dan naauwelijks meer te herkennen; neemt dikwerf geheel het karakter van kraamvrouwenkoorts aan, of gaat in dezelve over, en geeft aanleiding tot de verschillendste, langdurige (*chronische*) ziekten.

*Geneeswijze.*

## §. 323.

De geneeskundige behandeling splitst men in voorbehoedende en dadelijke. Hoe men door eene gepaste handelwijze de ziekte somwijlen verhoeden kan, ziet men reeds ten deele uit §. 316. De voornaamste aanwijzing hierbij is, om de zogaf-scheiding te bevorderen. Ter beantwoording aan dit doel, is het noodig, dat de borsten reeds voor de beval-ling behoorlijk verpleegd, niet te warm, noch te veel aan verkouding blootgesteld worden, men de tepels te voorschijn doet komen, dezelve tracht te verster-ken en tevens door eene zachte zuiging het zog naar de borsten lokt. Men drage vooral zorg, dat de zwangere, zoo veel mogelijk, in een' gezonden staat hare verlosfing verbeide en onderga, vrijware haar voor koudevatting en verhitting, voor mislagen in den eetregel, zoeken den endeldarm tijdig van drek-stoffen te ontlasten en late haar dagelijks eene ma-tige beweging in de vrije lucht maken. Onder het baren wachte zij zich voor verkouding of verhitting. Na hetzelfde legge men het kind tijdig genoeg, en nadat de bevallene door een' verkwikkenden slaap bekomen is, zoodra mogelijk, en ten minste acht of twaalf uren na de bevalling aan de borst, des-wege zorge de kraamvrouw onmiddellijk na de ver-losfing, dat het zog uit de borsten kan vloeijen, zij make de borsten en tepels met speekfel of melk lenig, late het kind van tijd tot tijd zuigen, waar-door der biest (*Collastrum*) ontlasting verschaft wordt ;

IV. D. 3°. en 4°. st.                      li                      zij



zij overdrijve slechts het zogen niet, en geloove vooral niet, dat het kind dadelijk zijn genoegen zuigen moet, hetgeen twaalf uren zonder eenig eten of drinken kan zijn. Zoodra de borsten beginnen op te zetten, lette zij slechts op hare ontlasting, en al kan ook het kind de borsten nog niet volkomen uithalen, laat men dezelve door een ander kind, en bij mangel hieraan, door eene andere persoon of zuigglazen uittrekken; blijven trouwens de borsten sterk gevuld, dan zijn de gevolgen pijn, stremming van het zog en ontsteking. Men vermijde thans nog zorgvuldiger dan ooit, alle schadelijke invloeden van den dampkring en eetregel; de kraamvrouw houde zich derhalve van het uur der verlossing aan, warm, prange zich door geene kleedingstukken in, onthoude zich van al te voedende spijsen en dranken, bier, wijn of vleeschsoepen, en nuttige in de eerste dagen niets dan dunne, water-, gepelde garst- of haverdegort soepen, en tot drank gekookt water, waarbij men een stuk geroosterd brood en een schijfje citroen voege, of garstwater enz. Kan of wil de bevallene niet zogen, dan sta men er in alle gevallen op, dat het kind gedurende eenige weken door de moeder gevoed worde, en drage zorg, dat, door een' schrälen, verkoelenden eetregel, door prikkeling op het darmkanaal, door regeling van de veelligt ongeregelde kraamzuivering, die in deze omstandigheid altijd iets sterker dient te zijn, het zog natuurlijk weggevoerd worde. Onder de geneesmiddelen verdient hier de *Sulphas Potassae* (*Arcanum duplicatum*) dagelijks eenige malen tot eene halve *drachma*, in een gepast

past voermiddel, in den §. 312 opgegevenen vorm, de meeste aanprijzing, doch zoo, dat zij niet te sterk ontlasting verwekt, en ook op de *Urin* werkt. De borsten bedekke men met matig warme doeken, die men boven den damp van *barnsteen* kan houden; of men wrijve de borsten zelve bij hevige pijn en spanning, bij aanwezige ophooping, met verzachtende oliën, bij voorbeeld warme *Oleum Amygdalarum*, of bijaldien de kraamvrouw het kind de borst niet geeft, met *Oleum Hyoscyami* en dergelijken in, slechts niet te dikwijls en te veel, om de, inzonderheid als de kraamvrouw niet zoogt, zoo noodige uitwaseming der borst niet te belemmeren.

§. 324.

Heeft nu de zogkoorts zich werkelijk ontwikkeld, dan moet men naar gelang van omstandigheden handelen, aangezien zich ook hier geen algemeen geldend geneesplan laat opgeven. Gemeenlijk ga men met de ingeslagene behandeling voort, en zij men niet te ongestadig. De kraamvrouw moet zich zeer rustig houden; voor alles, wat het gemoed kan aandoen en alle onnoodige bezoeken, gevrijwaard worden. Van het kraamvertrek verwijdere men diens, volgens alle mogelijk gedruisch, en hetzelfde zij niet te licht. Men schrijve een' ligten, niet te versterkenden, noch te verhittenden eetregel voor, geve dunne, slijmachtige soepen, laauwwarme, zacht uitwasemende dranken, bij voorbeeld vlier- of lindenbloesemthee, voornamelijk als de koorts reeds eenige uren bestond en er neiging tot zweeten komt. Trouwens men



neme liet jaargetijde in aanmerking, en werke, vooral in den zomer, niet te sterk op de huiduitwaseming. Des noods zorgte men door een niet te prikkelend klisteer voor buiksontlasting, diene in alle geval inwendig een' eetlepel *Ricinusolie* toe; doch men zij tevens niet te angstvallig; neme in aanmerking, dat de geheele gesteldheid eener kraamvrouw van dien aard is, dat zij zonder het minste gevaar eenige dagen zonder ontlasting kan zijn. Draagt de zogkoorts blijken van een' geprikkelden toestand des vaatgestels, dan doet de met citroen- of azijnzuur verzadigde potasch (*Mixt. Riverii*), (de spijsverteringbevorderende drank van BOERHAVE), als een bedarend en zweetdrijvend middel, goede diensten. Zijn de *Lochiën* onderdrukt, heeft de koorts een' hoogen graad bereikt, openbaart zij zich als eene zuivere ontstekingskoorts (*Synocha*), dan dient de behandeling ook ernstiger te zijn. Gaat de kraamzuivering geregeld haren gang, en klaagt de lijderes over geene pijnen in den buik, dan geve men een *Mixtuur* of *Emulsio* met *Nitrum*, en een zacht buikopenend en afleidend klisteer, den §. 322 opgegevenen eetregel en verpleging der borsten striktelijk latende nakomen. In een' hooger en graad van ontstekingskoorts kan men somwijlen eene aderlating op den arm of op den voet zeer geschikt in het werk stellen, inzonderheid als de kraamvrouw niet zoogt, en er kunnen zelfs sterkere ontlastmiddelen (*Purgantia*), en bij *gastrische* en galachtige zamengesteldheden, waar eene nederzetting van onreinigheden en gal na mislagen in de iëet, ergernis of toorn plaats heeft, behalve de purgeermiddelen, ook  
braak-

braakmiddelen (*Emetica*) te stade komen. Heeft de kraamvrouw kort voor hare bevalling of onder dezelfde koude gevat, en is de koorts alzoo meer van een' *rheumatischen* aard, dan verdient de *Salammoniac* deels als een bedarend en hoofdzakelijk op de huid werkend middel in der voege eener oplossing van ʒi tot ʒij in *Aqua destillata* of *Aq. Florum Tiliae*, met *Syrupus* of *Succus Liquiritiae*, *Gummi mimos.* en verder, bij vermindering der koorts, de *Spiritus Mindereri* met warme theeaftreksels van vlier, melisse, munt, kamillen en dergelijken, aanprijzing. Voor het overige laten zich hier geene algemeen op te volgene geneeskundige voorschriften geven, overmits zij naar de meest verschillende omstandigheden en zamengesteldheden door den Geneeskundige telkenreize moeten gewijzigd worden; en deze alle te vermelden is onmogelijk. De Arts moet zich naar iedere bijzonderheid weten te schikken: dit is zijne voorname kunst; dit zal hem het beste voor dwaling hoeden, en — ter geruststelling van beginnende kunstoeffenaren zij het gezegd — dit is ook, als men slechts onbevooroordeeld de zaak onderzoekt, in de meeste gevallen bij de zogkoorts zoo moeilijk niet.

### §. 325.

Op het einde dezes Hoofdstuks moeten wij nog aanmerken, dat eene kraamvrouw meermalen gedwongen is, het zogen, na het reeds beproefd te hebben, op te geven, of in het geheel niet aan te vangen. Zoodanige oorzaken kunnen zijn: geweldige inpranging der borst, of insmexing van vette



zalven; een zeer vlakke, niet vooruitkomende tepel, gebrekkelijke vorming der borsten, volstrekt gemis van tepels, ontvellingen, walgelijke eigenschappen des zogs voor het kind, zeer zwak ligchaamsgestel, uittering, bloedspuwing, hardnekkige droefgeestigheid, gebreken van het hart, krampen ten gevolge der toenemende, te groote prikkelbaarheid van het zenuwgestel, verzwakking van de gezigtswerktuigen door het zogen, onbeduidende zogaffscheidung, kwaadsappige, of teringachtige verschijnselen, hebbelijk gewordene buikloopen, wormen, huidwaterzucht, geelzucht, roos, etterende zweren enz. Is de zogaffscheidung door inpranging, of de aanwending van vette zalven in hare werking gestoord, dan bade men de borsten met een laauwwarm aftrekfel van vlier- of Malvabloemen. Kan zij evenwel wegens de overige vermelde oorzaken niet zogen; dan moet men eene zeer verdunnende diët, en de §. 311 opgegevene middelen voorschrijven, ten einde het zog uit de borsten te verwijderen en het bloed van deze stof te ontdoen. Bij aanleg tot tering (*Phthisis*), bloedspuwing (*Haemoptysis*) en bij ontstekingsachtige toevallen der borstholte kan, inzonderheid bij een' sterken aandrang van zog, volle, harde, pijnlijke borsten en aanmerkelijke koorts, eene bloedontlasting op den arm, of voet aangewezen zijn; de laatste voornamelijk als afleidende en om de *Lochiën* te vermeerderen. Zijn de borsten uitermate vol en gespannen, dan moet men van tijd tot tijd door zacht te zuigen en door het zetten van eene glazen klok op de borsten zoo veel zog ontlasten, als ter leniging en vermindering der pijn, en der

der spanning vereischt wordt. Men roemt ook ter verdrijving van het zog, de koorts nagelaten hebbende, nog eene aanmerkelijke hoeveelheid in de borsten voorhanden zijnde, zoogenaamde zogverdelende en verdrijvende middelen ter aanwending op dezelfde. Daartoe behoort de *Geranium robertianum*, die binnen twee tot drie dagen het zog wegmaakt, doch door weinigen om de sterke lucht verdragen wordt; het peterfeliëkruid (*Herba Petroselini*), walnotenbladen (*Folia Nucum Juglandic.*), die insgelijks zeer sterk rieken en hoofdpijn verwekken; het *Herba Daturae Stramonii*, waarvan de uitwaseming der versche plant, angst, duizeling en hoofdpijn te weeg brengt. Al deze middelen keuren wij zoo ongeëchikt, en de meeste derzelve zoo gevaarlijk als de kamfer, daar ten gevolge der te schielijke terugdrijving des zogs uit de borsten ligtelijk gevaarlijke gevolgen geboren worden. Men late het nu bij de gezegde voorschriften in de diët en algemeene geneeskundige behandeling berusten, de borsten tegen alle prikkeling, drukking en verkouding beschermende, en ze hoogstens, met een op linnen, dun gesmeerde pleister van *Sperma Ceti* of *Emplastrum saponatum* bedekkende.

#### L I T T E R A T U U R.

V. SWIETEN, *Comment. in BOERHAVE Aphorism. Tom. IV.*  
§. 1329.

ASTRUC, *Traité des Maladies des femmes, übersetst von*  
OTTO. Dresden 1776.



STOLL, *Aphorism. de cognos. et curand. hom. morb.*  
§. 775.

BURSER, *Instit. med. pract. T. II.*

S. G. VOGEL's *Handbuch. 2ter Theil.*

JÖRG'S *Handbuch der Krankheiten des Weibes. Leipzig*  
1821.

CARUS, *Gynäkologie, 2ter Theil.*

ROB. THOMAS, *Modern practice of Physic. London 1821.*

BURNS, *Midwifery. London 1820.*

HORN'S *Archiv, Bd. vij. 1 Bd. XI. 1 und 2.*

## T W E E D E   H O O F D S T U K.

*Van de kraamvrouwenkoorts.**Voorberigt.*

## §. 326.

Het leveren eener goede en volledige beschrijving der kraamkoorts zal voorzeker wel een der moeilijkste vraagstukken in het uitgestrekte gebied der gansche Geneeskunde zijn. Immers zoodra wij bedenken, dat deze ziekte zoo oud is, als de geschiedenis der Geneeskunde zelve, dat alreede HIPPOCRATES haar gekend en naauwkeurig beschreven heeft; dat na hem ontelbaar vele mannen haar meer of minder uitvoerig behandeld hebben, en dat wij ondanks al onze kennis van de natuur en het wezen dezer gevaarlijke ziekte, en gevolgelyk in de keuze van de geschiktste geneeswijze nog zeer verre van het doel verwijderd zijn en nog zoo veel onbegrijpelyks te verklaren hebben: dan is het niet te ontkennen, dat men, schoon met eene ruime mate van ondervinding toegerust, toch met eene zekere schroomvalligheid, en, om het zoo uit te drukken, met eene zekere vrees eene taak onderneemt, waaraan reeds zoo vele voortreffelyke mannen voor ons hunne krachten hebben uitgeput, en dat het name-



lijk meer dan gewone fcherpzinnigheid, meer dan gewone omzigtigheid en wijsheid vordert, hier voor een Handboek de juiste grenzen af te baken, en hier, zonder breedvoerig te herhalen, wat reeds zoo vele honderden voor ons daaromtrent gezegd en overwogen hebben, toch den lezer een behoorlijk verflag te leveren, van hetgeen anderen over de ziekte gedacht en van dezelve waargenomen hebben, ten einde hem langzamerhand en zonder hem af te matten, op het standpunt te plaatsen, waarop wij ons thans bevinden, en hem een kort, doch trouw gevolgd tafereel dezer ziekte af te malen, zonder — immers één kan toch niet alles zelf gezien en waargenomen hebben — de gewigtigste bevindingen van anderen over te slaan en uit het oog te verliezen. Inderdaad de naam van hem, die hier den gulden middelweg weet te bewandelen, en zich de goedkeuring van kunstkenners weet te verwerven, verdient in de geneeskundige Jaarboeken onder de eerste te schitteren.

*Begrip en Geschiedenis der ziekte.*

§. 327.

De verschillende benamingen alleen, welke men van tijd tot tijd aan deze ziekte gegeven heeft, bewijzen klaar, hoe weinig eenheid er in de gevoelens der fchrijvers over dezelve heerscht, en het is niet te veel gezegd, als men, gelijk WHITE bereids gedaan heeft, beweert, dat naauwelijks twee Auteurs deze gewigtige ziekte op gelijke wijze en uit hetzelfde oogpunt, ten aanzien van haar wezen, be-

beschouwd hebben. De belangrijkste namen, die deze koorts tot hertoe verkregen heeft, zijn de volgende: kraamvrouwen- of kraambedkoorts, kraamkoorts, netkoorts, *Febris Puerperarum*, s. *puerperalis*, *Febr. lactea maligna Puerperar.*; *F. humoralis nervosa*; *Febris miliaris complicata s. putrida maligna*; *F. puerp. intermittens pernicioza*; *F. puerp. acuta pernicioza*, *Peritonitis puerperalis*; — *fièvre des accouchées*; *enterite aiguë à la suite des couches*; — *puerperal peritonitis*, *puerperal fever*, *fever of-lying-in-women etc.* EDUARD STROTHER zou, volgens de opgave van HULM, deze ziekte het eerste met den naam van *puerperal fever* bestempeld hebben, hetgeen andere evenwel loochenen. Doch het zij, hoe het wil, zoo veel is bewezen, dat reeds HIPPOCRATES de ziekte gekend en nauwkeurig beschreven heeft, en wij zullen nader bij de *Aetiologie* gelegenheid hebben, aan te toonen, hoe vele schrijvers na hem tot op de laatste tijden dezelve beschreven hebben. Hier ter plaatse staat de verklaring der vraag, of dan deze kraamvrouwenkoorts werkelijk alleen in het kraambed zich openbaart, op den voorgrond. Eenige schrijvers, vooral CAPURON, namelijk, beweren, dat deze ziekte ook bij maagden, ja zelfs bij mannen zich kan ontwikkelen. Dit kwam inzonderheid daaruit voort, wijl men van oudsher de meest verschillende ongesteldheden met de kraamvrouwenkoorts verward en als zoodanig vermeld heeft, en het kan wel ter naauwernood een punt van geschil worden, dat, indien de naam van kraambedkoorts in het algemeen der onderhavige ziekte met regt toekomt, het dan eene

vol-



volstrekt eigenaardige ongesteldheid is, waaraan kraamvrouwen alleen onderhevig zijn, en buiten het kraambed geen geslacht, noch ouderdom door dezelve kan aangetast worden. Wij zijn volstrektelijk van gevoelen, dat men onder kraambedkoorts een geheel eigendommelijke, of zoo men wil, foortelijke ziekte te verstaan hebbe, die zich voor hare verschijnselen en geheele beloop als zoodanig kenschetst, en dat haar de naam van kraamvrouwenkoorts met alle regt toekomt, aangezien wij buiten het kraambed haar nog nooit hebben waargenomen en haar ontstaan betwijfelen, hoewel wij niet ontkennen, dat er zich ziekten bij ongehuwde vrouwen en meisjes, ja zelfs bij het mannelijk geslacht, kunnen opdoen, die al het voorkomen van dezelve hebben. De kraamvrouwenkoorts kenschetst zich niet alleen door hare verschijnselen, maar voornamelijk ook door haar groot gevaar en gewigt boven alle andere koortsen, die in het kraambed zich openbaren, en verdient bloot om die reden κατ' ἐξοχήν, den naam van *Febris puerperalis*. Teregt stelt CARUS het eigene van iedere kraamvrouwenkoorts in eene storing der, natuurlijk tijdens het kraambed plaatsgrijpende, verandering in het inwendige des vrouwelijken ligchaams. Immers altoos zien wij bij haar de eene of de andere verrigting meer of minder in wanorde: nu eens zijn het de kraamzuiveringen, dan weder de zogaffscheiding; nu wederom is er eenigerhande letsel in dit of dat orgaan van den onderbuik, oorspronkelijk uit de, door de baring veranderde, rigting der vochten en voornamelijk van den bloedsomloop, hetgeen der ziekte een geheel

eigendommelijk aanzien geeft, zonder dat evenwel daardoor hare naaste oorzaak reeds blijkt. Alleen uit de *physiologische* gesteldheid eener kraamvrouw laten zich de ziekelijke verschijnselen dezer koorts naar eisch verklaren; zonder de voorafgegane verlossing zou deze ziekte niet dien vorm hebben, en kon zij derhalve onmogelijk met den naam van kraamvrouwenkoorts bestempeld worden. Eene kraambedkoorts buiten het kraambed is dus een willekeurig aangenomen begrip, dat, als eene zich zelve tegensprekende bewering, als eene van alle zuivere ervaring ontbloote onderstelling, geen verdere aandacht verdient. En om nu echter een duidelijk denkbeeld dezer ziekte te vormen, moeten wij ons, gelijk reeds aangemerkt is, de *physiologische* gesteldheid eener kraamvrouw duidelijk voor oogen trachten te stellen; om die reden moeten wij aan datgene herinneren, wat wij ter zijner plaatse daaromtrent breedvoerig gezegd hebben (\*). Wij zullen hier nu slechts, met een paar woorden, de voornaamste oorzaken, hier in aanmerking komende, opgeven. Deze zijn: 1) de poging van het ligchaam in het algemeen en van den *Uterus* in het bijzonder, om in denzelfden toestand terug te keeren, waarin zij voor de zwangerschap, overeenkomstig de natuur, zich bevonden; alzoo: veranderde rigting van den bloedsomloop, vermindering der natuurlijk door de zwangerschap te weeg gebragte volbloedigheid (*Plethora*) des onderbuiks; verandering

(\*) Men zie ons *Handboek over de Ziekten van het Vrouwelijke Geslacht*. I. D. 1. St. §. 76—93.



ring der baarmoeder ten aanzien van hare grootte, gedaante, ligging, van hare inwendige vlakke en hare gansche werking; 2) de nu aanvangende verrigting der borsten; 3) de thans na de bevalling wederkeerende, verhoogde werkdadigheid van andere dusverre meer of minder afgenomene verrigtingen in sommige deelen des ligchaams, bij voorbeeld van de huid, het hart, van de longen en hoofdzakelijk der tot na de verlossing, meer of min, in hunnen omvang zamengedrukte ingewanden van den buik. Zoodra wij dit alles naauwgezet overwegen, dan bemerken wij, dat hier meerdere omstandigheden te zamenloopen, die, hoezeer op zich zelve natuurlijk, toch ligt door eene geringe aanleiding, ziekteoorzaken kunnen worden, en bijgevolg ook onder zekere voorwaarden, die wij lager breeder te ontwikkelen hebben, de kraamvrouwenkoorts kunnen doen ontstaan. Vooraf echter van de verschijnselen der ziekte.

### *Diagnosis.*

#### §. 328.

Nadat langer' of korter' tijd de, zeker voor elke koortsachtige ongesteldheid aanwezige, voorboden, als geeuwen, trekken en rekken der ledematen, hoofdpijn, gestoorde eetlust, moeheid, misfelijkheid, menigvuldiger polsslag, onrustige slaap, angstige droomen, zelfs ligte ijling enz. voorafgegaan zijn, treedt nu meestentijds tegen den avond van den tweeden, of derden dag na de bevalling, derhalve op hetzelfde tijdstip met de zogkoorts, de  
be-

bedoelde koorts met een' zachteren of sterkeren, lang- of kortdurigen aanval van koude, te voorschijn. Doch gemeenlijk is dit niet het geval; dikwerf gaan der ziekte geheel geene boden vooraf; zij openbaart zich plotseling, of het een of ander der vermelde teekenen doet zich op, zoodat men den in hinderlaag liggenden vijand niet vermoeden kan. Even zoo min laat zich iets zekers omtrent den tijd, dat de koorts aanvangt, zeggen: de ziekte vertoont zich, wel is waar, meestal, gelijk wij zeiden, op denzelfden tijd, als gemeenlijk de zogkoorts; doch men ontmoet nogtans gevallen, waar zij vroeger, of later zich begint te ontwikkelen. Het ontbreekt niet aan eenige, schoon zeldzame voorbeelden, waar de kraamvrouwenkoorts, gelijk ik eerst in den jare 1825 bij de in Februarij, Maart en April heerschende kraamvrouwenkoorts in het gesticht voor kraamvrouwen alhier bevestigd vond, onmiddellijk na de verlossing, of spoedig op dezelve aanvangt; somwijlen openbaart zij zich eerst op den vijfden, menigmaal nog later, na acht, twaalf, veertien dagen. Niet zelden is zij met de zogkoorts vereenigd, soms gaat deze, die dan meestal den vorm der *Ephmera lactea protracta* STOLLII heeft, eerst in de kraamvrouwenkoorts over. Even zulk eene onbestendigheid zien wij in de ziekteverschijnselen zelve, zoodat men zich, als het ware, gedrongen voelt, juist deze *Inconstantia Symptomatum*, voor iets kenschetfends in deze ziekte te houden. Tevens zien we daaruit, dat men bij hare beschrijving het oogmerk niet bereiken zou, wilde men alles gadeslaan, en elk verschijnsel opnoemen,

dat



dat deze of gene Arts meent waargenomen te hebben. Onze taak is het dan, het beeld der ziekte zoo af te malen, als het zich in de meeste gevallen aan ons voordoet, terwijl wij alleen die verscheidenheden gedenken zullen, welke het bestendigste haar vergezellen, of van gedaante doen veranderen. De aanval van koude nu, waarmede de ziekte veelal te voorschijn treedt, en die slechts in enkele gevallen gemist wordt, is over het algemeen hevig, aanhoudend, eensklaps zich openbarende. De lijderes is terstond of zeer prikkelbaar en gevoelig, of zeer neerslagtig, moedeloos, vol angst en vreeze; daarbij voegen zich hoofdpijn, inzonderheid in de voorhoofdstreek, boven de wenkbraauwen, afgematheid, misfelijkheid, zelfs wel braking, met één woord, *gastrische* verschijnselen, die echter in den beginne dikwerf nog ontbreken. Op de koude volgt nu de hitte; de huid wordt meestal brandend heet en droog; de kraamvrouw klaagt over een' hevigen, brandenden, onleschbaren dorst (een zeer bestendig, dikwerf tot de herstelling, of den dood aanhoudend, zeer karakteristiek teeken) de pols, die aanvankelijk vol en gematigd kan slaan, wordt spoedig en in de meeste gevallen zeer rad en menigvuldig, honderd twintig, honderd dertig, honderd veertig en bij sommige kraamvrouwen bij de laatste *Epidemie* in het kraamgesticht alhier in Februarij, Maart en April 1825, zelfs honderd vijftig slagen in eene minuut, klein en hard (volgens anderen is hij even dikwerf week); de warmte (*Temperatuur*) is daarbij niet altijd regelmatig verdeeld; eenige deelen doen zich koud op het gevoel voor, midde-

ler-

lerwijl andere brandend heet zijn. De aanval van koude en hitte keert nu ook vaak terug, zoodat over en weêr afwisselingen (*Remissionen*) en zelfs tusfchenpoozingen (*Intermissionen*) zich kunnen vertoonen. Somwijlen namelijk ontwikkelt zich de ziekte volkomen onder den vorm eener wisselkoorts; alle een of twee dagen doet zich dan tegen den avond een aanval van koude op, waarop hitte volgt, en soms de koorts geheel nalaat. Over het algemeen ontwikkelen zich nu daarbij menigerlei *hysterische* verschijnselen: het algemeene gevoel wordt veranderd; er heeft bedrog in de zintuigelijke gewaarwordingen plaats, dikwijls in vermindering bestaande, zoodat het der zieke bij genoegzaam licht in de kamer, te donker voorkomt en men eenige brandende kaarsen in hare nabijheid moet zetten; of ook ziekelijk verhoogd, zoodat zij bij voorbeeld muziek meent te hooren, en haar elk gedruisch, hoe zacht ook, hinderlijk is. Menigmaal en veelal op het hoogste der ziekte houden de, in den beginne vrij luide, klagten geheel op; zij klagen alleen over afmatting. Daarbij voegen zich nu spoedig voor het grootste gedeelte eigenaardige, plaatselijke aandoeningen: gewoonlijk tegen den tweeden of derden dag der ziekte klaagt de lijdere over eene hevige pijn in den onderbuik, het meeste rondsom den navel aanvangende, welke zij dikwijls als brandend, of snijdend afmalen, en die zich van daar uit naar de kraakbeensstreken (*Hypochondria*) en naar achteren, vaak bovenwaarts tot de fchouderbladen uitstrekt. De onderbuik wordt onder dat alles meer of min opgezet, gespannen, hard, gevoelig, en



menigmaal zoo gevoelig, dat de minste aanraking en het lichtste dekfel niet verdragen wordt. Dikwerf zet de buik zoo sterk uit, dat de lijderes volkomen het aanzien eener zwangere heeft; dan is er gemeenlijk ook beklemming in de borst, kortademigheid, en een weinig hoest voorhanden. Dat nu bij zulk eene gewigtige stoornis in de ingewanden van den buik de teekenen van onzuiverheden in de eerste wegen (*gastrische Symptomen*) niet ontbreken, spreekt van zelve, doch zij zijn van een' zeer verschillenden aard. De tong, die aanvankelijk dikwijls volkomen zuiver is, wordt meer of minder beslagen; zij is of vochtig, heeft een dun, slijmachtig overtrekfel, of zij wordt, hoe heviger de koorts wordt, en hoe vaker de verheffingen (*Paroxysmen*) plaats hebben, dik beslagen, droog, verkrijgt een bruin en zelfs zwart overtrekfel; de tanden worden zeer onzuiver, met slijm overdekt; de lippen met eene bruine korst bezet, dikwijls zwart; de adem wordt zeer stinkend, de maagstreek insgelijks gespannen en pijnlijk; de lijderes wordt miselijk, krijgt oprispingen en begint te braken, kan eten, noch drinken, ja, dit kan zoo ver gaan, dat zij, gelijk bij eene wezenlijke maagontsteking, alles weder overgeeft. Het gebrakte zelf is in deze gevallen insgelijks zeer onderscheiden, dikwijls is het loutere slijm, of eene waterige vloeistof; zoo brakte eene kraamvrouw bij de, door ons waargenomene, kraamkoorts-*epidemie* over de vier pinten van dit vocht uit; meestal is het eene galbraking (*Vomitus biliosus*), bij wijlen worden er aanmerkelijke hoeveelheden eener zwarte stof

stof ontlast. De ziekte gaat vaker nog met buikloop, dan met braking vergezeld. WHITE houdt denzelven zelfs voor het eenige, *critische* teeken in deze ziekte, doch hij dwaalt hierin jammerlijk; de lijderessen gevoelen zich, wel is waar, na elken stoelgang eenigermate verligt, de beterschap echter is niet alleen niet van duur, maar dikwijls neemt de ongesteldheid juist op deze wijze, onder bijkoming van de allergevaarlijkste verschijnselen (\*), den slechtsten keer. De lijderessen, namelijk, worden na iedere ontlasting al zwakker; de drekstoffen en de *Urin* loopen op het laatst onwillekeurig af; er openbaren zich flaauwten, uitputtend (*colliquatief*) zweet, hik, *Facies hippocratica*, blijken eener ware rotkoorts en eindelijk de dood. — De afgang zelf is in den beginne zeer sterk, zeer verschillende gekleurd, zwart, zeer stinkend. Soms wordt de lijderes door koliekaardige pijnen, door menigvuldige en pijnlijke persingen (*Tenesmus*), veelvuldigen drang tot *Urin*lozing gekweld. De *Urin* is over het algemeen zeer verzadigd, veeltijds dik, rood, met eene wolk, of rondrijvende draden, doch somwijlen ook volkomen helder. Dikwerf treft men daarbij medelijdende aandoeningen van het hoofd en de borst aan, welke men onmogelijk alle kan optellen. De verdienstelijke VOGEL heeft dus groot gelijk, als hij beweert, dat er geen gevaarlijk koortsverschijnsel bestaat, hetwelk men niet somwijlen bij deze koorts kan ontmoeten. Wat de verrigtingen in

(\*) Bij de vermelde kraamkoorts - *Epidemie* stierven de kraamvrouwen, die buikloop kregen.



in het kraambed aanbelangt; deze zijn in de meeste gevallen in een' meer of minderen graad veranderd. De zogaffcheiding neemt gewoonlijk met den aanval der koorts, of toch spoedig daarna af; de vroeger opzettende borsten worden flets, slap, doch evenwel niet ontbloot van zog; de kraamvloed vermindert meestal ook, verandert dikwijls in hoedanigheid, wordt zeer smerig en stinkend, en het is eene opmerkelijke, belangrijke waarneming, dat als de kraamzuivering onderdrukt, of minder werd, hare regelmatige terugkomst toch daarom niet *critisch* werkte. Dat verder de gansche werkkring der gevoeligheid in dit lijden betrokken wordt, hebben wij boven reeds aangestipt: over zulks vertoont zich raaskallen, verhoogde prikkelbaarheid; allerhande verschijnselen van zwangerschap en zenuwtoevallen zijn voorhanden, trekkingen van sommige deelen, beving der ledematen, algemeene stuiptrekkingen, peeshuppeling, hik (*Singultus*), slaapzucht (*Sopor*), half waken en slapen (*Coma Vigil*), toevallen van beroerte, uitputting enz. In de meeste gevallen kan men het der zieke aanzien, hoe hevig het *Organismus* aangetast is; hare gelaatstrekken zijn, wel is waar, niet altoos bestendig en op dezelfde wijze veranderd, doch over het algemeen zeer eigenaardig. Bij wijlen schijnt ook hier, gelijk bij de meeste overige verschijnselen, eene zekere afwisseling, eene toe- en afnemning plaats te grijpen, zoodat eerst in het hoogste der ziekte, de Arts alle hoop reeds opgegeven hebbende, de gelaatstrekken onveranderd blijven. Deze verschijnselen nu openbaren zich of eerstond na de eerste koortsverheffing, of eerst later,

als

als de ziekte alreeds eene aanmerkelijke hoogte bereikt heeft. Het gelaat is in den beginne rood, eenigzins opgezwollen, de wangen zijn dan niet zelden met donker roode vlekken bezet, terwijl andere deelen er bleek, doodelijk uitzien, en met een koud, kleverig zweet bedekt zijn; weldra echter verandert het gansche gelaat aanmerkelijk, het gansche uitzigt verraaft angst, schrik en hevige aandoening. Het aangezigt valt in, de oogen worden dof, troebel, levenloos, in hunne holte teruggetrokken, door een' bleeken kring omgeven, somwijlen tranend en met eene kleverige vloeistof gevuld; de neusvleugels worden breed, als het ware, van elkander getrokken, de lippen verliezen hare roodheid, en worden met korsten van onderscheidene kleur overtoegen. Dikwijls hebben de zieken iets wilds in haar gezigt, waarbij hare oogen door de *Orbita* rollen en zij angstvol rondzien. Eindelijk levert ook de oppervlakte der huid menigerlei ziekelijk verschijnsel op, dat bij lange na niet altijd *critisch* is; het veelvuldigste ontwikkelt zich een gierstuitslag (*Friesel*), na welks verschijning de koorts menigmaal toeneemt; wijders blutsvlekken, roosaardige vlekken, blaasjes en scheuren in de huid, zogkorst en dergelijken meer.

*Vergelijkingen der kraamvrouwenkoorts met  
eenige andere ziekten.*

§. 329.

De kraamvrouwenkoorts is dikwerf miskend en met andere ziekten verwisseld geworden, en het zal



daarom noodig zijn, die ziekten en hare onderscheidene kenteekenen voor te dragen, met welke deze mistasting het menigvuldigste heeft plaats gehad.

1) De ontsteking van het buikvlies. Het is niet te ontkennen, dat deze ziekte met de kraamvrouwenkoorts de meeste overeenkomst heeft. De laatste evenwel wordt over het algemeen door een' koortsaanval met koude en hitte voorafgegaan, die bij gene eerst het gevolg der ontsteking is. Bij de *Peritonitis* is de pols duidelijker ontstekingachtig, dan bij de kraamvrouwkoorts. Deze laatste doet zich dadelijk kwaadaardiger voor, de lijderessen zijn terstond meer aangetast, zwakker, angstiger en door hoofdpijn gekweld. Het gelaat is meestal ingevallen; het gezigt staat angstiger en wilder.

2) Van de zogkoorts onderscheidt zich de ziekte door den veel zachteren vorm der eerste; bij gene ontbreekt die sterke uitputting van krachten, pijn en de groote gevoeligheid van den onderbuik; de borsten zijn veelal vol en gespannen; de kranken hebben eene zekere steking en trekking in de borsten, onder de oksels, dikwijls eene prikkeling over het geheele ligchaam, al hetwelk bij de kraamvrouwkoorts gemist wordt.

3) Van de naweeën is de kraamkoorts gemakkelijk te onderkennen, door de tusschenpoozen, welke deze vergezellen, door de niet aanwezige koorts, en doordat zij ligter zich laten beteugelen, als ook over het algemeen door de veel mindere, dikwijls ontbrekende spanning en gevoeligheid van den onderbuik.

4) De

4) De koorts met gierstuitflag. Wyl de kraambekkoorts vaak met een gierstachtig uitflag ontstaat, heeft men beide dikwerf met elkander verward, en zij hebben zeker altijd dit met elkander gemeen, dat zij met grooten angst gepaard gaan. De uitflagkoorts echter ontwikkelt zich gemeenlijk later; de plaatselijke, hevige aandoening van den onderbuik wordt daarbij niet aangetroffen, en als het uitflag verschijnt, hetgeen dikwijls eerst tegen den zevenden dag der ziekte geschiedt, dan houdt de koorts op, hetgeen bij de *Febris puerperalis* hoogst zelden het geval is. Bij deze laatste is de koude meestal heviger en aanhoudender; de hoest en benaauwdheid in de borst, de steking in de huid, de algemeen brandende hitte in dezelve, welke men bij deze uitflagkoorts waarneemt, ontbreken. Ontsteking van enkele ingewanden des onderbuiks, te weten *Metritis*, verder kramp in de borst, *Cholera*, *Ileus*, koliek enz. doen zich te duidelijk kennen, door derzelve eigenaardige verschijnselen, dan dat men ze, oplettend zijnde, met de onderhavige ziekte zou kunnen verwarren.

### *Verloop en Uitgangen der kraamvrouwenkoorts.*

#### §. 330.

Uit het zoo even gezegde begrijpt men, welk een bedriegelijk ding (*proteusartig*) deze ziekte is, en hoe moeilijk, ja men mag wel zeggen, hoe onmogelijk het is, een eenvoudig denkbeeld van dezelve op te geven, en wij hebben ons daarom juist toegelegd, eerst naar de rij af die verschijnselen



te vermelden, welke de ziekte het meeste en bestendigste vergezellen, en zullen nu de ontwikkeling, het verloop en de uitgangen derzelve eenigzins nader in overweging nemen. De ziekte vertoont zich, gelijk wij boven reeds aanmerkten, alleen in het kraambed, doch overvalt hier zonder uitsluiting den verschillendsten ouderdom en gestellen; zij ontwikkelt zich zoowel bij eerst- (*Primiparis*) als bij meer gebaard hebbenden (*Multiparis*), na moeilijke en ligte verlosfingen, bij frische en sterke eveneens, als bij zwakke gestellen, bij jonge en oude vrouwen; men wil nogtans bespeurd hebben, dat zij onder zekere betrekkingen zeer ligt geboren wordt, namelijk na moeilijke verlosfingen (\*); zoodanige, die bij behoorlijke geschiktheid daartoe zich aan de verrigting van het zogen onttrekken, bij kwaadsappige voorwerpen, na allerlei nederdrukkende gemoedsbewegingen en mislagen in den leefregel. Daar, waar zij verschijnt, vertoont zij zich in eene drieledige verhouding, of zwerwend (*sporadisch*), of algemeen heerschend (*epidemisch*), of eindelijk besmettend (*contagiös*) en de ervaring van vroeger en lateren tijd pleit zoo onwederlegbaar voor deze bewering, dat men tegenwoordig daaromtrent wel niet meer verschillend zal kunnen denken (†). Haar *epidemisch* karakter schijnt

hoofd-

(\*) Bij de bewuste *Epidemie* der kraamvrouwenkoorts heeft het zich niet bevestigd; daarentegen wel, dat kraamvrouwen na de gemakkelijkste verlosfingen er door aangetast wierden.

(†) Deze waarheid bleek insgelijks bij de *Febris puer-*

hoofdzakelijk van zekere weërsgesteldheden af te hangen, en zij zal inzonderheid in den vochtigen, kouden herfst en winter, gelijkerwijze in den heeten zomer ligt van een' *epidemischen* aard worden (\*). Dat zij onder zekere invloeden tevens een' besmettelijken aard kan aannemen, is mede door de er-  
va-

*peralis* in het kraamgesticht van *Berlijn*; eerst vertoonde dezelve zich *sporadisch*, en was uit dien hoofde ook minder gevaarlijk; gevaarlijker werd zij naderhand, toen zij zich als *epidemisch* onderscheidde; hierop nu volgde de besmettelijke, welke dood en verderf onder de kraamvrouwen verspreidde, evenwel minder, dan men anders in kraamgestichten plagt waar te nemen.

(\*) Zoo heeft de *catarrhale*, *rheumatisch*-ontstekingachtige gesteldheid, die in den verloopen winter van 1824—1825 bij den sterken regen en de natte koude heerschte, zoowel in het kraamgesticht alhier, als in de stad zelve aanleiding gegeven, dat de kraamvrouwenkoorts *epidemisch* werd; het was opmerkelijk, dat eenige maanden vroeger de zwangeren en barenden eerst nog aan goedaardige, *rheumatische* koortsen en inzonderheid aan *Rheumatismus* van den *Uterus* geleden hebben, gelijk zich hetzelfde zoo in het oog loopend aan het einde der zwangerschap, tijdens de baring en zelfs nog in het kraambed kenschetste. In den zomer zelfs nog waren *rheumatische* koortsen der kraamvrouwen aan de orde van den dag; de sterke hitte in Julij en het begin van Augustus verwekte geene *epidemische* kraamvrouwkoorts, doch wel gewigtige zogkoorts; met de hevigste aandoeeningen des hoofds, belemmering in de zogafscheiding, zoogenaamde zogverplaatsingen, en, ten gevolge van het menigvuldige zweeten, ondermijning der weeën en karige zogafscheiding, en somwijlen volkomene verdwijning van hetzelfde.



varing ten duideliĳſte bewezen. Moeijelijker evenwel zal het zijn, om reeds met zekerheid op te geven, waaruit zulk eene ſmetſtof (*contagium*) haren oorsprong ontleent. Of hier ook de invloeden van het weder ten grondſlag liggen; of namelijk die weêrsgesteldheid, welke tot zulke koortſepidemiën aanleiding geeft, de ziekte beſmettelijk maakt, wanneer zij zeer ſterk haren invloed uitoefent, durven wij niet bepalen. Trouwens daarvan hebben wij ons in de laaſte *Epidemie*, die wij hier in *Berlijn* hebben bijgewoond, zeker overtuigd, dat de grootſte zorg voor zindeliĳheid en genoegzame doorſtrooming van lucht in de kraamkamer niet beletten kon, dat de koorts beſmettelijk werd. Wij gelooven dit deswege vooral hier te moeten aanmerken, aangezien de ziekte veelal niet dan in hospitalen en kraamgeſtichten zulk een boosaardig karakter aanneemt, en men daardoor ligt op het vermoeden kon komen, alſof hier de oorsprong van haar ontſtaan in gebrekkige verpleging en morſigheid lag. Wij bekennen, dat wij te voren met meerdere Artſen, van dit gevoelen geweest zijn, en dat ons dit juist tot meerdere voorzorg ten dezen aanzien heeft aangeſpoord; doch de ondervinding heeft ons onwederlegbaar het tegendeel bewezen. Wij kunnen de verzekering geven, dat in de kraamkamers van het kraamgeſticht alhier voor de grootſte zindeliĳheid en voor behoorliĳke doorſtrooming van lucht altijd zeer ſtreng en oplettend zorg gedragen werd, hetwelk zeer ligt in het werk kan geſteld worden, daar de ruimte van plaats in eene behoorliĳke verhouding ſtaat met de zaal der verzorgd wordende

zwan-

zwangeren; altijd echter vond het onaangename toeval plaats, dat deze gesteldheid door de bijkoming van barenden met weeën, onder welke eenige zelfs de kiem tot *epidemische* kraamvrouwkoorts met zich voerden, verbroken werd. In weerwil van dit alles kenmerkte zich deze ziekte in een' hoogen graad als besmettelijk (\*). Velen hebben het denkbeeld van *epidemisch* en *contagieus* onderling verward en voor even gewigtig gehouden, doch voorzeker ten onregte. Eene ziekte kan *epidemisch* zich voordoen, zonder daarom besmettelijk te zijn, wanneer namelijk algemeene invloeden voorhanden zijn, zoodra vele voorwerpen ter gelijker tijd, of na elkander, door dezelfde oorspronkelijke, schadende invloeden aangedaan, en op gelijke wijze ziek worden. Hier erft niet de eene van de andere de ziekte, maar door dezelfde nadeelige in-

(\*) In de stad mijner geboorte, *Wurzburg*, waar ik insgelijks, gelijk hier, het kraaminstituut opgerigt heb, en hetwelk mij als Onderwijzer, Arts en Verloskundige van September 1805 tot mijne beroeping naar *Berlijn* in September 1816 toevertrouwd was, heb ik ook steeds de meeste zindelijkheid in acht genomen; nooit zag ik eene *epidemische* en besmettelijke kraamvrouwkoorts, schoon in mijn' tijd honderd vijftig tot honderd zeventig zwangere in een jaar verlost werden; slechts zeer enkel vertoonde zij zich *sporadisch*. De opvolger echter in mijn vak van onderwijs heeft haar tweemaal *epidemisch* zien heerschen, en kon de *Epidemie* door niets anders beteugelen, dan door de geheele opruiming der kamer, afschuring en het op nieuws beschilderen der wanden; een bewijs, dat deze kraamvrouwenkoorts tot de besmettelijke behoorde.



invloeden, waardoor bij voorbeeld A ziek werd, worden ook B en C aangedaan. Bij de besmettelijke ziekten daarentegen ontwikkelt zich eerst uit de ziekte van den een' eene besmettelijke stof, die zich nu aan andere lichamen mededeelt en dezelfde ziekte veroorzaakt. Daarom kunnen ook *sporadische* ziekten besmettelijk worden, en dit heeft ook de ervaring bij de kraamvrouwkoorts geleerd in zulke gevallen, waar door den Arts, of eene oppasster de ziekte van eene reeds ongesteld zijnde tot eene gezonde vrouw overgebracht werd.

### §. 331.

De ziekte kan volgens sommigen enkelvoudig en zamengesteld zijn; doch ten aanzien van het laatste durven wij onze verdeeling niet zoo ver uitstrekken, en de bijzondere, in het oog loopende teekenen tot grondslag onzer verdeeling aannemen, gelijk onder anderen SCHMIDTMÜLLER gedaan heeft. Eenigen onderscheiden eene zuivere ontstekingsachtige, eene *gastrische*, eene zenuwachtige en eene rotachtige kraamvrouwenkoorts; wij gelooven echter, dat men daarbij grootendeels andere koortsen der kraamvrouwen met de eigenlijke *Febris puerperalis* verward heeft. Bij deze laatste bespeurt men gemeenlijk drie tijdperken: 1) het ontstekingsachtige (*Stadium Inflammationis*); 2) dat van uitzweeting (*Stadium Eruditionis*) en ten 3) het slepende (*Stadium Sequelarum*). De ziekte heeft altijd een en hetzelfde hoofdkarakter; met dit onderscheid nogtans, dat zij zich nu eens zoo, dan weder onder een' ander vorm vertoont; en gesteld, al hadden de

de *gastrische* verschijnselen nog zoo zeer de overhand, dan zal men toch daarom dezelve niet *gastrische* koorts heeten; want wilden wij bij zulk eene bedriegelijke ziekte, van enkele, bijzondere verschijnselen onze benaming afleiden, dan zouden wij, in plaats van de *Nosologie* dezer koorts duidelijker te maken, de verwarring slechts vermeederen, en in het voorbijgaan gezegd, zou onze benaming redekunstig (*logisch*) valsch zijn.

### §. 332.

Wat den duur der opgegevene *Stadia* betreft, deze is zeer ongelijk, doch gemeenlijk houdt het ontstekingachtige tijdperk niet langer dan drie tot vier dagen aan, dikwijls duurt het nauwelijks twee dagen en somwijlen slechts één' dag, en zelfs slechts weinige uren; dit is het geval bij eene zeer hevige kraamvrouwkoorts, gelijk wij daarvan in de jongste *Epidemie* ook overtuigd zijn geworden. Tevens gelooven wij, dat het ontstekingstijdperk in sommige gevallen reeds eenige weken voor de verlossing, of te gelijk met de baring begint, want anders zijn de, bij de opening na den, binnen weinige dagen gevolgden, dood, zoo algemeen waargenomene verwoestingen in de gezonde deelen van den onderbuik en de borstholte niet te verklaren; wij zullen dit bij de volgende beschrijving van de kraamkoorts-*Epidemie* alhier nader bewijzen. Haar uitgang nu is zeer onderscheiden: soms heeft er eene vermindering plaats en de ziekte begint menigmaal van voren af aan weder volstrekt op dezelfde wijze haren loop (*Cyclus*), zoodat het ontstekingachtige tijdperk

an-



andermaal te voorschijn treedt, of andere organen worden door ontsteking aangedaan, die te voren onverlet waren. Het *Stadium Exsudationis* volgt nu, als de ontsteking niet tot verdeeling overgaat, doch somtijds kan het eerste tijdperk door zich zelven of door een' spoedigen overgang in versterking met, of zonder uitzweeting doodelijk worden. Ook dit duurt een' langer' of korter' tijd, eensdeels zich rigtende naar de hoeveelheid, anderdeels naar de zitplaats der uitgezweete stof, en kan drie tot vijftien dagen aanhouden. Hoogst zeldzaam gaat nu, nadat het tweede tijdperk daar is, de ziekte in gezondheid over; de herstelling is althans dan zeer langzaam en geeft zelfs dikwerf aanleiding tot gewichtige naziekten. Veeleer ontwikkelen zich daarop velerlei gebreken, die na volkomene ondermijning der lijderes door bijkomende, uitterende koortsen en dergelijke haar doen bezwijken. Over het geheel genomen is de kraamvrouwkoorts eene allerhaastigste ziekte (*Morbus acutissimus*), zoo veel te eer, als zij dadelijk na de bevalling te voorschijn treedt; de kraamvrouwen sterven dikwijls reeds op den derden, vierden, vijfden, zesden, zevenden dag; in zeldzame gevallen, eerst eene week of later na de geboorte zich ontwikkelende, heeft zij over het algemeen een trager verloop en is alsdan veelal niet zoo kwaadaardig.

### §. 333.

De voornaamste uitgangen nu dezer ziekte zijn de volgende: 1) verdeeling. De, in zekeren zin, zeldzame gevallen, waar deze uitgang volgt, zijn

zijn de scheidingen (*Crisen*), waardoor de ziekte eene gunstige wending neemt, zeer veranderlijk. Meestal zal de kraamvrouwkoorts gelukkig ten einde loopen, als de zogaffscheiding weder geregeld haren gang gaat, en zelfs hebben die schrijvers, welke hare wezenlijke oorzaak op eene zogverplaatsing gronden, vele voorbeelden van dien aard bijgebracht, voornamelijk DOUBLET, en het is niet geheel te ontkennen, dat het een zeer gunstig teeken is, als de verrigtingen der borsten weder in orde komen, en deze weder meer beginnen te zwellen (*Turgor*); trouwens men moet hier niet te veel waarde aan hechten, als dit het eenige verschijnsel is. In andere gevallen geschiedt de *Crisis* door de kraamzuivering, door zweet, langs het darmkanaal, als wanneer men braking, zweet, of buikloop waarneemt, door een *critisch*, gierstachtig uitslag (een zeer twijfelachtig teeken), door de *Urin*. Puzos meent zelfs door kwijling de *Crisis* waargenomen te hebben. In al deze gevallen derhalve worden de lijderessen volkomen hersteld, en JÖRG merkt zeer juist aan: het haastige (*acute*) vertoont zich zoowel in de beterschap, als in de verergering, want in de veelal gelukkig aflopende gevallen ontwikkelt zich de gezondheid schielijk en de organen beginnen even zoo spoedig, als zij door de ziekte afgebroken werden, hunne vorige verrigtingen weder. Wij mogen echter niet onopgemerkt laten voorbijgaan, dat ook de gezondheid somwijlen langzaam terugkeert, en dat is eigenlijk het geval, als de ziekte den, aanstonds te beschrijven, tweeden uitgang neemt, waar in zeldzame voorbeelden, de koorts reeds lang bestaan heb.



hebbende, alles reeds verloren schijnende, de natuur zich toch nog een' gelukkigen uitgang verschaft, waarvan ik voorbeelden heb bijgewoond. — Een andere uitgang dezer ziekte nu is 2) de uitzweeting. Op deze wijze scheidt de ziekte zich veelvuldig, evenwel niet, dan in de allerzeldzaamste gevallen, met gelukkig gevolg voor de lijdende, daar het volstrekt niet in het bereik der kunst ligt, het uitgezweete te ontlasten. Dit geeft nu menigwerf tot nieuwe, trager verloopende ontstekingen, aaneengroeiingen en ontaarding van allerlei foort aanleiding en eindigt in den dood, of in gevaarlijke nagebreken, die insgelijks in een korter of langer tijdsbestek doodelijk eindigen. Wat hier uitzweet, is geen zuivere etter, trouwens, deze bevindt zich er toch onder. Ingevolge de daarmede genomene scheikundige proeven zoude het ware *Lympha* zijn, die de meeste gelijkenis met bloedwater heeft. De ziekte komt ten aanzien van dezen uitgang bijzonder overeen met het *Hydrocephalus acutus* der kinderen. Beide hebben het bijzondere, dat zij in den beginne ontstekingachtig zijn, de ontsteking echter gaat veelal zeer schielijk, vaak onmerkbaar voorbij en eindigt dra in uitzweeting en den dood; 3) de versterving. In dezen vorm der kraamvrouwkoorts gaat de ziekte gemeenlijk over, als de ontsteking zeer hevig is, en de koorts, wat hare verschijnselen aanbelangt, met de kwaadaardige zenuwenrotkoortsen overeenkomt. De ziekte heeft dan schielijk een doodelijk einde en men treft dan gewoonlijk de versterving slechts in enkele deelen aan, terwijl over het algemeen in de meest nabijgelegene

dee-

deelen de sterkste blijken van ontsteking aan den dag leggen. 4) Wat de eigenlijke naziekten betreft, deze werden reeds gedeeltelijk vermeld, en wij willen de voornaamste derzelve nog kortelijk opgeven. Zij zijn: *a) Tabes puerperalis; b) Ascites et Hydrops Ovarii; c) chronische* ontsteking in het eene of andere buiksingewand; *d)* aaneengroeiingen derzelve onderling in verschillende graden; *e)* verettering van sommige organen, bij voorbeeld der lever, der longen en dergelijken meer. Eindelijk ten 5) de dood. De ziekte gaat, gelijk gezegd is, of reeds in het ontstekingachtige tijdperk daarin over, of zij wordt vroeger of later door een' der genoemde, ongelukkige uitgangen doodelijk, meestal ten gevolge der uitzweeting (\*).

Uit-

(\*) Blij de vermelde *Epidemie* van kraamvrouwkoorts greep de verdeeling slechts daar plaats, waar dezelve een *epidemisch* karakter had; zoodra werd zij niet besmettelijk, of de dood volgde telkens in het tijdperk der uitzweeting; eene enkele slechts, bij welke de ziekte in dit tijdperk *chronisch* werd, verliet eerst na vele weken in volkomene gezondheid het huis; bij eene andere, waar dezelfde uitgang plaats had, verbeidde men insgelijks dezen gelukkigen afloop; doch zij stierf nog op den vier en twintigsten dag, grootelijks haren dood verschuldigd zijnde aan den hoogen graad van ongezeggenheid en slechte nakoming onzer voorschriften. Eindelijk vormde zich een *Absces* aan den navel, dat openbrak, en bij de lijkfchouwing vond men de uitgezweete stof niet alleen over het gansche darmkanaal en het buikvlies verspreid, maar zelfs de lever was geheel en al in verettering overgegaan en verteerd. Men zie onder: de lijkopeningen.



*Uitkomsten der Lijkopeningen.*

## §. 334.

Zoodra men de talrijke schriften der Geneeskundigen over dit onderwerp slechts vlugtig gadellaat; zoodra men overweegt, hoe ontelbaar vele lijken van vrouwen, werkelijk aan de kraamvrouwkoorts gestorven, geopend zijn, dan zal men het schier voor onmogelijk houden, dat de ziekte nog steeds ten aanzien van haar wezen niet duidelijk gekend is, zoo men niet van den anderen kant bedacht, welk een' schadelijken invloed de *Theoriën* op het onderzoek van lijken hebben; hoe men, door een opgevat gevoelen vooringenomen, ligtelijk iets ziet, wat men wilde zien; hoe men menigwerf de gevolgen eener ziekte voor hare oorzaak hield, en eindelijk met welk eene onnaauwkeurigheid dergelijke lijkopeningen dikwijls ondernomen en zelfs nog heden ten dage in het werk gesteld kunnen worden. Ondanks dit alles hebben de uitkomsten der dusverre gedane nasporingen veel met elkander gemeen, en juist dit zullen wij hier beknopt trachten in te vlechten, ten einde daaruit, ware het mogelijk, eenig licht omtrent het wezen der ziekte te erlangen.

## §. 335.

De lijken van aan kraamvrouwkoorts gestorvenen gaan zeer schielijk tot ontbinding over; de gewone doodvlekken vertoonen zich spoedig na het verscheiden, en veelal in een' sterkeren graad en grooteren omvang, dan gewoonlijk. De buik is gemeen-

meenlijk zeer opgezet, de buikbekleedselen bleek, of blaauw. Uit de meeste openingen des ligchaams, inzonderheid uit den neus en mond, vloeit een zeer dun, waterig bloed, dat dadelijk, gelijkerwijze het gansche ligchaam, een' zeer stinkenden en doodelijken reuk verkrijgt. Vaak ontmoet men nog de sporen van, in het leven ontwikkelde, uitslagen. In het inwendige nu vindt men, gelijk te verwachten was, de meeste veranderingen in de onderbuiksholte; deze nogtans kunnen menigerlei zijn, en de schrijvers loopen in hunne berigten hieromtrent zeer uiteen. Nog het menigvuldigste schijnt men ontsteking van het buikvlies, vastgroeiing van hetzelfde met de naburige deelen, verettering derzelve, uitvloeijing eener lymphatieke, kaasachtige stof in de holte van het buikvlies aangetroffen te hebben. Anderen willen de baarmoeder, het net, de darmen, de eijerstokken enz. ontstoken en veretterende gevonden hebben. Soms bemerkt men, dat eenige deelen koudvurig en met schijnvliezen bedekt zijn, of men ontwaart in de geheele buikholte eene melkachtige vloeistof met vlokken, met eene kaasachtige stof vermengd. Zeldzamer treft men op deze, of gene plaats in de buikholte verborgene *Abscessen* aan. In enkele gevallen wil men ook ontstekingen en uitzweetingen buiten de buikholte, in de zakken van het borstvlies (*Pleura*), in de longen enz. waargenomen hebben (\*). De uitkomsten van de,

in

(\*) Zoo waren bij al de, in de vermelde, *Epidemie* van kraamvrouwkoorts alhier, overledenen de longen en de *Pleura* tevens in den hoogsten graad ontstoken; niet



in de laatste helft des jaars 1819 in *Weenen* geheerscht hebbende, *Epidemie* waren van een' dergelijken aard: ook hier kenmerkte zich de ziekte aanvankelijk als ontstekingsachtig, met eene sterke geneigdheid tot uitzweeting en versterking. Van 26 Julij tot 31 Augustus werden zes en vijftig lijken geopend. Alle gingen zeer schielijk, meest onmiddellijk na den dood, tot volkomene ontbinding over; men bespeurde vele bleeke vlekken over het geheele ligchaam en het bloed liep uit neus en mond. Alle ingewanden, in het bijzonder echter de *Uterus*, waren zeer week en tot ontbinding overgegaan, en pleitten voor rotting en ontbinding van het gansche ligchaam. In de borst- en buikholte vond men uitzweelingen eener bruine wei, gemeenlijk met stollbare *Lympha* vermengd. Het *Peritonaeum* en de *Ovaria* vertoonden meer of minder duidelijk sporen van ontsteking; de inwendige vlakte van den *Uterus* was heetvurig, en dit was in ieder geval aan den baarmoedermond het duidelijkste blijkbaar, zoodat het al het aanzien had, alsof de ziekte van hier begonnen was.

§. 336.

alleen bespeurde men de uitzweelingen in de borstholte, maar bij eenigen zelfs in het hartezakje, en het hart zelf was in een geval met eene witte, op etter, of melk gelijkende, vloeistof bedekt. Om deze reden gevoelde de lijderes tijdens de koorts een' onbeschrijflijken angst, — en bijna alle zieken en gestorvenen hadden de hevigste toevallen van ontsteking der *Pleura* en longen, steken in de zijde, pijnen in de borst en hoest, waardoor het epidemisch geworden, *katharraal-rheumatische*, ontstekingsachtige karakter, zich zoo duidelijk deed kennen.

Wat nu eindelijk de uitkomsten der lijkopeningen bij de door ons laatstelijk waargenomene *Epidemie* betreft, die over het geheel met de door NÄGELIE beschrevene, de meeste gelijkenis heeft, en waarbij in het begin het ontstekingsachtige tijdperk niet miskend kon worden, dit is in het volgende vervat:

1) Bij eene, op den derden dag na de verlossing overledene, kraamvrouw vertoonde de bekkeneels-holte niets ziekelijks, behalve dat de bloedvaten eenigzins meer waren opgevuld, dan in den gezonden toestand. — In de borstholte was de *Pleura* met de longen en de ribben aaneengegroeid; de regter long was zonder bloed, de linker daarentegen geheel en al zwart en met bloed opgepropt. Het hartzakje bevatte ongeveer vijf oncen van een groen, geel water, het hart zelf was met bloed, en de geheele borstholte met eene aanmerkelijke hoeveelheid geel water opgevuld. Na het openen der onderbuiksholte vond men het buikvlies niet alleen in ontsteking, maar zelfs in koudvuur overgegaan; het darmkanaal met lucht gevuld en ontstoken; de lever op hare oppervlakte met eene dikke, taaije, met etter overeenkomende, slijm bedekt, hare linker kwab miskleurig en hard, de regter op den bovensten, stompen rand in hare zelfstandigheid geheel opgelost en papachtig; de galblaas geheel ontbloot van gal; de milt had op hare uitwendige, naar de buikbekleedselen, gekeerde vlakte, eene rozenroode kleur; de maag was op eenige plaatsen miskleurig en met eene groene vloeistof



opgevuld; het darmkanaal op sommige plaatsen met het buikvlies vergroeid; de baarmoeder deed zich aan hare voorzijde donkerrood, aan hare achtervlakte een weinig ontstoken voor; hare zelfstandigheid en de inwendige vlakten gaven niets krampachtigs, de nieren, pisleiders en de pisblaas integendeel ontsteking te kennen. Voor het overige was de gansche holte des onderbuiks door eene groen-geelachtige, met kaasachtige vlokken vermengde vloeistof opgevuld, welker hoeveelheid ongeveer vier ponden gewigts bedragen konde.

2) Bij eene, op den vierden dag na de verlossing gestorvene, kraamvrouw vertoonde de uitwendige gesteldheid niets onnatuurlijks. In de borstholte vond men de regter long zeer vast met de *Pleura* aaneengegroeid; de longen op hare achterste vlakten zeer ontstoken; de vaten der borstholte, als ook het hart, zeer rijk aan bloed; in het hartezakje bevond zich eene aanmerkelijke hoeveelheid groen-geelachtig water. De oppervlakte des middelfrifs had een donkerrood aanzien. De onderbuik was tot barstens toe opgezwollen. Na het openmaken konde men de buikbeksleden nauwelijks van de ingewanden des onderbuiks afscheiden. De uitzweeting was zoo aanmerkelijk, dat ze eerst met eene spons moest weggenomen worden, alvorens de overige *organen* ontbloot konden worden. Het *Peritoneum* was in deszelfs ganschen omvang zoo ontstoken, dat het eene donkerblauwe kleur verkregen had; het *Omentum majus* te zamengerold en koudvurig. De lever in hare zelfstandigheid opgelost en van eene aschgrauwe kleur; de galblaas be-

bevatte slechts weinige, hooggeel gekleurde gal. De maag, even als het gansche darmkanaal (*Tractus Intestinorum*) buitengewoon met lucht opgevuld; derzelver vaten als opgespoten en onderling door bandachtige draden, gevolgen der uitzweeting, vast vereenigd. De baarmoeder was niet ontstoken, nogtans wel uitgezet; hare overlangsche doormeting bedroeg acht duimen. De vaten waren van bloed ontbloot; de inwendige vlakke vertoonde niets ziekelijks; de eijerstokken en de trompetten van FALLOPIUS waren zeer ontstoken en de pisafscheidende werktuigen schenen volkomen gezond te zijn.

3) Bij eene, op den zevenden dag na de verlossing gestorvene, kraamvrouw kon men in de scheidelholte niets ziekelijks ontdekken. — Eene aanmerkelijke hoeveelheid geel, met etterachtige vlokken vermengd, water stroomde bij het openen der borstholte, uit dezelve. De longen waren op sommige plaatsen vastgegroeid en ontstoken; het in het hartzakje vervatte water bedroeg vier oncen; ook hier vond men etterachtige vlokken, het hart was bloedledig. De omvang van den onderbuik, van de lenden over den navel gemeten, hield vier en deszelfs hoogte van het schaambeek tot aan het zwaardvormige uitsteeksel des borstbeens twee voeten. Nadat de buikbeksels kruisvormig doorgesneden waren, bleek het, dat dezelve, mitsgaders de buikspieren, de dikte van een sterk kaartenblad hadden. Op eenige plaatsen waren de spieren door koudvuur aangetast. De beksels van den onderbuik, benevens de dunne buikspieren *weggeprepareerd* zijnde, vloede er eene aanmerkelijke



hoeveelheid groen-geelachtig water met etterachtige vlokken naar buiten; het buikvlies was hevig ontstoken, en de, tusfchen beide platen loopende, vaten als opgespoten; het ftelde een fchoon vaatnet voor. Het groote net (*Omentum majus*) geleeke eenen klomp etter, aan deszelfs onderften rand fcheen het koudvurig; de vaten der maag en van het ganfche darmkanaal waren buitengewoon ontstoken, en de maag zelve aan den portier zeer koudvurig, gelijkerwijze ook op meerdere plaatfen van den nuchteren darm (*Jejunum*). Door de uitgezweete *Lympha* was het darmkanaal op vele plaatfen met het buikvlies vastgegroeid en met lucht opgevuld. De lever met het buikvlies zoo vast vereenigd, dat zij niet dan met vele inffpanning kon worden blootgelegd; hare kleur was fmeurig wit, lederachtig op het gevoel, in hare zelfffandigheid echter was zij week, fponfachtig en zeer veranderd; de milt zeer opgezet en papachtig; het *Pancreas* en de overige klieren van den onderbuik waren in een' hoogen graad ontstoken en hard, en vele derzelve tot verettering overgegaan. De *Uterus* met de eijerfftokken en ronde banden inffgelijks zeer ontstoken; de baarmoeder bij het doorsnijden zeer week; de inwendige vlakke verfftoonde niets ziekelijks van aanbelang. De nieren waren wel eenigermate in omvang toegenomen, doch anders niet aangedaan; de pisleiders en pisblaas waren in hunne wanden zeer verdikt en ontstoken. De in den onderbuik begrepene vloeiffstof bedroeg acht pinten.

4) Bij eene, op den achtften dag na de verloffing geflorvene, kraamvrouw vond men bij het door-

doorsnijden der uitwendige, zachte deelen, de spieren en vaten nog redelijk met bloed gevuld; de borsten waren nog niet geheel en al van zog ontbloot; in de holte bespeurde men op eenige plaatsen de *Pleura* met de ribben en longen aaneengegroeid. De longen, het hart en het hartzakje waren gezond; deszelfs holte bevatte een vleeschkleurig water, welks hoeveelheid over de twaalf oncen bedroeg. — De onderbuik was miskeurig en tot barstens toe uitgezet; na de opening trof men het buikvlies, boven alle verwachting, in deszelfs gansche uitgestrektheid ontstoken aan, niet slechts waar het de dunne en de dikke darmen als *Mesenterium* en *Mesocolon* bekleedt, maar ook daar, waar het tusschen de trompetten en eijerstokken de breede baarmoederbanden en vledermuisvleugels vormt, en zich over de maag, lever, milt en nieren begeeft, en van deze als *Omentum minus* en *major* afdaalt. Bovendien vond men bloedige, wijachtige uitzweelingen. De blinde zak (*Saccus coecus*) der maag was zeer ontstoken en gedeeltelijk koudvurig, gelijkwijze de inwendige vlakke der maag en de linker leverkwab; de milt inwendig geheel ontbonden, koudvurig; de lever bleek en lederachtig op het gevoel. De baarmoeder deelde, wel is waar, luttel in de ontsteking, was echter nog zeer uitgezet; de nieren, voornamelijk de regter, opgepropt met bloed; overigens vond men niets aanmerkingswaardigs.

5) De schouwing van eene, twee en vijftig uren na de verlossing gestorvene, kraamvrouw leverde de volgende verschijnselen op. Bij het openen der buikholte trof men de maag en het darmkanaal bui-



tengewoon door lucht uitgezet aan; het buikvlies met al deszelfs verdubbelingen, en alle ingewanden des onderbuiks, zonder onderscheid, hevig ontstoken; door de uitzweëting hadden zich zekere bandachtige verlengselen gevormd; de hoeveelheid van het, in den onderbuik vervatte, water was aanmerkelijk; de vaten van het darmkanaal vertoonden zich als opgespoten; lever en milt zeer week, de eijerstokken overtroffen driemalen hunne natuurlijke grootte. In de borstholte vond men eene weiachtige vloeistof opgehoopt en alle ingewanden zoowel onderling, als met de *Pleura* vergroeid. De bekkeneelsholte leverde geen onnatuurlijke en ziekelijke verandering op.

6) Bij eene, zeven dagen na de bevalling overledene, twee en twintigjarige kraamvrouw, was de kleur der huid over het geheele ligchaam blaauw gevlekt; de buik opgezet; na het openen der buikholte deed zich het buikvlies overal gelijkelijk ontstoken voor; het groote net, als ook de vaten van het geheele darmkanaal, waren als opgespoten; de lever buitengewoon groot; hare zwaarte bedroeg zes en een half pond; in de regter kwab bespeurde men eenige onbeduidende verhardingen; het weeffsel der milt was papachtig; het darmkanaal op eenige plaatsen sterk met het buikvlies vergroeid; de baarmoeder hevig ontstoken en losser, even als de eijerstokken ongemeen in omvang vergroot en ontstoken; nieren, pisleiders en blaas deelden niet in de ontsteking. De buikholte bevatte eene groote hoeveelheid water met eene aanmerkelijk vele, op etter gelijkende, stof, hetgeen zich voornamelijk in den omtrek der baarmoeder verspreid had: — de *organen* der borsthol-

holte waren volkomen gezond, behalve dat de *Pleura* op sommige plaatsen met de ribben en longen vergroeid was. In de bekkeneelsholte waren de vaten van de hersenvliezen en de hersenen sterk met bloed opgevuld, en op vele plaatsen waren de vliezen met eene geleiaardige stof overtogen; de hersenholligheden vervatteden vele oncen eener weiachtige vloeistof. Opmerkelijk was de plotselinge dood van het in volkomene gezondheid geboren kind; in de eerste uren schreide het met eene sterke stem, nam de borst der moeder met veel gretigheid, en sliep eenigen tijd. Bij het ontwaken was het geluid veranderd; het werd in het gezigt en over het gansche ligchaam blaauw, als bij de blaauwzucht, geene bloedzuigers, of andere middelen bragten beterschap aan; het stierf nog denzelfden avond, nadat *Tetanus* en *Trismus* er zich bijgevoegd hadden. Het lijkje behield de donkerblaauwe kleur, even als een kind, dat aan blaauwziekte gestorven is. Na het openen der onderbuiksholte vond men alle organen zeer sterk met bloed opgevuld, de lever in eene onnatuurlijke grootte; in de borstholte, de longen en het hart van bloed overkropt; in het hart zelve niets onnatuurlijks. De bekkeneelsholte bevatte eene groote hoeveelheid geronnen bloeds; de hersenvliezen waren bedekt met stolbare *Lympha*; de boezems, de vaten van het weeffel der hersenen van bloed overstelpt; de holligheden bevatteden eene geringe hoeveelheid van eene waterige vloeistof.

7) Bij eene, op den vier en twintigsten dag na de geboorte, wel is waar, in het geslacht bevalene, doch buiten hetzelfde overledene kraamvrouw,

was



was het gansche ligchaam uitgeteerd; doodvlekken vertoonden zich op alle plaatsen; de onderbuik was bleek en slechts weinig opgezet, daarbij niet te min hard; bij het openen van den onderbuik vond men de buikbekleedselen zeer dun, de spieren van bloed ontbloot; uit de gemaakte opening vloeide eene aanmerkelijke hoeveelheid eener vreesfelijk stinkende etterachtige stof; het buikvlies was op vele plaatsen deels miskeurig, deels zoo ontbonden en verward, dat het onmogelijk was, het in deszelfs loop te volgen. De lever was met eene korst, van de dikte eens vingers, bedekt, en nadat deze afgenomen was, bleek de zelfstandigheid geheel en al opgelost te zijn; in den bovensten, stompen rand der linker leverkwab ontmoette men eene zweer, welke vrij diep in de zelfstandigheid indrong; de onderste vlakte was schier zwart en door etter met de maag en het groote net vastklevende; de galblaas geheel ledig; de milt ook in hare zelfstandigheid ontbonden; het *Pancreas* en alle andere klieren vond men deels verhard, of tot verettering overgegaan. — Het groote net (*Omentum majus*) was boven den navel bijkans etter geworden, onder den navel trouwens volkomen weggeteerd; de maag, gelijkewijze het darmkanaal, miskeurig, en op alle plaatsen vergroeid, de uitzweeting het allersterkste in het bekken; de baarmoeder, benevens hare eijerstokken en banden, schenen slechts weinig geleden te hebben; de baarmoeder in eene, naar den tijd gerekend, natuurlijke grootte samengetrokken; de nieren, pisleiders en blaas gezond; na het openen der maag ontmoette men spruw, even als in den mond

mond en zoo ook in het gansche darmkanaal; de wanden der maag zoowel als het gansche darmkanaal, waren tweemaal dikker, dan in den natuurlijke toestand. — In de holte zelve vond men niets, dat opmerking verdiende.

### Oorzaken

#### §. 337.

Het meeste, wat dit Hoofdstuk als inleiding voorafgegaan is, kan hier in zekeren zin toegepast worden; bijkans iedere schrijver, die de kraamvrouwkoorts behandeld heeft, denkt en oordeelt op eene bijzondere wijze over de naaste oorzaak derzelve, en het wordt dienvolgens dubbel noodzakelijk, hierin stelselmatig te handelen, en die Auteurs bij elkander te plaatsen, welke in de hoofdzaak met elkander overeenstemmen, zonder daarom bij datgene stil te staan, waar de een in sommige punten van den anderen afwijkt, zonder alle bijzondere *Theoriën* in de *critische* weegschaal te leggen. Wij houden ons overtuigd, dat men tevreden zal zijn, als wij voor een *praktisch* Handboek slechts een kort overzicht der aannemelijkste veronderstellingen (*Hypothesen*) leveren, daar de *critische* beschouwingen derzelve ons door zoo vele schrijvers tot verveling toe opgedischt zijn, en ons van alle dusverre opgeteekende gevoelens nauwelijks een eenig volkomen schijnt gegrond te zijn.

#### §. 338.

Voor de naaste oorzaak nu heeft men naar  
de



de volgorde af, de volgende grandoorzaken aangenomen: 1) onderdrukte, of teruggeblevene kraamzuiveringen: HIPPOCRATES, AVICENNA, LUDOV. MERCATUS, RÖSLIN, SENNERT, RIVER, SYLVIUS, WILLIS, SYDENHAM, STROTHER, JOHNSON, MAURICEAU, DE LA MOTTE, SMELLIE, ASTRUC, TISSOT, BOERHAVE, VAN SWIETEN, HEISTER, ALLIONI. Eenigen, gelijk bij voorbeeld WILLIS, TISSOT, VAN SWIETEN gronden echter het wezen der ziekte niet alleen in de *Lochiën*, en zullen daarom ter behoorlijke plaatse nogmaals vermeld worden. — 2) Ontsteking der baarmoeder: PLATER, FR. HOFMANN, BURTON, EDM. JOHNSTONE, THOM. DENMAN, KIRKLAND, GILCHRIST, SMELLIE, BREFFELD, TISSOT, ARMSTRONG. — 3) Enteritis et Omentitis: voornamelijk HUEME en LEAKE. — 4) Peritonitis: HUNTER, FRANK, WALTER, MARCUS, CURT SPRENGEL, OSWALD, WENZEL, SCHMIDT, CAPURON, HARLESS, BURNS, ARMSTRONG, JOHN DAVIES, HORN en vele lateren. — 5) Roosachtige ontsteking van alle buiksingewanden: LA ROCHE. — 6) Metastasis lactis: PUZOS, LEVRET, DELEUREI, DOULCET, DOUBLET, ARCHIES, SAUVAGES, VAN SWIETEN, SELLE, GRUNER, FUCHS, CAPURON en anderen. — Ophooping van galachtige, rotachtige, slijmige en andere stoffen, die nog in de eerste wegen verzameld, of reeds in het bloed overgegaan zijn: TH. COOPER, SENNERT, RIVER, WILLIS, WHITE, MILLAR, MANNING, BUTVER, AIKEN, DENMAN, STOLL, VOGEL, FRANK, LENTIN. — 8) Verflapping der buikspieren, be-

benevens zwakte van het net, der baarmoeder, der darmen, met ophooping van raauwe stoffen in de eerste wegen vereenigd: voornamelijk RICHTER. — 9) Heerschende en bijzondere gesteldheid der kraamvrouwen: WITTMER. — 10) Belemmerde vrije loop des bloeds in den onderbuik, verzwakte spijsvertering tijdens de zwangerschap en vermeerderde prikkeling tijdens de baring: RATSKY. — Nederzetting van bloed, zog, gal, etter, uitgezweete stof en darmozuiverheden in het net: OSIANDER. — 1) SACHTLEBEN erkent meerdere oorzaken, namelijk een, twee, drie en zeven. BURSER houdt de kraamvrouwkoorts insgelijks voor eene ziekte, welke uit vele oorzaken ontstaan kan; de *Febris puerperalis lochialis* en *gastrica* en de, uit deze zamen- gestelde, vormen echter schijnen hem toe de meeste aandacht te verdienen. — 13) SCHMIDTMULLER zegt: het eigenaardige der kraamvrouwkoorts bestaat daarin, dat, terwijl alle andere werktuigen van het ligchaam zich tegen eenen natuurlijken prikkel aankanten, blijkens de algemeene koortsachtige bewegingen, de zoo even genoemde werktuigen (de borsten, huid, *Uterus* en darmkanaal) bij de algemeene pogingen van het bewerktuigde gestel in gebreke blijven. — 14) HUFELAND: ophooping van voedende *Lympha* in den onderbuik, verbonden met *Atonie*, prikkeling en sterke geneigdheid tot rotachtige ontbinding; alzoo een' *asthenischen* toestand. HORN stemde in het wezenlijke hiermede overeen. Nog kortelings echter schijnen deze Artsen van dit ge-



gevoelen teruggekomen te zijn, en het wezen dezer ziekte voornamelijk op *Peritonitis* te gronden. — Eindelijk CARUS stelt het wezen dezer koorts: in eene, met hevige koorts verbondene, stoornis der in het kraambed natuurlijke plaatsgrijpende verandering in het binnenste des *Organismus*, die zich doet kennen door eene op onnatuurlijke plaatsen te voorschijn tredende, ziekelijk verhoogde, met ontsteking en groote geneigdheid tot afzondering zich kenmerkende, werkzaamheid des vaatgestels, en hij verklaart zich de, dikwijls daarmede gepaard gaande, buikvliesontsteking voornamelijk uit het vervolg van de inwendige vlakke des *Uterus* en der trompetten van FALLOPIUS met het buikvlies.

### §. 338.

Alvorens wij nu ons eigen gevoelen omtrent het wezen der kraamvrouwkoorts uiten, moeten wij nog op twee verhandelingen de aandacht bepalen, die, in een der laatste stukken van ons *Journal*, in eene vrije vertaling door Doctor STEINTHAL geplaatst zijn. De eene bevat zeer leerrijke nasporingen omtrent de ziektekundige Ontleedkunde des buikvlies, door SCOUTETTEN; de andere, beschouwingen der kraamvrouwkoorts door JOHN DAVIES. De eerste maakt ons in zijne verhandeling op het nauwkeurigste met de verschijnselen en gevolgen der bij het leven plaatshebbende, haastige en langdurige buikvliesontsteking bekend; hij toont ons, hoe het buikvlies geheel of gedeeltelijk kan ontstoken zijn, zonder dat de naburige ingewanden mede aangedaan worden, en wij leeren daaruit, voor onze ziekte

ten

ten minste zoo veel kennen, dat vele van de vermelde uitkomsten der schouwingen (*Sectionen*) zich als gevolgen der *Peritonitis* laten verklaren. Nog belangrijker en van meerdere waarde echter zijn ons de voortreffelijke opmerkingen van JOHN DAVIES; wij durven hier evenwel slechts het hoofdzakelijke daarvan overnemen. Ontsteking, zegt de Heer DAVIES, is niet de onmiddellijke uitwerking van een' uit- of inwendigen ziekte-voortbrengenden prikkel, maar eerst een middellijk gevolg der, door denzelfden te weeg gebragte, stoornis in het gezonde weeffel des aangedanen deels. Wordt alzoo eenigerhande deel door een' schadelijken invloed aangedaan, dan ontstaat er eerst eene stoornis in deszelfs oorspronkelijke gesteldheid, daardoor wanorde in deszelfs verrigtingen, vermeerderde aandrang van bloed, en daaruit openbaren zich de verschijnselen der ontsteking. — Hieruit moet men nu niet opmaken, dat er op een' schadelijken indruk altijd ontsteking volgt; integendeel, waar zij zich ontwikkelt, daar geschiedt het op deze wijze. — De haastige ontsteking, zegt hij op eene andere plaats, kan dienvolgens van eene werktuigelijke oorzaak afhangen, die de natuurlijke gesteldheid der hoofdbestanddeelen van een *Orgaan* verbreekt, of zij kan door eene zelfstandigheid ontstaan, die met het eene of andere van deszelfs bestanddeelen zich scheikundig vereenigt, of eindelijk op eene *dynamische* wijze, zoodra het veranderde weeffel de levenswerking van een deel stoort. In enkele gevallen nu, wel is waar, kan de kraamvrouwkoorts door eene werktuigelijke belediging van het buikylies, gedurende het baren,

IV. D. 3°. en 4°. st.                      M m                      ont-



ontstaan, doch die vorm derzelve, die dikwijls *epidemisch* voorkomt, schijnt zijn' oorsprong uit geen werktuigelijke oorzaak te ontleenen; immers de koorts openbaart zich even dikwijls na ligte, als na moeilijke verlosfingen.

### §. 340.

Neemt men nu alles, wat wij dusverre over de *Aetiologie* dezer ziekte geschiedkundig hebben opgeteekend, naauwkeurig op, dan blijkt het, dat men bijkans algemeen overeenstemt, om de naaste oorzaak der ziekte en hare voornaamste zitplaats in den onderbuik, en wel in eene ontstekingsachtige aandoening van eenigerhande buiksingewand te zoeken; en vergelijkt men nu nog de uitkomsten der lijkenopeningen daarmede, dan is voorzeker het bestendigste, wat wij aantreffen, een ontstekingsachtige toestand van het buikvlies, wel is waar, niet altijd, evenwel toch zeer vaak van den *Uterus*, ten minste van het hem omgevende buikvlies, van de trompetten, eijerstokken en banden. Bewijst dit nu echter reeds, dat de naaste oorzaak der kraamvrouwkoorts, het wezen derzelve, of met andere woorden: de ziekte zelve, *Peritonitis*, *Metritis* enz. zij? — Voorzeker neen! — Ook hier heeft men oorzaak en gewrocht met elkander verwisfeld. Gene ontsteking (de haastige) is allezins de veelvuldigste en de meest in het oog vallende gezellin en het gevolg der kraamvrouwkoorts, doch zij zelve is immers al weder het uitwerksel eener haar verwekkende grondoorzaak, en wij gelooven daarom, dat, indien het ons gelukt zal zijn, deze naaste oorzaak op te sporen, dan

dan niet alleen het wezen dezer ziekte, maar ook dat van vele dergelijke, als van het *Hydrecephalus acutus*, blijken zal. Van alle dusverre opgemaakte *Theoriën* schijnt ons die van CARUS de schoonste te zijn. Zeker nogtans kan men ook hier weder vragen: waarin bestaat nu dan gene stoornis? Wat is de naaste oorzaak derzelve? Waarom ontwikkelt zich de kraamvrouwkoorts op den eenen tijd dikwijls niet, waar duidelijk zulke invloeden en zulke aanleidende oorzaken voorhanden zijn, die men gemeenlijk onder de verwijderde oorzaken dezer koorts telt; en omgekeerd: waarom ontstaat zij somwijlen, zonder dat er genoegzame gelegenheidgevende indrukken zijn op te sporen? Blijkbaar ligt hier iets ten grondslag, wat wij nog niet kennen, en dat, als het daar is, onder alle omstandigheden en zonder onderscheid de ziekte doet geboren worden. Wij betuigen, dat ons dit iets, dit *sine qua non* der kraamvrouwkoorts nog onbekend is, en zijn over het algemeen van gevoelen, dat het ons, in dezen zin, met alle *dynamische* ziekten juist niet veel beter gaat. In de genezing zou dit ook gelukkig niet veel afdoen, indien wij slechts, door ondervinding geleerd, het regte begrip van het verloop eener ziekte niet uit het oog wilden verliezen, — indien wij slechts alle *Theoriën* en stelsels van het ziekbed verwijderden. Wij zullen te dezen aanzien ons gevoelen nog nader mededeelen.

#### §. 341.

Wij keeren ons nu tot de verwijderde oorzaken dezer ziekte, te weten tot diegene, welke



de wording dezer ziekte begunstigen. Hier nu valt eerst aan te merken, dat er gemeenlijk eene zekere voorbeschiktheid vooraf moet gaan, wil ze in vereeniging met schadelijke invloeden de ziekte veroorzaken, zonder dat wij met juistheid weten te bepalen, waarin deze bestaat. Alleen dan, als de koorts een' besmettelijken aard verkrijgt, tast zij de allergezondste vrouwen aan, hetgeen door genoemde *Epidemie* op nieuws bevestigd is. Eenigen stellen de voorbeschiktheid in drukking op den onderbuik, voornamelijk door inpranging, ter verberging der zwangerschap, waardoor alsdan het net, tusfchen den opklimmenden *Uterus* en het uitwendig drukkend vermogen, het meeste lijdt; gebrekkige ontlasting in de zwangerschap, vooral ophouding van winden, het gebruik van vele purgeer- en afdrijvende middelen, misbruik der aderlating in de zwangerschap. De smetstof tast ook bij voorkeur het net en het buikvlies aan, aangezien het eerste buitendien in de zwangerschap gedurig uitgezet, en het laatste te gelijk aanmerkelijk uitgerekt wordt; hetgeen na de bevalling zeer vermindert. Eenigen willen waargenomen hebben, dat kwaadsappige vrouwen met eene flappe vezel, en zulke, die armoede en allerlei gebrek geleden hebben, bovenal door de kraamvrouwkoorts aangetast werden. De ervaring spreekt dit echter tegen, en wij vernemen, dat bij de bovengenoemde *Epidemie* in *Weenen*, alle goed gevoed waren en de meeste een sterk gestel hadden, slechts drie (onder zes en vijftig) waren mager. Dat de weersgesteldheid hierin dikwijls eene gewigtige rol speelt, is niet te ontkennen, eene plot-

plotselinge weersverandering pleeg het gevaarlijkste te zijn: wanneer het, bij voorbeeld, na eene aanhoudende, drooge hitte, plotseling vochtig en koud wordt. De vermelde *Epidemie* openbaarde zich voornamelijk na den overgang van eene, maanden lang aangehouden hebbende vochtigheid in de hevige, drooge koude (\*). Volgens sommigen zou de koude veel tot de ontwikkeling en verspreiding der ziekte bijdragen, en deze over het algemeen in koude landen menigvuldiger zijn, dan in warme, in den winter vaker voorkomen, dan in den zomer. Het laatste nogtans schijnt de ervaring dusverre niet te bevestigen, aangezien men even zoo dikwijls, vooral in kraamgestichten, in den zomer als in den winter *Epidemiën* waargenomen heeft. Wij voor ons gelooven echter, dat eene langdurige, drooge hitte in den zomer de kraamvrouwkoorts niet doet ontstaan, overmits hier meer aandoeningen der hersenen en zoogenoemde *metastatische* ontstekingen met uitzweeting aangetroffen worden. Een bestendig natte, nu met warmte, dan met koude afwisselende zomer trouwens, schijnt, zoo als het ons voorkomt, de ontwikkeling der kraamvrouwkoorts te begunstigen. Voor het overige kan als aanleidende oorzaken der kraamvrouwkoorts al datgene gerekend worden, dat tevens tot andere koortsachtige ziekten der kraamvrouwen gelegenheid geeft, bij voorbeeld verkouding, moeilijke verlosingen, ruwe handgrepen en instrumentale kunstbewerkingen, kwetsing

der

(\*) Dit heeft de *Epidemie* in het gesticht alhier ook bevestigd.



der teeldeelen, ongeregelde kraamzuiveringen, onttrekking aan de verrigting van het zogen, misflagen in den eetregel, zielsaandoeningen enz. Wordt eene aanvankelijk *sporadische*, of bloot *epidemische*, door den invloed des weders te weeg gebragte, kraamvrouwkoorts in kraamgestichten en hospitalen besmettelijk, dan geven gewoonlijk de volgende, na-deelige invloeden aanleiding tot de ontwikkeling dezer smetstof: een bedorven, ongezond geworden dampkring in de kraamkamers en gangen, door het te veel bij elkander liggen van zwangeren en kraamvrouwen; door veelvuldig zweeten, door de uitademing bij ophooping van onzuivere stoffen in de maag; door winden, stinkende *Lochiën* en onzuivere kleederen en bedden, voornamelijk bij gebrek aan noodige verschooning; door bedorven, rottend koe- of paardenhaar in matrassen; waarom bij de aankoop, of de verwisseling van nieuwe bedden te dezen aanzien zeer te letten is; bedorvene lucht in hospitalen, waar zwangeren zich bevinden, vooral door ongestelden, welke met stinkende en sterk etterende zweren behebt zijn; reden, waarom ook de vereeniging van een kraamgesticht met een hospitaal niet doelmatig is; onachtzaamheid omtrent de ondersleekfels, niet spoedig uit de kraamvertrekken gebragt wordende. Slechte inrigting der gemakken en rioolen, uit welke de stank naar de kamers trekt. Dat deze gelegenheidgevende oorzaken werkelijk de besmettelijke kraamvrouwkoorts verwekken kunnen, staat de ervaring; dat men dezelve alleen in kraamgestichten en hospitalen waargenomen heeft, inzonderheid waar vele kraamvrouwen bij elkander liggen, en

en de dampkring wegens morfigheid bedorven was, gelijk in het *Hôtel de Dieu* te *Parijs*, in het kraamgesticht te *Weenen* enz., dat men haar vooral in den zachten winter, gelijk bij voorbeeld de verstrekenen van 1824--1825 hier in *Berlijn* was, en bij een' zeer natten en heeten zomer heeft zien heerschen, dat men haar menigmaal slechts in enkele kamers en zalen waarnam, en zij ophield, zoodra men de kraamvrouwen in eene frische, met kalk bestrekenen, doorgeluchte en doorrookte kamer bragt, en dat men ook juist kraamvrouwen door haar zag aangetast, die volkomen gezond in het kraamgesticht, of in het hospitaal, en wel kort te voren opgenomen waren. Ingevolge deze daadzaken, moet men een langzamerhand zich ontwikkelend *Contagium* aannemen, en wij zijn bij de jongste *Epidemie* in het kraamgesticht alhier nog sterker daarvan overtuigd geworden, naardien de kraamvrouwkoorts, zoo lang het getal der kraamvrouwen met de ruimte overeenkwam, zich slechts hier en daar (*sporadisch*) vertoonde, en zelfs als *epidemische*, door de weersgesteldheid veroorzaakt, een goedaardig karakter had en gelukkig afliep. Zoodra evenwel de ruimte, door de onverwachte zamenkomst van vele zwangeren en kraamvrouwen, betrekkelijk te klein werd, ontwikkelde zich eerst eene smetstof; de kraamvrouwkoorts werd besmettelijk, deelde deze stof reeds aan zwangeren mede, en nam toen een boosaardig karakter aan, dat zich in het bijzonder kenschetste door het hoogst snelle verloop der koorts, door de buitengewone pijn in den onderbuik en vooral omtrent de navelstreek, door den verschrikkelijken angst en de



ontstekingachtige toevallen der borstingewanden, door den korten duur van het eigenlijk ontstekingachtige tijdperk, door de schielijke vermindering der levenskrachten, en door den snellen en bij zes kraamvrouwen in het kraamgesticht doodelyken afloop; door de uitzweeting eener wijachtige en etterachtig stinkende vloeistof, en ontsteking van alle organen des onderbuiks en der borstholte; aanmerkelijke verwoesting van het net, der lever en der milt.

*Voorzegging.*

§. 342.

Volgens het eenstemmig getuigenis van alle vroegere en latere Geneeskundigen is de kraamvrouwkoorts eene hoogst gevaarlijke, in de meeste gevallen doodelyk eindigende ziekte. Om deze reden gebruike de Arts hier alle mogelijke omzigtigheid; hij zij liever te vreesachtig in zijne voorspellingen, dan dat hij te veel belove; want zeer dikwijls, als alles naar beterschap staat, neemt de ziekte een' kwaden keer en de zieke is reddeloos verloren. Hoe vroeger na de verlossing de ziekte zich ontwikkelt, — hoe later zij herkend, — hoe langer zij verzuimd wordt, des te gevaarlijker. Zamengesteldheden dezer ziekte met reeds aanwezige stoornissen in de buik- en borstingewanden maken deze ziekte tot eene der gevaarlijkste en ongeneeslijkste. Het is een goed teeken, als de buikpijn, en het hoofd te gelijker tijd aangedaan zijnde, ook deze aandoeningen spoedig verminderen, de tong vochtig en de adem-

ademhaling ligter wordt; als de krachten toenemen, de pols langzamer en voller wordt, de angst der lijderes verdwijnt, en zij zich, zonder pijn in den onderbuik, oprigten en op beide zijden leggen kan. Zeer gegrond zegt VOGEL, de onderbuik is hoofdzakelijk het punt, van waar leven en dood uitgaan; hoe meer deze lijdt, des te grooter is het gevaar; hetzelfde beweert ook STARK. Een zeer goed teeken is het, als de zieke bewustzijn van zich zelve en een helder uitzigt krijgt; als eene verschijnende *Diarrhoe* verligting aanbrengt. Dit is echter alleen het geval, als de pols daarop langzaam wordt. Over het algemeen is de pols en de gansche gesteldheid der lijderes ten aanzien der voorzegging van zeer veel aanbelang; hoe radder de pols, hoe sneller de ademhaling is, des te meer gevaar fluit de ziekte in zich. Alle andere teekenen kunnen zich verbeteren, en wij durven op dezelve geen' staat maken, zoo lang de polslag niet zeldzamer en het uitzigt der lijdenden niet vrolijker wordt. Slechte teekenen zijn: plotseling toenemende uitzetting van den onderbuik; plotselinge verdwijning des zogs; eene plotselinge onderdrukking der *Lochiën*; slapeloosheid; rusteloosheid der kranken, verandering van het algemeene gevoel. FRITZE, VOGEL en anderen houden het voor een zeer kwaad, de eerste zelfs voor een volstrekt doodelijk teeken, als het der lijderes niet licht genoeg in het vertrek is. Hebben er zich nu reeds inwendig uitzweelingen ontwikkeld; vertoonen zich nu die verschijnselen, waardoor de koorts der rotzenuwachtige nabijkomt, namelijk een zeer radde pols, zeer versnelde ademhaling, brandende hette,



opgezette buik met koude ledematen, trommelzuchtige opzetting des onderbuiks, onwillekeurige ontlasting der drekstoffen en *Urin*, ijelhoofdigheid, flauwten, *Facies hippocratica*, dan is de dood schier zeker.

### Geneeswijze.

#### §. 343.

Men zal veelligt geene ziekte aantreffen, over wier doelmatige behandeling de Geneeskundigen nog zoo verschillend denken, ja dikwerf zoo regtstreeks onderling strijdig waren en nog zijn, dan juist bij de kraamvrouwkoorts; — en wij zouden inderdaad de geschiedenis dezer ziekte weder moeten doorloopen, wilden wij aantoonen, hoe men van HIPPOCRATES tijden aan, tot op den huidige dag, deze behandelde. Dit evenwel zou voor een *praktisch* Handboek weinig nut stichten, en wij verwijzen te dezen aanzien gaarne naar vele andere schrijvers, die zich hiermede opzettelijk hebben bezig gehouden. Hier zij het genoeg, alleenlijk aan te merken, dat men vooral het daaromtrent niet eens kan worden, of men aderlaten zal, of men over het algemeen de ontstekingswerende, of *antigastrische* geneeswijze volgen zal of niet. Elke bijzondere behandeling heeft hare voorstanders, ieder beroept zich op zijne ondervinding. Ons bedunkens, zal in het algemeen die behandeling de beste zijn, die zich naar den bijzonderen aard en gang der ziekte rigt, die, verre van alle eenzijdigheid, elk geval, zoo veel mogelijk, afgetrokken beschouwt; zich nog-

tans

tans aan die middelen houdende, welke door de ondervinding als de beste gekeurd zijn.

§. 344.

Indien eene kraamvrouw over pijn in het voorhoofd, in den onderbuik en voornamelijk in de streek des navels klaagt, zij de Arts hoogst oplettend en denke, inzonderheid in een kraamgesticht, of een hospitaal, aan kraamvrouwkoorts, en trachte zoo spoedig mogelijk de ontwikkeling eener *epidemische* en besmettelijke kraamvrouwkoorts te voorkomen. Bevinden zich dienvolgens meerdere kraamvrouwen in een vertrek, dan late men haar zoodra mogelijk van elkander scheiden, en ieder in een afzonderlijk vertrek en bed brengen; deze maatregel is van zulk een gewigt, dat ik in het kraamgesticht te *Würzburg*, zoowel als in het hier aanwezige, aan denzelfen de verhoeding eener *epidemische* en besmettelijke kraamvrouwkoorts dusverre inzonderheid te danken had. Het vertrek, waarin de eerste kraamvrouw aan kraamvrouwkoorts ziek gelegen heeft, moet van stonden aan ontruimd worden, niet slechts tot hetzelfde doorgelucht en beroekt is, maar het mag ook niet vroeger door kraamvrouwen betrokken worden, dan vóór de dekens gewaschen en de wanden gewit zijn, het beweegbaar huisraad met loog gezuiverd en des noods met olieverbstreken is; het paardenhaar gekookt, de matrassen gewaschen en nieuwe, met versch stroo gevulde, stroozakken aangeschaft zijn. Wordt de ziekte *epidemisch*, dan moet men bovendien die algemeene in-



invloeden, welke haar dit karakter deden verkrijgen, trachten te verwijderen, wanneer men daartoe in staat is, hetwelk de Arts bij de *Constitutio annua* niet altoos in zijne magt heeft, gelijk het de *Epidemie* alhier bewezen heeft. Wordt zij eindelijk besmettelijk, dan laten ons zeker de meest vermogende middelen in den steek; de ziekte schijnt nu haar hoogste toppunt bereikt te hebben, en onze zorg moet dan hoofdzakelijk daarheen gerigt zijn, om de verdere verspreiding der smetstof te verhoe-den, waartoe, ingevolge de laatste ervaring, de beroeringen van GUITON MORVEAU van bewezen nut zijn, gelijkerwijze wij dezelve ook bij de *Epidemie* in het gesticht alhier met de beste gevolgen in het werk gesteld hebben.

#### §. 345.

Ten aanzien der bijzondere behandeling schijnt ons diegene de gelukkigste te zijn, die, naar het beloop der ziekte zich rigtende, steeds voor oogen houdt, dat dezelve, wel is waar, aanvankelijk van een' ontstekingsachtigen aard is, dat echter het ontstekingsachtige tijdperk schielijk voorbijgaat en er in de meeste gevallen neiging tot uitzweeting bestaat, als wanneer de gansche ziekte een meer *asthenisch*, zenuwachtig, of rotachtig karakter aanneemt. WALLER drukt zich mischien het kortste en zakelijkste uit, als hij zegt: de kraamvrouwkoorts vertoont zich met, *an excessive action with diminished power* (\*) verhoogde krachtingen met verminderd werkvermo-

(\*) Cf. *London med. Journ.* Febr. 1825.

mogen. De ziekte heeft dien ten gevolge veel overeenkomst met een' door plaatselijke ontsteking vergezelden *Typhus*, gelijk ARMSTRONG bereids zeer juist heeft aangemerkt. Wij verdeelen nu onze behandeling in voorbehoedende en genezende. Ten aanzien der eerste, moet men reeds bij elke zwangere daarop denken, dat zij voor kraamvrouwkoorts blootstaat, zoo veel te meer, als de *Constitutio annua* daartoe voorbeschikt, of als de kraamvrouwkoorts *epidemisch*, ja zelfs bloot *sporadisch* in onzen omtrek, of nabijheid zich bevindt. Dit nu geschiedt het beste, door zorg te dragen, dat de kraamvrouw voor alle schadelijke invloeden gevrijwaard worde, die stoornis in het kraambed kunnen te weeg brengen. Men vermijde namelijk verkouding; mislagen in den eetregel, gemoedsaandoeningen; en zorge voor behoorlijke buikontlasting, voor regeling der kraamverrigtingen, voor toereikende ruimte en doorstrooming van lucht in de kraamkamer en dergelijken meer. Ontwikkelt zich desniettemin koorts, dan zij men zeer oplettend, beschouwe alle verschijnselen op het naauwkeurigste, en behandel haar omzigtig, al had zij ook het voorkomen eener *Febris lactea*, het beste met zachte *Diaphoretica*, des noods ook met zachte ontlastmiddelen. Men geve der lijderes tot drank dunne, slijmachtige dranken, amandelmelk; schijnt het pisscheidingstelsel geprikkeld te zijn, dan gebruike men in- en uitwendig *Anodyna*, en vestige bijzonder de aandacht op de kraamzuivering. Aanvanke-lijk kunnen hier laauwe, halve baden, dampbaden aan de teeldeelen, zelfs inspuitingen van een *Decoct.*

Al.



*Althaeae*, een *Infusum Sambuci*, met bijvoeging van *Conium* of *Hyoscyamus* zeer zich heilzaam be-  
toonen. — Zijn er aanmerkelijke misslagen in den  
leefregel voorgevallen, en openbaren zich ten ge-  
volge hiervan *gastrische* verschijnselen; is de zaak  
zeer duidelijk (dikwijls kunnen dergelijke verschijn-  
selen als *Symptomata* van een' geprikkelden *Uterus*  
toevallig zich ontwikkelen), dan komt een zacht  
braakmiddel, het beste uit *Ipecacuanha*, te stude.  
Zijn de *Lochiën* onderdrukt, is het voorwerp zeer  
sterk en saprijk, door de voorafgegane verlossing  
niet zeer verzwakt, dan kan eene aderlating, het  
beste op den voet, van heilzamen invloed zijn.

#### §. 346.

Heeft de kraamvrouwkoorts zich nu duidelijk  
geopenbaard, hetgeen namelijk door eene bijkomende,  
plaatselijke pijn op deze, of gene plaats des onder-  
buiks, inzonderheid echter omstreeks de navelstreek  
geschiedt, en komt de Arts er spoedig genoeg bij,  
dan komen aanvankelijk inwendig *Anodyna*, te pas,  
amandel- of papaverzaaddranken steeds met bijvoeging  
van *Aq. Amygd. amararum*, of als de pijn meer  
van een' krampachtigen aard is, valeriaan met eene  
geringe hoeveelheid *Extractum Opii*, *Hyoscyami*.  
Uitwendig stelle men in het werk laauwe stovingen  
van *Herba Conii*, *Hyoscyami*, omslagen van *Species*  
*aromatic. emollientes*, of inwrijvingen van *Linimen-*  
*tum volatile, saponato — camphoratum*, *Ol. Hyos-*  
*cyami*, kamfer, *Opium* of dergelijke. Stovingen van  
azijn over den geheelen onderbuik verschaffen ins-  
gelijks, vooral bij eene aanmerkelijke, trommelzuch-

tige uitzetting des onderbuiks met verhoogde gevoeligheid, heerlijke diensten; behalve dit, zijn zuurdeeg en Spaansche vliegen aanprijzenswaardig. Men wachte zich trouwens, om zich te lang daarbij te bepalen! — Vertoont zich na verloop van een paar uren niet duidelijk eenige gunstige verandering; openbaart zich de minste schijn van plaatselijke ontstekings, van een bijkomend, algemeen lijden des *Organismus*; is de pols hard, klein, snel en de pijn in den beginne terstond hevig in de navelstreek, dan opene men dadelijk eene ader. Eene sterke aderlating is bij de eerste ontwikkeling der ziekte ongetwijfeld hier van het uitstekendste nut, en wij voor ons zijn van gevoelen, dat het beter zij, hier iets te veel te doen, dan iets te verzuimen. De ontsteking heeft een buitengewoon snel verloop; de tijd is hier te kostbaar, om te dralen; is het regte tijdstip voorbijgegaan, hetwelk dikwijls reeds met een' halven dag, ja zelfs met eenige uren het geval is, dan schiet er over het algemeen niets meer ter redding der lijdende over. Intusschen is het zeker hoogst moeilijk, hier immer het juiste tijdstip te treffen; voorzeker kan men ook hier door eene te late, ontijdige en te overvloedige bloedontlasting zeer ten nadeele werken. Bij herhaling te aderlaten, is zeldzaam zaak, of het moest zijn, dat wezenlijk het ontstekingsachtige tijdperk nog aanhoude, en de koorts het ware ontstekingsachtige (*Synocha*) bezitte; heeft men voor algemeene bloedontlasting geene aanwijzing meer, dan doen bloedzuigers, op den onderbuik gezet, insgelijks goede uitwerkselen; daarenboven leeraarde de ondervinding me-



menigwerf, dat, als men de bloedvermindering over-  
 dreven, en de ziekte als zuiver ontstekingsachtig be-  
 oordeeld en behandeld had, de meeste zieken over-  
 leden. De overige geneeskundige behandeling moet  
 doorgaans meest naar de toevallen (*symptomatisch*)  
 ingerigt zijn: goede, algemeene, geneeskundige  
 grondbeginfelen zullen ons de beste middelen aan  
 de hand doen, en wij onthouden ons hier voorbe-  
 dachtelijk van ieder afzonderlijk voorschrift, aange-  
 zien zij voor den ouden *Practicus* nutteloos, voor  
 den jongen Geneeskundige zelfs schadelijk zullen  
 zijn. Dit alleen zij in het algemeen gezegd, dat  
 de ziekte, zoo lang zij in het ontstekingsachtige tijd-  
 perk verkeert, nevens de aderlating eene ontstekings-  
 werende behandeling behoeft; het salpeter in een  
 afkookfel der *Althaeae*, in eene *Emulsio* of *Mix-  
 tura oleosa* verdient hier vooral aanprijzing, en —  
 bijaldien de koorts, inzonderheid bij eene algemeene  
*rheumatische* en *catharrale* gesteldheid, het nood-  
 zakelijk maakt, den aandrang van bloed van de on-  
 derbuksingewanden en edele werktuigen naar de  
 huid te leiden, en op deze wijze gene inwendige,  
 edele deelen te vrijwaren, — in verbinding met de  
 kamfer, na behoorlijk in het werk gestelde bloed-  
 ontlasting, terwijl men altoos het meeste op den  
 toestand der kraamzuivering letten, en vooral den  
 kraamvloed, zoodra hij te gering of te geheel on-  
 derdrukt is, door inspuitingen van een kamillenaf-  
 trekfel, der *Cicuta* en dergelijken, en als hij zeer  
 stinkende is, of eene rotachtige hoedanigheid heeft,  
 door inspuitingen van garstewater met een kinaaf-  
 kookfel bevorderen moet. Van even zoo veel belang  
 is

is het, de zogaffcheiding door het aan de borst leggen des kinds aan te zetten; doch dit is bij de besmettelijke kraamvrouwkoorts, ingevolge onze, bij de vermelde *Epidemie* van kraamvrouwkoorts, verkregene ondervinding, dikwerf gevaarlijk; wij verloren eenige kinderen, wier dood wij echter geenszins aan de in het werk gestelde berookingen van GUITON MORVEAU, integendeel wel aan de smetstof zelve, den dampkring, die de moeder omgaf en aan de daaruit voortgevloeide ontaarding des zogs konden toeschrijven. Want juist die moeders in de kraamvertrekken, welke door de aanwending der zoutzure berookingen van de kraamvrouwkoorts niet aangetast werden, hadden haren kinderen de borst gegeven; van de aangevoerde berookingen maakte men vlijtig gebruik, en de kinderen stierven niet. Uit dien hoofde zal het raadzamer zijn, bij de besmettelijke kraamvrouwkoorts, de borsten door andere, wel te verstaan, onbezwangerde vrouwen, of door jonge honden te laten uithalen, of verzachtende baden, zuurdeeg en drooge koppen in het werk te stellen.

#### §. 347.

Het zoete kwik of *Calomel* wordt, als een der voornaamste en werkzaamste middelen, geprezen. Blijkens de laatste waarnemingen van JOHN DAVIES, heeft het zich in alle gevallen heilzaam betoond. Hij laat voor de toediening van hetzelfde eene ruime aderlating doen; doch hij heeft het ook in eenige gevallen zonder dezelve aangewend, en meent bemerkt te hebben, dat het kwik spoediger op de speekselklieren werkt, als eene bloedontlasting voor-

IV. D. 3<sup>e</sup>. en 4<sup>e</sup>. st.                      Nn                      af-



afgegaan is. Hij geeft namelijk het kwik in ver-  
eeniging met *Opium*, zoodat het niet op den stoel-  
gang werkt, alle drie tot vier uren, tot zich teeke-  
nen van kwijling (*Prodroma Salivationis*) opdoen (\*).

Om

(\*) Men zie de *Bemerkungen über das Kindbetterin-  
nenfieber*, medegedeeld door Dr. STEINTHAL von JOHN  
DAVIES, in ons *Journal f. Geburtshülfe, Frauenzimmer  
und Kinderkrankheiten*, Bd. V. St. 2. p. 398. Zoo even  
ontvang ik een nieuw geschrift van Dr. J. F. SCHWEIGHAU-  
SEN in *Strasburg: Das Gebären nach der Beobachteter  
Natur und die Geburtshülfe nach dem Ergebniss der  
Erfahrung. Strasburg und Leipzig 1825. 8°.*; in dit ge-  
schrift vindt men op het einde bladz. 251, onder den  
titel: Middel tegen de kraamvrouwkoorts,  
het volgende, dat onze aandacht tot zich trok: die  
soort van kraamvrouwkoorts, welke men thans *Peritonitis*  
noemt, en wier bijzondere kenteecken, hevige pijn,  
vooral in den onderbuik, met zwelling en zeer radde  
pols zijn, heeft gemeenlijk een doodelijk uiteinde. Een  
vriend heeft mij een recept tegen deze ziekte medege-  
deeld, hetwelk van een' Franschen Arts afkomstig is,  
wiens naam echter zoo onduidelijk geschreven was, dat  
wij denzelven niet konden ontcijferen. — Ik had dit  
recept vele jaren ter zijde gelegd, eensdeels omdat mij  
deze ziekte nog niet voorgekomen was, anderdeels om-  
dat ik over het algemeen niet van enkele recepten tegen  
ziekten houte, maar eene geneeskundige behandeling  
noodig achte; bovendien kwam mij het middel ook te  
sterk voor. Trouwens, er deden zich twee twijfelach-  
tige gevallen van de vermelde soort van ziekte op, waar  
de pols reeds over de honderd vier en twintig slagen in  
eene minuut telde, en waar ik de lijderessen voor verloren  
verklaard had. — Bij het eerste geval dacht ik, nu zal  
ik dat middel eens beproeven, daar er toch geene hoop  
meer

Om de buikontlasting geregeld aan den gang te houden, wendt men daarenboven klisteren aan. Zoodra ziet men geene werking van het kwik, of de ziekte vermindert aanmerkelijk. Men dient nu minder van hetzelfde toe, of laat het geheel en al weg, en tracht slechts het ligchaam gedurende een paar dagen onder de nawerking van het kwik te houden. Heeft eindelijk de plaatselijke pijn volkomen nage laten, en is de mond eenigzins aangedaan, dan geeft men vervolgens een zacht versterkend middel, bij voorbeeld *Inf. Columbo*, met eene geringe hoeveelheid salpeter er bij. De heer D. zelf betuigt, dat herhaalde waarnemingen nog over het doelmatige dezer handelwijze moeten beslissen, doch spoort de Artsen tot onderzoek aan. Wij hebben de *Calomel* op eene dergelijke wijze bij kraamkoorts-*Epidemie* toegediend, en in die gevallen, waar zij nog *sporadisch* en *epidemisch* was, heeft het insgelijks in groote giften, afwisselend met *Emulsiën*, bij welke *Aq. Laurocerasi*, of *Extract. Hyoscyami* of *Opium* gemengd werd, de heerlijkste uitwerkingen te weeg ge-

meer is, en het hielp, als door een' tooverslag, binnen de twaalf uren, in beide gevallen. — Het voorschrift is: *Calomel*, *Extr. Hyoscyami*, *Opii thebaic* aa gr. xij m. f. *mass pil. ad pil. N<sup>o</sup>. xii. S.* alle vier uren vier pillen op eens in te nemen. — Ik heb echter de *dosis* in zoo verre gewijzigd, dat ik, in plaats van twaalf grein heulsap, slechts acht gaf, en in plaats van alle vier uren vier, slechts alle drie uren drie pillen gebruiken liet; terwijl ik de zieken dien dag meermalen kwam zien. — Breder hierover uit te wijden, acht ik voor Artsen overbodig.



gebragt, en bij eene lijderes, reeds door trommelzucht (*Meteorismus*) in den hoogsten graad aangedaan, met allerhevigste pijn en een' pols van honderd dertig slagen, heeft het in groote, dikwijls herhaalde, giften, te gelijk in vereeniging met stovingen van azijn en eene blaarpleister over den geheelen buik wonderen gedaan; de lijderes werd gered. Maar wierd de koorts van een' besmettelijken aard, dan liet het ons in de steek, even als alle andere middelen, offchoon het juiste tijdstip voor de bloedontlasting, welke deszelfs gebruik voorafging, wel te onderscheiden was. Uit hoofde de besmettelijke koorts bij velen terstond in den beginne met *Diarrhoe* gepaard ging, moest het omzigtiger in kleine giften, en met *Opium* in groote hoeveelheden en *Emulsiën*, of ook in het geheel niet toegediend worden; dan eens verergerde het de *Diarrhoe*, of was de gift van het *Opium* te sterk, dan hield, wel is waar, de sterke ontlasting op, doch de trommelzucht, de angst, beklemdheid, ontstekingsachtige toevallen der longen, de pols vermeerderden; huid en tong werden droog. Om deze reden moeten wij aanmerken, dat DAVIES zoowel als SWEIGHAUSER van de buitengewone sterke werking des kwiks, verbonden met *Opium* en *Extractum Hyoscyami* spreken, doch nergens doelt het op de besmettelijke kraamvrouwkoorts, namelijk op diegene, welke men toch zelden anders, dan in kraamgestichten en hospitalen aangetroffen heeft. DAVIES gebruikte het enkel in de bijzondere praktijk, gelijk hij zelf erkent, en het schijnt nog grootelijks bevestiging te behoeven, of diegene, welke hij behandel-

delde, door eene besmettelijke kraamvrouwkoorts aangetast waren; naardien hij, DAVIES, de opening van twee daaraan gestorvene, bijgewoond heeft. Tijdens de in Februarij, Maart en April heerschende, besmettelijke kraamvrouwkoorts deed ik toch vele verlosfingen in de stad; niet eene bevallene werd door de kraamvrouwkoorts aangetast, offchoon ik mij dagen en nachten met de, in het kraamgesticht aan de kraamvrouwkoorts, ziek liggenden als Genees- en Verloskundige gestadig bezig hield. De opmerkingen, welke de Heer Dr. SCHENK te *Siegen* in zijne hoogst merkwaardige beschrijving eener gelukkige verlossing door de keizersnede in het 3<sup>o</sup>. *Stuck* V. *Bd.* van mijn *Journal für Geburtshülfe* medegedeeld heeft, kunnen insgelijks ruimschoots op de kraamvrouwkoorts toegepast worden. Nergens, zegt hij, moeten de tegenaanwijzingen van dit middel ernstiger overwogen worden, dan hier. Tot de dingen, welke uit den weg geruimd moeten worden, voor men geneeskundig te werk gaat, behoort inzonderheid de belette buikontlasting. Wel is waar, schijnt deze geene hinderpalen in den weg te staan, van wege het ontlastende vermogen des middels, dat dan hier, behalve de bedoelde hoofdwerving, ook tegen de ontsteking kan van dienst zijn. Intuschen kan men, blijkens de ervaring, het kwik dikwijls dagen lang op elk uur gebruiken laten, zonder eenige uitwerking, zich aanhoudend verzamelende, en in dezen tijd ook deszelfs ontstekingswerend vermogen geheel verliezende. Ver-  
toont er zich nu eindelijk werking, dan blijft het meestentijds niet bij de heilzame ontlasting van



nadeelige, vuile stoffen, maar er volgen — aangezien de vereenigde hoeveelheid des kwiks op eens met eene verschrikkelijke hevigheid de ingewanden aantast — menigvuldige, ondermijnende, waterige ontlastingen na; de wegen der spijsvertering zijn nu dikwerf uitermate geprikkeld en verzwakt, de bestaande ziekte verandert van aard, de *Crisis* wordt belet enz. Het zoete kwik is reeds daarom in het begin van toevallen in den onderbuik, waar de, door de keizersnede verlost, kraamvrouwen aan onderhevig zijn, ten eenemale te verwerpen. Nimmer durft men hier het gebruik des middels onvoorwaardelijk aanprijzen, hetwelk in andere ontstekingen, bij voorbeeld de vliezige keelontsteking geoorloofd is. De ontsteking heeft hier een' bijzonderen aard, men kan haar niet zuiver (*traumatisch*) heeten, uit hoofde de verwonding slechts de verwijderde oorzaak van dezelve uitmaakt; zij is eene *consensuelle*, door opvolgende prikkeling van het zenuwstelsel verwekte. De ingewanden vereischen de zachtste behandeling, de voorzigtigste wegruiming van al datgene, wat hen prikkelen kan. Het kwik echter is immers een voor de spijsverteringswerktuigen vijandelijk middel, hetwelk, luidens de ondervinding, zelfs den gezonden darm in ontsteking kan brengen, en zal dien ten gevolge den reeds gevoelig geprikkelden nog sterker beleedigen. De Heer Profesfor JÖRG heeft insgelijks reeds vroeger in zijne *Schriften über die Kenntniss des menschlichen Weibes*. II. Bd. S. 27, voortreffelijke wenken omtrent de toediening van het kwik in de kraamvrouwkoorts gegeven, die door beginnen-

nende kunsttoefenaren inzonderheid wel mogen n de aandacht gehouden worden, opdat men door de toediening des kwiks in kraamvrouwkoorfen en ontstekingachtige ziekten van den onderbuik, niet meer schade dan nut toebrengende.

### §. 348.

De braakmiddelen behooren reeds dadelijk, vooral in het ontstekingachtige tijdperk bij de kraamvrouwkoorts in het werk gesteld te worden, als de pols hard, de tong geel of bruin beslagen is en de lijdesfen een' vuilen smaak hebben, en de van zelve zich vertoonende neiging tot braken, voor ophooping en vergaringen van raauwe, galachtige en slijmige onzuiverheden in de maag en darmen pleiten; van het grootste belang is derzelve aanwending in het gemelde tijdperk, inzonderheid bij de besmettelijke kraamvrouwkoorts. Men gebruike echter geenszins den braakwijnsteen, maar *Ipecacuanha*, en wel in zulk eene gift, dat men van het brakingverwekkend vermogen, zoo veel mogelijk, verzekerd kan zijn. Met de purgeermiddelen moet men bij de kraamvrouwkoorts zeer omzigtig zijn, daar zij niet lang verdragen worden, veelal te sterk werken, de plaatselijke ontsteking vermeederen, *Diarrhoe* veroorzaken en den overgang tot een' *asthenischen* toestand verhaasten en de uitzweeting begunstigen.

### §. 349.

Indien de bloedontlasting niet op het geschiktste tijdstip bewerkstelligd wordt, dan kan men van deze,



noch van het salpeter iets meer verwachten, de koorts gemeenlijk reeds van een' *asthenischen* aard geworden zijnde, waarbij niettemin, of de plaatselijke ontsteking verder voortgaat, of het tijdperk der uitzweeting zich heeft ontwikkeld. In het eerste geval onderkent men zulks aan den kleinen, niet harden, maar zeer radden, onregelmatigen, beven- den pols, door invalling van het gelaat en de huid, verminderde warmte der uitwendige deelen, door eene kille, fletsche, flappe, alles behalve gespan- nene of volkomen drooge, niettemin kleverige huid, door toenemende gevoeligheid en opgezetheid des onderbuiks, somwijlen, doch niet altoos, door verschijnselen van zwakte van het zenuwgestel, bij voorbeeld gemis, of onvolkomenheid van het herin- neringsvermogen, stille ijhoofdigheid, groote zwakte, beving, peeshuppeling en dergelijken. Bij zoodanige verschijnselen is het hoog tijd, de levenswerking van het vaatgestel aan te zetten; ten einde dit doel te bereiken, komen de zoogenaamde *Diaphoretica*, BOER's kraampoeder, dat uit *Antimonium* bestaat, *Salammoniac* met *Vinum Stibiatum*, de *Tartris Potassae stibiata* in kleine giften, de *Acetis Ammo- niae liquida* en de kamfer te pas. Dit is bij de op- gekomene *Asthenie* zoo veel te meer zaak, als dezelve voornamelijk in het vaatgestel blijkt te zetelen, deels uit gebrek aan opwekking en werkdadigheid in hetzelfde, vooral aan deszelfs omtrek (*Peripheri- schen*), deels door verminderde levenskracht, door gebrek aan levendige uitzetting. Tevens ontmoet men in de genoemde tijdperken der kraamvrouw- koorts ongelijke verdeelingen der bloedmasa, een'

tragen voortgang des bloeds, eene *passive* ophooping in de gewigtigste deelen en *organen* van den onderbuik, welke de kamfer, naardien zij het bloed gelijkelijk verdeelt, en hetzelfde tevens naar den omtrek (de huid) drijft, dikwijls spoedig en zeker wegneemt. Om deze reden blijft het ook bij de kraamvrouwkoorts in het bewuste tijdperk der ziekte een der heilzaamste, zweetdrijvende middelen, om de *Crisis* door de huid te bewerken, inzonderheid als werkeloosheid en gebrek aan levensopwekking en prikkeling des bloeds in dezelve de uitwaseming belemmeren. Moge de huid droog en ter *Transpiratie* ongeneigd zijn, zoo moet men voor het gebruik der kamfer laauwe baden, waschingen der ledematen en van het gezicht met warm water en azijn, zuurdeeg, blaarpleisters en dergelijken als voorbereiding, in het werk stellen. — De terpentijnolie, welke onlangs door de Engelschen aangeprezen werd, kan even als de kamfer slechts in het bekende *Stadium* der kraamvrouwkoorts, en doorgaans niet toegediend worden, als de koorts het *stenische* karakter nog draagt, en waar de *Crisis*, hoofdzakelijk door de huiduitwaseming, nog door een' hevigen ontstekingsprikkel, of door krampachtige beletfelen verhinderd wordt; want de terpentijnolie is nog in een' hooger en graad dan de kamfer, een krachtig, doordringend en prikkelend middel. Zij zet het vaatgestel sterk aan, inzonderheid de *peripherische* uiteinden der slagaderen, en legt een allersterkst, zweet- en pisdrijvend vermogen aan den dag, zoodat het de huid en nieren levendig aan doet en prikkelt. Doch in het aangevoerde tijdperk



der *Asthenie* kan zij eer nog van dienst zijn, vooral ook wegens haar sterk opwekkend vermogen op het watervaatstelsel, de slijmvliezen, en op de huid. Zij moet echter met eenige omzigtigheid en niet in al te groote giften gegeven worden, opdat zij geen hevige braking, ontlasting, belette pislozing, bloedwater, bovenmatige roode kraamzuiveringen, of werkelijk baarmoederlijke bloedstorting (*Haemorrhagia Uteri profusa*), bloedspuwing enz. veroorzake. — Braakmiddelen zijn ook in dit tijdperk der ziekte nog aangewezen, eensdeels als er werkelijk nog vuile stoffen voorhanden zijn, anderdeels als er eene werkeloosheid in het gansche vaat- en zenuwgestel plaats vindt, of als de *Crisis* door de huid, ten gevolge eener kramp, belemmerd wordt, hetwelk men uit de droogte der huidoppervlakte, den zeer radden pols, de drooge, bevende tong, de peeshuppeling en dergelijken leert kennen; een braakmiddel kan, behalve dat, door deszelfs schokkende, verkeerende werking op het zenuwgestel, door verhooging van alle edele verrigtingen en door opheffing van de, in de weg staande, *peripherische* kramp, die de koorts verzelt, nog heilzame gevolgen hebben.

### §. 350.

Bij den overgang der kraamvrouwkoorts uit het bekende tijdperk der *Asthenie* tot rot- of zenuwkoorts zijn, behalve de kamfer, de valeriaan, *Serpentaria*, de minerale zuren, het *Acidum sulphuricum dilutum*, de *Mixtura sulphurico acida* Ph. B. (*Elixer acidum* HALLERI), het *Acidum muriaticum*

*oxygenatum*, de muskus enz. aangewezen, en de heilzame uitwerking van dit middel is bij eene *Peritonitis putrida* en *nervosa* niet te miskennen. Doch bijaldien, inzonderheid bij de besmettelijke kraamvrouwkoorts, de uitzweeting, of nederzetting van stof, heeft plaats gegrepen, beantwoorden, ten minste volgens onze tot dusverre verkregene ondervinding, de gemelde middelen even zoo weinig aan de verwachting als andere, die men tot dit oogmerk aanprezen heeft, als daar zijn: de *Calomel*, de spiesglansmiddelen, de *Senega*, de *Arnica*, de *Digitalis*; de *Carbonas Potassae* en dergelijken, om door aanzetting en verhooging van de werkdadigheid des watervaatgestels en der pisafscheiding, van het huidwerktuig en de wormswijze beweging des darmkanaals het opgehoopte vocht te verdrijven. Zelfs de, in dit tijdperk zoo hoog geroemde, braakmiddelen hebben ons althans geen nut meer verschaft, zoodra er nederzetting van stof bestond, en waar zij ons zoowel als andere middelen niet te leur stelden, had zich de ontsteking des onderbuiks wel niet verdeeld, maar de krachten slechts waren gezonken; er had zich meer een werkelooze staat van het vaatgestel geopenbaard, de onderbuik begon ook wel eens meer op te zwellen. De pols was menigvuldig, klein en zwak, de pijnen nogtans waren niet geheel en al verdwenen, en de koude der ledematen werd gemist, die gewoonlijk de nederzetting van stof begeleidt. Of de terpentijnolie in dit tijdperk nog hulp verschaffen kan, weten wij niet te bepalen; hare naauwe verwantschap ten aanzien van hare werking met de kamfer, die wij steeds vruchte-



teloos beproefd hebben, laat ons voor als nog in twijfel, of de terpentijnolie werkelijk door de Engelschen in het tijdperk der reeds plaatsgegrepen uitzweeting, of na de nederzetting van stof zij toegediend geworden.

### §. 351.

Tot uitwendige middelen, die op den onderbuik aangewend worden, prijst men omslagen, inwrijvingen, zuurdeeg en Spaansche vliegen. De omslagen, in den vorm van eene pap, worden door de lijderesfen wegens de groote gevoeligheid des onderbuiks zelden verdragen, hoofdzakelijk omdat bij de kraamvrouwkoorts de hevigheid der pijn met de koorts in gelijke verhouding staat. Ik ondervond nog het meeste baat bij een vlieraftreksel met fenel, niet te nat, aangewend; als dit niet hielp, met bijvoeging van azijn. Met het gebruik en de uitwerkselen der koude omslagen, door eenige Artsen zoo hoog geprezen, ben ik niet bekend. De inwrijving van oliën en zalven, eensdeels om de pijnen en de mischien aanwezige kramp te bedaren, anderdeels om de ontsteking te verdeelen, zoo als de *Oleum Hyoscyami* en *ammoniatum*, de heulsap- en kamferolie, de *Acetum saturninum*, de *Unguent. Hydrargyri cinereum* (*Ung. Nitrat. Hydrargyri*) worden bij de groote gevoeligheid des onderbuiks ook niet lang verdragen. Heerlijke gevolgen echter ziet men, de koorts en pijnen toenemende, de buik opzettende, van mostaardpappen en Spaansche vliegen, bijzonder van de laatste na voorafgegane stovingen van den onderbuik met azijn, blijkens de  
bij-

bijzonder goede uitwerkfelen in de bewuste *Epidemie* van kraamvrouwkoorts. Wel te verftaan, niet eerder, dan nadat door bloedontlasting en de overige ontftekingwerende middelen de eerfte, hevige prikkeling in het vaatgeftel verminderd is, en het *stenifche* karakter der koorts, de *Synocha*, naar het *asthenifche*, of zenuwachtige overheft. Want zij inzonderheid, die Spaanfche vliegen op den onderbuik leggen, zijn het, welke de zoo hoogst ongunftige uitgangen, de uitzweeting, de lymphatieke en weiachtige uitftortingen in de kraamvrouwkoorts verhoeden. Om deze reden, beantwoordde ook hare aanwending in de vermelde kraamvrouwkoorts-*Epidemie*, die meer als eene *katarrhale* en *rheumatifche* ontfteking des onderbuiks zoowel als der borstholte zich openbaarde, zoo goed aan de verwachte, heilzame uitwerking. Tot de uitwendig aan te wendene middelen behooren nog de laauw-warme baden, welker gebruik §. 346 bijzonderlijk behandeld is. Voor het overige moet men, vooral in het tijdperk van zwakte (*Asthenie*) en waar eenmaal de uitzweeting daar is, zeer omzigtig zijn, naardien in fommige gevallen bij derzelver gebruik de dood fchielik en bij wijlen ook flechts toevallig intreedt, als wanneer de des onkundige omftanders meestal het verfcheiden der lijdende aan de aanwending der baden toefchrijven.

#### §. 352.

De eetregel moet naar het tijdperk der ziekte ingerigt worden. Zoo lang de geneeskundige behandeling in het eerfte tijdperk fterk ontftekingwe-

ren-



rende is, moet men insgelijks alleenlijk eene verdunnende diëet voorschrijven, haverdegort en garstenwater, een afkookfel van graswortel, naar omstandigheden met of zonder plantenzuren, inzonderheid het citroenzuur, het wijnsteen-zuur, flambozenazijn, honig met wijnazijn, water, waarin geroosterd brood gekookt en citroenzuur, amandelmelk, en bij de kraamvrouwkoorts met een' *rheumatischen* of *catarrhalen* toestand (*Diathesis rheumatica*) een lindenbloesemaftrekfel, laauw garstenwater; in het tijdperk der *Asthenie* aanvankelijk ligte vleeschsoepen, gekookt ooft met een luttel wijns, vervolgens krachtiger vleeschsoepen, een weinig water en wijn, en dan over het algemeen krachtige voedfelen en dranken. — Daarenboven is het van het hoogste aanbelang, vooral bij de *epidemische* en besmettelijke kraamvrouwkoorts, dat men gedurende de ziekte op het naauwkeurigste zorgt voor versche lucht, menigvuldige verschooning van beddegoed en linnen, voor vervrolijking der lijdende en verwijdering van al die zorgen, welke het gemoed kunnen treffen.

#### L I T T E R A T U U R.

HIPPOCRATES, *de morb. mulier. Libr. 1. Epidem. Libr. 1 et 3.*

VAN SWIETEN, *Commentar. etc. Libr. 4<sup>o</sup>. §. 1329.*

HULME, *Abhandlung von dem Kindbettfieber. Aus dem Engl. Leipzig 1772.*

JOHN LEAKE, *prakt. Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbett. Aus dem Engl. 1775.*

TH. KIRKLAND, *Versuche über das Kindbettfieber. Aus dem Engl. Gotha 1778.*

DE LA ROCHE, *Untersuchung über die Natur und Behandlung des Kindbettfiebers, mit Anmerkungen von SELLE.* Berlin 1785.

DOUBLET, *neue Untersuchung des Kindbettfiebers.* Aus dem Franz. Jena 1785.

SACHTLEBEN'S, *Kritik der vorzügl. Hypothesen etc.* Leipzig 1793.

ASTRUC, *Abhandlung von den Frauenzimmerkrankheiten.* Aus dem Franz. Leipzig 1776.

STOLL, *Aphorism. etc.* Vindob. 1786.

BREFELD, *Beiträge zu den Grundz. der Heilkunde, nebst einer praktischen Abhandlung von Kindbettfieber.* Munster 1803.

BOER'S *Abhandlungen und Versuche.* Bd. I und II.

OSIANDER'S *Denkwürdigkeiten.* Bd. I.

SELLE, *medic. clin.*

BURSER, *institut. med. pract.* Tom. II.

P. FRANK, *Epitome.* Tom. II.

MARCUS, *Specielle Therapie.* 2ter Theil.

VOGEL'S *Handbuch.* 2ter Theil.

JÖRG, *Handbuch.* Bd. II.

CARUS, *Gynäkologie.* 2ter Theil.

RICHTER'S *Therapie.* 2ter Theil.

ROB. THOMAS, *l. c.*

BURN'S *Midwifery.*

VAN FRORIEP'S *Handbuch der Geburtshülfe.*

HARLESS, *Specielle Nosologie.* 1ter Theil.

HORN'S *Archiv.* Bd. I und II, en op meer andere plaatsen.

HUFELAND'S *Journal.* Bd. XX. XXI. XXIV en anderen.

Dr. C. F. NÄGELE, *Schilderung des Kindbettfiebers, welches vom Juni 1811 bis April 1812 in der Entbindungs Anstalt zu Heidelberg geherrscht hat.* Heidelberg 1812. 8°.



VON SIEBOLD's *Journal*, op verscheldene plaatsen.

London, *med. repository*. Sept.—Dec. 1824.

Edinburg, *med. Journ.* Jul. 1824.

London, *med. und phys. Journ.* Sept.—Dec. 1823,  
verder Febr. 1825.

Dr. A. E. V. SIEBOLD, *Versuch einer Pathologie und Therapie des Kindbettfiebers, nebst einer Darstellung der Epidemie, welche vom Februar bis April 1825 in der Gebäranstalt der Königlichen Universität zu Berlin geherrscht hat.* Frankfurt a. M. bei Franz. Varrentrapp. 1825. 8<sup>o</sup>.

SALOMON, *Verloskundig Handboek*, bij J. VAN DER HEY. Amsterd. 8<sup>o</sup>. II. Deel.

BUCHNER, *Geneeskundig Handboek*, bij BERNTROP. Amsterd. 8<sup>o</sup>.

Van de talrijke *Dissertatiën* noemen wij  
alleenlijk de volgende:

ZEHNER, (*Eine Jubilarschrift.*) Mannheim 1776.

D. J. NOLTE. Gotting. 1785.

D. J. HUTTER. Frankfurt 1785.

BORCHERS. Göttingen 1793.

SCHÖLLER. Wirzburg 1799.

MEYER. Giessen 1804.

In Berlijn hebben als *Inwijdingsredevoering* dit onderwerp  
behandeld: SCHLOSS und VERLAGE. 1820;

HUETTMAN und HOFFMANN. 1823.

Eindelijk verdient nog eene loffelijke vermelding:

LOBSTEIN, *Dissert. sur la fièvre puerperale.* à Paris An XI.



## T W E E D E   G E D E E L T E.

VAN EENIGE IN HET KRAAMBED VEELVULDIGER  
VOORKOMENDE, DER KRAAMVROUWEN ECHTER  
NIET ALLEEN TOEBEHOORENDE KOORTSEN.

## §. 353.

Reeds boven §. 317 hebben wij de wondkoorts, de rheumatische, de gastrische, de gierst- en rooskoorts als zoodanige soorten van koortsen aangeduid, die bij kraamvrouwen, wel is waar, vaker zich opdoen, dan de overige koortsfge ziekten, waardoor ook voorwerpen van allen ouderdom en geslacht konden overvallen worden; en wij zullen deswege bij onze beschouwing des te korter zijn, naarmate al de genoemde ziekten, als zij in het kraambd zich vertoonen, doorgaans in het wezenlijke niet verschillen van dezelfde ongesteldheden buiten het kraambd; reden, waarom wij hier eigenlijk kunnen volstaan met de bloote opgave dier oorzaken, waardoor derzelver ontwikkeling bij kraamvrouwen hoofdzakelijk ontstaat, en datgene op te merken, wat veelligt door de bijzondere gesteldheid der kraamvrouw als zoodanig, en als gevolg der voorafgegane verlossing ten aanzien van de *Diagnosis*, *Prognosis* en genezing, bijzonder voor oogen dient gehouden te worden.



## E E R S T E   H O O F D S T U K.

*Van de wondkoorts.*

## §. 354.

Onder wondkoorts in het algemeen verstaan wij die algemeene aandoening des bewerktuigden gestels, welke ten gevolge van eenigerhande beleediging van een deel des menschelijken ligchaams onder den vorm eener koorts zich openbaart. Zoodanige koorts ontwikkelt zich alzoo des te spoediger, hoe gewigtiger en zenuwrijker het beleedigde *orgaan*, en hoe gevoeliger en prikkelbaarder het daarin betrokken voorwerp is. Wondkoortsen der kraamvrouwen zijn derhalve van die, waarvoor andere voorwerpen buiten het kraambed blootstaan, niet onderscheiden; gewoonlijk echter zijn ze heviger en van meerder aanbelang, naardien de kraamvrouw, hare gansche natuurlijke gesteldheid in aanmerking genomen, bereids veel met eene gekwetste overeenkomt, gelijk I. Deel 1<sup>o</sup>. Stuk, §. 92 aangetoond werd; zij is prikkelbaarder, door de voorafgegane verlosfing aangedaan en voor elken indruk gevoeliger; de kraamvrouw heeft op zich zelve reeds, gelijk elke gewonde, een' zekeren aanleg tot koorts en tot ontflekingen, en zij moet alzoo door werkelijke kwetsingen zoo veel te heviger aangetast worden. Meestentijds nu zijn het beleedigingen van de, in het verlosfingwerk zelve betrokkene, deelen, wel-

welke de wondkoorts der kraamvrouwen te weeg brengen, dienvolgens verscheuring van den bilnaad, den baarmoederhals, kneuzing van den *Uterus* en de scheede; verscheuring van sommige deelen derzelve enz. Deze beleedigingen worden soms, ondanks de grootste oplettendheid van den, bij de baring hulp toebrenghenden, persoon, door de omstandigheid onvermijdelijk veroorzaakt; doch helaas! — in de meeste gevallen ontstaan zij door ongeschikte en ruwe handen — of instrumentale hulp, door verwaarloosde, of onkunstmatige ondersteuning des bilnaads, door onhandig, ruw onderzoeken, door voorbarige afhaling der nog onvolkomen afgescheidene nageboorte, door ruwe aanlegging der tang enz. Hieruit blijkt, dat men door eene doelmatige en behoedzame leiding der verlossing, en vermjding der verkeerde meening van sommige Verloskundigen en Vroedvrouwen, als of eene natuurlijke baring altoos zeer schielijk geschieden moet, de wondkoorts zeer vaak voorkomen kan. Met opzet merk ik dit hier aan, naardien ik Verloskundigen en Vroedvrouwen zeer dikwijls daarin mislagen heb zien begaan; dat zij namelijk niet genoeg op de hulp der natuur vertrouwen, haar geen' tijd genoeg gunnen, ter volbrenging van het verlossingswerk, en zich bijgevolg allerhande ongepaste en nadeelige kunstgrepen voorloven, waartoe inzonderheid het te vroegtijdige breken des waters behoort, met oogmerk spoedig daaraf te komen, of ook wel — *ut aliquid fecisse videantur!* (\*) — Zeer natuurlijk ontstaan daaruit dan

(\*) Om den schijn van iets gedaan te hebben.



dan dikwerf moeilijke verlosfingen, beleediging der deelen en wondkoorts, die niet zelden hoogst kwaadaardig is.

### §. 355.

Heeft de wondkoorts zich nu ten gevolge eenigerhande beleediging geopenbaard, dan treft men gewoonlijk de volgende verschijnselen aan: de kraamvrouw, die reeds door de voorafgegane verlossing in een' zeer geprikkelden toestand verkeert, en wier pols, ook zonder eenige vroegere verwonding eenigzins verhaast is, krijgt meestal tegen den avond van den tweeden, derden of vierden dag na de bevalling een' aanval van koude, die gewoonlijk slechts vijftien tot zestien minuten aanhoudt, doch ook een uur lang duren kan. Alsdan volgt hitte, die menigmaal een' aanmerkelijken graad bereikt, langer of korter tijd toeven kan, en soms met ijlhoofdigheid verbonden is, welke immer in zweet overgaat. Heeft deze verheffing der koorts nu acht tot twaalf uren aangehouden, dan bespeurt men veelal tegen den morgen vermindering; het zweeten neemt af, de pols wordt langzamer, blijft nogtans haastiger, dan hij voor het *Paroxysme* was. Een schier dergelijke, zelden zwakker, vaak nog heviger aanval; trouwens zonder voorafgaande koude, vertoont zich tegen den avond van den volgenden dag, en de ziekte houdt, over het algemeen, een zeer regelmatig beloop. Ten aanzien der beleedigde plaats zelve nu, bespeurt men alle blijken van ontsteking, en deze is, inzonderheid gedurende het hevige der koorts, hoogst gevoelig. Altoos gaat de ontsteking in verettering over, en de kraamzuiveringen nemen dan

dan altijd een' zeer bijzonderen, buitengewoon sterken reuk aan, worden finerig, etterachtig, somwijlen zelfs stinkend en rotachtig.

### §. 356.

Het gevaar der ziekte rigt zich naar den graad en de zitplaats der beleediging, en naar het doelmatige onzer geneeskundige behandeling, en alles, wat wij ten opzichte der *Prognosis* en geneeswijze in de eerste afdeeling, §. 2—34, alwaar de beleedigingen der teeldeelen zijn afgehandeld, nader verklaard hebben, kan hier toegepast worden. Zorgen wij voor behoorlijke zindelijkheid der kraamvrouw; vrijwaren wij haar voor koudevatting, misflagen in de diët, gemoedsaandoeningen, en wat de hoofdzaak is, wordt de wonde goed behandeld, dan zal ook de koorts in de meeste gevallen gelijken tred, met de verbetering van het gekwetste deel, houden, en van langzamerhand genezing volgen. Daarentegen evenwel, kan de anderzins goedaardige ziekte van een' zeer boosaardigen, zenuw- en rotachtigen aard worden, als wanneer de genezing hoogst moeilijk valt. Natuurlijk blijft hier de plaatselijke behandeling de hoofdzaak, en moet volgens het leerstuk der verzwering (*helkologische*) ingerigt worden; de inwendige behandeling echter vermag men ook niet geheel uit het oog verliezen, welke aanvankelijk meer ontstekingswerend, geruststellend zijn moet, waartoe, behalve eene verkoelende, prikkelooze diët, de uitmelkingen (*Emulsionen*) het beste geschikt zijn, welke men met zacht ontlastende middelen vereenigen kan.



Later, als de ontsteking bedaald en de verettering voorhanden is, moet men de krachten der lijderes trachten te versterken. JÖRG prijst in deze omstandigheid inzonderheid een mengsel van water en wijn. Over het geheel moet men nu tot een' meer voedenden, prikkelenden eetregel overgaan, en des noods ook tot *Tonica*, *Roborantia*, *Antiseptica* inwendig, vooral den *Cortex peruvianus*. — Datgene, hetwelk BURNS onder den naam van *Ephemeral fever or weed* beschrijft, schijnt de meeste overeenkomst met deze ziekte te hebben, alhoewel het ook veel van de volgende heeft.

## T W E E D E   H O O F D S T U K.

*Van de rheumatische koorts.*

## §. 357.

Ook hier is wederom hetzelfde toepasselijk, wat boven reeds gezegd werd: de *rheumatische* koorts der kraamvrouw heeft doorgaans niets eigenaardigs, en onderscheidt zich van alle andere *rheumatische* koortsen alleen daardoor, dat zij van grooter aanbelang is, eensdeels omdat zij de kraamverrigtingen ligtelijk stoort, en zich dienvolgens spoedig met andere kraambedziekten verbindt, of daarin overgaat; anderdeels omdat de kraamvrouw alle koudevatting des te sterker gevoelen moet, hoe meer de oppervlakte van hare huid in den natuurlijken toestand tot vermeerde uitwaseming geneigd is. Altoos namelijk ontstaat deze ziekte uit het vatten van koude, en zij is daarom telkens voor te komen; niet altijd evenwel is de Arts in staat, daartoe iets bij te dragen. Trouwens de zaak is gewigtig genoeg, om alle Genees- en Verloskundigen aan te sporen, zoo streng mogelijk en behoedzaam zorg te dragen, dat de kraamvrouw zich voor iedere koudevatting vrijware; want niet alleen dat de verkouding reeds op zich zelve dikwerf eene belangrijke ongesteldheid kan verwekken, maar er bestaat tevens geene ziekte der kraamvrouw, welke niet door de vereeniging met deze gelegenheidgevende oorzaak een' ernstigen keer



neemt. (cf. MENZ, *Diss. inauguralis de pathologia rheumatismi in morb. puerper. Lips. 1788.*) Ter voorkoming derzelve zorgt men reeds gedurende de zwangerschap, dat de kraamvrouw zich warm houde, en wel de borsten, den onderbuik en de voeten voor iederen schadelijken invloed der lucht vrijware. Tijdens de baring zelve moet men dubbel oplettend zijn; de barende niet noodeloos ontblooten, het vertrek, naar het jaargetijde geëvenredigd, warm houden. Na de bevalling moet de kraamvrouw, als zij buiten het bed beviel, dadelijk weder in hetzelfde gelegd worden; men moet aldan, en zoo lang de kraamzuivering sterk vloeit, slijpt voor droog, behoorlijk uitgewasemd, schoon linnen zorgen, opdat zij door de uitwaseming der vochtige lakens geen nadeel bekome enz. Indien men al deze omstandigheden zorgvuldig en met de slijptste nauwgezetheid altijd zelf kan in acht nemen, dan zou de *rheumatische* koorts zich zeker niet vertoonen. Waar zij echter zich ontwikkelt, is zij naar den graad der verkouding zachter of heviger. Altoos vangt zij met koude aan, waarop hitte en gemeenlijk een zeer sterk zweet, onder de lozing van eene zeer troebele *Urin* met een grondzetsel, volgt, die evenwel meestentijds de, met de koorts vereenigde, *rheumatische* pijnen verzacht. Bereikt de koorts eene aanmerkelijke hoogte, dan wordt de algemeene gevoeligheid niet zelden medelijdend aangedaan; er openbaren zich zenuwachtige toevallen, die veelal aanhouden, tot de hitte verdwijnt. Bovenal verdient ook hier de plaatselijke aandoening voor oogen gehouden te worden, aangezien de koorts zich immer

naar

naar dezelve rigt , en deze laatste , wanneer zij vrij hevig is , ligtelijk tot kraamvrouwkoorts kan overgaan , gelijk de , in Februarij , Maart en April 1825 in het kraamgeſicht alhier , waargenomene *Epidemie* van kraamvrouwkoorts bevestigd heeft. Had de verkouding weinig te beteekenen , dan neemt de ziekte menigmaal na een' enkelen aanval van koude , hitte en zweet met het laatste haar afscheid. In andere gevallen heeft er alleen vermindering plaats ; er volgen nog eenige lichtere aanvallen , die altoos weder met koude beginnen. De behandeling is over het algemeen zeer eenvoudig ; de hoofdaanwijzing berust in , zoowel algemeen als plaatselijk , de werking der huid op te wekken ; inrusſchen mag dit niet te ſterk geſchieden : gemeenlijk kan men met zeer zachte , zweetdrijvende middelen volſtaan , bij voorbeeld *Murias Ammoniae* , *Vinum stibiatum* , *Spiritus Mindereri* , *Aqua Florum Sambuci* , vlierthee , thee met citroenzuur en dergelijken. Plaatselijk dekke men het beleedigde deel , als het uitwendig zich bevindt , zorgvuldig ; drooge warmte is aanvankelijk het beste en veeltijds toereikende. Mocht men wegens de hevigheid der pijn daarmede niet volſtaan kunnen , zoo neme men tot inwrijvingen van *Balsam. Opodeldoch* , *Linimentum volatile* , *Tinct. Opii* en des noods ook tot zuurdeeg en blaarpleisters de toevlugt. Stovingen en pappen keurt JÖRG met volle regt af.





## DERDE HOOFDSTUK.

*Van de gastrische koorts.*

## §. 358.

Deze koorts ontwikkelt zich soms, na een' tevoren beganen misflag in den eetregel, in de eerste dagen des kraambeds, en is daarom somwijlen met de zogkoorts verwisfeld geworden. Die verschijnselen, welke wij als gezellen der gewone, *gastrische* koorts kennen, kenmerken ook deze ziekte, als zij kraamvrouwen overvalt; de onderkenning derzelve nogtans wordt dikwerf moeilijk, wijl de kraamverrigtingen over het algemeen daardoor meer of min van den regel afwijken, en zij alzoo eenige gelijkenis met eene zogkoorts verkrijgt, die met onzuiverheden in de eerste wegen toevallig verbonden is. Bij de *gastrische* koorts evenwel zijn de bekende verschijnselen van onzuiverheden in de eerste wegen terstond aanwezig en maken de hoofdzaak uit; zij is altoos door een' misflag in den eetregel voorafgegaan; trekking en steking in de borsten en onder de okselen, en de andere, eigenaardige ken-teekenen der zogkoorts ontbreken. De buik is niet altoos opgezet; de lijderees klaagt over geen bepaalde pijn, maar meer over koliekaardige krimpelingen; de stoelgang — de buik mag verstopt, of geregeld zijn — is zeer stinkende. De lijdereessen zijn onrustig, hebben oprisping, misfelijkheid, afkeer

van

van spijzen, somwijlen van zelve braking; de pols is rad; de warmte der huid verhoogd; niet zelden hevige hoofdpijn in de voorhoofdstreek aanwezig. Zij zijn zeer heet op het gevoel, offchoon zij over huivering klagen, en zeer dorstig zijn. De behandeling vereischt ook hier alle omzigtigheid, en men wachte zich voor de toediening van sterke ontlastmiddelen. Braakmiddelen verdienen hier klaarblijkelijk boven de *Purgantia* de voorkeur, en zijn over het algemeen voldoende. Is dit het geval niet, dan stelle men niet te prikkelende klisteren in het werk, of men geve bittere, zacht losmakende extracten, en ga men langzamerhand, de ergste verschijnselen verdwenen zijnde, tot de minst prikkelende maagversterkende middelen over. Te allen tijde moet men den eetregel doelmatig inrigten; de lijderes moet aanvankelijk meer honger lijden en alleen van lieverlede ligt verteerbare, niet te sterk prikkelende spijzen nuttigen.



## VIERDE HOOFDSTUK.

*Van de koorts met gierstuitslag.*

## §. 359.

Hoe verschillend ook de gevoelens der Geneeskundigen over het wezen en het gevaar dezer ziekte zijn, zoo komt men toch vrij algemeen overeen, dat de onderhavige koorts der kraamvrouwen, van het gewone gierstuitslag, zoo als het bij voorwerpen van ieder geslacht en ouderdom zich vertoont, in het wezenlijke niet onderscheiden is, en dat alleenlijk de vereeniging van dezelve met het kraambed, in betrekking van haar gewigt en behandeling, eene bijzondere oplettendheid verdient. Wij kunnen derhalve hier kort zijn, aangezien wij alleen van het, met het kraambed zamengestelde, gierstuitslag te spreken hebben, en verwijzen ten opzichte van het algemeene, naar grootere, geneeskundige werken. Men leze vooral BURSER, die deze ziekte zeer volledig behandeld, en voornamelijk ook het gierstuitslag in het kraambed naar deszelfs aard en gewigt naar eisch overwogen heeft. Doch eene andere, juist hier te huis behoorende, vraag is, of de *Febris miliaria* over het algemeen, en bijgevolg ook de *Febris miliaria Puerperarum* altijd eene toevallige ziekte zij, of dat zij ook als eene oorspronkelijke, op zich zelve staande ziekte (*Morbus primarius s. idiopathicus*) zich openbaren kan?

Wij

Wij gelooven, dat deze vraag thans, nadat STÖRCK, COLLIN, TISSOT en meer anderen haar zoo naauwkeurig overwogen hebben, niet meer in aanmerking zal kunnen komen; wij althans houden ons overtuigd, dat de koorts met gierstuitslag zeker in de meeste gevallen toevallig bij andere ziekten zich vertoont, dat zij dan dikwijls verhoed kan worden, en zich door het gevaar en de behandeling derzelve altijd naar den aard dier ziekte rigt, bij welke zij zich gevoegd heeft: — dat men nogtans ook voorbeelden ziet, waar de ziekte als *Morbus per se* (op zich zelve) ontstaat, en zonder dat zich de eene of andere gelegenheidgevende oorzaak laat opsporen. De ondervinding kan hier alleenlijk beslissen, en heeft, volgens ons gevoelen, onwederlegbaar beslist. Te ontkennen is het niet, dat vele vrouwen eene bijzondere voorbeschiktheid daartoe hebben; en voornamelijk schijnen dezulke een' sterken aanleg daartoe te bezitten, die lang aan witten vloed en rheumatieke pijnen geleden hebben. Wat de naaste oorzaak der ziekte in het algemeen betreft, deze is nog altijd verborgen; menigwerf en in de meeste gevallen schijnt er werkelijk een eigenaardig *Miasma* ten grondslag te leggen, doch deszelfs aard kennen wij nog niet, en schoon ook deze koorts zich dikwijls *epidemisch* of *endemisch* voordoet, zoo vindt men toch insgelijks zekere gevallen, waar zij *sporadisch* en uit, in het lichaam zelve, gevestigde oorzaken zich ontwikkeld heeft. Ja somwijlen schijnt de ziekte zelfs, als zij zeer kwaadaardig werd, een' besmettelijken aard te kunnen verkrijgen, gelijk zich zulks door eene, door

mij



mij waargenomene *Epidemie* van koorts met gierstuitslag op het land, in het *Wurzburgsche* schein te bevestigen. — De verschijnselen, onder welke deze uitslagkoorts zich openbaart, hebben doorgaans niets eigenaardigs; het uitslag heeft denzelfden vorm en dezelfde bijzondere kenteekenen, als het gewone gierstuitslag, en treedt nu eens als wit (*Miliaria alba*), dan weder als purper- (*purpura*), of als rood gekleurd gierstuitslag (*Milliaria rubra*) te voorschijn. De daarmede verzeld gaande koorts is niet altijd hetzelfde; nu eens is het eene eenvoudige prikkelkoorts, dan heeft zij meer van het ontstekingsachtige, dan weder van het zenuwachtige. De ziekte kan derhalve goed- en kwaadaardig zijn, en het strijdt om die reden regtstreeks tegen de ervaring, wanneer vele schrijvers haar als eene gevaarlijke ongesteldheid, anderen daarentegen, zoo als bij voorbeeld JÖRG, als eene koorts, die nauwelijks de aandacht verdient, afschilderen. Staat de ziekte op zich zelve, zonder eenige samenstelling, zich als eene zuiver eigenlijdige, *Febris miliaris* ontwikkelende, dan is het altijd een gevolg der stofelijke terugwerking van het gierstuitslag, en rigt zij zich met al hare verschijnselen naar de hoedanigheid van het uitslag. Het witte gierstuitslag zou van meerder aangelegenheid zijn en grooter gevaar in zich sluiten.

De onderkenning is gemakkelijk en de gedaante van het uitslag is eigenlijk het eenigst bestendige dezer ziekte. Het zijn of kleine, spitse, donker- of purperrood gekleurde verhevenheden of bultjes der huid, die even als gierstkorrels er uitzien (*Miliaria rubra*); of er bevinden zich op de-

dezelve witte, doorschijnende blaasjes, die met eene witte, lymphatieke vloeistof gevuld zijn, die veelal na verloop van eenige dagen verdroogt, waarop de afschilfering (*Miliaria alba*) volgt. Meestal nu openbaart zich de koorts, wel is waar, tegen den tijd, dat de zogkoorts gewoonlijk ophoudt, en doet zich dan als eene *Febris lactea protracta* voor, doch dit is niet bestendig zoo. Zij kan vroeger, evenwel ook later verschijnen, langzaam en schiekelijk, eenvoudig of vereenigd met andere ziekten, zich ontwikkelen. Kortom, wij herhalen het nogmaals: het gierstuitslag in het kraambed bezit niets eigenaardigs, en wij voegen hier daarom datgene nog bij, wat veelligt bij de behandeling nog van eenig bijzonder nut zou kunnen zijn. Bij deze staat ten allen tijde op den voorgrond, de ziekte te verhoeden, en dit kan zeker in de meeste gevallen geschieden, door alles te vermijden, wat de huid verzwakt en haren warmtegraad te zeer verhoogt. De kraamkamer moet ruim en niet te donker zijn; men zorge, zonder de lijderes aan togt, of het vatten van koude bloot te stellen, voor behoorlijke doorstrooming van lucht en zindelijkheid; azijnberookingen zijn tot dat einde bij deze uitslagkoorts van zeer veel nut; men voorzie te regter tijd en behoedzaam in behoorlijke verschooning van het ligchaam en het bed; het linnen kan men wel eenigermate verwarmen, doch het mag volstrekt niet te warm, noch te veel doorrookt worden. Men late de kraamvrouw niet met vederen bedden overdekken; men houde haar in het gemeen niet al te warm; vermijde alle prikkelende, verhittende dranken; schrijve integendeel zuurachtige en verkoel-



koelende voor, haverdegort of garstenwater met citroenzuur, en men vergenoege zich met zulke middelen, die haar in een milddadig, zacht zweet houden. Is het gierstuitflag voor den dag gekomen, dan lette men zoo veel te naauwkeuriger op gene bijzonderheden, behandelde de lijderes volgens algemeene, geneeskundige grondbeginfelen, en vestige daarbij inzonderheid de aandacht op de zogaffcheiding en kraamzuivering. Alles, wat bijdraagt, om de kraamverrigtingen op een' geregelden voet te brengen, en hetgeen bereids op andere plaatsen breeder overwogen werd, maakt de ziekte zachter; want als de kraamzuivering, of de zogaffscheiding onderdrukt of verminderd is, dan wordt natuurlijk de overhand hebbende strekking naar de huid slechts sterker, deze laatste nog meer verzwakt en voor de ziekte des te vatbaarder.



## V I J F D E    H O O F D S T U K .

*Van de rooskoorts.*

## §. 360.

De vrouwen zijn ongetwijfeld , over het algemeen , meer aan roosaardige aandoeningen onderworpen , dan de mannen , en men behoeft zich derhalve niet te verwonderen , dat insgelijks bij de kraamvrouwen veelvuldig roosachtige ontstekingen , inzonderheid aan de borsten , aan de ledematen , en onder den vorm van aangezigtsroos voorkomen , waarbij dan koorts komt , welke men met den naam van rooskoorts (*Febris erysipelacea*) bestempelt. Zoodanige vrouwen , die mede buiten het kraambed aan hebbelijke roos leden , worden inzonderheid zeer dikwijls in het kraambed daardoor overvallen. Beledigingen van gevoelige deelen , te weten van den *Uterus* , prikkeling der borsten onder het zogen , mislagen in den eetregel , gemoedsaandoeningen , voornamelijk schrik , zijn de meest gewone gelegenheidgevende oorzaken. De *Diagnosis* is altijd ligt. Het gevaar rigt zich naar de zitplaats der ziekte. Aangezigtsroos is altijd gevaarlijker , gaat ligt tot ontsteking in het hoofd (*Encephalitis*) over , en kan somwijlen door beroerte (*Apoplexie*) schielijk doodelijk worden. De roos der borsten gaat spoedig in verettering over en is vaak van langen duur ; de roos aan de ledematen heeft veelal geneigdheid tot



verharding en legt niet zelden den grond tot witte zwelling (*Phlegmatia alba*). Wat LORRY (*de morbis cutis*) onder den naam van: *Affectus crustosus puerperarum*, beschrijft, komt veel met deze ziekte overeen. De behandeling behoort algemeen en plaatselijk te zijn. Inwendig geve men zacht ontstekingswerende middelen, zorg voor regelmatigheid in de kraamverrigtingen en voor genoegzame buikontlasting, het beste door zacht losmakende klisteren. Bij de aangezigtsroos moet de behandeling ernstiger, sterker ontstekingswerend zijn. Wat de plaatselijke behandeling aanbelangt, zoo beproeve men eerst de verdeeling; het beste door de aanwending van drooge warmte; gekamferde doeken, kruidenkusfentjes van *Flor. Sambuci*, *Farina fabarum* en dergelijken. Zijn de borsten aangedaan, dan late men dezelve van het zog ontdoen, echter niet door het kind. Volgt nu evenwel de verdeeling niet spoedig, vertoont zich duidelijk hardheid, dan moet men de, nu schier niet meer te vermijdene, verettering bevorderen en den etter schielijke ontlasting trachten te bezorgen. Alsdan komen pappen van verzachtende stoffen (*Species emollientes*) met *Hb. Conii*, *Hyoscyami* te pas, dezelve zoo lang voortzettende, tot men nog maar eenige hardheid bespeuren kan. Het openbreken des ettergezwels kan men meestal der natuur overlaten. Waar dit echter te lang duurt, waar men vrees voor verzakking van stof heeft, daar moet men het *Absces* kunstmatig openen. Geringe verhardingen en klonters, die soms op enkele plaatsen nog terugblijven, gaan gemeenlijk door den tijd van zelve weg.

## L I T T E R A T U R.

## §. 361.

De afgehandelde koortfen tot het tweede gedeelte behoorende, zijn door weinig fchrijvers opzettelijk befchouwd. Behalve de reeds meermalen aangehaalde, algemeene geneeskundige werken, zoo als bij voorbeeld BURSER, VOGEL en anderen noemen wij alleenlijk nog de volgende:

JÖRG, *op. cit. Cap. xxxiv et xxxvj.*

CAPURON, *op. cit. Partic. II. Chap. III.*

SELLER, *med. clin.*

BURN'S *Midwifery.*

WEDEL, *Diss. de purpura puerperarum. Jena 1690.*

ARAND, *Diss. de purpura puerperarum. Gott. 1765.*

CARL WHITE, *von der Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. Leipz. 1775. 8°.*

HARTMANN, *Diss. de purpura puerperarum. Argent. 1779.*

MEYER, *Diss. de indole et praeservationi purpurae puerperarum. Fr. ad Viadr. 1785. v. Bald. Ausz. 1. p. 8.*

LOSSIUS, *Diss. inauguralis de purpura puerperarum. Erford 1724.*

GASTELLIER, *Abhandlung vom Frieselfieber der Kindbetterinnen. Een bekroond Prijsfchrift. Uit het Fransch. Mannheim 1782.*

C. J. DAMILANO, *Abhandlung über den Friesel im Piemontesischen. Aus dem Italien. übers. Götting. 1782.*



---

## VIERDE AFDEELING.

### VAN VERSCHILLENDE ANDERE ONGESTELDHEDEN DER KRAAMVROUWEN.

#### EERSTE HOOFDSTUK.

##### *Van de flauwten, krampen en zenuwaandoeningen der kraamvrouwen.*

§. 362.

**K**raamvrouwen zijn aan velerlei zenuw- en krampachtige toevallen onderworpen, die, offchoon aan het kraambed niet alleen eigen, toch dikwijls genoeg voorvallen, om ze althans hier-eene kleine plaats in te ruimen. Daartoe behooren dan nu vooreerst de flauwten, die, over het geheel genomen, naar evenredigheid bij het vrouwelijke geslacht oneindig meer voorkomen, dan bij mannen, en waaraan de vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling veel sterker onderhevig zijn. Over het algemeen gaan met dezelve vele *hysterische* aandoeningen vergezeld, die van meer- of mindere aangelegenheid zijn, al naar dat de aanleidende oorzaken gemakkelijk zijn weg te nemen, of niet. De

voor-

voornaamste oorzaken, waaruit na de bevalling flauwten geboren worden, zijn dan de volgende: 1) voorbeschiktheid, *Diathesis nervosa*. Men treft vrouwen en meisjes aan, die bij den minsten indruk op het ligchaam, of den geest (*physisch, psysische*) in onmagt vallen, en het is derhalve niet te verwonderen, dat bij deze voornamelijk de, met de baring verbondene, zwakte en opvolgende uitputting in werkelijke flauwte overgaat. In deze gevallen ontwikkelen zich dikwijls ter gelijker tijd *hysterische* aandoeningen, en het is om die reden niet zeer gemakkelijk, zulke flauwten van een zwaar, *hysterisch* toeval en van krampen te onderscheiden. De verflapping van alle spieren des ligchaams en de ras voorbijgaande, slechts eenige minuten durende stilstand van het hart, kenmerken in het bijzonder de flauwte; doen haar als zoodanig kennen en van dergelijke toevallen onderscheiden. 2) Te schielijke verlosfingen. De al te spoedige, dikwijls plotselinge en onverwachte ontlasting van den *Uterus*, van de in denzelfven begrepene vrucht, geeft zelfs daar, waar geene bloedstorting achtervolgt, hetgeen toch meestal het geval is, zeer dikwijls aanleiding tot uitputting en flauwte. 3) Bloedstorting. Hoe sterker en schielijker een bloedvliet ontstaat, des te spoediger volgt flauwte, die niet zelden in schijn- (*Asphyxie*) en werkelijken dood eindigt. 4) Belediging der teeldeelen. Hiertoe behoort inzonderheid de scheuring der baarmoeder, als wanneer de lijderes plotseling onder een' hevigen gil flauw valt, en dikwijls met zekerheid weet te bepalen, dat haar iets in het lijf geborsten is.



Daarenboven moet ik vooral nog de aandacht bepalen op de afscheuring der scheede van de baarmoeder, die dikwijls zonder eenigen bemerkbaren bloedvliet kan plaats vinden en tot hoogst gevaarlijke flaauwten aanleiding geeft. Eindelijk kunnen ook 5) gemoedsaandoeningen, hevige verkoudingen, misflagen in den eetregel en dergelijken flaauwten verwekken, de eerste door regstreekfche inwerking op het zenuwgeftel, de laatste inzonderheid, doordien zij ondermijnende ontlastingen, braking, buikloop, overtollige kraamzuivering, of ook onderdrukking derzelve en, daaruit ontspringende, ophooping en naar de borstholte veroorzaken. De voorzegging, zoowel als de genezing, blijkt alzoo van zelve en rigt zich naar elke bijzondere oorzaak; er blijft ons nu alleen nog over, om bijzonder de opmerkzaamheden op te wekken, om toch bij geenerhande flaauwte eener kraamvrouw het onderzoek door de scheede (*Exploratio per vaginam*) te verwaarloozen, uit hoofde hetzelve ons meestal de belangrijkste inlichting geeft en deszelfs veronachtzaming in sommige gevallen, bij voorbeeld bij verborgene bloedsstorting, bij beleediging der teeldeelen, op zich zelve niet doodelijk zijnde, ligtelijk den dood der pas verlosste te weeg brengt. — Bijaldien men weet, dat eene vrouw tot flaauwten aanleg bezit, dan moet men hare wezenlijke ontwikkeling trachten voor te komen, door de verlosfing met omzigtigheid en geduld te leiden, opdat zij niet te fchielijk plaats grijpe, geene deelen beleedigd worden enz. Terftond na de verlosfing legt men een buikband aan en diene inwendig een opwekkend mid-

middel toe, met bijvoeging van een weinig *Opium*, bij voorbeeld een specerijachtig theeaftreksel, eenigen wijn en dergelijken.

### §. 363.

De hartklopping (*Palpitatio Cordis*) is in het kraambed mede geen buitengewoon verschijnsel, dat somwijlen de flaauwte voorafgaat, doch ook dikwijls op zich zelve bestaat, zonder deze. Zij komt insgelijks in de zwangerschap reeds menigmaal voor, vooral bij de zulken, die ook buiten dezelve veel daarvan leden, en is dikwerf een bloot toeval van *Hysterie*. In het kraambed openbaart zij zich meestal zeer plotseling; de lijderes bespeurt eene klopping in de borst, niet zelden met groote benaauwdheid verbonden; hierbij voegt zich vaak klopping in het hoofd, bedwelming en vermeerderde warmte des gezichts. Daarenboven is de pols zeer verhaast, niet zelden opgezet, en de kraamvrouw wordt gedurende zulk een' aanval zoo angstig, dat zij zich den dood nabij waant. Zelfs na den aanval is het gemoed nog altoos zeer ter neder gedrukt en gevoelt de lijderes zich sterk geschokt, en is gewoonlijk met een algemeen zweet bedekt. Zulke aanvallen komen dan ook wel eens meermalen weder, als wanneer de lijdende in den vrijen tijd een' zeer veranderlijken warmtegraad heeft en veel door winden en oprispingen gekweld wordt. Gewoonlijk is de hartklopping, geen toeval eener andere gevaarlijke ziekte, bij voorbeeld van een *organisch* gebrek des harten, of eene ziekte der baarmoeder zijnde, van weinige beteekenis, hoewel zij dikwijls zeer



hardnekkig is. Als gevolg eener plaatselijke volbloedigheid openbaart zij zich na de bevalling hoogst zeldzaam, maar meer in de eerste maanden der zwangerschap. In de meeste gevallen betoonen de *Nervina*, *Antispasmodica*, *Tonica* en *Derivantia* (afleidende middelen) goede diensten. Men geve *Aether aceticus*, *Aether sulphuricus alcoholicus*, *Tinct. Opii*, *Ammonialia* en dergelijken meer.

### §. 364.

Krampachtige ongesteldheden van den onderbuik komen insgelijks na de verlossing menigvuldiger voor en mogen niet gering geacht worden, naardien zij anderzins ligtelijk tot ontsteking kunnen overgaan. Daartoe behoort vooreerst de maagkramp, die volgens BURNS zeer gevaarlijk is, als zij binnen de drie weken na de verlossing zich vertoont. Deze roemt ter beteugeling derzelve het schielijke gebruik van terpentijn, en als deze niet helpt, zestig tot honderd druppels *Laudanum* met *Aether sulphuric*. 3j en *Spir. aromatic. ammoniacale* 3ij, benevens zuurdeeg op de maagstreek. Gewoonlijk worden zulke vrouwen daarvan gedurende het kraambed aangedaan, die ook vroeger reeds meer daaraan onderhevig waren. Somwijlen voegt zij zich bij opstijgingen der baarmoeder, zoodat gene nalaten en de *Regio epigastrica* opzet en zeer pijnlijk wordt. Ook na overladingen der maag en na het vatten van koude ontstaat de maagkramp niet zelden, en vermindert dan voor eenigen tijd door eene vrijwillige braking. MUR-SINNA prijst daartegen het volgende poeder aan:

R. *Rha-*

R. *Rhabarb.*

*Conchae praep.* āā gr. xv.

*Opii puri* gr. i.

*Camphor.* gr. iij. M. f. p. D. S.

om het uur met veel water, of kamillen-  
thee in te nemen, tot er vermindering  
volgt. Uitwendig roemt hij daarbij omslagen met  
koud water. — STARK heeft inzonderheid veel op  
met de *Asa foetida* en bittere extracten in pillen.  
Anderen met de valeriaan en het *Magisterium Bis-*  
*muthi*.

### §. 365.

Wijders openbaren zich dikwijls schielijk na de  
bevalling kolieken, die plotseling opkomen en  
meest des avonds een begin nemen, soms lang aan-  
houden, over het algemeen echter zich verheffen  
en afnemen, waarbij de pols aldra verhaast wordt.  
Zachte ontlastmiddelen, in vereeniging met kramp-  
werende, bedarende middelen, hebben hier vooral  
goede uitwerkselen. — Een pijnlijk gevoel in de  
streek der nieren kwelt ook somwijlen eenige dagen  
na de verlossing de kraamvrouwen en houdt gere-  
gelde verheffingen; doch hetzelfde wijkt meestal  
spoedig bij het doelmatig gebruik van ontlastmidde-  
len, klisteren, *Opiaten*, stovingen, Spaansche vlie-  
gen enz.

### §. 366.

Ook de opstijging der baarmoeder (*Suffo-*  
*catio uterina*, *Hysterismus*) mogen wij hier niet  
over slaan. Altijd ontstaat dezelve uit groote gevoe-  
ligheid van den *Uterus*, die door eene zekere  
schudding der zenuwen tot allerhande krampachtige



toevallen aanleiding geeft. — De buik zet op, zonder spanning; de lijderes klaagt over benaauwdheid, zamensnoering van de keel, moeilijke ademhaling; de pols is klein en rad en de lijderes bijkans flauw. De baarmoedermond is krampachtig samengetrokken en de kraamvloed onderdrukt. De ziekte sluit meestal geen gevaar in zich, kan echter aanhoudend en bedenkelijk worden, en is veelal zeer hardnekkig. Voorzeker mag ook hier het onderzoek niet veronachtzaamd worden, en de behandeling moet zich over het geheel naar de oorzaken schikken. Gemeenlijk is men genoodzaakt tot de reeds dikwijls vermelde bedarende en krampstillende middelen de toevlugt te nemen.

### §. 367.

Eindelijk moeten wij nog van de moeilijke ademhaling (*Dyspnoea*) gewag maken, die uit onderscheidene oorzaken kan voortvloeijen, en zeer dikwijls geboren wordt uit een' te vroeg en te strak aangelegden buikband. Dikwijls schijnt het middelrif voornamelijk te lijden. De lijderes ontwaart dan gemeenlijk een onvermogen bij de inademing, meestentijds reeds een paar uren na de bevalling; heeft soms pijnen in de zijde, in de heiligbeensstreek, of in den hartkuil, of zij gevoelt eene drukking dwars over het onderste gedeelte der borstholte, waarbij de pols zeer verhaast is en het aangezicht doodelijk bleek er uitziet. Hier gebruikt men sterke krampwerende middelen (*Antispasmodica*), *Opiaten*, *Tinct. valerian.*, *Ammonialia*, *Aeth.* en dergelijken.



## T W E E D E   H O O F D S T U K.

*Van de stuiptrekkingen der kraamvrouwen.**Oorzaken.*

## §. 368.

Wij bepalen ons hier bloot bij eene opgave, van die oorzaken, welke inzonderheid in het kraambed tot stuipen aanleiding geven, en bij het geven van een uittreksel der verschillende vormen derzelve, derzelve gevaar en behandeling, en verwijzen ten opzigte van het algemeene naar datgene, wat op andere plaatsen en inzonderheid II. D. 4°. Stuk, 3°. Afd. 4°. Hoofdstuk over het begrip en den aard der stuiptrekkingen in het algemeen breedvoeriger opgeteekend staat.

## §. 369.

Dat kraamvrouwen gemeenlijk ligt door stuiptrekkingen worden aangedaan, behoeft ons niet te verwonderen, als wij bedenken, dat alle gelegenheidgevende oorzaken tot deze ziekelijke aandoeningen, even als zij buiten het kraambed aanwezig zijn, ook hier voorhanden kunnen zijn; dat de kraamvrouw zoo veel te vatbaarder zal zijn, hoe meer zij in een', door de voorafgegane invloeden, verzwakten toestand verkeert, en hoe gevoeliger haar zenuwgestel is, en dat nu daarbij nog meerdere aanlei-



leidende oorzaken van een' bijzonderen aard zich voegen, waardoor gedurende het kraambed bijzonderlijk stuipen geboren worden. Deze laatste invloeden nu zullen wij hier eenigzins nader verklaren. Bij alle zenuwziekten (en hiertoe moeten wij toch ook zeker de stuipen rekenen) leert ons de ondervinding, dat de eerste aanval, als het ware, de kiem (*Seminium*) tot een' volgenden legt, zoodat zij, die eenmaal een' aanval van *Epilepsie* gehad heeft, gestadig in gevaar verkeert, ander- en meermalen door denzelfven aangedaan te worden. Zulk eene kiem zal zoo veel te vaster zich zetelen, hoe veelvuldiger en sterker aanvallen er voorafgegaan zijn, en wij zien om die reden zoo dikwijls, dat kraamvrouwen door stuiptrekkingen overvallen worden, waar de voorname grond tot derzelver ontwikkeling juist daarin ligt, dat de pas bevallene ook bereids in vorige jaren, of in de laatste zwangerschap (het meeste), of onder de voorafgegane baring daaraan leed, en waar de gelegenheidgevende oorzaken veel te onbeduidend zijn, dan dat men aan dezelve alleen, zonder eene zekere voorbeschiktheid, het ontstaan der ziekte zou kunnen toeschrijven. Wij kunnen derhalve met regt beweren, dat de, voor de bevalling reeds bestaan hebbende, stuiptrekkingen en de daardoor gelegde ziekelijke kiem (*Seminium morborum*) inzonderheid de aanleidende oorzaken van de stuiptrekkingen der kraamvrouwen wierden. Tot de bijzondere hier in aanmerking komende gelegenheidgevende oorzaken echter, behooren nu de volgende:

- 1) Bloedvloeijingen. Het is hier de plaats niet, al die oorzaken te vermelden, welke bloedvloeij-

vloeiing na de bevalling veroorzaken kunnen, doch het is eene algemeen bekende daadzaak, dat zeer dikwijls, na anderzins gelukkig afgeloopene verlosfingen, baarmoederlijke bloedvloeijingen ontstaan kunnen. Deze kunnen nu, gelijk over het algemeen alle ontlastingen van vochten, ligtelijk stuiptrekkingen te weeg brengen: ja wij zien, dat alle dieren, die door verbloeding omkomen, stuiptrekkende sterven. Gewoonlijk geeft men als grond der ziekelijke verschijnselen het volgende op: de reden, dat vochtontlastingen, zegt men, zoo spoedig kramp verwekken, is, dat zij, van den eenen kant door ontneming van bewerktuigde stof, verflapping en zwakte der vaste deelen te weeg brengen, van den anderen de gevoeligheid van het zenuwgestel verhoogen. BICHAT daarentegen erkent de zoogenaamde ontkenkende opwekking (*negative Excitation*) als grondoorzaak: de hersenen worden hier door gemis van bloed in een' onnatuurlijken toestand gebragt, hetwelk hij een' ontkennenden prikkel heet en dat tot stuiptrekkingen aanleiding zou geven. Deze stelling is in allen gevalle zeer fcherpzinnig, al verklaart zij ons ook het wezen der ziekte niet. Trouwens zoo veel is bewezen, dat de hersenen, als het middelpunt van het zenuwgestel, hier op eenigerhande wijze aangedaan worden. 2) Teruggeblevene lichamen in de baarmoeder. Meestal blijven er na de verlosfing, het bloedverlies mag dan bij de baring aanmerkelijk, of luttel geweest zijn, — gestold bloed, zoogenoemde bloedklonters terug. Doch er kunnen ook enkele deelen der nageboorte blijven zitten, ja in zeldzame gevallen kunnen afgebrokene in-



instrumenten tot stuiptrekkingen na de geboorte aanleiding geven. 3) Beledigingen van den Uterus. De *Uterus* kan, of door instrumenten beledigd, of door hevige zamentrekkingen, of eindelijk door eene te sterke drukking van de zijde des kinds tot aan stuiptrekkingen toe geprikkeld worden. Dikwerf ontspruiten dezelve uit eene ontsteking der baarmoeder, of na moeilijke verlosfingen, bij eene ongeschikte behandeling der nageboorte, door verandering der natuurlijke ligging des *Uterus*. Wij namelijk, hebben reeds bij een *Retro-* en *Anteversio Uteri* stuiptrekkingen zien geboren worden. 4) Beledigingen van andere deelen. Verscheuring der scheede, van den bilnaad en dergelijken zijn niet zelden oorzaak van wondkoortsen, die, als zij hevig zijn, ook meerendeels door stuipachtige toevallen vergezeld gaan. Menigmaal ligt de grond van het ontstaan van stuipen bij kraamvrouwen in eene ontstekingsachtige aandoening des ruggemergs, waar ons de ter gelijker tijd te voorschijn tredende, eigenaardige kenteekenen der ontsteking van het ruggemerg (*Myelitis*) inlichting geven. Wij hebben een merkwaardig geval van dien aard waargenomen, waar bij eene kraamvrouw de *Myelitis* met geweldige achteroverkromming (*Opisthotonus*) en algemeene stuiptrekkingen zich openbaarde, en waar hoofdzakelijk de aanlegging van bloedzuigers langs de gansche wervelzuil zich zeer heilzaam betoonde. 5) Onderdrukking en ongeregeldeheid der kraamverrigtingen wordt hier gemeenlijk ook tot de aanleidende oorzaken gerekend. Zoo volgen somwijlen ook stuiptrekkingen,

als

als de zogaffcheiding, of de kraamvloed plotseling onderdrukt wordt, of als de eene, of de andere tegennatuurlijk verminderd is; wij kunnen nogtans de onderdrukte of veranderde kraamzuivering niet wezenlijk voor de oorzaak der stuipen houden, aangezien gene zelve immers slechts het gevolg eener andere oorzaak is, zoo als bij voorbeeld der *Metritis*, der wondkoorts, kraamvrouwkoorts enz., en deze derhalve eigenlijk tot de stuiptrekkingen in een oorzakelijk verband staat. In dit opzigt moeten wij den heer MIGUEL ten eenemale gelijk geven, die eene verhandeling over dit onderwerp geschreven heeft. — Nog eer zou eene zogverplaatfing naar het hoofd op zich zelve alleen tot stuipen gelegenheid kunnen geven, en vermag hier niet over het hoofd gezien worden. 6) Misbruik der ontlastende geneeswijze. Hiertoe behoort vooral het misbruik, dat men van *drastische*, te prikkelende en verhittende ontlastmiddelen maakte en tevens nog maakt, veelal met het op zich zelve niet zelden bereids schadelijke oogmerk, om de zogaffcheiding te onderdrukken. Doch ook het verkeerde gebruik der bloedontlastingen in de zwangerschap behoort hiertoe, in zoo verre zij de reeds daar zijnde natuurlijke geneigdheid tot stuipen, door verhoogde gevoeligheid en zwakte nog vermeerdert. Eindelijk kunnen ook 7) misflagen in den eetregel en gemoedsaandoeningen zeer ligt door stuipen achtervolgd worden, hetgeen insgelijks zeer gemakkelijk te verklaren is, als wij ons datgene herinneren, wat wij vroeger over de natuurlijke prikkelbaarheid der kraamvrouwen gezegd hebben.



De stuiptrekkingen der kraamvrouwen nu kunnen algemeen en bepaald zijn, en alle, met spiervezelen bedeelde, werktuigen kunnen daardoor aangedaan worden. De meeste, in het kraambed voorkomende, vorm is de *Eclampsia* s. *Epilepsia puerperarum*. Deze is eene haastige *Epilepsie*, die tevens al in de zwangerschap en onder de baring verschijnen kan. Zij vertoont zich, of onder den vorm *a*) van *Ecl. sanguinea*, bij jonge saprijke vrouwen, die sterk de maandstonden hadden, en welke men verzuimd heeft te aderlaten, en zoo veel te eer, als de kraamvloed onderdrukt, of te gering is. Alsdan ontwikkelen zich alle verschijnselen van algemeene volbloedigheid (*Plethora universalis*) en inzonderheid toevallen van ophoopingten naar het hoofd. Of de ziekte geeft zich (en dit ziet men meer, ofschoon het ook gevaarlijker is) *b*) als *Ecl. synoptica* te kennen, die dan naar haren oorsprong met zeer veel regt eene *Eclampsia ab exinatione* (door uitputting) mag genoemd worden en na een groot bloedverlies plaats grijpt, of na te schielijke verlosfingen, zonder dat daarbij veel bloed verloren gaat. Hier zijn vooral de spieren van het aangezicht hevig door stuiptrekkingen aangetast; de pols is zwak, afgebroken of onmerkbaar; de kranke verkeert in een' bewusteloozen toestand, is slaapzuchtig, onbeweeglijk, met koude en stijve ledematen. De stuiptrekkingen komen aanvallenderwijze, dikwijls meermalen terug en loopen dan zeker op eene zware flauwte uit, die niet zelden met den dood eindigt. Som-

wij-

wijlen en in het bijzonder na fchielijke verlosfingen zonder buitengewoon bloedverlies gaan de ftuiptrekkingen, kramp in de maag en het middelrif vooraf (F. SCHMULZ, *diagnost. Tabellen*). Wijders kunnen misfagen in de diët, gemoedsaandoeningen en dergelijken haar te weeg brengen. Tot de bijzondere ftuiptrekkingen kan men de hik, braking, hartklopping en in een' zekeren zin ook de naweeën brengen. Hier enkel een paar woorden over de laaften. Zij behooren ongetwijfeld gelijk de baringsweeën tot de meer natuurlijke en gewone verschijnselen en verrigtingen van den *Uterus*, die, wel is waar, niet volftrekt, zoo als gene, behoeven te verfchijnen, echter toch als bewijzen der herftellende natuur (*Molimina naturae medicatricis*) aan te merken zijn, welke dienen moeten, om den *Uterus* langzamerhand van de, in hem vervatte, bloedklonters, overblijffels der nageboorte enz. te ontdoen. Men kan haar dus alleen dan tot de wezenlijk ziekelijke verschijnselen en bijgevolg tot de ftuiptrekkingen tellen, als zij een' meer hevigen graad, dan gewoonlijk, bereiken; als zij heviger worden, dan de baringsweeën, als krampachtige toevallen, koortfge bewegingen, ftuiptrekkingen van andere deelen er bijkomen. Dit mag dan misfchien in de meeste gevallen een gevolg der op eenigerhande wijze gebrekkige, te vast vergroeide, of verdeelde nageboorte zijn; het kan nogtans ook als een zuiver *hysterisch* toeval bij eene te hoog geftegene gevoeligheid des *Uterus* zich vertoonen, en vereifcht dienvolgens nu eene meer ontftekingwerende, dan eene meer krampftillende geneeswijze.



*Voorzegging.*

## §. 371.

Ten aanzien der voorzegging is men het niet ééns: zoo hebben eenigen, zoo als bij voorbeeld *ASTRUC*, *TISSOT* de stuipen der kraamvrouwen voor gevaarlijker gehouden, dan die der zwangeren en barenden. *MAURICEAU* en *LEVRET* zijn van een tegengesteld gevoelen; de laatste evenwel houdt de, bij kraamvrouwen uit sterk bloedverlies en uitputting ontstane, stuipen voor de gevaarlijkste, en met regt! *GARDIEN* en *MIGUEL* houden die der barenden voor de gevaarlijkste. Wij zijn het over het geheel met dit gevoelen eens, doch de bijzondere voorzegging zal zich immer naar de aanleidende oorzaken moeten rigten en des te ongunstiger zijn, hoe gewigtiger, en moeilijker deze weg te nemen zijn.

*Geneeswijze.*

## §. 372.

Zekere regelen voor de behandeling op te geven, is even onmogelijk als voor de *Prognosis*. Ook hier moet ons hoofddoel zijn, die nadeelige invloeden te verhoeden, welke tot het ontstaan van stuiptrekkingen aanleiding kunnen geven, en de gelegenheidgevende oorzaken, welke de ziekte reeds voortgebragt hebben, ware het mogelijk, te beteugelen. Hieruit blijkt het dus reeds van zelve, wat ons in elk bijzonder geval te doen sta. Slechts dit merken wij in het algemeen aan, dat bloedontlastingen en  
ont-

ontstekingwerende middelen gewoonlijk hier minder zijn aangewezen, dan bij de sluipen der zwangeren en barenden; want veelal liggen hier verzwakkende invloeden ten grondslag, die eene meer prikkelende behandeling vereischen.

Wat de *Eclampsia puerperarum* betreft, deze moet insgelijks overeenkomstig haren aard behandeld worden. Zij is aanvankelijk niet zelden van een ontstekingachtig karakter, vooral bij vochtrijke, prikkelbare kraamvrouwen, en vordert alsdan een sterk ontstekingwerend geneesplan, somwijlen zelfs herhaalde aderlatingen op een' en denzelfden dag; bloedzuigers aan het voorhoofd, koude omslagen van SCHMUCKER, of nog beter met eene, met ijs gevulde, blaas op het hoofd; inwendig salpeter. In het begin enkel, naderhand, als de pols niet ontstekingachtig meer is, met bedarende middelen, bij voorbeeld *Camphor. Extr. Opii* verbonden; wijders lavementen, zuurdeeg, Spaansche vliegen aan de kuiten; bij hevige pijnen, een' zeer sterk samengetrokken *Uterus* en onderdrukten kraamvloed, pappen van *Species emollientes* met *Herba Cicutae*, *Hyoscyami*, *Belladonnae*, inspuitingen in de scheede van genoemde kruidenaftreksels. De *Eclamps. synoptica* is veelal doodelijk, als zij na aanmerkelijke ondermijning van krachten en bloedverlies zich ontwikkelt; men moet nogtans prikkelende en bedarende middelen aanwenden: *Tinct. thebaica*, *Aether aceticus*, wijn, specerijachtige omslagen op den onderbuik, halve baden en dergelijken. De zogaffscheiding dient volstrekt aan den gang gehouden te worden, trouwens, men moet de borsten kunstmatig van het zog



ontdoen, geenszins zulks door het kind laten ver-  
rigten.

L I T T E R A T U U R.

SELLE, *med. clin.*

FRORIEP'S *Handbuch der Geburtshülfe.*

REIL'S *Fieberlehre.* 4ter Bd.

RICHTER'S *Therapie*, 7ter Bd.

ROWLEY'S *prakt. Abhandl. über die Frauenzimmerkrank-  
heiten.* Aus dem Engl. v. MICHAËLIS. Breslau 1799.

PETRI, *Dissert. inaug. de convulsion. gravid. parturient.  
et puerperarum.* Gotting. 1790.

MIGUEL'S *Abhandlung von den Convulsionen bei Schwän-  
gern, Gebärenden u. Wochnerinnen.* Aus dem Franz.  
v. CERUTTI. Leipzig 1824.



## DERDE HOOFDSTUK.

*Van de Manie en Melancholie  
der kraamvrouwen.**Begrip.*

## §. 373.

Onder *Manie* en *Melancholie* (*Mania* en *Melancholia puerperarum*) verstaan wij de bekende vormen van ongesteldheden der ziel, als zij bij kraamvrouwen zich vertoonen. Zij zijn van dezelfde ziekte, zoo als zij buiten het kraambed zich openbaren, in het wezenlijke niet onderscheiden, doch men heeft er eene bijzondere soort van gemaakt, aangezien de *Mania* en *Melancholia Puerperarum* naar evenredigheid veelvuldiger plaats grijpen, en met die invloeden, welke hier bijzonderlijk in aanmerking komen, bij voorbeeld met den kraamvloed, de verrigting van het zogen zeer dikwijls in een oorzakelijk verband staan.

*Diagnosis en Verloop.*

## §. 374.

De ziekte ontwikkelt zich zelden voor den derden dag na de verlossing, veelal eerst op den veertienden dag en nog later. Meestentijds openbaart zij zich plotseling, zonder eenige voorboden, soms evenwel



onder onzekere voorteekenen van een' onrustigen nacht, terwijl de lijderessen in den beginne gewoonlijk meer tot dolheid, dan tot droefgeestigheid geneigd zijn, zoodat niet zelden de *Manie* eerst na eenigen tijd in *Melancholie* overgaat. Gaan voorboden de ziekte vooraf, dan breekt de eigenlijke ziekte gemeenlijk spoedig daarop uit; en zij bestaan dan in allerlei zenuw- en krampachtige toevallen: de zieken zijn onrustig, werpen zich van de eene zijde op de andere, zijn of slapeloos of hebben althans een' onrustigen slaap, schrikken dikwijls in denzelven wakker, hebben ijsfelijke droomen, worden door algemeene en plaatselijke stuiptrekkingen aangedaan, klagen over moêheid, hoofdpijn, trekking in de ledematen; zijn zeer prikkelbaar, tot toorn geneigd, of angstig, schuw, buitengewoon vreesachtig; hare gansche houding is over het algemeen veranderd; zij zijn somwijlen zeer spraakzaam, praten gedurig over een en hetzelfde onderwerp, of zij uiten, geheel tegen hare gewoonte, onvoegzame taal, vloeken, bezweringen en dergelijken. De huiduitwaseming is of geheel onderdrukt, of de huid zeer heet, door zweet bedekt; de onderbuik is meestal verstopt; de pols zeer veranderlijk, meestal haastig; de tong met witte slijm overtogen; de *Urin* is in den beginne wit, citroenkleurig; zij hebben dorst; de eetlust is of natuurlijk, of zij willen niets naar zich nemen. In al deze verschijnselen echter treft men doorgaans niets bestendigs aan. Komt nu de ziekte werkelijk tot stand, dan zijn de kraamvrouwen in den beginne gemeenlijk door het dolle heên, en leggen dan alle verschijnselen eener razende dolheid

heid (*Mania furubunda*) aan den dag. Zij spreken en handelen dan geheel verkeerd, hebben veelal geene zelfbewustheid; zij brengen onvoegzame, verstandelooze taal voort; zij beschimpen alle omstanders, spuwen of slaan om zich heen; of zij lagchen, zingen (\*), willen het bed uitspringen en hebben dikwijls veel kracht, zoodat eenige mannen naauwelijks in staat zijn, haar te houden, Hierbij komen dan veeltijds allerlei krampachtige bewegingen in onderscheidene deelen des ligchaams, vertrekkingen van het gezigt, wild rondrollende oogen, verwijdering der oogappels, rilling der ledematen en dergelijken. De lijderefsen leggen soms eene buitengewone hardnekkigheid aan den dag, willen noch spijzen, noch geneesmiddelen gebruiken; slapen schier niet of toch zeer onrustig; de ademhaling is prangende, snel; de pols somwijlen verhaast, somwijlen langzaam, veelal zeer veranderlijk; de *Lochiën* zijn of geregeld, of in hoeveelheid en hoedanigheid veranderd, te gering, geheel onderdrukt, of te overtollig, stinkend, etterachtig, miskleurig, wegvretend. De zogaffcheiding blijft gemeenlijk onveranderd, ja de lijderefsen worden dikwijls plotseling, terwijl zij het kind zogen, door een' aanval overrompeld. De onderbuik is gemeenlijk verstopt; zij hebben soms koliekaardige pijnen, lijden aan persingen en moeilijke waterlozing, zoodat onder aan-

hou-

(\*) Zoo verlost en behandelde ik eene door *Mania* aangedane kraamvrouw in *Berlijn*, welke voortreffelijk het klavier bespeelde; onophoudelijk speelde zij met de handen, hare stem daarbij parende.



houdende pogingen om ontlasting te krijgen en de *Urin* te lozen, de hoofdpijn dikwijls eene aanmerkelijke hoogte bereikt. In dezen vorm heeft de ziekte veel van het haastige *Dilirium* bij *Encephalitis*, doch de kenschetsende teekenen der laatste ontbreken. Bij deze namelijk zijn er duidelijke blijken van ophooping van bloed naar het hoofd; het aangezicht is rood, opgezet; de kropslagaderen kloppen hevig; de oogen zijn rood, zeer schuw voor het licht, tevens toch meestal de oogappels verwijd; de ijlhoofdigheid is heviger, woedender, zelden tuschenpoozend; de hoofdpijn bestendiger; de pols duidelijk ontstekingsachtig, niet zoo veranderlijk, of traag; de tong is altijd zuiver en zeer rood; het gehoor dikwijls zeer scherp en fijn; de *Urin* meestentijds donker rood enz. Niettegenstaande dit alles is het niet te loochenen, dat de aanvankelijke ontwikkeling der *Encephalitis*, als de koorts nog zeer onduidelijk is en als de ziekte kort na de verlossing zich ontwikkelt, ligtelijk met de beginnende *Mania Puerperarum* kan verwisfeld worden. Deze nu heeft gemeenlijk afwisselingen en een zeer verschillend verloop. Er zijn voorbeelden, waar de *Mania* reeds binnen de twee uren geheel over is, doch over het algemeen houdt zij eenige weken en zelfs maanden aan. In dit geval gaat zij dan gewoonlijk in droefgeestigheid over, die insgelijks van een' onzekeren duur is en dikwerf tot aan eene nieuwe ontvanging blijft bestaan. De ziekte heeft meestal een' tuschenpoozenden *Typus* en de lijderessen zijn, de vrije tijd uitgezonderd, treurig, gemelijk, voor zich zelven heen, beminnen de een-

zaamheid, nemen aan niets deel, bekommeren zich noch om hare huisfelijke belangen, noch om haar kind, ja somwijlen willen zij het laatste niet als het hare erkennen en koesteren haat jegens haren echtgenoot. Jegens haren Geneeskundige leggen zij niet zelden wantrouwen en haat aan den dag. Men moet haar tot eten en drinken en tot andere ligchamelijke bezigheden aanzetten, en dikwijls zijn ze niet vrij van bloôzinnigheid. In de vrije dagen daarentegen, zijn ze vriendelijker, herinneren zich menigmaal de begane dwaasheden, en smeken uit dien hoofde om vergiffenis; verlangen haar kind te zien, liefkozen hetzelfde en zijn zeer verstandig. Zij zien er gewoonlijk zeer bleek en aangedaan uit; hebben geen behoorlijken eetlust, geneigdheid tot verstopping, klagen over allerlei geestverbijsteringen en worden magerder.

### Oorzaken.

#### §. 375.

Ook hier liggen, gelijk bij alle ongesteldheden van den geest, geestige (*psychische*) en stoffelijke (*somatische*) oorzaken ten grondslag, die de ontwikkeling der ziekte zoo veel te eerder bevorderen, hoe grooter de aanleg daartoe is, en het is niet te ontkennen, dat het kraambed zelf den grond eener ziekelijke kiem legt, die de wording dezer ziekte zeer bevordert. De, door de voorafgegane zwangerschap en geboorte te weeg gebragte, velerlei aandoeningen van den geest en inspanningen des ligchaams, de daardoor veroorzaakte zwakte en



gevoeligheid van het gansche zenuwgestel maken de kraamvrouwen voor ieder' uitwendigen indruk zoo veel te gevoeliger, en kunnen dan onder zekere omstandigheden ligt in *Manie* en *Melancholie* ont-aarden. In weerwil van dit alles, blijft de naaste oorzaak der ziekte voor ons nog een raadsel; het is niet te ontkennen, dat sommige vrouwen er een' erfelijken aanleg toe bezitten, zoodat zij in ieder kraambed er door overvallen worden. Anderen worden er in iedere zwangerschap door gekweld; ja men heeft enkele voorbeelden, dat vrouwen nooit er van bevrijd zijn, dan juist tijdens haren zwangeren staat. Deze vlugtige opmerkingen pleiten zoo veel te meer voor de juistheid der vorige bewering, dat wij, name-lijk, den aard van dezen aanleg en der ziekte zelve nog niet juist kennen. Eenigen stellen voor grondoorzaak eene zogverplaatsing (*Metastasis lactea*), doch voor-zeker zeer verkeerd. De zogbereiding is dikwijls niet alleen niet onderdrukt, maar ik heb waarge-nomen, dat de ziekte midden onder het zogen kan uitbreken. Tot de gelegenheidgevende oorzaken be-hooren nu al de zoodanige invloeden, die ook an-dere ziekten in het kraambed kunnen doen ontstaan: gemoedsaandoeningen, ligchamelijke prikkelingen van een' *mechanischen* of *dynamischen* aard; misbruik der *Narcotica*, der geestrijke middelen, mislagen in de diët van allerlerlei soort, ongeregeldheid der kraamzuiveringen, inzonderheid te sterke kraamvloed. Eindelijk kunnen ook wormen er aanleiding toe geven.

*Voorzegging.*

## §. 376.

Over het geheel genomen is dezelve gunstig en het is uitgemaakt zeker, dat, van alle zielsongesteldheden de *Mania* en *Melancholia Puerperarum* de beste voorzegging gedoogen. De ziekte kan dikwijls, inzonderheid onder den vorm van droefgeestigheid, eenige maanden slepende blijven, doch de lijderezen worden zeker altijd er van hersteld. Op zich zelve en in haren oorspronkelijken vorm neemt de ziekte zeker nooit een doodelijk einde. Hoe korter zij eerst geduurd heeft, des te eerder kan men genezing verwachten. Het is een zeer gunstig teeken, als de maandstonen geregeld weder verschijnen, die dan dikwijls zwartachtig bloed bevatten.

*Geneeswijze.*

## §. 377.

Bij de behandeling dezer ziekte moet men de aanleidende oorzaken bestendig voor oogen houden en naar haar bijzonder karakter wijzigen, en men zal ook hier, gelijk bij de meeste ongesteldheden der ziel zien, dat veelal ligchamelijke oorzaken ten grondslag liggen, doch men mag evenwel de *psysische* geneeswijze niet geheel en al achterwege laten. Eerstelijk dan moet de Geneeskundige trachten uit te vorschen, wat de ziekte veroorzaakt hebbe, en heeft men eene gelegenheidgevende oorzaak ontdekt, dan



dan moet deze door eene, naar omftandigheden geëvenredigde, handelwijze verwijderd, of althans moeten hare fchadelijke uitwerkfelen, zoo het mogelijk is, voorkomen worden. Heeft de lijderes vrije tufchentijden, dan gebruike men die, om haar vertrouwen te erlangen, waaromtrent men natuurlijk geene bijzondere regelen kan opgeven; men moet op haar gemoed trachten te werken, haar liefderijk, deelnemend behandelen, zonder daarbij de noodige waar- digheid en den, naar ftrengheid zweemenden, ernst te laten varen. Men verwijdere over het algemeen alles, wat de lijdende flechts het minfte prikkelen kan, onderrigte de oppasfter behoorlijk, veroorlove geene bezoeken, lette fteeds op de kraamzuivering, zorg voor genoegzame buiksontlasting enz. Zoo veel in het algemeen! De ziekte moet nu overeenkomftig haren aard behandeld worden. Zij behoort duideljk tot de zenuwachtige, doch treedt gemeenlijk onder twee vormen te voorfchijn, en is of eenigermate ontfteking-, of zuiver zenuwachtig, en vordert derhalve een onderscheiden geneesplan.

### §. 378.

Bij de zuivere, enkelvoudige *Manie* is dit evenwel, fchoon de ziekte ook aanvankelijk een ontftekingachtig karakter heeft, zeldzaam zoo duideljk en in zulk een' hoogen graad, dat men eene fterk ontftekingwerende behandeling behoeft; men moet hier met de bloedontlasting zeer omzigtig zijn; zij kan, ontijdig in het werk gefield, de ziekte juist eerst wezenlijk boosaardig maken, en is flechts dan noodig, wanneer de koorts hevig en de pols wer-  
ke-

kelijk ontstekingsachtig is, derhalve bij wezenlijke ontstekingsachtige zamengesteldheden; want behalve dit, wordt de dolheid gemeenlijk zelden zoo woedend, dat men aderlaten moet. Daarentegen leggen men veelvuldiger bloedzuigers aan de slapen, en daaraan heeft men meestentijds genoeg. Ook BURNS, ESQUIROL en anderen zijn van dit gevoelen. In plaats der bloedzuigers, kan men ook van bloedige koppen gebruik maken. Inwendig geve men dan verkoelende, zachte ontlastmiddelen: *Cremor Tart.*, *Oxymel Squillit*, plantenzuren, *Pulpa Prunorum*, *Tamarind.*, *Sal Seignette*, *Citras Potassae*, *Mixt. Riverii*, zelfs *Nitrum*. Uitwendig verdienen naast de bloedzuigers, de koude stovingen de eerste plaats. Men laat het hoofdhaar geheel of gedeeltelijk afscheren, of (hetgeen aanvankelijk genoeg is) men laat het haar op het hoofd iets dunnen en ter weërszijden scheiden, vlijtig omslagen van ijskoud water, water en azijn, sneeuw- of ijswater, of ook van werkelijk ijs, door middel eener blaas gebruik makende. Buitendien wende men afleidende, openende of meer prikkelende klisteren, voetbaden, zuurdeeg aan de kuit en dergelijken meer aan. Langzamerhand en hoe meer de ziekte het zenuwachtige karakter verkrijgt, gaat men tot de *Nervina* over. Hier heeft men dan de kamfer tot drie, vier, vijf *per dos.* aangeprezen, wijders het *Extractum Hyoscyami* van twee tot drie greinen alle drie tot vier uren; het *Extr. Stramonii per dos.* aanvankelijk een half grein, of ook de Tinctuur daarvan, de *Belladonna*, *Digitalis* en zelfs het heulsap, het laatste echter behoort hier niet te huis, vermits het de lijdende

dik-



dikwijls nog meer opwekt. Tevens neemt men hier de zoogenaamde uitwendige afleidende middelen (*Derivantia*) te baat; *Vesicatoria* in den nek, aan de kuit en dergelijken meer. Duurt de ziekte nu langer, dan het kraambed, als wanneer zij veelal onder de gedaante van *Melancholie* zich vertoont, dan moet men een' meer regtstreeks tegenprikkelenden weg inslaan. Dan komt de walging en braking verwekkende geneeswijze te pas, alzoo braakwijnsteen in kleine giften, enkel of vereenigd met *Tartris Potassae*, *Sulphas Potassae*; bij herhaling geheele braakmiddelen, het beste *Tartris Potassae stib.* met *Ipecacuan.* en *Puly. Amyli* als braakpoeder; warme baden en in dezelve koude omslagen op het hoofd, overgietende en stortbaden, verder pijnverwekkende middelen, Spaansche vliegen, mostaardpappen en haarfnoeren. Het is mede eene zaak van het hoogste gewigt, de lijderessen uit haren dagelijkschen werkkring te brengen; men voere haar naar het land, trachte haar doelmatig bezig te houden; zorg steeds voor open lijf, voor een' ligt te verteren, voedzamen eetregel; dagelijksche beweging in de vrije lucht en behandel haar in het geheel als ieder andere zielszieke. *Drastica*, *Narcotica* heeft men hier ook aangeprezen, doch wij twijfelen, of die in het slepende *Stadium* wel iets zullen uitrigten. Bij de herstelling poge men de lijderes door eene kleine reis, aangename bezigheid en behoedzame terugkeering in de oude betrekkingen te verstrooijen, en de wederinstorting te verhoeden. Hebben de lijderessen een' erfelijken aanleg tot *Manie*, dan moet men, wanneer er andermaal zwangerschap plaats

plaats heeft, met zorgvuldigheid, de uitbarsting der ziekte op alle mogelijke wijzen trachten te keer te gaan. — Hier kan het dikwijls te pas komen, tijdens en inzonderheid tegen het einde der zwangerschap ader te laten; behalve dat, zorg men voor behoorlijke buiksonstlasting. Na de verlossing verwijdere men alles, wat slechts het minste prikkelen kan; de eetregel zij zacht, de middelen bedarende: *Camphor*, *Extr. Hyoscyami*, hetwelk inzonderheid tegen de zoo lastige slapeloosheid wordt aanprezen; BURNS is van gedachten, dat men dergelijke kraamvrouwen zoo vroeg mogelijk uit het kraambed nemen en ze allerlei kleine bezigheden geven moet, die het ligchaam niet inspannen en den geest vervrolijken. Grijpt er niet spoedig weder zwangerschap plaats, en dat is immer eene hoogst wenschelijke zaak, opdat de vrouw eens goed op haar verhaal kome, dan trachte men in den vrijen tijd den aanleg tot *Manie* geheel te verdelgen. Hiertoe verdienen dan oplosfende, zacht versterkende middelen: valeriaan, *Fol. aurantior.*, *Quassia*, *Murias Ammoniae*, *Martialia*, verder zoutbaden, ijzerbevattende baden en inzonderheid de zeebaden de meeste aanprijzing.

#### L I T T E R A T U U R.

BERGER, *Dissert. de puerperarum mania et melancholia.*  
Götting. 1745.

JANI in STARK's *Archiv.* II. pag. 65.

RASCHER, *Diss. de mania et melancholia puerperarum.*  
Erf. 1794.



F. W. DORFMÜLLER'S *Beitrag zur Behandlung des Wahnsinns der Kindbetterinnen*, in STARK'S *neuem Archiv*.  
I St. N<sup>o</sup>. 3.

BURNS, *l. c.*

REIL'S *Fieberlehre*. Th. IV.

SELLE, *med. clinic.*

ROWLEY, *l. c.*

JACKERT, *de mania puerperali diss. inaugur. Berolin.* 1821.

*Des Verfassers Journal für Geburtshülfe*. III. Bd. 3 St.  
p. 448.



## VIERDE HOOFDSTUK.

*Van de buikvliesontsteking der kraamvrouwen.**Begrip en geschiedenis der ziekte.*

## §. 380.

Onder *Peritonitis puerperalis* verstaan wij de zuivere, eenvoudige ontsteking van het buikvlies, als wijvlies, gelijk die ontstekingsachtige aandoening, welke wij ook in de *Pleura* en in de wijvliezen der hersenen aantreffen. Men was lang oneenig, of de wijvliezen over het algemeen wel in ontsteking konden verkeeren en zelfs nu nog vindt men verdienstelijke mannen, welke van eene *Pleuritis* en *Peritonitis*, als werkelijke ontsteking, niets weten willen. Wij zijn evenwel, met de meeste Geneeskundigen reeds lang van gedachten geweest, dat ook de wijvliezen werkelijk ontstoken kunnen zijn. Trouwens, het is eene andere vraag, of het buikvlies op zich zelve ontstoken kan zijn, zonder de daaronder liggende deelen tevens mede aan te doen. De vroegere Genees- en Ontleedkundigen, te weten BONETUS, MORGAGNI en anderen hielden de ontsteking van het buikvlies altoos voor eene *sympatistische* aandoening van andere ontstekingen in den onderbuik en ontkenden derhalve het daarzijn eener *Peritonitis simplex, genuina s. idiopathica*. JOHNSTON en WALTER komen er het allereerst vooruit, dat dit

IV. D. 3°. en 4°. st. R r vlies



vlies op zich zelve ontstoken kan zijn en die toevallen veroorzaakt, welke men gemeenlijk aan de kraamvrouwkoorts toekent.

BICHAT dan maakte later op de afgescheidene gesteldheid van sommige weeffels opmerkzaam, en toonde namelijk door eene aanmerkelijke reeks van proeven, dat deelen, die laagswijze aan elkander grenzen, toch ten aanzien van derzelver ziekelijke aandoeningen onafhankelijk van elkander kunnen zijn. Dit voetspoor volgende, heeft GASC in zijne *Dissertatione (sur les maladies des fièvres à la suite des couches etc.)* duidelijk bewezen, dat het buikvlies enkel ontstoken kan zijn, zonder de onderliggende weeffels mede aan te doen, ja zelfs, dat in vele gevallen, de, in het slijmvlies zetelende, ontsteking verdwijnt, zoodra zij zich in het wijvlies openbaart. Dit gevoelen nu bevestigen ook meerdere Fransche en Engelsche Artsen. Zoo zegt JOHN DAVIES in zijne voortreffelijke verhandeling over de kraamvrouwkoorts: „Ieder deel heeft zijne bijzondere verwantschap, die uit zijne eigenaardig gewijzigde gesteldheid voortvloeit, en zelfstandigheden, die na deelige verwantschappen voor het eene deel bezitten, hebben veelligt op andere deze betrekking niet. Om die reden is het eene deel met celweeffel, een ander met het slijmvlies, een derde met het wijvlies vereenigd enz. Eene ongesteldheid kan zich van de eene plaats naar eene anders gestelde verspreiden, bij voorbeeld van het buikvlies tot den spierrok der darmen, doch over het algemeen heeft zij eene bijzondere neiging, om in de verdere uitbreiding van hetzelfde weeffel voort te gaan. Het

is derhalve eene algemeen geldende natuurwet, dat eene stof, die verwoestende eigenschappen voor het eene weeffel bezit, niet zoo op een ander werkt." De beste verklaring van deze ziekte en hare ziekelijke veranderingen zijn wij aan den Heer SCOUTETTEN verschuldigd, die in zijne zaakrijke, reeds vroeger vermelde verhandeling over de *pathologische* ontleedkunde van het buikvlies, met de grootste nauwkeurigheid, den zetel en de gevolgen der *Peritonitis* beschrijft, en wij betuigen met genoegen, dat wij in deze zeer rijke bron de gewigtigste onderrigtingen en zeer dikwijls de schoonste bevestiging onzer eigene waarnemingen gevonden, en gene daarom volgaarne ten nutte der wetenschap gebruikt hebben. De *Peritonitis puerperalis* is dienvolgens eene ontsteking van het buikvlies bij kraamvrouwen. Zij is van dezelfde ziekte, zoo als zij buiten het kraambed, of ook bij mannen voorkomt, in het wezenlijke volstrekt niet onderscheiden; en het eenige onderscheid, dat er tusfchen *Peritonitis puerperalis* en buikvliesontstekingen bestaat, ligt in eenige bijomftandigheden, die met de voorafgegane zwangerschap, de verlossing en derzelve gevolgen in nader betrekking ftaan. Al die wezenlijke oorzaken, welke gemeenlijk de *Peritonitis* verwekken kunnen, komen hier derhalve in aanmerking: doch men vergeete niet, dat menigerlei eigendommelijke, door den, om het zoo eens uit te drukken, bijzonderen toefland van het kraambed daargestelde, oorzaak deze ziekte in het kraambed veel fpoediger doet ontwikkelen en haar van ernstiger aard kan maken, dan wanneer zij buiten hetzelve zich openbaart, of bij mannen



zich opdoet. Deze ziekte nu heeft of een haastig of een traag verloop. In het eerste geval ontwikkelt zij zich plotseling met zeer openbare ziekteverschijnselen en eindigt schielijk; in het laatste geval is zij, of het gevolg en de uitgang der haastige buikvliesontsteking, of zij doet zich als oorspronkelijk *chronische* ontsteking onder langzame en onduidelijk te voorschijn tredende teekenen op, zonder dat de lijderes zelve het bespeurt. Ten aanzien van den voortgang der *Peritonitis* moeten wij wijders nog aanmerken, dat dezelve of het *Peritoneum* in deszelfs ganschen omvang inneemt, of bloot tot bijzondere deelen van hetzelfde zich bepaalt, waaruit ook de verschillende benamingen ontstaan, zoo als bij voorbeeld *Omentitis*, *Epiploïtis*, *Mesenteritis*, aan deze ziekte gegeven, zoodra men veronderstelde, dat zij een der opgegevene deelen innam. Blijkens de waarnemingen van den heer SCOUTETTEN kunnen alle deelen van het buikvlies ontstoken zijn: eenige deelen worden veelvuldiger in de ontsteking betrokken, dan andere, zoo bij voorbeeld is het *Mesocolon transversum* en het darmscheil zeldzamer ontstoken, dan dat gedeelte van het buikvlies, hetwelk den vrijen rand der darmen overtrekt. Dat gedeelte van hetzelfde, hetwelk de pisblaas bekleedt, is meer door ontsteking aangedaan, dan dat, hetwelk het middelrif bedekt.

### *Diagnosīs.*

#### §. 381.

De haastige darmontsteking openbaart zich gewoonlijk een paar dagen na de verlossing en veelal vroeger dan

dan de *Metritis*, gemeenlijk van den tweeden tot den vierden dag, en men meent alsdan wel waargenomen te hebben, dat de pols van de verlossing af reeds radder is en blijft, dan hij zoude behoeven. Menigmaal vertoont zich de ziekte onmiddellijk na de bevalling, en zij ontwikkelt zich over het algemeen, na verloop van veertien dagen, zeldzamer. Men ontmoet echter gevallen, waar zij zelfs de derde week nog ontstond. Profesfor PINEL geeft zelfs een voorbeeld op, waar eene minne nog na de dertien maanden door deze ziekte overvallen werd. Trouwens deze gevolgtrekking strekt zich te ver uit, naardien wij hier alleenlijk over de *Peritonitis puerperalis* handelen. De lijdende ontwaart in den beginne, gelijk bij de ontsteking van andere wijvliezen, eene rondtrekkende huivering, of eene algemeene, langen of korten tijd durende, koude, die soms in de eerste dagen nalaat en dan aanvalsenderwijze terugkeert, terwijl zij ook andere koortsachtige bewegingen gevoelt; onpasfelijkheid, soms wel braking, beving, zwaarte in de ledematen enz. Hierop volgt hitte, die meer of minder sterk wordt; dorst; de pols slaat haastiger; de buik wordt of in den geheelen omvang of eerst in het bijzonder op eene plaats pijnlijk, van waar het zich dan verder uitbreidt. De pijn in den buik is gemeenlijk zeer hevig; de lijdere begeeft zich met het ligchaam voorover, of trekt de dijen op, ten einde de buikspieren te verflappen. De minste aanraking, ja zelfs de drukking van het bed en de kleederen wordt onlijdelijk; zij heeft het brandend heet, een' onleschbaren dorst, kan alleen op den rug met gebo-



gene knieën liggen; klaagt over hevige hoofdpijn en angst, en moet bij de geringste beweging des lichaams, en bijzonder als zij zich overeind wil richten, overluid weenen. De onderbuik wordt opgezet en gespannen; de spanning neemt schielijk toe en de lijderes krijgt dikwijls het aanzien eener hoog zwangere; de pols is klein, zeer rad, honderd twintig tot honderd dertig slagen in eene minuut en hard; het aangezicht bleek, miskleurig, met koud zweet bedekt, of somwijlen ook rood, opgezet, de gelaatstrekken, als het ware, naar boven getrokken (een zeer karakteristiek teeken); de tong is of zuiver, of wit en droog. De lijderes blijft dorstig, soms nog brakende; de ademhaling is moeilijk, kort en versneld; de inademing vooral menigmaal zeer pijnlijk. Hierbij komt nu in enkele gevallen eene hoest, welke het lijden nog vermeerdert en nu eens later, dan weder terstond aanwezig en met ontstekingsachtige pijnen van het borstvlies verbonden is. Somwijlen wordt de lijderes door vele oprispingen gekweld, die insgelijks aanmerkelijke pijn veroorzaken. De eetlust is gemeenlijk niet gansch en al verloren, doch heeft toch weinig te beteekenen; zij heeft van zich zelve een onaangenaam gevoel, is zeer onrustig en kan den slaap niet vatten. De toestand van het darmkanaal is zeer onderscheiden; menigmaal gaat dit geregeld; op eenen anderen tijd bestaat er buikloop en verstopping. De *Urin* is meestentijds rood en weinig, bij de lozing hevig brandende. De lijdende heeft veelvuldiger aandrang daartoe, doch raakt slechts weinig op eens kwijt. Wat de kraamverrigtingen betreft,

de

de zogaffcheiding is meestal onderdrukt , aanvankelijk althans verminderd ; de borsten zijn flap en ontbloot van zog , fomwijlen zelfs gevoelig. De *Lochiën* zijn in het algemeen almede onderdrukt , of toch , al vloeijen zij ook al in eene geringe hoeveelheid , in hoedanigheid veranderd en zeer stinkende. Al deze verschijnselen nu zijn naar die mate onderscheiden , naar gelang de ontsteking uitgebreider is , of niet. Neemt de ziekte een' goeden keer , dan verdwijnen van lieverlede de genoemde verschijnselen ; de zwelling bereikt niet zulk een' hoogen graad ; de pijn vermindert ; zij kan zich op de zijde leggen , of eene zittende houding aannemen ; de pols wordt langzamer , het aangezicht begint natuurlijk er uit te zien , enz. Indien , daarentegen de koorts doodelijk afloopt , dan verergeren alle verschijnselen ; de pijn houdt eindelijk plotseling op ; de pols wordt kleiner en sneller , op het laatste niet meer te tellen ; een koud , kleverig zweet bedekt het ligchaam ; de ledematen worden als marmer zoo koud ; pis en drekstoffen vloeijen onwillekeurig af ; de lijderes heeft braking , krijgt spruw in den mond en in den flokdarm ; zij is gestadig sluimerende , zonder verkwikking , fomwijlen zachtelijk ijlende ; doch heeft ook dikwijls tot aan het laatste oogenblik haar volle verstand en sterft menigmaal reeds op den vijfden dag der ziekte , over het algemeen echter pas op den zevenden , achtsten tot tienden.

Is de ontsteking plaatselijk , dan zijn de verschijnselen naar gelang van de zitplaats onderscheiden. Ter plaatse van de meeste pijn bestaat ook de ergste ontsteking. Is bij voorbeeld de ontsteking tot een



gedeelte van het buikvlies bepaald, dat de blaas overtrekt, dan is zeker altijd de afvloeiing belemmerd, hebbende de lijdere pijn in de bekkenstreek. Is het middelrifgedeelte van het buikvlies (*Portio Diaphragmatis Peritonei*) bloot aangedaan, dan ziet men voornamelijk de volgende verschijnselen: een bestendig voortdurende hik (*Singultus*), onvermogen om diep in te ademen en het bovenste gedeelte der buikspieren te gebruiken. BROUSSAIS zag zulk een geval in het hospitaal *Val de Grace* reeds binnen twee maal vier en twintig uren doodelijk eindigen. Zetelt de *Peritonitis* in de onderscheidene plooijen van dit vlies, die de darmen op hunne plaats bevestigd houden, bij voorbeeld in het *Mesorectum*, *Mesocolon* enz., dan zitten de pijnen zeer diep, zijn stomp en vermeederen bij de drukking weinig of niet. De buik is week op het gevoel en de lijdere gevoelt zich slechts eenigermate onpasselijk. Is de ontsteking van een' *chronischen* aard, dan komen de bovengenoemde verschijnselen langzamerhand te voorschijn; de lijdere klaagt over rondzwervende pijnen in den buik, die noch hevig, noch langdurig zijn. Men verwacht dezelve dikwijls met naweeën, de buik echter is eenigzins vol; misfelijkheid bestaat er met een' snellen pols; de dorst is insgelijks zeer groot en er voegen zich velerlei *hysterische* aandoeningen bij, die de aandacht ligtelijk van het eigenlijke beeld der ziekte afleiden.

## Oorzaken.

## §. 382.

Alles, wat tot ontsteking van andere deelen aanleiding geven kan, heeft ook vermogen deze ziekte voort te brengen, en wij kunnen die oorzaken over het algemeen in voorbeschikkende en gelegenheidgevende verdeelen. Wat gene aangaat, daartoe behoort de volbloedigheid van den onderbuik (*Plethora abdominalis*), welke door de zwangerschap en het verlosfingswerk voortgebracht was. Daarom kan de *Peritonitis* reeds in de zwangerschap zich ontwikkelen (\*), en in dit geval duurt zij, volgens onze ervaring, bij veronachtzaming lang, verspreidt zich zoo langer zoo meer over alle deelen van het buikvlies, zonder vroegtijdige geboorte, of den dood naar zich te slepen, waarvan ik een zeer merkwaardig voorbeeld in mijn *Journal* (1 Bd. 1 St.) vermeld heb. De algemeene gevoeligheid en voornamelijk de plaatselijke prikkelbaarheid van het baarmoederstelsel komt mede hier zeer in aanmerking, die door bijkomende gelegenheidgevende oorzaken ligtelijk eene ontstekingsachtige aandoening van het buikvlies kunnen te weeg brengen. Tot de laatste behooren deels *mechanische*, deels *dynamische* oorzaken. Tot gene brengen wij stooten, vallen, slaan, drukking, onvoorzigtig gebruik van instrumenten, het te vaste aanleggen der

(\*) Men zie ons *Handboek voor de Ziekten van het Vrouwelijke Geslacht*. II. Deel, IV. Stuk, bl. 406.



der fluitbanden enz. In het, door ons aangehaalde, geval (*l. c.*) was de *Peritonitis* reeds in de zevende maand, door een' val op den onderbuik van eene hooge muur af, ontstaan; tot deze rekenen wij mislagen in de diëet, koudevatting, te vroege verlaten van het kraambed, inpranging van het ligchaam kort na de verlossing, gebrek aan zindelijkheid, onderdrukking der kraamverrigtingen, teruggetredene *Rheumatismen*, gemoedsaandoeningen en dergelijken meer. De gedeeltelijke *Peritonitis* ontstaat, volgens de opgave van SCOUTETTEN, gemeenlijk door een' schie-lijk werkenden prikkel, die met kracht op eenigerhande bepaald gedeelte van het buikvlies aankomt, bij voorbeeld eene plotseling plaatsgrijpende doorboring van de darmen, eene schielijke scheuring van de maag of de galblaas geven dikwijls gelegenheid tot haar ontstaan. Menigmaal ontstaat zij door eene bloote verplaatsing der ontsteking, van het slijmnaar het wijvlies. Uit den aard der verschijnselen laten zich gemeenlijk de oorzaken dezer verschillende soorten van *Peritonitis* onderkennen. Wanneer wij bij voorbeeld, zegt de Heer SCOUTETTEN, een' zieke zien, die, na alvorens aan hevige *Gastro-enteritis* geleden te hebben, waarvan hij bijkans hersteld is, plotseling, zonder blijkbare oorzaak, de hevigste verschijnselen van *Peritonitis* aan den dag legt; als wij bemerken, dat zijn buik, die week en niet zeer pijnlijk was, hard, opgezet en bij de minste aanraking pijnlijk wordt, dat zijne gelaats-trekken veranderen, de pols zeer klein, ingetrokken, dikmaals onregelmatig wordt, dan kunnen wij ons verzekerd houden, dat er zich plaatselijke ont-  
ste-

steking van het buikvlies ontwikkeld heeft en dat deze waarschijnlijk door de doorboring van eenen darm en de uitstorting van vreemde stoffen in de holte van het buikvlies veroorzaakt is. Ik heb, voegt hij er bij, vele gevallen van dien aard gezien en de *Diagnosis* werd telkens door de lijk-schouwing bevestigd.

### *Uitgangen.*

#### §. 383.

De uitgangen der *Peritonitis puerperalis* zijn van die van andere ontstekingen volstrekt niet onderscheiden; de ziekte kan derhalve: 1) in verdeling overgaan. Jammer maar, dat dit gebrek zoo hoogst zeldzaam zulk een' gunstigen keer neemt, en deze openbaart zich, gelijk wij boven reeds aangehaald hebben, door eene trapswijze vermindering van alle verschijnselen, en op deze wijze gaat de ziekte in het gemeen zeer snel over, dikwijls reeds na weinige dagen. 2) Verettering. Zij valt veel meer voor, dan de verdeling, en stelt zich gemeenlijk tegen den achtsten of negenden dag in. Men kan haar vermoeden, zoodra de pijnen en de spanning van den onderbuik nalaten, de lijderes een gevoel van zwaarte in den buik heeft; de pols bij voortdurende of toenemende snelheid eene bijzondere weekheid verkrijgt en golvend wordt; men behoeft er niet meer aan te twijfelen, als de lijderes huiveringen ontwaart en de vochtgolving duidelijk te voelen is, de *Urin* troebel wordt en een etterachtig bezinkfel erlangt, en de koorts van een'



een' uitterenden aard wordt. Bij dezen uitgang der ontsteking wordt in de gelukkigste omstandigheden de etter opgeslorpt, gelijk wij in den vervlogenen winter in het kraamgesticht alhier waarnamen, of er vormden zich dan ook wel in- of uitwendige *Abscessen*; vloeit de etter naar buiten, dan kan langs dezen weg de genezing nog volgen; stort hij zich echter in de buikholte uit, dan ontstaat of plotseling de dood, of er ontwikkelt zich een meestentijds doodelijk eindende *Ascites purulentus*. Deze uitgang is ten aanzien van het gevaar verschillende, al naar dat de etter deze of gene plaats inneemt. Hoe dieper hij zakt, des te moeilijker de genezing, en zoo veel te ligter worden er nieuwe ontstekingen en uitterende koortsen geboren. Met dezen uitgang mag men 3) de uitzweeting niet verwarren, waarin de *Peritonitis*, gelijk alle ontstekingen van wijachtige deelen zeer ligt overgaat. Zij geeft zich te kennen door de uitvloeijing van velerlei vochten, en veroorzaakt soms aaneengroeijingen van het buikvlies met de darmen en van deze laatste met elkander. 4) Verharding. Eene geringe verharding en verdikking ontstaat zekerlijk na iedere, maar eenigzins aanmerkelijke ontsteking van het buikvlies. Meerendeels echter neemt alleen de *chronische* ontsteking dezen uitgang en geeft dan naderhand tot menigerhande wanvormingen en verwoestingen aanleiding. 5) De verfterving. Zij bestaat gemeenlijk slechts een gedeelte van het *Peritonaeum*; hoe schielijker de ontsteking voortgaat, — hoe hooger graad zij bereikt, — zoo veel te ligter grijpt deze uitgang plaats. Hoe plotselinger de, te

voren hevige, pijn ophoudt, als wanneer de bijtende hitte (*Calor mordax*) in koude verandert; de pols zwak, onregelmatig, tusfchenpoozend wordt, de gelaatstrekken invallen enz., des te grooter is dan het gevaar. Eindelijk gaat de haastige ontsteking 6) in de *Peritonitis chronica* over. De ziekte neemt, als zij eenige weken geduurd heeft en de lijderes zich naar omftandigheden iets beter bevindt, zonder hersteld te zijn, een' trageren gang aan, en men zegt dan, de ziekte is *chronisch* geworden. Hier ontstaan dan ligtelijk verhardingen, aaneengroeijingen en velerlei opvolgende gebreken, die naar gelang van derzelver verschillenden aard of moeilijk te genezen, of volstrekt ongeneeslijk zijn.

### *Uitkomsten der Lijkopeningen.*

#### §. 384.

Zij zijn onderscheiden, naar gelang van de uitgebreidheid der ziekte en naar den langer' of korteren duur derzelve. De Heer Dr. SCOUTETTEN heeft in dit opzigt de wetenschap met zulke gewigtige en uitvoerige waarnemingen verrijkt, dat wij onze geëerde lezers sterk nopen, om zijne verhandeling, waarvan eene getrouwe vertaling in ons *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer und Kindbettkrankheiten* (\*) te vinden is, met aandacht te lezen, en

(\*) *Ueber die pathologische Anatomie des Peritonaei* von Dr. SCOUTETTEN. Mitgetheilt von Dr. STEINTHAL. V. Bd. 2ter Stuck. s. 369. 3ter Stuck. s. 648. Frankf. a. M. 1825.



en laten het hoofdzakelijke hier zoo kort mogelijk volgen. Na den eersten ligten graad van ontsteking bespeurt men kleine roode vlekken van bijkans eene lijn in de doormeting, die louter uit stippen zijn te zamengesteld, zeer kleine tusschenruimten overlatende, waar het buikvlies nog deszelfs natuurlijke kleur heeft behouden. Deze roode vlekken nemen het geheele buikvlies, of enkele deelen van hetzelfde in. In plaats van deze vindt men somtijds dit eerste blijk van ontsteking door de ontwikkeling van bloedvaten gekenmerkt, die meer of minder talrijke, roode strepen daarstellen. Het buikvlies zelf ziet er nog droog en glanzig uit; het ontstokene gedeelte nogtans, als men het met de vingers aanraakt, met eene olieachtige, vrij taaije, uitgezweete stof bedekt. De vlekken komen nu digter bij elkander, loopden ineen en maken roode plaatsen van verschillenden omvang uit. Het buikvlies verliest nu bereids deszelfs doorschijnendheid, zonder verdikt te zijn. De roodheid wordt donkerder en uitgebreider; er ontwikkelen zich roode banden en strepen; het *Peritoneum* is gelijkmatig rood en heeft een ruig aanzien, en men treft het zelden nog droog en glanzig aan, gelijk bij den aanvang; meestal is er reeds eene witte vloeistof in de buikholte voorhanden. De roode kleur ontstaat uit eene doorzweeting van bloed op de oppervlakte van het buikvlies. Bij de gedeeltelijke *Peritonitis* zijn niet zelden sommige plaatsen van het buikvlies zoo sterk ontstoken, dat zij purperrood, violetkleurig, of geheel zwart er uitzien. Alsdan hechten de darmen zich menigmaal aan elkander vast, zonder eenig  
daar

daar tusſchen gelegen ſchijnvlies; waar dit laaſte beſtaat, kan men een witachtig ſtremſel bemerken, dat uit eiwitſtof beſtaat en dikwerf eene aanmerkelijke uitgebreidheid beſtaat. Gaat nu de *Peritonitis* nog verder, dan ontſtaat er heetvuur (*Gangraena*), hetwelk aan eene zwarte vlek meestal van weinig omvang, ſoms een duim en daarover, kenbaar is. Menigmaal ontmoet men, zonder uitſtorting van drekſtoffen, een, door ontwikkeling van *gas*, gevormd luchtgezwel, zoodat alle verdubbelingen van het buikvlies vaneengeſcheiden zijn. Enkele malen vindt men etterverzamelingen in het darmſcheil. Beſtond de ontſteking federt drie tot vier weken, dan ontwikkelen zich valſche, eiwitachtige vliezen van eene witte, grauwe of roode kleur, die tot aaneenhechtingen van allerlei ſoort aanleiding geven. Deze vliezen kunnen zich in zeldzame gevallen reeds na zes en dertig tot acht en veertig uren vormen, hunne dikte nogtans ſtaat met den duur der ziekte in eene vrij juiste verhouding. De vliezen zijn niet ſtuk te wrijven en zeer veerkrachtig. Wat de vloeïſtof aangaat, die men na haastige ontſteking in de holte van het buikvlies aantreft, zoo is in den beginne het uitgeſtorte vocht alleen in hoeveelheid vermeerderd, doch niet van den natuurlijken ſtaat afwijkende. Dit hebben wij bij een, in de eerſte dagen doodelijk geëindigd, geval in ons verlosſingsgeſlacht bevestigd gevonden. Nadat de ontſteking eenige dagen geduurd heeft, wordt de vloeïſtof grauwwit, naar melk gelijkende, zonder dat hier eene zogverplaatſing deel aan heeft. Zuiver bloed ſtort zich maar zelden uit; daarentegen ziet men



men meer bloedige strepen op vele plaatsen der darmen. De hoeveelheid van het uitgestorte vocht verschilt van eenige oncen tot op een paar pond; het vocht is van eene onderscheidene lijvigheid, helder als water, of olieachtig, dik, als dunne room, of als etter van het celweeffel. Bij de gedeeltelijke *Peritonitis* vindt men dikwijls eene melkachtige, gele, wijachtige vloeistof, waarin gele vlokken rond-drijven, naar eiwit gelijkende.

Is nu de *acute* ontsteking in de *chronische* overgegaan, dan vindt men velerlei ziekelijke veranderingen, die naar den duur der ziekte en de gesteldheid der lijderefsen verschillende zijn. Loopt de ontsteking, na vijftig tot zestig dagen bestaan te hebben, doodelijk af, dan vindt men den onderbuik met eene grootere of geringere hoeveelheid eener witte vloeistof gevuld, die veel overeenkomst met geronnen melk heeft. Tusschen de darmen ontdekt men eene menigte schijnvliezen, die dikwijls plaatselijk zakken vormen, welke eene zeer onderscheidene soort van vocht bevatten. Als men deze schijnvliezen afscheidt, dan vertoont zich het *Peritoneum* minder rood, dan bij de *acute Peritonitis*, en is somtijds zelfs in het geheel niet van kleur veranderd. Gemeenlijk is hier de hoeveelheid van het uitgestorte vocht niet zoo groot, dat de buik er aanmerkelijk door uitgezet wordt. Somwijlen, vooral bij voorwerpen van eene *lymphatische* gesteldheid, ontmoet men eene aanmerkelijke hoeveelheid van eene gele, dikachtige wei en niet het minste bewijs van schijnvlies. Het buikvlies is in dit geval verdikt en rood. Het net (*Omentum*) wordt dan dik-

dikwijls zeer dik en erlangt volkomen een vleezig aanzien, doch de beide vliezen, die hetzelfde vormen, laten zich van elkander scheiden, en de gescheidene vlakke doet zich, als met jong vleesch, voor. — Heeft de *Peritonitis* reeds eenige maanden geduurd, en wel bij een voorwerp van een *sanguinisch*, *lympathisch* temperament, dan zijn de buikswanden na den dood in het geheel niet door eene uitgezweete stof uitgezet, maar met de darmen vereenigd, die zelve door het net bedekt zijn, dat dikwijls zich tot het bekken uitstrekt en met eene menigte van witte knobbeltjes, van verschillende grootte, en door meer of minder bloedvaten omgeven, bezet is. Deze witte knobbeltjes ontmoet men ook aan het darmscheil en de darmen, die menigmaal onderling vereenigd zijn. In den beginne doen zich die knobbeltjes als witte puntjes voor, die langzamerhand in elkander loopen; zij hebben dan dikwerf de grootte eener erwt, en zijn van zulk eene vaste zelfstandigheid, dat men ze niet van het buikvlies afscheiden kan, zonder hetzelfde te verscheuren. Naar gelang zij nu grooter worden, naar die mate verweken zij, zoodat zij allengs veel van etter krijgen, tot eindelijk de eiwitaardige stof, waaruit zij bestaan, zich weder verhardt en niet zelden eene kalkaardige hoedanigheid aanneemt. Daar, waar geene knobbeltjes of verhevenheden op het *Peritoneum* voorhanden zijn, is hetzelfde of donkerrood, violetkleurig en zelfs zwart, of als de knobbeltjes zelve zeer klein en vast zijn, als wanneer zij wit en glanzig er uitzien, dan zijn soms ook de vrije tusschenruimten van het buikvlies zeer

IV. D. 3°. en 4°. st.                      S s                      vast,



vast, wit en glanzig, zoodat het *Peritonaeum* een wit, paarlachtig voorkomen verkrijgt. Indien dit zoo gesteld is, dan ontmoet men weinig uitgestorte vochten in de buikholte, die dan gemeenlijk graauw, bruin en somtijds geheel en al zwart er uitzien. Bij vele voorwerpen, waar tevens de ontsteking drie tot vier maanden bestaat heeft, treffen wij nog meerdere veranderingen aan. De buikswanden zijn door eene vrij aanmerkelijke hoeveelheid van wij uitgezet. De darmen zijn op elkander geplakt, dikwijls geheel tegen de ruggekolom gedrongen. Het geheele *Peritonaeum* is verdikt en vlokkig, heeft een spekachtig graauw aanzien, bezit niet zelden bloedige strepen en vele roode vlekken of uitstortingen van bloed, van eene verschillende uitgestrektheid.

Openbaart zich de dood ten gevolge van eene uitstorting van bloed, gelijk soms het geval is, als eenige bloedvaten verscheuren, dan vloeit er eerst uit de opene buiksholte eene bloederige wij van eene ongelijke hoeveelheid. In sommige gevallen worden er uit de *chronische Peritonitis* oorspronkelijke zweren geboren, die aanvankelijk als loutere ontvellingen voorkomen en dan ook de naburige deelen kunnen aantasten. Zulke zweren van het buikvlies kunnen ook opvolgend ontstaan, bijzonder daar, waar het slijmvlies der darmen er in deelt. Dikwijls gaat bij eene zeer langdurige (*chronische*) *Peritonitis* de ontaarding zoo ver, dat men bij de opening der buiksholte in het midden het buikvlies met de darmen in eene geheel gescheidene, verwarde massa te zamengerold, vindt, zoodat men de bijzondere deelen niet onderscheiden kan.

kan. Deze kogelvormige, bruine of zwart geleverde masfa is door eene roodachtige of zwarte wij omgeven, en het is opmerkelijk, dat deze verwoesting zich bij het leven door niet één bijzonder teeken te kennen geeft. Zij overvalt bij voorkeur zeer dorre gestellen. De verfterving kan als gevolg der *chronische Peritonitis* insgelijks zich vertoonen; zij openbaart zich door graauwe, zwartachtige korsten, die bij de aanraking ligt breken en eene eigenaardige lucht van zich geven. Trouwens zij verspreidt zich slechts plaatselijk en niet over het gansche buikvlies; valt zelden voor, naardien de dood veelal vroeger tusfchen beide komt, eer de verfterving zich ontwikkelen kan. Eindelijk kan het buikvlies ook eene kraakbeenige, beenige en scirrheufe ontaarding ondergaan.

### *Voorzegging.*

#### §. 385.

De *Peritonitis puerperalis* is altijd eene bedenkelijke ziekte, die over het algemeen slechts eene twijfelachtige voorspelling gedooft; niettemin maakt de uitgebreidheid en de during der ziekte hierin wel eenig onderscheid. Hoe moeilijker en ingespannener de voorafgegane verlossing was; hoe spoediger na dezelve de ziekte zich openbaart; hoe verder zij zich over de gansche uitgestrektheid van het buikvlies verspreidt, des te erger en gevaarlijker is zij. Als de vroeger zeer hevige pijn op eens nalaat, de pols te gelijker tijd al sneller en kleiner, eindelijk onregelmatig en tusfchenpoozend wordt,



en de bovengenoemde ongunstige verschijnselen zich opdoen, dan is het schier een zeker teeken van den aannaderenden dood. Is de verettering tot stand gekomen, dan kan men toch nog immer hoop voeden, als er zich uitwendig een ettergezwel openbaart en de etter langs dezen weg zich ontlast. Wordt de ziekte van een' slependen aard, dan is de voorzegging in alle geval hoogst ongunstig; de *Peritonitis* geeft dan, gelijk wij gezien hebben, tot vele opvolgende gebreken aanleiding, die de lijdende vroeg of laat doen bezwijken.

### Geneeswijze.

#### §. 386.

De *Peritonitis* vordert het ontstekingswerende geneesplan, vooral bloedontlastingen en salpeter vroegtijdig in het werk gesteld. Doch deze ziekte behoort tot de zoodanige, waar spoedige hulp van den Geneeskundige vereischt wordt, wil hij iets uitrigten, vooral omdat dikwijls het grootste gevaar op uitstel zich grondt; twee uren angstvallige twijfeling heeft niet zelden onherroepelijk den dood der lijderes ten gevolge; om die reden, moet men haar dikwijls, dagelijks drie tot vier malen bezoeken, en naauwkeurig op alle omstandigheden en hoofdzakelijk op den toestand van den onderbuik letten, tot het grootste gevaar voorbij is. De bloedontlastingen maken hier het hoofdmiddel uit; zij moeten tijdig genoeg en in eene genoegzame hoeveelheid in het werk gesteld worden. Eene enkele aderlating op den arm, ter regter tijde aangewend, doet hier, op grond

grond onzer veeljarige ondervinding, meer af, dan alle andere middelen te zamen genomen, en verwijderd niet zelden spoedig alle gevaar; heeft men echter het tijdstip ter bloedontlasting laten voorbijgaan en verwaarloosd, dan is meestentijds de overgang in verettering en versferving onvermijdelijk. Zoo lang de ontsteking slechts eenigermate hevig, pijn en gevoeligheid van den onderbuik groot en door dezen algemeen verspreid, de oprigting des ligchaams belemmerd, of de geringste beweging met pijnen verbonden, de hitte des ligchaams, brandend, droog; de pols klein, een weinig hard of ook sterk, vol en de wangen door eene brandende roodheid omschreven zijn, de onderbuik in een' volbloedigen toestand verkeert en de koorts meer het karakter van *Synocha* heeft, zijn de algemeene bloedontlastingen dringend aangewezen, en men durft het hier niet op plaatselijke bloedontlastingen laten aankomen. De lijderes zal dan over het algemeen de aanzetting van bloedzuigers niet verdragen. Is het noodig, dan moet de aderlating herhaald worden, tot men duidelijk vermindering waarneemt. Naderhand kan men ook met plaatselijke bloedontlastingen te hulp komen, en alleen dan, als het meer *Peritonitis partialis* is, als de ontsteking en pijn slechts tot eene plaats bepaald en niet algemeen verspreid zijn, de koorts ook zulk een' hoogen graad niet bereikt heeft, meer afwisselt, of het karakter van *Typhus* of *Synochus* verkrijgt, de plaatselijke pijn echter de overhand heeft, make men dadelijk van bloedzuigers gebruik; zoo na mogelijk hier aan de plaats der locale ontsteking gezet,



nemen zij de plaatselijke volbloedigheid weg en bezorgen den vochten een' vrijeren omloop, en tijdig genoeg en in eene toereikende hoeveelheid aangewend, zijn zij in staat de ontsteking of geheel weg te nemen, of haar aanmerkelijk te verminderen en de gevaarlijkste uitgangen te voorkomen. Men zet dan vijftien, twintig tot vijf en twintig bloedzuigers en laat ze behoorlijk nabloeden.

### §. 387.

Tot inwendige middelen zijn het salpeter en verkoelende ontlastmiddelen, het beste de middelzouten, dienstig. Het salpeter wende men in die gevallen aan, waar de koorts het karakter van *Synocha* heeft en nadat de algemeene aderlatingen in het werk gesteld werden, inzonderheid echter als de plaatselijke ontsteking hevig is en na voorafgegane koudevatting, of *mechanische* invloeden ontstond; bij het nalaten der koorts en waar zij meer het karakter van *Synochus* heeft, bij belemmerden stoelgang en daarmede vereenigde *gastrische* ophooping en verzamelingen komen de verkoelende ontlastmiddelen en middelzouten te stade; deze zijn geenszins te prikkelend en worden door de lijderesfen over het algemeen beter verdragen, dan de olieachtige *Purgantia*, die bij de *Enteritis* of de kraamvrouwenkoorts later te pas komen, bij welke gemeenlijk ook de darmen ontstoken zijn. — Een der vermogendste middelen bij de *Peritonitis* is het kwikzilver; daar zij zoo zeer met de ontstekingen van weiachtige en *lymphathieke* deelen overeenkomt. Heeft de koorts het karakter van *Synocha*, en bestaat er aanwijzing

tot eene algemeene aderlating, en het toedienen van het salpeter, dan geeft men hetzelfde na de aanwending dezer middelen, en bij voorkeur de *Murias Hydrargyri oxydulati* in toereikende giften van gr. II—III, alle twee of drie uren, en gaat zoo lang er mede voort, tot pijn en koorts bedaard zijn, doch niet te lang, om kwijling te verhoeden. Is de *Peritonitis* met eene *catarrhale* ongesteldheid verbonden, en wisselt de koorts meer af, dan kan het kwik vroeger en terstond in het eerste tijdperk der ziekte toegediend worden; hier is het, waar ook het *Salammoniac*, de *Vinum stibiatum* en de *Spiritus Mindereri* de beste uitwerkselen doen. — De lijderes moet een' ligt te verteren', spaarzaam eetregel houden; slijmachtige en verdunnende dranken drinken en zich rustig houden. Tevens zorgen voor regeling der kraamverrigtingen en behandelde hare afwijkingen volgens aanwijzing en bijzonderheden.

### §. 388.

Met de §. 387 opgegevene middelen tot inwendig gebruik vereenige men te gelijk die der uitwendige; tot de voornaamste en meest vermogende behooren ontegenzeggelijk, inzonderheid als de koorts het karakter van *Synocha* heeft, de ontsteking door eene *catarrhale* of *rheumatische* ongesteldheid vergezeld gaat, of de pijn slechts tot eene plaats bepaald is, behalve de bloedzuigers, verzachtende pappen, en als de pijn daarop niet spoedig verdwijnt, de inwrijvingen van gelijke deelen *Ung. neapolitanum* en *Althaeae*, en bijaldien de inwrij-



ving zelve pijn mogt verwekken, met bijvoëging van *Hyoscyamus*olie; de kwikzalf is zelfs nog van bewezen nut, als de ontsteking sommige verharde plaatsen heeft achtergelaten, die gevoelig zijn, en bij eene volgende zwangerschap en verlossing van nadeelige uitwerkselen kunnen zijn. Specerijachtige omslagen zijn dan aangewezen, wanneer de *Peritonitis* meer door werktuigelijke oorzaken te weeg gebragt werd, bij voorbeeld door drukking, stooten, vallen en dergelijken; de koorts reeds langen tijd aanhield, zeer afwisselt en zenuwachtig schijnt te worden en de buik zeer opgezet is; in dit geval alleen ook zullen de koude omslagen dienstig kunnen zijn, die bij eene *catarrhale* of *rheumatische* ongesteldheid meer schaden en de, ter verdeeling vereischt wordende, scheidingen (*crizen*) belemmeren moeten. — Zuurdegen en Spaansche vliegen, die bij plaatselijke ontstekingen over het algemeen niet zelden onmisbare middelen zijn, werken mede bij de *Peritonitis*, behoedzaam aangewend, zeer veel goeds uit. Zoo lang de koorts nog zuiver ontstekingachtig is, niet afwisselt en de pijn in den onderbuik zeer hevig is; zoo lang de eerste prikkeling in het vaatgestel niet weggenomen, of de noodige bloedontlastingen bewerkstelligd zijn, kunnen de Spaansche vliegen afzonderlijk nog niet aangewend worden; met de ophouding der koorts en na behoorlijk verrigte bloedontlastingen zullen zij, inzonderheid bij een' opgezeten buik, bij *catarrhale* of *rheumatische Complicatie* en bij eene *metastatische Peritonitis* of zoogenaamde zogverplaatting, heilzaam werken, even zoo gunstig zullen zij zich betoonen, als de ont-

ste.

steking tot verettering of versterking dreigt over te gaan, en de koorts naar het zenuwachtige overhelt en de lijderesfen in een' staat van werkeloosheid verkeeren. Want in dit geval werken zij als vermogende, opwekkende en prikkelende middelen op het zenuw- en vaatgestel, en bevorderen de scheiding door de huid, terwijl zij bij te vreezene verettering, de werkdadigheid van het opflorpend vaatgestel krachtadig opwekken. Het zuurdeeg is sedert lang hoofdzakelijk als een afleidend en tevens als algemeen, de gevoeligheid en prikkelbaarheid, opwekkend middel bekend, doch onderscheidt zich ten aanzien van deszelfs werking van die der Spaansche vliegen door zijne kortdurige werking, en niet zoo krachtadige opwekking van het vaat- en zenuwgestel, door mindere stoornis en niet zoo duidelijke bevordering der afscheidingen en opslorpingen. De Arts zal dien ten gevolge bij de aanwending op deze onderscheidene werkingen de aandacht moeten bepalen, ten einde daarnaar de keuze van *Sinapismata*, of Spaansche vliegen in te rigten. Men legt dezelve, vooral bij eene aanmerkelijke opgezetheid van den onderbuik en te duchtene verettering, of heetvuur onmiddellijk op dezen zelven, of bij eene *rheumatische* gesteldheid en *metastatische* ontsteking, waar zij meer als afleidend moeten werken, op een' zekeren afstand, bij voorbeeld aan de bovenste en onderste ledematen, en zelfs op de borsten, vooral bij de *Peritonitis*, welke door eene zoogenaamde zogverplaatfing veroorzaakt is. Tevens kunnen ze als lokkende middelen met nut gebruikt worden, als de *Lochiën* te gelijker tijd onderdrukt zijn, ter



bevordering van deze. Tot dat einde laat men ze aan de kuit en of de dijen, vooral dicht bij de gewrichten leggen. Voorts kunnen de laauwwarme baden, dagelijks eenige malen herhaald, bij de *Peritonitis puerperalis* met zeer veel nut in het werk gesteld worden, men vrijware de lijderes daarbij alleenlijk voor het vatten van koude. Bij de *Peritonitis rheumatica* en *catarrhalis*, en waar de verdeling der ontsteking en de scheiding, vooral bij droogte der huid, door zweet nog niet heeft plaats gegrepen en alles werkeloos is; de koorts naar het zenuwachtige overhelt, en men vrees voor verettering en heetvuur koestert, zijn ze voornamelijk aangewezen. Des noodts nog met bijvoeging van specerijachtige kruiden, vooral wanneer een sterk opwekkende, prikkelende en te gelijk blijvende indruk op de uiteinden van het zenuw- en vaatgestel, bijgevolg op de huid, vereischt wordt, waardoor de levenswerking deels verhoogd, deels naar buiten afgeleid, en ook de uitwendige afscheidingen bevordert en voortgebragt worden, zonder uit het oog te verliezen, dat zij tevens de werkdadigheid van het opslorpend vaatgestel verhoogen en de verdeling der ontsteking zoo veel te eerder bevorderen.

### §. 389.

Heeft de etter zich reeds gevormd, dan zijn de teekenen: ophouding der pijn, veelvuldige koude en huiveringen, radde, golvende pols, sluipkoorts tegen den avond, koude, met zweet bedekte ledematen over dag, en troebele *Urin* met een etterachtig bezinkfel. De etter zelf kan zich soms  
tus-

tusſchen het buikvlies en de buikſpieren verzamelen, of zich dieper in de buik- en bekkenholte onder de voortplanting van het buikvlies verſpreiden. Bij dezen uitgang der ontſteking heeft in de gelukkigſte gevallen opſlorping van den etter plaats, of er vormt zich een ettergezwel omſtreeks den navel, boven de ſchaambeenderen, in de eene, of andere kraakbeensſtreek, gelijk wij een geval waarnamen, waarbij te gelijker tijd een *Absces* in de lever zich ontwikkelde, in de darmbeens-, of heiligbeensſtreek, in de lies, of in de ſcheede. — Bij den gelukkigſten afloop poge men de werking van het opſlorpende vaatgeſtel te verſterken, de nog voorhandene ontſteking te verdeelen en daardoor de verettering te beteugelen. De *Calomel* in kleine giften vroegtijdig en bij vrees voor kwijling in vereeniging met *Opium* toegediend, en inwrijvingen der kwikzalf, waarmede men ter bevordering van de opſlorping des etters het *Liquor Ammon. carb.*, de *Flores Arnicae*, *Rad. Senegae*, de *Squilla*, *Digitalis purpurea*, de kamfer, blaarpleiſters, in ettering gehouden, ſpecerijachtige pappen en dergelijken, warme baden vereenigt, zijn die middelen, waarvan men in dezen veel goeds kan verwachten. Vertoont zich op de eene of andere plaats een ettergezwel, dan moet men de doorbraak en de uitvloeijing des etters door *Emollientia* en *Maturantia*, alsmede door eene geſchikte ligging trachten te bevorderen. Ontwikkelt zich het *Absces* in de ſcheede, dan zijn warme, verzachtende inſpuitingen dienſtig. Zoo lang mag men, vooral bij *Abscesfen* in de nabijheid van het bekken of het dijgewricht, die zich naar buiten ont-



ontlasten willen, niet wachten, maar men moet, als de vochtgolving duidelijk wordt, het gezwel door middel van een bijtmiddel, of beter door eene insnijding voorzigtig, den toegang der lucht zoo veel mogelijk afluitende, openen, naardien anderszins de etter zich ligtelijk naar binnen uitstort en daaruit *Caries* der bekken- en dijbeenderen ontstaan kan. — Om het *Absces* in de scheede te openen, is de *Hysterotomus* van OSIANDER zeer geschikt. Daarbij trachte men de krachten der lijderes te ondersteunen, en kome des noods door een' versterkenden leefregel en door ligt versterkende middelen, die de lijdende verdragen kan, hierin te gemoet. Eene meer uitvoerige behandeling overigens vindt men in het volgende Hoofdstuk opgeteekend. Hebben er uitzweelingen plaats gegrepen, dan staat de *Calomel* in geringe giften op den voorgrond, tot aan het punt van kwijling voortgezet, enkel of in verbinding met pis- en zweetdrijvende middelen, die somwijlen, het gebrek nog geen hoogen graad bereikt hebbende, zeer voortreffelijke diensten be- toonen, de uitgezweete stof opnemende. Is er reeds versterving voorhanden, dan is voorzeker alle hulp te vergeefs. Het moet dan alleen ons oogmerk zijn, de krachten der lijderes te ondersteunen, en haar leven, zoo lang mogelijk, te behouden. Hoofdzakelijk komt hier de bederfwerende en versterkende geneeswijze (*Methodus antiseptica et roborans*) in haren ganschen omvang te pas.

L I T T E R A T U R.

§. 390.

BURNS, *op. cit.* pag. 525. *sqq.*

ROB. THOMAS, *op. cit.* pag. 875. *sqq.*

CAPURON, *l. c.* pag. 531.

RICHTER'S *Therapie* I. Bd.

VON SIEBOLD'S *Journal*, iter Bd. iter Stuck. s. 141.

SCOUTETTEN, über die pathologische Anatomie des Peritonaei, in VON SIEBOLD'S *Journal* 1825. Mitgetheilt von Dr. STEINTHAL.



---

V I J F D E    H O O F D S T U K .

*Van de Psoitis en het ettergezwel in het bekken  
bij kraamvrouwen.*

*Begrip der ziekte.*

§. 391.

Het ettergezwel op de lendenpier (*Abscessus psodiacus*) ontstaat altijd ten gevolge eener ontsteking van de lendenpier (*Psoitis*, *Inflammatio musculi psoas*), en heeft meestal zijne zitplaats in het haar omgevende celweeffel, echter ook in het gedeelte van het buikvlies, dat de lendenpiereu bedekt, vandaar ook dat vele schrijvers, zoo als bij voorbeeld PETER FRANK, het bij de *Peritonitis* behandelen. De *Psoitis puerperalis*, te weten die ontsteking van de lendenpier, die in het kraambed voorvalt, heeft natuurlijk niets eigenaardigs boven eene gewone *Psoitis*, dan dat zij bij eene kraamvrouw zich ontwikkelt en daardoor van meerdere aangelegenheid wordt. Deze ziekte nu heeft of een haastig, of een traag verloop, en wij onderscheiden derhalve de *Psoitis acuta, vera*, als den zeldzamer' vorm van de *Ps. chronica, purulenta, phthisica* (*Phthisis puerperalis*); naar FR. B. OSIANDER zonderling koude kraamvrouwkoorts genaamd, wegens de veelvuldige en hevige aanvallen van kou-

koude, waardoor deze koorts zich van alle andere onderscheidt, hetgeen echter aan het bekken *Absces* als een eigenaardig teeken niet toekomt. De ziekte was reeds aan de oudere Geneeskundigen bekend en door COEL. AURELIANUS (*chron. Lib. V. Cap. I. de Ischiadicis et psoadicis*) vrij uitvoerig beschreven. Onder de latere Schrijvers is zij vooral door FORD en ABERNETHY in het breede behandeld.

### *Diagnosis en Verloop.*

#### §. 392.

Het eigenaardige kenteeken van *Psoitis* is eene pijn in de lendenstreek, naar onderen tot in de lies- en dijstreken zich uitstrekkende, bovenwaarts zich tot in de ruggegraat uitbreidende, en zich verheffende, zoodra de dij opgeligt, tegen den buik opgetrokken, of uitgestrekt wordt, of als het bovenste gedeelte des ligchaams zich oprigt. De lijdere ondervindt de meeste verligting, als, bij eene voorovergebogene houding van het gansche ligchaam, de dij eenigzins gebogen wordt. Het vaste staan op den voet der ongestelde zijde is of zeer moeilijk, of ten eenenmale onmogelijk, en de gang alleen met een sterk voorovergebogen ligchaam doenlijk en dan altoos nog zeer gebrekkig. Gaat de ziekte schielijk voort, dan is de pijn duidelijk en levendig, en het gebrek over het algemeen ligter te erkennen en zeker altijd met eene meer of minder hevige koorts vergezeld. Bij de *chronische Psoitis* ontbreekt de koorts menigmaal geheel en al; de pijn is stomper, heeft meerdere tuschen-

poo-



poozen, wordt niet zelden onmerkbaar en de ziekte is dan ligtelijk te miskennen. Bij deze plaatselijke verschijnselen openbaren zich nu dadelijk bij het begin, of nadat het gebrek eenigen tijd bestaan heeft, algemeene en medelijdende toevallen: somwijlen begint de geheele ziekte met koortsachtige verschijnselen. Het koortsachtig karakter is duidelijk *inflammatorisch*, en heeft gemeenlijk volkomen den vorm eener *Febris intermittens*; de lijderes wordt na de gewone voor teekenen door eene sterke koude bevangen, die langer of korter tijd aanhoudt, waarop eene even zoo sterke hitte met een' vollen, radden pols volgt, die eindelijk in zweet overgaat. Zulke verheffingen vertoonen zich dan, wel is waar, overvloediger in de vier en twintig uren, zij komen echter zoowel ten opzichte van den tijd, als den duur ongeregeld: de bijzondere aanvallen stemmen in het geheel niet overeen, gelijk bij eene *Febris intermittens duplicata* of *triplicata*, en de pols blijft tevens in de vrije tusschentijden altijd iets sneller. Voor het overige bevindt zich de kraamvrouw in den tusschentijd niet ongesteld; zij heeft geene hoofdpijn, of ligchaamspijnen, geen bijzonderen dorst; de kraamzuivering kan natuurlijk en de stoelgang regelmatig zijn. De plaatselijke, eigenaardige verschijnselen nogtans duren voort. Daarbij komen dan ook dikwijls *gastrische* toevallen; de lijderessen beginnen soms te braken; doch slechts met voorbijgaande verligting. Eenigen hebben geheel geen bijzondere pijn in de holte des bekken, maar bloot in de strek der blaas, of in den een' of anderen voet. Deze bezwaren kunnen be-

reids

reids in de zwangerschap voorhanden geweest zijn, die gedurende de koorts heviger worden. De *Urta* heeft dan een' zeer stinkenden of knoflookachtigen reuk en verkrijgt een aanmerkelijk koortsachtig bezinkfel. De duur der koorts is zeer onderscheiden; zij kan met acht tot negen dagen eindigen; doch ook vele weken aanhouden. Daar, waar de ziekte slepende wordt en in verettering overgaat, neemt de koorts spoedig het karakter eener slepende, uiterende koorts (*Febris hectica lenta*) aan, of ontbrak dezelve eerst, dan doet zich naderhand eene sluipkoorts op, welke eindelijk de lijdere ondermijnt. Neemt de ziekte spoedig een' kwaden keer, dan treft men de volgende verschijnselen aan: de pijn in de holte des bekken, of schaamtestreek vermeerderd; de lijdere kan de betasting van de schaamte- of liesstreek niet verdragen; de aanvallen van koude worden menigvuldiger, sterker en blijven tot den dood niet geheel en al achterwege; de pols wordt zwakker en haastiger; de ademhaling beklemd; de lijdere vormt allerhande denkbeelden en heeft weinig slaap. Eindelijk laat de plaatselijke pijn na; de lijdere wordt zeer onrustig, werpt zich naar alle kanten, en meestentijds geeft zij, na eene kortstondige rust, den geest. Duurt de ziekte langer, dan hebben de afwisselingen van koude dikwijls plaats, niet zelden komen er meerdere op een' dag; soms schijnt de koorts, als het ware, geheel op te houden; den eenen dag is alles beter, den anderen weder erger; eindelijk ontwikkelt zich een ettergezweel, of naar binnen of naar buiten. Al deze verschijnselen nogtans, de plaatselijke uitgezonderd,

IV. D. 3°. en 4°. st.      T:      zijn



zijn onzeker, en men moet derhalve, in het bijzonder bij de *chronische Psoitis*, zeer oplettend zijn, wil men de ziekte niet miskennen. Het menigvuldigste zeker heeft men dit gebrek met heuppijn, pijn in de nieren, *Rheumatismus* en dergelijken verward. Bij de heuppijn echter bepalen zich de pijnen meer duidelijk in den loop der zitbeens- en dijzenuwen; bij de gebreken in de nieren zijn er meer duidelijke teekenen eener ongeregelde pisbereiding, die bij het bekkenabsces niet zelden ganschelijk gemist worden; tevens is de buiging van de dij en den rug hier niet zoo belemmerd. Is er twijfel omtrent den waren aard des gebreks, dan is het altoos raadzamer, het ergste te denken, ten einde zich op deze wijze het zekerste voor schade te hoeden.

### Oorzaken.

#### §. 393.

Tot de meest gewone oorzaken behooren die invloeden, welke de lendenspier sterk inspannen: sterke baringsweeën, vooral bij drukking van een beklemd, groot hoofd; kneuzing en verwonding door de tang, die verkeerd aangelegd werd, zware en langdurige tanggeboorten, die groote inspanning vereischen, uitwendige beledigingen dezer deelen door stooten, vallen, kneuzingen, het te vroeg verlaten des beds, waarbij de kraamvrouw dikwijls terstond na de geboorte weder hare huisfelijke bezigheden aanvaardt, zware lasten tilt en dergelijken meer. Bij de *chronische Psoitis* zijn zoodanige plaatsen

felijke oorzaken dikwijls maanden en jaren lang vooruitgegaan, zoodat men om dezelve reeds niet meer denkt. In zulke gevallen bespeurde de lijderes altijd onmiddellijk na de beleëdiging eene zekere pijn; dezelve verdween echter van lieverlede, en men slaat verder op dezelve geen' acht, hoezeer er altijd eenige spanning en gevoeligheid overbleef, tot ten langenlaatste, na korter of langer tijd, het gebrek uitbreekt. Ook de schaambeensfede kan tot *Psoitis* aanleiding geven. Gemeenlijk ontstaat de ziekte bij kwaadsappige, ongezonde voorwerpen, en liggen hier dikwijls inwendige oorzaken ten grondslag, bij voorbeeld *rheumatische*, jichtige en *scrofuleuse* ongesteldheden; aaneengroeiing door den oorspronkelijken vorm, en te vaste aanhechting der baarmoederlijke banden met de inwendige bekleedselen des bekken, waardoor bij de toenemende zwangerschap de *Uterus* losgescheurd wordt; vergroeiingen ten gevolge van stoornis in de maandstonden, van een' langdurigen, witten vloed; het gebruik van afdrijvende middelen bij zwangeren, en met een woord alle invloeden, waardoor het vaatgestel van den *Uterus* en het bekken geprikkeld wordt en ophoopingten ontstaan, kunnen reeds in de zwangerschap tot *Psoitis* en het ettergezwel in het bekken den grond leggen. FORD, WEDEMEIJER (z. GRÄFE'S *Journal*. Bd. V. St. 4), ASTLEY COOPER, HARLESS erkennen, als naaste oorzaak der *Psoitis*, beenbederf (*Caries*) der wervelen, en zijn van gedachten, dat de *Psoitis* en voornamelijk de uit inwendige oorzaken langzaam, en door kwaadsappige verschijnselen met eene uitterende koorts



zich ontwikkelende , grootendeels eene toevallige ziekte , namelijk oorspronkelijk uit eene beenontsteking en *Caries* van de ligchamen der wervelen en darmbeenen ontstaat en gaande gehouden wordt. Daar althans , waar zich een ettergezwel in het bekken gevormd heeft , zal beenbederf de grondoorzaak der ziekte uitmaken. Doch alhoewel ook in sommige gevallen eene lendenverzwering en ten gevolge derzelve een *Absces* in het bekken zich op de vermelde wijze kan ontwikkelen , zoo vindt men toch niet zelden de wervelen volkomen gezond en het beenbederf kan , indien het bestaat , veeleer het uitwerksel der begonnene verettering , dan de oorzaak derzelve zijn.

### *Uitgangen.*

#### §. 394.

Als gevolgen dezer ziekte gaven wij bereids de verdeeling en de verettering op. Gene doet zich kennen door de geheele verdwijning der verschijnselen , en zou voorzeker veelvuldiger verkregen worden , werd het gebrek in den beginne niet zoo dikwijls miskend en ondoelmatig behandeld. Deze ontsteking gaat het allerméeste tot verettering over , die zich door de bekende verschijnselen openbaart , nemende de aanvankelijk ontstekingsachtige koorts al meer en meer den vorm eener *Febris lenta hectica* aan. Bij de haastige *Psoritis* zal men dezen uitgang niet ligt voorbij zien , en de etter heeft zich ook hier gemeenlijk in het celwijsweeffel ,  
dat

dat de spieren omgeeft, nedergezet. De *Psoittis chronica*, die insgelijks niet zelden tot verettering overgaat, heeft een veel trager verloop, en de ettervorming ontstaat dikwijls eerst na eenige maanden, onder zeer duistere en onduidelijke teekenen, die naar de verschillende zitplaats des etters onderscheiden zijn. De etter zakt nu of naar binnen, of naar buiten; in het eerste geval heeft hij gemeenlijk zijn verblijf in de holte des bekken, of hij vormt pijpzweringe kanalen naar verafgelegene deelen, zelfs opwaarts tot in de borstholte, tegen de wetten der zwaarte, zoodat bij de lijderes eindelijk een teringachtige hoest, en alle verschijnselen eener ware *Phthisis purulenta* zich opdoen. In de meeste gevallen zakt de etter tot aan de dijspieren naar beneden, komt onder den liesband (*Ligamentum poulpartii*) en veroorzaakt in de liezen een rillend, pijnloos gezwel. Zoodra zich dit uitwendig vertoond heeft, houden de plaatselijke pijnen in de leverstreek op; de zwelling neemt toe, als de lijderes den adem inhoudt, of hoest; zij vermindert door drukking en bij eene horizontale ligging, en heeft veel overeenkomst met eene breuk (*Hernia*), waarvan zij zich, door de voorafgegane bijzonderheden en door de duidelijk te ontwarene vochtgolving laat onderscheiden. Soms zakt de etter nog lager onder den breeden dijszwachtel (*Fascia lata*) en vormt dan wel eens uitwendig eene dergelijke zwelling aan de knie. Menigmaal ziet men uitwendig, de etter in de holte des bekken afgezakt zijnde, dit gezwel naast den aars (*Orificium ani*) ontstaan; of er vormt zich een *Absces* aan de inwendige zijde der



dij; fomwijken vertoont zich hetzelfde aan den buik, of ook op den rug.

### *Voorzegging.*

#### §. 395.

Op zich zelve is de ontsteking van de lendenpier in het geheel zoo gevaarlijk niet, en zou gewis oneindig meer een' gelukkigen uitgang nemen, als het gebrek niet zoo dikwijls miskend en de noodige hulp in den beginne niet verwaarloosd werd. Van daar ook, dat de *acute Psoitis* naar evenredigheid minder gevaarlijk is, dan de *chronische*, juist ter oorzaak, dat zij minder miskend en vroeger doelmatig behandeld werd. Is er reeds etter voorhanden, dan blijft de voorzegging altoos hoogst ongunstig, en de ziekte neemt dan vaak na een' langer' of korter' tijd een' doodeliiken uitgang, hoezeer het niet aan voorbeelden ontbreekt, dat zelfs daar, waar reeds verettering en hevige koorts bestond, de genezing toch gelukte, waarvan ik een merkwaardig geval in mijn *Journal* (Bd. III. St. 2. Seite 206) geplaatst heb.

### *Geneeswijze.*

#### §. 396.

Over het geheel komt de ontstekingswerende geneeswijze hier te pas, en de Geneeskundige kan soms hier reeds veel ter verhoeding des gebreks bijdragen. Zoodra eene vrouw in de zwangerschap over kramp in de voeten klaagt, met een drukkend pijnlijk gevoel in de holte des bekken, dan moet men

men inzonderheid zorg dragen, dat de zwangere alle inspanningen van het ligchaam vermijde, en is het voorwerp daarenboven nog volbloedig, dan aarfele men niet, om eene voorbehoedende (*prophylactische*) aderlating te doen, ten einde den aandrang van bloed naar de holte des bekkens te beperken. Wijders zijn laauwe baden nuttig. Men zij tevens oplettend op alle uitflagen van zwangeren en kraamvrouwen, en trachte derzelve terugtreding door eene behoorlijke behandeling te verhinderen: is eenigerhande uitslag eensklaps verdwenen, dan kan men zeker zijn, dat het zijn weg naar de holte des bekkens genomen heeft; om deze reden stelle men dadelijk *Diaphoretica* en *Vesicatoria* in het werk, ten einde hetzelfde, zoo spoedig mogelijk, naar de huid terug te brengen. Ontstaat na de verdwijning van het huiduitslag een witte vloed en uitslag aan den buik, dan is het zoo veel te zekerder, dat er eene stofverplaatsing naar de teedeelen bestaat, en dan wordt iedere stompe pijn in de holte des bekkens van veel aangelegenheid. Laat zich het uitslag door uitwendige middelen niet naar de huid terug leiden, dan zijn warme baden en Spaansche vliegen aan de buitenzijde der dij ten dringendste aangewezen, waarmede men niet te lang toeven mag. Is er nu werkelijk *Psoitis* voorhanden, dan opene men eene ader, zette bloedzuigers, of make, zoo diep mogelijk, inkervingen, zoo nabij aan de plaats van de locale ontsteking, als geschieden kan; men zette bloedige koppen; tot inwendig gebruik zijn *Calomel*, verkoelende middelzouten dienstig; uitwendig inwrijvingen van *Unguentum*



*neapolitanum*, pappen uit *Species emollient.* met *Hb. Cicutae*, *Hyoscyami*, warme baden. De lijdende moet stil te bed blijven en zich van allen ligchaamsarbeid onthouden.

§. 397.

Heeft er zich verettering in de holte des bekken gevormd, hetgeen men voor zeker kan houden, als de kraamvrouw twee of drie malen daags een' koorts-aanval krijgt, dan moet men de teeldeelen en de streken van het bekken, vooral de lies- en darmbeensstreken en die der pisblaas boven de schaambeenderen allernaauwkeurigst onderzoeken. Vindt men bij het onderzoek geen' etterzak in het bekken, of aan de teeldeelen, dan kan men, als de etter eenigzins diep zit, niets doen, om deszelfs afzakking naar buiten te bevorderen; hoogstens kan men door eene behoorlijke ligging der lijderes der natuur behulpzaam zijn. Uitwendige middelen kunnen hier in het geheel niets verrigten. Vormt zich eindelijk uitwendig aan de teeldeelen een *Absces*, dan moet hetzelfde, zoo schielijk mogelijk, geopend en volgens heilkundige regelen behandeld worden. Wordt het *Absces* nu op de gewone wijze geopend, dan volgt, blijkens de ervaring, de dood nog vroeger, dan wanneer men het digt laat, en alle verschijnselen pleiten er voor, dat de toetreding der dampkringslucht in de etterholte van hoogst nadelige uitwerking is. Zal derhalve de kunstbewerking met gelukkig gevolg bekroond worden, dan moet men het *Absces* in dier voege openen, dat er geene lucht indringen kan. — Tot dit einde eenigerhande bijtmiddel aan te wenden, is, volgens onze ervaring

ring, veel pijnlijker, dan de insnijding, en vertraagt de ontlasting des etters. Niettemin moet men hier soms toe overgaan, aangezien de lijderes, uit vrees voor het mes, tot de insnijding niet besluiten kan. Wat nu de opening met het mes aangaat, hier verdient de Methode van JOHN ABERNETHY de meeste aandacht. Volgens deze opent men het gezwel met een' *Troisquart*, of een *Lancet*, en bedekt men, na de ontlasting des etters, dadelijk het gaatje met eene pleister, en laat de genezing en sluiting van hetzelfde der natuur over. Dusverre hebben wij altijd deze manier gevolgd, en nooit *Caries* zien geboren worden (\*). Eens schoof ik de huid spannenderwijze, alvorens de insnijding te maken, naar de tegengestelde zijde terug, maakte de snede en liet nu den vinger los, waardoor het indringen der lucht onmiddellijk van buiten verhoed werd, zonder de uitvloeijing te hinderen. Ontwikkelt zich het *Absces* op nieuws, dan herhale men de kunstbewerking op dezelfde wijze, hetgeen men zelfs niet te lang mag uitstellen. Langs dezen weg verandert

eind

(\*) Zou men hier niet zeer geschikt ter ontlasting des etters een kopglas kunnen gebruiken? Dat de toetreding der dampkringslucht, vooral bij *Psoitis* verderfelijk is, weet ik uit eigene ervaring; voor een paar jaren had ik zulk een' lijder onder mijne behandeling: ofschoon in den bloei zijnes levens en van een sterk gestel zijnde, verkeerde hij reeds in een' *hectischen* toestand ten gevolge der verettering; door de afsluiting der dampkringslucht echter onttrok ik hem een' gewissen dood. Het is hier de plaats niet, breeder hierover uit te weiden.

DE VERT.



eindelijk het ettergezwel der lendenpier in een eenvoudig uitwendig, en men kan dit als zeker aanmerken, zoodra bij de laatste kunstbewerking slechts weinig etter uitgevloeid is, als, nadat dezelve ontlast is geworden, geen etter meer te voorschijn komt, na alvorens in de strek van den *Pouppurschen* band sterk met den vinger gedrukt, denzelven teruggetrokken en de lijderes in eene staande houding gehoest te laten hebben; als voorts het hoesten niet meer op het op nieuws ontwikkelde gezwel werkt; als bij ééne horizontale ligging, of uitwendige drukking, hetzelfde niet meer vermindert. Is het zoo ver gekomen, dan kan men het gansche gezwel met eene snede openen en als gewoonlijk behandelen. Bij het openen zelve moet men het instrument in eene schuinsche rigting invoeren; voor de lancetsteek is de rigting van boven naar beneden de beste. Steeds zorg men, dat alle etter ontlast worde; des noods kan men de opening vergrooten; en men doet zeker goed, om de uitvloeijing van den etter te bevorderen, de lijderes in de meest mogelijke opgerigte houding te *opereren*, waarbij men haar somwijlen den adem inhouden en hoesten laat. Is de etter volkomen ontlast, dan moet men de wonde altoos met kleefpleisters toehalen en bedekken. Gedurende deze gansche behandeling moet de lijderes zich zoo stil mogelijk en in de meest opgerigte houding plaatsen.

### §. 398.

Meestentijds zakt de etter naar de scheede af, en gehoorzaamt zodoende, aan de wetten der  
 zwaar-

zwaartekracht. Bespeurt men bij het onderzoek den etterzak, of eene weeke, golvende plaats, dan opent men ook deze bij tusschenpoozen, waartoe de *Hysterotomus* van OSIANDER zeer geschikt is. Mogt de lijderes tegen het openen met een instrument zich aankanten, en heeft er zich alreede een aanmerkelijk ettergezwel gevormd, dan kan men eene spons in de scheede brengen, en over de, niet door de spons bedekte, plaats, eene Spaansche vliegpleister, op zeemleër gestreken, leggen, ten einde het inwendige vlies der scheede te prikkelen, op te heffen en dunner te doen worden, waardoor men het doorbreken van het *Absces* bespoedigt. Was de plaats zeer week, dan kan men ook zonder veel omflags en zonder der lijderesfe iets te zeggen, hetzelfde met een' waterbreker, of *Troiquart* openen. In dit geval zou mischien de *Speculum Vaginae* van DUPUYTREN bijzonder geschikt zijn, om, nadat dezelve binnengebragt is, en ingeval de voorgestelde *Operatie* door middel van het mes tegenkanting ontmoette, eenigerhande bijtmiddel op de weeke, golvende plaats aan te brengen.

### §. 399.

Ten aanzien der inwendige behandeling, moet men, inzonderheid bij sterke verettering en uitte- rende koortsen, op versterking der lijderesfe en verbetering harer spijsvertering de aandacht vestigen, hoofdzakelijk door het rijkelijk gebruik van kina, in vereeniging met IJslandsche mos en een' voedenden eetregel. Trouwens de genezing gelukt niet altijd met de opgegevene geneeswijze. Dit kan voort-



voortvloeijen uit eene ontsteking der etterholte, ondanks alle voorzorg; eene inwendige oorzaak, die de ziekte deed geboren worden, nog voortwerkt en gene onderhoudt; reeds aanwezige *Caries* en ontwikkeling van het *Absces* na eene zeer hevige ontsteking. Haastige ontstekingen hebben gemeenlijk in het nabijgelegene celweeffel eene verdikking en verharding ten gevolge, uit hoofde de holte van het daarop gevormd wordende *Absces*, na de ontlasting des etters, zich minder zamentrekt en vernaauwt, dan een *Absces*, dat na eene *chronische* ontsteking ontstaat, waaraan het aangrenzende celweeffel slechts weinig deel neemt. Bij de *Abscesfen* van de laatste soort is derhalve de opgegevene geneeswijze vooral heilzaam. — Ingeval men in de genezing niet slaagt, ziet men tweederlei uitgangen plaats grijpen; de etter namelijk begint zoo langer zoo meer uit te vloeijen, stervende de lijderes aan uittering, of het *Absces* gaat tot eene pijpzweer over, waarbij de lijderes dikwijls lang leeft; eene zoodanige fistel zag ik na een *Absces* in het bekken ontstaan bij eene voorname vrouw, die hoogst moeilijk verlost was en bij welke de *Psoitis* door den Arts miskend werd; zij leefde nog vele jaren, tot zij, ten gevolge van verettering en daaruit voortgevloeid beenbederf der bekkenbeenderen, aan uittering stierf. Desniettemin bestaan er gevallen, waar, na werkelijk beenbederf, alles ten goede afliep. Om deze reden mag men zelfs in dit en andere vroeger vermelde gevallen, de hoop niet geheel en al opgeven. — Bij ontsteking van de etterholte kunnen rust, uit- en inwendige ontstekingwerende middelen, en vooral

ee-

eene spoedige ontlasting des nieuw gevormden etters, op eene, van de eerste opening eenigzins verwijderde, plaats somwijlen nog den slechtsten uitgang voorkomen; en houdt men zich overtuigd, dat eene nog voortwerkende oorzaak der aanhoudende verettering ten grondslag ligt, dan moet men zoodanige middelen in het werk stellen, welke met den ziekte-toestand overeenstemmen. Voor het overige behoort de verdere uitwendige behandeling bij de *Chirurgie* te huis, weshalve wij dezelve hier gevoegelijk kunnen overslaan.

#### L I T T E R A T U R.

§. 400.

VOGEL'S *Handbuch*. IV. Theil.

C. C. SIEBOLD'S *chir. Tagebuch*. p. 18.

B. OSIANDER, *die Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten und die Entbindungswissenschaft betreffende Abhandlungen und Nachrichten*. Tübingen 1787. 8°. S. 2.

Desselben *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe*. I. Bd. s. 153.

RICHTER'S *Therapie*. 1ter Bd.

Desselben *Chirurgie*. 5ter Bd.

HARLESS, *Specielle Nosologie*, eerste Hälfte.

HORN'S *Archiv*. VI. Bd. 1 St. N°. 5.

V. SIEBOLD'S *Journal*. III. Bd. 2tes St. s. 206.



## ZESDE HOOFDSTUK.

*Van de witte zwelling van het been  
bij kraamvrouwen.**Begrip en geschiedenis der ziekte.*

## §. 401.

Onder *Phlegmatia alba dolens puerperarum* verstaat men eene geheel eigenaardige ziekte, door welke, wel is waar, niet alle kraamvrouwen zonder onderscheid overvallen worden, daar zij in sommige gevallen reeds tegen het einde der zwangerschap zich openbaart, en men zelfs hoogst zeldzame voorbeelden heeft, dat mannen er door aangedaan werden (WHITE, SIMONS, SANKEY); in de meeste gevallen nogtans komt zij eerst na de verlossing te voorschijn, en staat derhalve onder de ziekten der kraamvrouwen juist op hare plaats. Zij doet zich, over het geheel genomen, kennen als een vaak plotseling zich vormende, vaste, gespannene, veerkrachtige, glanzige, warme, pijnlijke zwelling van eene bleekwitte kleur, welke de onderbuikstreek (*Regio hypogastrica*) en de naburige plaatsen tot beneden aan den voet inneemt; meestal alleen de onderste ledematen; in enkele gevallen volgens CALISSEN, CASPER, en eene, door ons in den jare 1824 gedane, waarneming de bovenste ledematen en de eene helft des ligchaams

aan-

aandoet en over het algemeen korter' of langer' tijd na de verlossing te voorschijn treedt.

§. 402.

De verschillende, niet zelden geheel verkeerde namen, dezen ziektenvorm gegeven, toonen reeds klaar genoeg, hoe duister en zwak onze begrippen omtrent het wezen derzelve nog zijn, en wij behoeven ons zoo veel te minder daarover te verwonderen, aangezien deze ziekte in het geheel tot de ziekelijke zeldzaamheden behoort, en onze denkbeelden omtrent andere ziekten, die naar evenredigheid oneindig meer voorvallen, niet veel helderder zijn. De meest algemeene naam der ziekte is *Phlegmatia alba dolens puerperarum*, woordelijk, verzameling eener pijnlijke, witte, slijmachtige vloeistof: *Φλεγμα* namelijk heet bij HIPPOCRATES hitte: als zoodanig wordt het door hem en alle latere Artsen voor eene witte, taaije, koude vloeistof in het ligchaam gebruikt, welke de Romeinen *Pituita*, slijm noemen. Daarenboven heeft men haar *Oedema lacteum*, *Oedema Puerperarum* (CALLISSEN) genoemd; voorts *Ischias a Spareanosi* (*σπαργανωσις* beteekent oorspronkelijk het inwikkelen, of omzwachtelen des kinds), en men verstaat daaronder ook (*Diascorides*) eene, ten gevolge der te overvloedige zogaffcheiding (*Polygalalia*), ontstane stofverplaatsing naar eenig deel, zoodat *Scelalgia* (van *σκελος* voet, of been en *αλγος* pijn) *puerperarum*, mischien de eenvoudigste en beste benaming is. Bij de Franschen komt dit gebrek meestal onder den min juiststen naam van *enfleur des jambes lacteuse*, *infiltration lacteuse* voor. De

En-



Engelschen noemen haar nu *milk leg*, dan *swelled leg*, of met eene omschrijving *painful intumescence of the lower extremity incident to lying in-women*; bij ons eindelijk wordt zij met den naam van witte zwelling van het been in het kraambed bestempeld.

§. 403.

Dat de ziekte over het geheel tot de zeldzame verschijnselen behoort, blijkt aldra uit een kort, geschiedkundig overzicht derzelve. C. WHITE, van wien wij, volgens mijn weten, de eerste uitvoerige behandeling dezer merkwaardige ziekte hebben, zegt ons, dat van één duizend acht honderd zeven en negentig vrouwen, die in het *Westminster General Dispensary* verlost zijn geworden, slechts vijf er door aangedaan werden, en van acht duizend vrouwen, die hij deels in het kraamgesticht te *Manchester*, deels in zijne bijzondere, uitgestrekte praktijk verlost heeft, slechts vier deze ziekte kregen. WYER zag van negen honderd negen en tachtig kraamvrouwen vijf daardoor aangetast; SANKEY van twee honderd slechts eene; JÖRG heeft in eene vijf- en veertigjarige praktijk de ziekte slechts drie malen zien plaats grijpen, en ik zelf heb dusverre na eene zes- en twintigjarige praktijk slechts vijf gevallen van dien aard bijgewoond, waarvan ik er vier behandeld heb. Reeds uit dit vlugtig overzicht wordt het verklaarbaar, waarom deze ziekte gedurende zulk een' langen tijd geheel onbekend bleef, en waarom men later, toen men naauwlettender op dezelve werd, de ziekte dikwijls verwarde en nog

tot op de laatste tijden ziektevormen, onder den naam van *Phlegmatia alba dolens* beschrijft, die alles behalve daartoe te brengen zijn. De oude Schrijvers schijnen haar ganschelijk over het hoofd gezien te hebben, hetwelk ons echter geenszins kan doen besluiten, dat zij hun niet is voorgekomen. MAURICEAU is voorzeker de eerste geweest, die ons eene eenigzins breedvoeriger beschrijving van dit gebrek geleverd heeft (in het jaar 1778); naderhand hebben de Schrijvers met meerdere oplettendheid deze ziekte gadegeslagen en beschreven.

### *Diagnosis.*

#### §. 404.

De *Phlegmatia alba dolens puerperarum* vertoont ons ten aanzien van haren vorm, hare during, hare uitgangen zoo vele verscheidenheden, en de Schrijvers komen in de beschrijving derzelve zoo weinig overeen, dat het inderdaad eene hoogst-moeijelijke taak is, een trouw, naar de natuur genomen, alle wezenlijke hoofdtrekken omvattend tafereel derzelve te schetsen. Zeer zelden in de eerste dagen des kraambeds, meestentijds eerst tien tot veertien dagen na de bevalling tot de vierde, zeldzaam tot de zesde week toe, bespeurt de kraamvrouw aanvankelijk eene niet zeer hevige pijn, die gemeenlijk van de *Regio hypogastrica* of *inguinalis* der eene zijde, soms ook van het heiligbeen, of van de okselstreek aanvangt, en meerendeels tot de halve zijde des ligchaams

IV. D. 3°. en 4°. st.                      V v                      zich



zich bepaalt (\*). Veeltijds verspreidt zich de pijn zeer fchielijk over het gansche lid, zoodat niet een plekje, zonder de hevigste pijn kan aangeraakt worden; en het der lijderes volstrekt onmogelijk is, hetzelve te verroeren. Hier komt spoedig koorts bij, die veelal zonder koude zich ontwikkelt, en zelfs, tegen den avond zich verheffende, met ijling vergezeld gaat. Edoch het vaatgestel wordt er niet alleen in betrokken, er vertoonen zich ook *sympatische* ongeregeldheden in het zenuwgestel en de spijsverteringsorganen. Menigmaal volgt de pijn de rigting van den *Nervus cruralis* en *obturatorius*. Volgens BURNS gaat de zwelling veelal eene prikkeling der baarmoeder vooraf, verbonden met eene verhoogde gevoeligheid van alle, in het bekken begrepene, deelen (†). De baarmoeder is een weinig gezwollen, de pols zeer snel (honderd twintig

(\*) Een der door ons behandelde voorwerpen, had eenige dagen te voren eene branding en jeuking in de regter voetzool bespeurd.

(†) Ik heb daarom onder de vijf door mij waargenome-  
mene gevallen, waarvan een de nog onlangs hier aanwezige Heeren Prof. CARUS en FRANKE uit *Dresden*, o. m. r. Dr. ERHARD en eenige andere Artsen zagen, de *Phlegmatia alba dolens* twee malen na eene vervroegde geboorte (*Accouchement forcé*) en eens na eene zware tanggeboorte zich zien ontwikkelen, wordende bij het *Accouchement forcé* de baarmoeder voornamelijk in een' zeer geprikkelden toestand gebragt; bij de zoo even genoemde lijderes, welke ik aan CARUS zien liet, moest ik om het voorkomen der navelstreng en omdat het water reeds weggevloeid was, de verlossing bespoedigen en den baarmoedermond met de vingers door geweld openen.

tig tot honderd veertig), doch week en niet vol, de warmtegraad der huid verhoogd; de lijderes heeft dorst; de tong is wit en vochtig; de eetlust ontbreekt; de lijderes nogtans heeft niet altijd een bleek, opgeblazen aangezicht en geene ontlasting, of raakt zeer stinkende, galachtige stoffen kwijt. De *Urin* is smeurig, de kraamvloed soms onderdrukt of stinkend, op andere tijden ongeregeld. De lijdende brengt meestal onrustige nachten door, ijlt in sommige gevallen en zweet sterk. Te gelijker tijd wordt nu de pijn al heviger; de liesklieren en de schaamlippen van de eene zijde zetten op en de lijderes heeft een gevoel van pijn, zwaarte en stramheid in het eene, of andere van deze, of aangrenzende deelen, hetgeen nu van lieverlede, van boven naar beneden, langs het been tot aan den voet zich verspreidt. De ziekte heeft in dit eerste tijdperk, dat ik liefst het pijnlijke wil noemen, eenige overeenkomst met een haastig *Rheumatismus*, met dat onderscheid, dat hier alleen de hevige ontstekingsachtige verschijnselen ontbreken. Trouwens zij kunnen voorhanden zijn, als zij na moeilijke verlossingen, door beleediging van de baarmoeder en de aangrenzende deelen in het bekken, zich opgedaan had, als wanneer deze ziekte in dit tijdperk ligtelijk met eene andere kan verwisseld worden; ook ten aanzien van de verklaring der naaste oorzaak dezer ziekte is deze *Complicatie* van

nen. Het kind lag dwars. Slechts in twee gevallen, van welke ik de eene lijderes verlost, echter niet behandeld heb, was de baring ligt en geregeld.



van aangelegenheid. Langzamerhand, gewoonlijk reeds de eerste twee of drie dagen, laat de pijn eenigzins na en beginnen de deelen te zwellen, hetgeen dikwerf zeer geregeld, van boven aanvangende, tot den voet zich uitstrekt, doch vaak ook sneller geschiedt, zoodat reeds na verloop van een tot twee dagen de eene zijde van de *Regio hypogastrica* tot aan de teenen geheel opgezwollen is. Niet altijd houdt de zwelling zulk een' regelmatig loop. WHITE beweert, wel is waar, dat het eigenaardige kenteeken dezer ziekte bestaan zou in eene zwelling van de geheele schaamlip, alleen van eene zijde, welke vast, glanzig, warm, gespannen, veerkrachtig en pijnlijk is, plotfeling zich ontwikkelt, van eene bleek witte kleur is, en gaandeweg zich tot den voet uitbreidt, en dit zoo bestendig zou plaats grijpen, dat als een been alleen lijdt, de zwelling van de schaamlip derzelfde zijde zoo juist omschreven is, dat, als men eene lijn van den navel tot den aars trekt, dezelve hier niet buiten zal komen. Doch, offchoon wij niet ontkennen willen, dat dit teeken in de meeste gevallen voorhanden is, zoo schijnt WHITE toch zoo veel te zeggen, dat hij het als een eigenaardig, nimmer gemist wordend kenteeken opgeeft. Ongetwijfeld trof men toch ook gevallen aan, waar dit niet zoo was, en waar namelijk de zwelling het allereerste in de kuit en aan de knie begon en zich van daar of naar boven en beneden verspreidde (\*).

§. 405.

(\*) Dit was het geval bij de boven vermelde lijderes, die CARUS zag; offchoon dezelve in den eersten tijd na  
de

## §. 405.

Onderzoekt men nu de, in de zwelling betrok-  
kene, deelen naauwlettender, dan ziet men dat de  
zwelling overal gelijkmatig is, en niet verandert  
bij eenigerhande ligging; de deelen zijn voller en  
harder, dan gewoonlijk, zeer gespannen, veerkrach-  
tig, voor den druk eens vingers in het geheel niet,  
of slechts voor een' korten tijd wijkende, doch  
hoogst pijnlijk bij de aanraking, en geene kuilen  
nalatende. In weerwil van dit alles mist men de  
ontstekingachtige roodheid en de algemeene verschijn-  
felen der ontsteking, of het moest zijn, dat zij bij  
voorbeeld na eene zware en gewelddadige verlossing  
volgt, in welk geval althans verschijnselen van ontste-  
king voorafgegaan zullen zijn, ten gevolge van de aan-  
doening der teeldeelen, van eene wondkoorts, of *Me-  
tritis*, of zelfs de ontwikkeling der *Phlegmatia alba  
dolens* zelve nog kunnen verzellen. In dit geval is de  
pols van begin aan geprikkeld en ontstoken, anderzins  
bespeurt men wel eens niets ontstekingachtigs in  
denzelven (*Puls. inflammatorius stricte sic dictus*)  
en hij is het ook in het vervolg niet, hoezeer altijd  
nog zeer rad. De zwelling zelve heeft eene bui-  
tengewone, witte en glanzige kleur, en is hoogst  
zelden met enkele roode vlekken, die ook wel eens  
puisten vormen, voorzien: steekt men in dezelve,  
dan

de verlossing over pijnen in de heiligbeensstreek en de  
diepte des buik klaagde, vertoonde de opzwellings, verzeld  
met de hevigste pijnen, zich het allereerst in de kuit en  
de knie, en bleef eenige maanden lang daar zitten.



dan vloeit er soms volstrekt niets uit; meestal echter ontlast zich eene geringe hoeveelheid eener heldere, niet gestolde, *lympathieke* vloeistof, gelijk ik ze in een der door mij waargenomene gevallen gezien heb; de zwelling echter verandert hierdoor niets. Wat den duur en graad dezer laatste aanbelangt, deze zijn ook zeer onderscheiden; reeds boven heb ik aangemerkt, dat zij somwijlen reeds in de eerste vier- en twintig tot acht- en veertig uren volkomen ontwikkeld zich vertoont; menigmaal nogtans houdt het eenige dagen aan en in dit geval wordt de voet altijd het laatste aangetast. Soms wordt de voet der ongestelde zijde tweemaal zoo dik, als de andere, doch dit grijpt slechts zelden plaats; bij wijlen evenwel bereikt zij zelfs een' hooger en graad, en ik moet op grond mijner ondervinding, in twee gevallen, ROB. THOMAS gelijk geven, als hij zegt, dat de zwelling bij vrouwen van eene slappe vezel, die reeds onder de zwangerschap sterk aan huidwaterzucht en aderspatten op den voet onderhevig waren, veel sneller toeneemt. Ik houd mij overtuigd, dat eene mijner lijderessen eens vroeg of laat aan waterzucht sterven zal. Nadat nu het tweede tijdperk (*Stadium*), hetgeen wij het *St. tumiferum* noemen willen, twee tot acht dagen geduurd heeft, gaat de ziekte in het derde of in het *Stad. sequelarum s. chronicum* over. De koorts houdt op; de zwelling met al haar verzellende verschijnselen verminderen in dezelfde orde, als zij zich ontwikkeld hadden. Het gansche lid is nu ongelijk op het gevoel en de watervaten zijn menigwerf hard gespannen (*Chordae*), zoodat

het

het voorkomt, alsof er klieren verhard zijn. ROBERT THOMAS meent echter, dat men, naauwkeurig onderzoekende, derzelve rapden minder omschreven vindt, dan bij de *Glandulae conglobatae*, en de ongelijkheden ontspruiten uit de onderscheidene lijvigheid der, op verschillende plaatsen, uitgestorte *Lympha*. De klieren zelve kan men dikwijls duidelijk voelen, die bij de betasting gevoelig, doch zelden zeer opgezet zijn, en grooter zich voordoen, doordat de vroegere zwelling opgehouden heeft. Nadat nu koorts en zwelling afgenomen zijn, blijft het aangedane lid nog bij voortduring stijf, zwaar, doof en zwak, en het duurt, over het algemeen, zeer lang, eer het deel weder deszelfs vorige gezondheid verkregen heeft; ja dikwijls komt het eenmaal daarin betrokkene deel nooit tot deszelfs natuurlijken staat terug, hetgeen later nog bij de beschouwing der gevolgen en uitgangen dezer ziekte met meerdere overwogen zal worden.

#### §. 406.

Offchoon het nu, blijkens den vorm en den loop der ziekte, haar aan geen eigenaardige kenteekenen ontbreekt, zoo is het toch zelfs bekwamen Artsen overkomen, om haar met andere, meer of min op haar gelijkende vormen te verwarren, en het zal uit dien hoofde zeker niet overtollig zijn, de voornaamsten derzelve met hare onderscheidene kenmerken hier bij elkander op te geven.

#### §. 407.

Van het zuchtgezwel (*Oedema*) onderscheidt



zich de ziekte zeer duidelijk: het zuchtgezwel is veel weeker, kouder en deegachtiger op het gevoel, laat bij drukking eene groeve na en is ten eene-male onpijnlijk. Hetzelve begint van onderen van den voet af, bijzonder rondsom de enkels, en gaat van lieverlede naar boven. Bij eene waterpasfe ligging vermindert het zuchtgezwel, en steekt, of snijdt men er in, dan loopt er eene aanmerkelijke hoeveelheid vocht uit. Op de onderhavige ziekte heeft de *Hydrops cellulosus puerperarum* eenige meerdere gelijkenis, door de daarmede gepaard gaande sneeuw witte kleur, doch zij is meestentijds over het gansche ligchaam verspreid en bezit daarenboven overvloedige kenteekenen.

#### §. 408.

De *hysterische* opblazing (*Pneumatosi hysterica*), welke zelfs de voortreffelijke SYDENHAM met *Phlegmatia alba* zou verwisseld hebben, heeft doorgaans geen zeker verloop, is eene vlugtige, krampachtige zwelling, verdwijnt even plotseling, als zij ontstaat, en overvalt meerendeels alleen zwakke, *hysterische* vrouwen, en vereenigt zich om die reden altijd met velerhande *hysterische* toevallen. Gemoedsaandoeningen, verkouding, sterke hitte en dergelijken zijn de aanleidende oorzaken derzelve. — Met het luchtgezwel (*Emphysema*), de roos (*Erysipelas*), de *Induratio Telae cellulosaë*, de heupjicht (*Ischias*) zal de onderhavige ziekte niet ligt, tenzij door een' eerstbeginnende in de kunst, kunnen verward worden. Intusschen verdient hier eene, zeker hoogst zeldzame, verwijding

ding der watervaten (*Varicositas vasorum absorbentium*) (\*) vermeld te worden, welke SÖMME-RING eenmaal gezien heeft, waar bij eene volsappige vrouw, wier kniegewricht vergroeid (*Anchylosis*) was, de opflorpande vaten zoo verwijd zich ver-toonden, dat zij eene foort van zuchtgezwel vorm-den. Als hij hetzelfde met eene naald opende, sprong de beslotene *Lympha* met eenige kracht er uit. Dit alleen reeds en het gansche verloop der ziekte zal beide ligt van elkander doen onderken-nen. — Bij de eenvoudige *Scelalgie*, die ook JÖRG van de *SCELALGIA Puerperarum* onderscheidt, neemt de pijn bij iedere beweging toe, alhoewel er niet altijd zwelling mede gepaard gaat.

#### §. 409.

Eindelijk moeten wij nog van twee andere foorten van ziekten gewag maken, waarvan de laatste inder-daad met de onderhavige ziekte, te weten in het *chronische* tijdperk der laatste, zoo veel overeen-komst heeft, dat men haar voor eene basterdfoort derzelve zou kunnen houden. Dit is namelijk eene foort van *Elephantiasis*, die onder den naam van klierziekte van *Barbados* bekend staat, overmits zij op dit eiland het menigvuldigste, edoch, volgens de waarnemingen van THOMAS, niet uitsluitend voor-komt. Dr. HENDY (†) houdt eene ontsteking en ver-

(\*) *De morb. vasorum absorbentium. Traj. ad Moes-num* 1795. p. 44. §. 22.

(†) F. SCHNURRER, *geographische Nosologie*, 8<sup>o</sup>, Stuttgart 1814, p. 426.



verstopping der opslorpemde vaten voor de naaste oorzaak dezer ziekte. Bij ons is uit baarblijkelijke gronden eene mistasting in beide niet mogelijk; in gene landen is hare juiste onderscheiding evenwel, die voorzeker nog het meeste uit het verloop der ziekte en de bijomstandigheden zal moeten opgemaakt worden, zoo veel te belangrijker, naar gelang hare behandeling onderscheiden is. De tweede soort van ziekte is, naar het schijnt, insgelijks eene basterdsoort van *Elephantiasis* en heerscht oorspronkelijk onder de inwoners van *Cochin*, aan de kust van *Malabar*, en is om die reden onder den naam van *Cochin leg* bekend. Zij bestaat in eene opzwelling van het eene been en strekt zich van de navoetsbeenderen tot de knie toe uit, en is niet alleen daardoor gemakkelijk van de *Phlegmatia alba* te onderkennen, maar ook inzonderheid, door dat zij pijn, noch moeilijkheid in het gaan veroorzaakt.

#### *Oorzaken en wezen der ziekte.*

##### §. 410.

Het zou ons te ver buiten de omschrevene grenzen van een Handboek brengen, indien wij ons breedvoerig met het onderzoek van al de bewijzen voor en tegen afgeven wilden, die de verschillende Schrijvers voor hun gevoelen over de verwijderde oorzaken en het eigenlijke wezen dezer ziekte, en tegen de ongerijmde meeningen van anderen te berde gebragt hebben. Wij laten het derhalve bij eene opgave van de gevoelens der beroemdste Schrijvers, onze eigene gedachten er bijvoegende.

Zul-

Zulken, die eenig meerder onderrigt daaromtrent verlangen, verwijzen wij naar de werken van WHITE en CASPER (*infr. citat.*)

#### §. 411.

Wat vooreerst de gelegenheidgevende oorzaak aanbelangt, zoo heeft men het veelvuldigste het vatten van koude daarvoor gehouden: want eens ter zijde geschoven, dat ons het opsporen eener zoo algemeene ziekteoorzaak niet de minste verklaring omtrent het wezen dezer gewigtige ongesteldheid geeft, zoo heeft het aan de meeste Artsen, die zelven de ziekte waargenomen hadden, niet mogen gelukken, eene wezenlijke verkouding als gelegenheidgevende oorzaak aan te toonen, en in de enkele gevallen (\*), waar gene voorafging, bleef

(\*) Onder de vijf gevallen, die ik in mijne zes- en twintigjarige praktijk heb aangetroffen, waren er slechts twee, waar de kraamvrouwen te voren bepaald koude hadden gevat; bij de eene na eene ligte, regelmatige verlossing reeds in de zwangerschap door 'tugt, en doordat zij zich des daags bestendig bij het vensterraam ophield, en des nachts in het bed lag, met de regterzijde naar een' kouden wand gekeerd, waarom het regter der onderste ledematen dan ook door de *Phlegmatia* aangetast werd; bij de andere na eene moeilijke verlossing op den tienden dag des kraambeds door de verwisseling van koud beddengoed; bij de drie anderen was het door geene koudevatting te weeg gebragt; en maakte deze werkelijk de gelegenheidgevende oorzaak uit, dan moest de ziekte zich bij menigvuldige verkoudingen, waaraan zwangeren vóór, na en onder de verlossing zich blootstellen, oneindig meer ontwikkelen.



bleef het dan toch altijd nog hoogst twijfelachtig, of zij tot de ziekte, als de oorzaak tot het uitwerksel, stond; want anders kan men met hetzelfde recht andere schadelijke magten, zoo als bij voorbeeld de *Anasarca* evenzeer als gelegenheidgevende oorzaak beschouwen, dewijl zij soms deze ziekte vooruitging. Even zoo min schijnen gemoedsaandoeningen op zich zelve tot dit gebrek aanleiding te geven; immers dan zoude zij veel meer bespeurd worden. Belemmerde kraamvloed, ongeregelde zogaffcheiding (\*), moeilijke verlosfingen (†), en daar-

(\*) Geene der kraamvrouwen, welke ik door de ziekte zag aangetast, heeft gezoogd. De lijderes, welke CARUS zag, had het kind slechts eenige dagen aan de borst gehad, doch de zogaffcheiding werd door het zwakke, ontijdig geborene en door middel van het *Accouchement forcé*, wegens de dwarse ligging en zich aanbiedende navelstreng ter wereld gebragte kind niet genoegzaam bevorderd, en daar het vroegtijdig stierf, moest het zogen geheel en al gestaakt worden. Ondertusfchen heeft mijn schoonvader, de heer Dr. J. CHR. GOTTL. SCHÄFER, aan wien de ziekte gedurende eene vijftigjarige praktijk, gelijk hij mij fchreef, ook slechts zeldzaam voorkwam, dezelve toch een paar malen bij zelfzogende waargenomen.

(†) Onder de vier aan ons voorgekomene gevallen was eene kunstmatige verlossing, door het *Accouchement forcé*, door middel van de keering wegens voorligging der *Placenta* op den baarmoedermond, voorafgegaan, en had de verkouding op den tienden dag na de bevalling plaats gegrepen; in een ander zag ik mij genoodzaakt, van wege de naauwte des bekkens en beklemming des hoofds de verlossing met de tang te bewerkftelligen; zij

daaruit voortvloeiende prikkelingen van den *Uterus* en de naburige deelen zijn nog minder als zekere *Causae remotae* aan te merken; want de ziekte komt immers reeds in de zwangerschap, ja zelfs in enkele gevallen bij mannen voor, en zelfs in de meeste gevallen van *Scelalgia Puerperarum* gingen de, in het kraambed aanwezige, verrigtingen volkomen haren natuurlijken gang. Dat der ziekte eene zekere kiem, eene *Causa praedisponens* ten grondslag moet liggen, kan men bijkans voor zeker houden, naardien vrouwen, die eenmaal dit gebrek ondergaan hebben, ligt weder daardoor aangetast worden. Waarin echter deze kiem bestaat en of zij mogelijk eerst uit de eenmaal plaats gehad hebbende ziekte zich ontwikkelde, durf ik niet bepalen. WHITE nu erkent als naaste oorzaak der onderhavige ziekte eene verstopping der watervaten en ten gevolge daarvan eene ophooping van *Lympha* in de ongestelde deelen, en gelooft, dat zij voornamelijk uit de aanhoudende drukking van het kindshoofd

was zeer moeilijk, verscheidene trekken waren er noodig, en de weeke deelen des bekkens, spieren, zenuwen, vaten, bloed- en watervaten hadden door drukking, kneuzing en prikkeling tijdens de kunstbewerking veel geleden; hier ontwikkelde zich het gebrek eerst eenige weken daarna en zonder voorafgegane verkouding; daarentegen was in een ander geval de geboorte zeer gemakkelijk en ligt in haar werk gegaan. In het vierde, bereids boven vermelde geval vond ik mij, daar de nog kloppende navelstreng zich aanbod, het vruchtwater afgevoerd was en door de onregelmatige ligging des kinds insgelijks gedrongen, de verlossing te bespoedigen.



hoofd op de opslorpende vaten in het bekken haren oorsprong zou ontleenen. De rand namelijk aan de bovenste engte des bekkens vormt dikwerf eene sterk vooruitsstekende lijn aan de schaambeenderen, waardoor er vaten in sommige deelen verscheurd worden. Doch zulk eene beleediging zal niet de pijn verwekken, immers de zwelling zelve gaat deze vooraf, en vertoont zelfs de ziekte zich niet, gelijk wij eenmaal zagen, ook aan de bovenste ledematen; en, wat meer is, bij mannen? TRYE schrijft de ziekte mede aan verstopping der watervaten toe, die, ten gevolge eenigerhande ontsteking geboren wordende, drukking, of de opslorping eener scherpe stof veroorzaakt had. DENMAN is bijkans van hetzelfde gevoelen; hij veronderstelt, dat de ziekte allereerst in de liesklieren ontstaat, door de opslorping van een zeker, prikkelend beginsel in den kraamvloed, als gevolg eener onnatuurlijke afscheiding van den *Uterus*. Ook FERRIAR stemt voor ontsteking der opslorpende vaten, zonder de geboorte juist daartoe uitsluitend te betrekken, omdat de ziekte ook wel gedurende de zwangerschap zich ontwikkelen kan. CASPER voegt zich ook bij diegenen, die eene ontsteking der watervaten, en in enkele gevallen mischien van het celweeffel, voor de naaste oorzaak der ziekte houden. Even zoo CARUS. DAVID DAVIS daarentegen gelooft, deze in eene hevige ontsteking van eene of meerdere der voorname aderen binnen het bekken, of in deszelfs nabijheid te vinden, waardoor derzelver vliezen verdikt worden. Zoo vormden zich schijnvliezen in haar inwendige, en eene langzame stolling

van

van hetgeen zij bevatten; somwijlen verettering van haar gansche weeffel. Daardoor wordt de ruimte der vaten van lieverlede minder, dikwijls geheel verftopt, zoodat ze het haar toegevoerde bloed niet verder kunnen voortftuwen enz. HULL denkt, dat de naaste oorzaak bestaat in eene toevallige ontsteking, die eene fchielijke uitstorting eener aanmerkelijke hoeveelheid wij en ftolbare *Lympha* uit de uitwasemende vaten in het celweeffel der aangedane deelen te weeg brengt. ROB. THOMAS verklaart zich niet duidelyk, als hij zegt: de ziekte fchijnt een plaatselyk karakter te hebben en tot de watervaten van het lid der ongeftele zijde beperkt te zijn. Dr. J. CHR. GOTTLIEB SCHÄFER is ook van gevoelen, dat de zitplaats der ziekte niet in het bloed en deszelfs wij, gelijk bij de zogkoorts, maar in het watervaatgeftele zij op te fpooren, en dat dezelve door de drukking in de zwangerschap op de watervaten voornamelyk de dijen en beenen aandoet. ALDERS eindelyk beweert, dat de dijzenuwen de deelen zijn, die het eerfte lijden, en dat de zwelling van het celweeffel als een gevolg van het lijden der zenuwen is aan te merken.

#### §. 412.

Eindelyk nu zoo ver gekomen zijnde, dat ik ook mijne denkwijze over het wezen dezer ziekte zoude mededeelen, zoo ftel ik terftond op den voorgrond, dat mij de, van de ziekte gemaakte, waarnemingen nog niet toereikende zijn, om iets zekers en bevredigends daarover te kunnen zeggen; offchoon mijn gevoelen op de door mij gedane waarnemingen ge-

grond



grond is, beschouwe men hetzelfde slechts als eene beredeneerde veronderstelling (*rationellen Hypothese*) en ik wil gaarne aan anderen de beslissing overlaten, of zij eenige waarde heeft, dan niet. Het is gebleken, dat de meesten der bijgebragte Schrijvers zich voor ontsteking der watervaten verklaard hebben, desnietteenstaande moet ik toch bekennen, dat het mij voorkomt, dat de meeste eigenaardige kentekenen van ontsteking ontbreken: noch de pols, noch de *Urin*, noch de ziekte kenfchetsende, witte kleur der zwelling pleiten voor dit gevoelen, en de bewijzen, die CASPER voor zijne bewering en tegen WHITE's gevoelens aanvoert, komen mij ten eenemale ongegrond voor. Nog minder geldend komt mij DAVIS verklaring voor, aangezien alle zijne ziektebeschrijvingen ons geen juist, zuiver denkbeeld der *Phlegmatia alba dolens* geven en mij doen denken, dat hij, even als vele andere vermaarde Artsen, de ziekte verwart.

#### §. 413.

Bijaldien ik alle omstandigheden naauwkeurig overweeg, dan voel ik de meeste geneigdheid, om met hen overeen te stemmen, welke eene tegennatuurlijke ophooping van *lymphatieke* stoffen in de watervaten van het aangedane deel tot grond aannemen, en ik geloof, dat daardoor eene bijzonder verhoogde opgewektheid der opflorpande vaten geboren wordt, die allezins eene bijzondere neiging veroorzaakt, om tot ontsteking over te gaan, zonder daarom reeds werkelijk ontsteking te zijn; en bijaldien zij zich als zoodanig aan den dag legt, dan doet zij terstond de  
 hei-

heiligbeenszenuwen, en vooral de zitbeens- en dijzenuwen aan, gelijkewijze de *Fascia lata* en de zenuwscheede (*Neurilema*); de peesvliezen schijnen alsdan inzonderheid ten zetel der ontsteking te verstreken, en dit zijn ook juist dezelfde deelen, als de swelling aan het eene of andere der bovenste ledematen te voorschijn treedt, gelijk ik ze een enkelen keer na eene moeilijke verlossing zag geboren worden, bij welke de barende hare handen en voeten ter verarbeitung der weeën sterk ingespannen had. Deze aanvankelijke ontstekingachtige toestand echter neemt langzamerhand, en in het bijzonder nadat de uitzweeting der overkropte water-vaten in het celweeffel der aangrenzende deelen heeft plaats gegrepen — de *Crisis* dezer ziekte — meer of minder het karakter van verlamming aan, waardoor evenwel de grond tot het *chronische* verloop van het laatste tijdperk der ziekte gelegd werd. Voor dit gevoelen schijnen, naar mijn inzien, de volgende gronden te pleiten: 1) zwangeren en kraamvrouwen zijn over het algemeen met eene zeer verhoogde vormkracht, een hoog gestegen groeiend en instandhoudend leven bedeed en zijn ook bij uitstek tot uitzweetende ontstekingen (*exsudative*) geneigd; 2) moet ik aanmerken, dat in de, door mij waargenomene, gevallen, de zwangeren een zeer kennelijk sterk en saprijk gestel hadden; drie vooral deden zich door overmaat van *Lympha* (*Plethora lymphatica*) in het ligchaam kennen, waren zeer goed gevoed, hadden zeer volle borsten, maakten weinig beweging en aten sterk; eene derzelve was bijzonder door haren eetlust bekend, IV. D. 3<sup>e</sup>. en 4<sup>e</sup>. st. Xx had



had een kalm temperament, hetgeen bij twee schier aan het *phlegmatifche* grensde, leidde het onbekommerdste leven, fliep veel en lang, beminden wijn enz. Eene andere was, wel is waar, van eene zeer volsappige, dikbloedige en in het oog vallende fterke gesteldheid, doch zij leed veel door zorg en kommer in de zwangerschap; had vroeger eene flechte, vochtige woning; beide leden aan aderspatten (*Varices*). Hoe dikwijls vindt men ook deze niet verbonden met eene zwelling der onderfte ledematen, het zuchtgezwel of *Anasarca*, dat men echter geenszins met de *Phlegmatia alba dolens* verwarren moet, en dat meestal na de verlosfing verdwijnt, waar gene eerst ontftaat, of als zij in de zwangerschap zich reeds ontwikkeld had, in het kraambed met vermeerdering van pijn toeneemt, en zich doet kennen door de, in den beginne met haar vereenigde, ontftekingachtige koorts, die zich door de buitengewone, de heiligbeens-, zitbeens- en dijzenuwen innemende pijn, aan den dag legt. Eindelijk komt het ons voor, dat ook die geneesmiddelen voor dit gevoelen pleiten, welke overeenkomstig onze ervaring en die van andere Geneeskundigen in deze ziekte het meeste vermogen bezitten, als daar zijn: de *Calomel*, de *Digitalis*, de *Antimonialia*, de *Acetis Ammoniae liquida*, de middelzouten, de Spaanfche vliegpleisters en in het algemeen zulke geneesmiddelen, door welke de *Plethora lymphatica* verminderd, of de ongeregelde ophooping van *lymphatieke* vloeistoffen in de watervaten door de huid, den stoelgang, of de piswegen weggenomen wordt.

Bij de §. 405 vermelde gesteldheid eener kraamvrouw, met name de al te sterke opvulling der watervaten met *Lympha* en de bijzondere opgewektheid van het opflorpend vaatgestel, kunnen eensdeels reeds in de zwangerschap en voornamelijk bij de verlossing velerlei gelegenheidgevende oorzaken te weeg brengen, dat of de *Phlegmatia alba dolens* alleen en geen andere ziekte verschijnt, welke het regelmatig en gelukkig verloop des kraambeds stoort, of zij verzellen althans aanvankelijk andere ongesteldheden, die op rekening der *Phlegmatia* geschoven worden, en daarom zoo ligt eene verwarring in de onderkenning (*Diagnosis*) en *Aetiologie* dezer opmerkelijke ziekte veroorzaakt hebben. De gelegenheidgevende oorzaken kunnen evenwel verschillende zijn. 1) Verkouding; zij behoort, wel is waar, tot de oorzaken, maar wij kunnen haar, op grond onzer ervaring, niet immer als de eenige aanmerken, gelijk wij boven reeds aangetoond hebben; anders zou de *Phlegmatia* veel meer voor moeten komen, en wij kunnen ter goeder trouw beweren, dat bij twee onzer lijderezen noch in de zwangerschap, noch bij de baring, noch in het kraambed verkouding er deel aan had. In twee gevallen was zij, wel is waar, duidelijk de aanleidende oorzaak, alhoewel zij toch in de *Plethora lymphatica* haren grond had. Daar derhalve, waar zij door verkouding ontstaat, vooral als deze alreede in de zwangerschap en baring haren invloed uitgeoefend heeft, draagt zij volkomen het karakter van eene



*rheumatische* ongesteldheid, en daar, waar zij met eene ontstekingachtige koorts zamengaat, dat eener *rheumatische* ontsteking, die inzonderheid de zenuwscheeden en peesvliezen, bij voorbeeld de *Fascia lata*, aandoet en de pijnlijkheid te weeg brengt gelijkerwijze de baarmoeder en het buikvlies, ten gevolge eener verkouding en algemeen heerschende, *rheumatische* gesteldheid, aan *Rheumatismus* en eene *rheumatische* ontsteking, *Metritis* en *Peritonitis* lijden kunnen. Verloskundigen, die nauwkeurig in hunne waarnemingen zijn, is het niet onbekend, welk een' invloed de volheid van het watervaatgestel (*Plethora lymphatica*) op de baring heeft, en hoe zich zelfs door eigenaardige verschijnselen aan de baarmoeder en in de naburige deelen, de stoornissen van het werk der verlossing door onnatuurlijke ophooping van *lymphatieke* vloeistoffen te kennen geven, en het komt ons voor, dat, deze volheid der watervaten niet reeds bij de geboorte doorgrond en doelmatig behandeld wordende, de *Phlegmatia alba dolens* in het kraambed, als eene hoogst nadeelige *Crisis*, ontstaat. Gelijkerwijze kan zich bij de genoemde gesteldheid van het watervaatstelsel door eenen *rheumatischen* aanleg de *Phlegmatia alba dolens* ontwikkelen, die de heiligbeensstreek, de onderste of soms de bovenste ledematen aandoet, hoofdzakelijk omdat beide tijdens de baring ingespannen en aan verkoudingen blootgesteld worden. 2) Doch het vatten van koude is niet altijd de gelegenheidgevende oorzaak, welke deze ziekte verwekt, want bij meergemelde gesteldheid kan reeds eene sterke inspanning bij de baring, de drukking

van

van een groot kinderhoofd; inzonderheid bij een te naauw bekken, en als de barende te sterk tot ver-  
 arbeiding der weeën aangezet wordt, de verlossing  
 met de tang, welke vele inspanning vereischt, ge-  
 welddadige verwijding van den mond der baarmoeder  
 bij een *Accouchement forcé* de *Phlegmatia alba dolens*  
 te weeg brengen, die in vereeniging met eene  
 ontstekingsachtige koorts zich opdoet; alsdan is de  
 pijn in de heiligbeensstreek en de knie buitengewoon  
 hevig en inderdaad alleen uit medelijdendheid oor-  
 spronkelijk; de lijderes duldt niet de minste bewe-  
 ging en betasting, hoogstens slechts een ligt over-  
 dekfel; de pols is niet alleen zeer snel, maar ook  
 vol en eenigzins hard; de dorst der lijdende neemt  
 toe; de *Urin* is aanvankelijk zeer rood, een dik  
 bezinkfel op den bodem achterlatende; de dij zelve  
 is veel gevoeliger en warmer, de huid met enkele,  
 roode vlekken bedekt, naar het glanzige, vast en  
 gespannen, zoodat men met den vinger op dezelve  
 drukkende, niet gemakkelijk een' kuil maakt. Ver-  
 volgens, wanneer ook de koorts haar ontstekingsachtig  
 karakter verliest, zal, wel is waar, de pijn niet  
 geheel en al ophouden, maar wel minder hevig zijn;  
 de lijderes kan beter de bedekking van het lid en  
 warmte verdragen; de pols is nog rad en niet meer  
 vol en hard, ja na langer of korter tijd geheel re-  
 gelmatig; de zwelling blijft nog voortduren, de  
 warmtegraad der huid nogtans is verminderd, zij is  
 zelfs minder gespannen en glanzig; de koude bestaat  
 niet meer; er wordt meer *Urin* geloosd, die eene  
 heldere kleur heeft; er vertoont zich soms, vooral  
 bij de *Diathesis rheumatica*, eene *Diarrhoe*, waar-



door zich de lijdere, ingevolge onze bevinding, zeer verligt gevoeld, en die de zwelling en spanning van het aangedane deel vermindert. 3) Eene derde oorzaak, die bij de bewuste gesteldheid van het watervaatgestel de *Phlegmatia alba dolens* verwekken kan, is het nietzogen, waardoor de *Crisis* van het kraambed gestoord en de volheid van het watervaatgestel (*Plethora lymphatica*) zoowel als de opgewektheid van hetzelfde verhoogd wordt; in dit geval gaat meestentijds een' geruimen tijd eene vermengde ontstekingskoorts vooraf, met afwisselende en dikwerf terugkeerende huiveringen, welke met de verschijning van de *Phlegmatia alba dolens* haar afscheid neemt; in deze omstandigheid is er gemeenlijk weinig, of zelfs geheel geen zog in de borsten gekomen, en men komt derhalve ligt in verzoeking, de ziekte, vooral in het begin, met eene zoogenoemde zogverplaatsing te verwisselen; dat de *Phlegmatia alba dolens* luidens SCHÄFER's waarnemingen ook bij zogenden zich vertoont, doet hier niets ter zake, nademaal zij niet alleen daardoor, maar gelijk aangetoond werd, ook door andere gelegenheidgevende oorzaken bij de voorhandene gesteldheid, ondanks de geregelde zogaffscheidung, zich ontwikkelen kan. 4) Het gebruik van te voedende en verhittende spijsen en dranken in het begin des kraambeds, waardoor de *Lympha* opgehoopt, de opwekbaarheid der opflorpande vaten vermeerderd en eene vermengde ontstekingskoorts kan veroorzaakt worden, als wanneer de ziekte zoodanig te voorschijn treedt, als N<sup>o</sup>. 3 opgegeven wordt; vereenigen zich daar nu nog mede een zeer heet kraam-

ver-

vertrek, heet weder, opwekkende gemoedsaandoeningen, menigvuldige bezoeken, onrust, gebrek aan slaap, en zoogt de kraamvrouw niet, dan wordt de wording dezer ziekte zeer bevorderd. 5) Eindelijk is het niet te ontkennen, dat somwijlen bij voorwerpen — die behalve met *Plethora lymphatica*, ook met aanmerkelijke volbloedigheid (*Plethora sanguinea*) behebt zijn, wier voeding en herstellingsvermogen op een' hoogen trap staat, of wier aderlijk leven verhoogd is, aan aanbeijen (*Haemorrhoides*) lijden, die veelal tevens ongeregeldheden in het poortaderstelsel aanduiden — de *Phlegmatia alba dolens* ontstaan en als *Crisis* beschouwd worden kan, die gemeenlijk eene koorts van een zuiver, ontstekingsachtig karakter voorafgaat, en der zwelling zelve het N°. 2 gemelde karakter nog in een' hooger' graad mededeelt. In dit geval zelfs kan zich bij kraamvrouwen, die niet zogen, eene zoogenaamde zogverplaatfing, of een ettergezwel op eene andere plaats vormen, onder welke de *Phlegmatia alba dolens* niettemin voortduurt en haren eigen' gang gaat; inmiddels kan eene vermengde ontstekingskoorts de zwelling vermeerderen, der genezing in den weg staan en de ziekte van zeer langen duur doen worden, gelijk ik een merkwaardig, door mij waargenomen geval op eene andere plaats nader breedvoerig beschrijven zal.



*Gevolgen en Uitgangen.*

## §. 415.

Hoe verschillend de gevoelens der Geneeskundigen te dezen aanzien zijn, de meesten toch stemmen daarin overeen, dat de ziekte over het algemeen een' zeer tragen gang heeft en somwijlen maanden en jaren duren kan, eer de lijdenden weder volkomen gezond worden. BOER (\*), WESTBERG (†), MEISSNER (§), CASPER en anderen brengen ons voorbeelden bij, waar de ziekte zeer lang duurde en de zorgvuldigste behandeling trofseerde. — In de gevallen, die ik waarnam en behandelde, waren vijf, zes en zeven maanden ter volkomene genezing noodzakelijk. De wenschelijkste, doch gelijk het schijnt, de zeldzaamste uitgang is die, waar de zwelling langzamerhand zich verdeelt, de pijn en de koorts ophouden en het ongesteld geweest zijnde deel deszelfs verrigtingen volkomen weder ten uitvoer brengt. In zeer vele gevallen blijft het onderste lid zwak en eenigzins gezwollen, zoodat de lijdere gedurende haar gansche leven een' hinkenden gang behoudt, of de minste verandering van het weder er in bespeurt, gelijk dit bij eene onzer lijderezen sedert vele jaren het geval is: somwijlen vormt zich een *lymphatiek*- of ettergezwel; in het eerste geval be-

(\*) *Loco infr. cit.*(†) HUFELAND'S *Journal*. Febr. 1817.(§) VON SIEBOLD'S *Journ.* 1823. *1ter Heft*. STEFFEN, in HUFELAND'S *Journ.* Bd. L. St. 6.

bevat het slechts eene *lymphatieke* vloeistof, in het tweede geval etter, hoezeer WHITE betuigt, dat hij dit nooit heeft plaats zien grijpen. Beide uitgangen kan ik op grond mijner ervaring bevestigen; in het eene geval had zich het *Lympha-Absces* aan den linker voorarm, en achter aan het heiligbeen gevormd, en vorderde de ontlasting der *Lympha* door middel van een bijtmiddel; in het andere, dat CARUS zag, ontstond er niet dan eenige weken daarna een ettergezwel van achteren aan het heiligbeen, dat met de dij gemeenschap had, en van zelve na de aanwending der rijpmakende middelen openbrak en gelukkig genas. Deze uitgang is in ieder geval langdurig en gevaarlijk, als zich de natuur zelve, gelijk ik in het vermelde geval gezien heb, geen gelukkigen uitweg baant, het *Absces* openbreekt, of de kunst de ontlasting der *lymphatieke* vloeistof met de meeste voorzigtigheid bewerkstelligt. Eenige willen ook den overgang in heetvuur waargenomen hebben, en in beide laatste gevallen kan zelfs, ten gevolge van eene zich ontwikkelende, uiteringskoorts, de dood plaats grijpen, hetgeen nogtans hoogst zeldzaam schijnt te zijn. In de meeste gevallen van een' doodelijken uitgang zou de dood op den derden, vijfden, zevenden of negenden dag op het hoogste standpunt der pijnlijke verschijnselen voorgevallen zijn. Volgens BURNS zou de dood somwijlen zich plotseling openbaren, als de aan de betere hand zijnde lijdere zich onvoorzigtig aan lichaamsinspanning overgeeft. Niet zelden zal, nadat de eene zijde aanvankelijk beter of geheel hersteld is, de andere kant aangedaan worden. Som-



wijlen wordt ook een der bovenste ledematen mede aangedaan, zoodat dan, uitgezonderd het hoofd en de hals, de gansche helft des ligchaams door de ziekte aangetast wordt. Zelfs eene soort van wankormigheid kan het gevolg dezer ziekte zijn, de voet wordt deegachtig, knobbelig; er ontwikkelt zich eene soort van *Elephantiasis*. Eindelijk heeft men ook waterzuchtige toevallen, vooral in den vroeger gezonden voet, zich zien openbaren.

*Uitkomst der Lijkopeningen.*

§. 416.

Dat ook zelfs de uitkomsten der lijkopeningen niet veel hebben bijgedragen, om de, over deze ziekte verspreide, duisternis op te klaren, behoeft ons niet te verwonderen, als wij bedenken, dat deze ongesteldheid in het geheel zoo spaarzaam voorkomt, dat dien ten gevolge de lijkopeningen nog veel zeldzamer zijn, en dat bovendien de ziekte dikwijls miskend, en bijgevolg verkeerde gevolgtrekkingen daaruit ontsproten zijn. In het door CASPER verhaalde, uit de geneeskundige jaarboeken van de Universiteit te *Halle* in den jare 1815 ontleende geval levert de schouwing het volgende resultaat op: de breede baarmoederbanden waren zeer vaatrijk; de inwendige vlakke der baarmoeder smeurig graauw, week, heetvurig en stinkend, even zoo de scheede. Nadat men de huid der dij doorsneden had, bleek het celweeffel eenigzins opgelost en allerwege met een bruinachtig, reukeloos vocht opgevuld te zijn; de liesklieren meer met bloed voorzien

zien en gezwollen dan gewoonlijk; de spieren van het been en de aangrenzende deelen zeer slap; de zenuwen en bloedvaten in derzelver natuurlijken toestand. Opmerkelijk was het, dat de ziekelijke gesteldheid van het celweeffel niet bloot aan het geheele been, maar ook in het gansche bekken tot aan de *Psoas*, *Iliacus internus* enz. te ontdekken was. DAVIS geeft ons vier doodelijk geëindigde gevallen van *Phlegmatia alba dolens*, waar inzonderheid de aderen van de dij en de naastliggende deelen ontstoken, verdikt en op enkele plaatsen met stolbare *Lympha* opgevuld waren, zijnde de *Uterus* met deszelfs aanhangfels (*cum annexis*) of geheel en al gezond, of ook mede door de ontsteking aangetast.

### Voorzegging.

#### §. 417.

Deze vloeit reeds ten deele van zelve uit het boven gezegde voort, en alle Schrijvers komen met mij in zoo verre overeen, dat de *Phlegmatia alba dolens puerperarum* eene hoogst kwaadaardige ziekte is, omtrent welke de voorzegging zeer twijfelachtig, dikwijls zeer slecht is; intusschen moet men bekennen, dat het ongunstige der *Prognosis* ook voornamelijk daarin zijnen grond heeft, dat wij omtrent de naaste oorzaak het nog niet eens zijn, het wezen en den aard der ziekte nog niet genoegzaam kennen, en bij gemis aan deze kennis, er nog geen zekere geneeswijze voor bestaat, en dat wij om deze reden de noodige, geneeskundige hulp niet



niet vroeg genoeg toebrengen, vooral ook diegene, welke, indien zij niet in de zwangerschap ontstond, hare volkomene ontwikkeling reeds in het eerste tijdperk verhoedt, nademaal de opvolgende *Crisis* door uitzweeting klaarblijkelijk de ziekte op den langen weg schuift, en wanneer ook de dood mogelijk slechts in de zeldzaamste gevallen intreedt, dan is toch haar verloop niet alleen altijd zeer traag, maar tevens hoogst lastig, en blijven er in de meeste gevallen meer of min gewigtige nagebreken over. Of de ziekte in een en hetzelfde lid meer dan eens zou kunnen ontstaan, is nog niet uitgemaakt; WHITE en SANKEY ontkennen dit; daarentegen wordt somtijds in een opvolgend kraambed het te voren niet aangedane deel in het lijden betrokken. De ziekte is zeer aan instortingen onderhevig, bijaldien de lijderesfen zich te vroeg weder aan den arbeid begeben en de nog zwakke deelen inspannen. De vroegere verlossing heeft doorgaans geen regstreekschen invloed op het verloop en het gevaar dezer ziekte, immers zij ontstaat even dikwijls na ligte, als na moeilijke verlossingen, niet minder dikwijls bij forsche dan bij zwakke voorwerpen. Even zoo min rigt zich de ziekte naar den ouderdom des voorwerps, of naar het jaargetij, de gesteldheid van het weder enz. Hoe meer de ziekte met andere zamengesteld is, des te gevaarlijker wordt de voorspelling. Tevens schijnen voorafgegane waterzuchtige aandoeningen der ziekelijke deelen de voorzegging hagchelijker te maken.

## Geneeswijze.

## §. 418.

Dat zich bij eene ziekte, van wier innerlijk wezen men nog zoo weinig weet, geen algemeen geldende en bestendige geneeswijze laat opgeven, spreekt van zelve. Hier maakt het alzoo ook de groote kunst van den Arts uit, elk bijzonder geval zoo veel mogelijk afgetrokken te beschouwen. Over het algemeen echter zij men toch steeds behoedzaam en omzigtig in de behandeling. De Geneesheer moet hier volstrekt vermogende middelen en alle zijne krachten in het werk stellen; hij moet de ziekte zoo vroeg mogelijk trachten te onderscheiden en te bestrijden; hij vergete nogtans niet, dat hij met eene kraamvrouw te doen heeft, fla om die reden acht op den, door het kraambled eigenaardig gewijzigden, toestand der lijderes, op hare gevoeligheid, op den staat harer krachten, op zamenstellingen (*Complicatiën*), en op de veelligt aanwezige ongeregeldheden in de kraamzuiveringen en de zogaffcheiding enz. Bij de behandeling nu moet men, deels op den algemeenen toestand des ligchaams, deels op het plaatselijke lijden de aandacht vestigen.

## §. 419.

Voor en aler wij echter ons geneesplan vormen, moeten wij wel onderscheiden, of de ziekte, overeenkomstig het §. 413 door ons opgegevene gevoelen, door de ongeregelde ophooping van *Lympha*  
en



en daaruit voortgevloeide bijzonder verhoogde opwekbaarheid der opslorpande vaten alleen veroorzaakt is, en deze als enkelvoudig, of als zamengesteld, voornamelijk door de gelegenheidgevende oorzaken te weeg gebragt, te voorschijn treedt. Is gene enkel en volstrekt alleen aanwezig, dan vordert de geneeswijze dringend en vroegtijdig, reeds in den beginne van het eerste tijdperk, de volheid van het water vaatgestel (*Plethora sanguinea*) in het ligchaam te verminderen en de overhand nemende uitzweeting, de te sterke verzameling van *lymphatieke* vloeistoffen in de opzwellende en pijnlijke deelen te beteugelen. In dit eenvoudig en met geen vermengde ontstekingskoorts, algemeene volbloedigheid (*Plethora sanguinea*), noch met plaatselijk slagaderlijke of aderlijke ontsteking vereenigde geval, is het vereischte, de krachten der natuur vooral door doelmatige voorschriften in den eetregel, den staat des kraambeds steeds voor oogen houdende, te ondersteunen; daartoe behooren het zoo dikwijls mogelijk aan de borst leggen des kinds; onthouding van een' te voeden den, verhittenden eetregel en het bloote genot van verdunnende dranken, bevordering des kraamvloeds, zorg voor behoorlijke buikontlasting en *Urinlozing*, matige warmte van bed en kamer, en bedekking van het aangedane deel met een' ligten doek. Doch daar deze voorschriften op zich zelve zelden genoegzaam zijn, moet men de werkzaamheid der natuur door nog sterker middelen ondersteunen en nog op eene andere wijze de ontlasting der te overtollige *Lympha* in het ligchaam trachten te bevorderen, vooral als de kraamvrouw niet zoogt. Drie wegen

zijn

zijn er , welke wij daartoe inslaan kunnen , de huid , de stoelgang en de *Urina*ffcheiding. Men kan , wel is waar , niet altijd met zekerheid bepalen , welke weg de beste en zekerste is ; de Geneesheer moet zorgvuldig en onbeschroomd onderzoeken , vergelijken en dan beslissen , welke weg , de bijzondere neiging van het ligchaam in aanmerking nemende , de voorkeur verdient. De Geneeskundigen prijzen in hunne waarneming nu deze dan gene middelen , de eene zag het meeste nut van ontstekingswerende ontlastmiddelen , de andere van *Diaphoretica* , een derde van *Diuretica*. Deze drie verschillend werkende middelen kunnen alle heilzaam geweest zijn , als bij derzelver toediening altijd die middelen uitgekozen werden , welke met de pogingen der natuur overeenstemden. Dien ten gevolge zullen — inzonderheid als verkouding , of eene *rheumatische* aangelegenheid als gelegenheidgevende oorzaak er bijkomt , de huid warm , lenig , reeds tamelijk vochtig is , als er neiging tot zweeten , hitte en dorst voorhanden is , of als de lijderes reeds meermalen gedurende de zwangerschap , met duidelijke verligting der toevallen , sterk gezweet heeft , de pols vrij vol en golvend is , en er noch in het darmkanaal , noch in de piswegen iets voorhanden is , dat ons zou kunnen noodzaken om op deze te werken — voornamelijk de *Diaphoretica* aangewezen zijn , als ook over het algemeen die middelen , welke de afscheidende werking der huid verhoogen , de huiduitwaseming en het zweet bevorderen. In deze omstandigheid komen tot inwendig gebruik te stude het azijnzuur , de azijnzure potasch , de azijnzure *Ammonia* , de

*Sal-*



*Salammoniac*, de spiesglansmiddelen in kleine giften, de vlier- en lindenbloesemthee, en bij werkeloosheid en kramp der huid kan zelfs de *Ipecacuanha* in kleine hoeveelheid en een braakmiddel van heilzame uitwerking zijn, aangezien zij in het eerste geval de werkzaamheid van de uiterste einden der vaten verhoogen, en in het tweede geval door eene tegenprikkelende afleiding en regtstreeksche werking op het zenuwgestel de kramp, welke de huiduitwaseming belemmert, wegnemen. Is de pijn van het aangedane deel reeds hevig, dan dient men de *Ipecacuanha* met *Opium*, of nog beter het *Doversche* poeder (*Pulv. Sudoriferans DOVERI*) toe. Met deze middelen verbindt men te gelijk zuurdegen en Spaansche vliegen, die op het ongestelde deel aangewend moeten worden; de laatste hebben in deze ziekte over het algemeen de voorkeur, daar zij, behalve de prikkeling van de zenuwscheede der heilig-, zitbeens- en dijzenuwen af te leiden, ook de, met dezelve verbondene, verhoogde groei- en herstellingskracht verzwakken, en de afscheiding der wijachtige en *lymphatieke* vloeistof door de huid naar buiten en door de piswegen bevorderen, inzonderheid als zij eene blaar trekken. Men legt dezelve daarom op het pijnlijke deel, onmiddellijk bij voorbeeld op de heiligbeensstreek, op de inwendige zijde der dij, van de kuit, op den arm, of bijaldien de dij en het been aangedaan zijn, volgens BOER in den vorm van een' smallen kousenband boven of onder het kniegewricht, of klimt de pijn tot een' hoogen graad en kan de lijderes de minste aanraking niet verduren, dan doen koude omslagen

van

van loodwater (*Aqua saturnina*) nog heerlijke uitwerkselen, gelijk ik in eenige, door mij zelve behandelde gevallen, ondervonden heb.

§. 420.

Klaagt de kraamvrouw over eene zekere onrust en een onaangenaam gevoel in den onderbuik, had zij tijdens de zwangerschap, of in het kraambed voor de ontwikkeling der ziekte met verligting ontlasting gehad, is hare huid tevens droog en dor, heeft zij veelligt reeds onder de baring, of kort voor dezelve eenige dunne stoelgangen gehad, waarvan het vatten van koude echter geenszins oorzaak is, dan zijn ter vermindering der *Plethora lymphatica* ontlastmiddelen dienstig. Even als ter verhooging der werkdadigheid van het huidorgaan en der huiduitwaseming, zachte, niet te sterk prikkelende en verhittende zweetmiddelen, in het bijzonder bij de, buitendien zoo zeer naar het ontstekingsachtige overhellende, gesteldheid eener kraamvrouw aangewezen zijn, zoo ook moet men hier slechts van de zachtste ontlastmiddelen gebruik maken, als daar zijn: de Tamarinde, het *Electuarium lenitivum*, de Manna, het Glauberzout (*Sulphas Sodae*), het zout van SEIGNETTE (*Tartris Sodae*), het *Arcanum duplicatum* (*Sulphas Potassae*) en dergelijken.

§. 421.

Bespeurt men geenerhande werking van de natuur naar de huid, noch naar het darmkanaal, klaagt de kraamvrouw veelmeer over eene buitengewone en bestendige spanning in de streek der nieren, over

IV. D. 3°. en 4°. st.                      Y y                      pij-



pijnen, branding en menigvuldigen aandrang in en op de blaas; is in de laatste weken der zwangerschap vrij veel *Urin* geloosd, en moet zij uit de natuur, over het algemeen bij elke gelegenheid, bij voorbeeld bij schrik, koudevatting en dergelijken haar water dikwijls lozen, dan zijn de *Diuretica* de hier aangewezene middelen, en ten einde de overtollige *lymphatieke* vloeistoffen in het ligchaam der kraamvrouw, voornamelijk door de vermeerderde afscheiding der *Urin* te verminderen en de uitzweeting in het celweeffel, zoo het mogelijk is, of geheel te verhoeden, of te beperken, en daardoor het tweede tijdperk (*Stadium tumiferum*) korter te maken, de meeste zouten, de azijnzure potasch (*Acetis Potassae*, *Terra foliata Tartari*), in vereeniging met *Aqua Petroselini*, het *Herba digitalis*, vooral in verbinding met *Calomel* of het zoete kwik, de *Squilla*; de vloeibare, koolstofzure zouten bevattende spijzen en dranken, spergies, peterfelie, pinksternakelwortel, kervel, felderij en dergelijken.

#### §. 422.

Ontwikkelt zich de ziekte dadelijk bij zeer sterke, prikkelbare en volbloedige (*Plethora sanguinea*) kraamvrouwen, draagt de koorts een ontstekingsachtig karakter, en is de pijn zeer levendig, voegen er zich ontstekingsachtige toevallen bij, heeft de ziekte het karakter van eene *rheumatische* ontsteking, van een' *Rheumatismus acutus* na voorafgegane verkouding, vooral bij eene schielijke verandering van den warmtegraad, grepen er vroeger bij de verlossing ster-

sterke inspanningen plaats , inzonderheid bij drukking van een groot hoofd , of een eng bekken op de vaten en zenuwen van het bekken ; was de verlossing door de hulp der kunst , of bij een *Accouchement forcé* door geweldige verwijding van den mond der baarmoeder bewerkstelligd ; grijpt in het eerste tijdperk der ziekte eene vereeniging met eene hevige zogkoorts , met *Metritis* , eene *metastatische* ontsteking of zoogenaamde zogverplaatfing stand ; hield de kraamvrouw met het zogen des kinds op , wordt dezelve aan de schadelijke uitwerkingen van een te koud kraamvertrek , van het genot van te voedende en te verhittende spijsen en dranken blootgesteld , openbaren zich te gelijker tijd verwijdingen in de aderen of eene aderlijke ontsteking ; zijn de pijnen in de heiligbeensstreek , in de dij , in de knie enz. zeer hevig , is der lijderesse de geringste betasting ondragelijk , bezit de zwelling meer dan gewone warmte , is de huid met enkele roode vlekken bezet , naar het glanzige , stijf en gespannen ; de pols vol , eenigermate hard , rad ; ijlt de lijderes , is zij zeer onrustig en slapeloos en de *Urin* hoogrood , dan stelle men bij zulk eene vereeniging stoutmoedig eene aderlating in het werk , legge dadelijk bloedzuigers aan , en de gansche behandeling zij ontstekingswerend. Offchoon wij ook van gedachten zijn , dat het , in die gevallen , waar de *Phlegmatia alba dolens* op zich zelve te voorschijn treedt , volstrekt noodzakelijk is , komt het ons echter voor , dat WHITE en BOER te ver gegaan zijn , wanneer zij dezelve ten eenemale afkeuren : wij houden ons veeleer , op grond onzer ondervinding , overtuigd , dat men



haar in de vermelde gevallen niet ontberen kan. Waar zij niet dringend aangewezen zijn, wendt men het salpeter, den *Tartarus depuratus* in vereeniging met *Magnesia*, de ontstekingswerende middelzouten, de *Sulphas Potassae*, de *Sulphas Sodae*, de *Tartris Potassae*, Tamarinde, de plantenzuren, inzonderheid het wijnsteen zuur (*Acidum tartaricum*) in eene oplossing tot drank aan.

#### §. 423.

In het tweede tijdperk der ziekte, het tijdperk der opzetting (*Stadium tumiferum*), waar de uitzweeting der *lymphatieke* vloeistoffen niet alleen volkomen geschied is, maar ook de zwelling en pijn een' hoogen graad bereikt hebben, zijn over het algemeen geene aderlatingen aangewezen, dewijl zij de lijderes en zelfs de werkdadigheid der opslorpande vaten te veel verzwakken; de zwelling, verzameling van vochten en de ziekelijke veranderingen in de bewerktuiging der zenuwen, in de peesvliezen en in het celweeffel begunstigen; alleen dan, als er in dit tijdperk eerst eene *Complicatie* (§. 422) bijkomt, of indien hetzelfde veronachtzaamd is, mag, trouwens met de meeste omzigtigheid, eene algemeene, of eene plaatselijke bloedontlasting, door middel van bloedzuigers op het lijdende deel beproefd worden; de eerste heb ik, wel is waar, in die omstandigheid niet meer aangewend, de bloedzuigers nogtans hebben eene aanmerkelijke vermindering der zwelling en der pijn ten gevolge gehad. Voor het overige doen de §. 422 opgegevene middelen ook in dit tijdperk nog goede diensten, edoch de buitengewone op-  
zwel.

zwellings der aangedane deelen en de, met dezelve toenemende, te hevige pijnen dienen hier vooral aandachtig gadegeflaggen te worden. Ten einde deze te lenigen, make men koude omslagen van het, door bijvoeging van *Acetis Plumbi liquida*, versterkte loodwater, eene oplossing van *Salammoniac* in wijnazijn, en als de lijderes dezelve verdragen kan, bij hevige spanning en pijnlijkheid, legge men pappen van *Herba Cicutae*, *Hyoscyami*, *Belladonnae*, *Digitalis*, terwijl men inwendig het blaauwzuur (*Acidum prussicum*), het bilsenkruidextract en het heulsap, het laatste het beste in het *Doyersche* poeder, toedient, bij welks inwendige toediening men echter zorgen moet, dat het de buiksonstlasting niet stremme, hetgeen voorzeker nadeelig is. Ter beperking der zwelling gebruike men, behalve de §. 420 aangeprezene middelen, het kwik in vereeniging met het *Herba digitalis*, zelfs in die mate, dat er vele stoelgangen en buikloop op volgen. Geene middelen hebben mij ooit in dit tijdperk meer dienst bewezen, dan de laatstgenoemde; zij beantwoorden aan een drieledig geneeskundig oogmerk; beide wekken de werking van het watervaatgestel op; het *Calomel*, tot er ontlasting en buikloop volgt, toegediend, verwijdert de bovenmatige ophooping van *lymphatieke* vochten en beteugelt de zwelling, en naardien de *Digitalis* de prikkeling der zenuwen bedaart, werkt zij tevens als pijnstillend middel. Het is opmerkenswaardig, dat men de *Calomel* bij deze ziekte in zeer groote hoeveelheden kan toedienen, zonder speekselvloed te veroorzaken, wij althans hebben denzelfen er niet uit



zien ontstaan, daarentegen wel eene *Diarrhoe*, die, wel is waar, hebbelijk werd, doch met vermindering der zwelling en pijn. Dezelve kan ook als scheidend (*critisch*) werken, en om die reden moeten haar niet geheel, ten minste niet in het tweede tijdperk trachten te stuiten. De *Calomel* diende ik van één tot twee greinen verbonden met een vierde, een half tot een geheel grein *Herba digitalis* toe, de eerste ook in vereeniging met de *Magnesia* bij belemmerde ontlasting nog in grootere giften, en de *Digitalis* tot een waterig aftreksel van eene halve tot eene geheele *drachma* op vijf tot zes oncen *colatuur*; waarvan twee, drie en vier malen daags een halve, of geheele eetlepel vol ingegeven werd. Uitwendig bewerkstellige men, ter vermindering der zwelling, inwrijvingen van de salpeterzure kwikzalf (*Unguent. Nitratis Hydrargyri*) enkel, of bij hevige pijnen in vereeniging met de *Oleum Hyoscyami*; niet minder goede uitwerkselen zag ik van het *Unguentum de Digitali purpurea* en zelfs van de versch gekneusde bladen als pappen. STEFFENS (*loc. cit.*) heeft ook bewezen nut gezien van gelijke hoeveelheden *Unguent. Nitratis Hydrargyri* en *Unguent. Althaeae* onder elkander gemengd, waarvan hij dagelijks anderhalf tot twee drachmen op het ziekelijke deel liet inwrijven. De Spaansche vliegen trouwens doen, hoofdzakelijk in het tweede tijdperk, de heilzaamste uitwerkselen, welke dikwijls en op onderscheidene plaatsen van het aangedane deel, bij voorkeur in voege eenes kousenbands, aangewend moeten worden. De algemeene toestand der lijdende moet naar de bijzondere omstandigheden be-

behandeld worden. Men drage echter alle zorg voor eene te voedende diëet, prikkelende en versterkende middelen, zelfs nog in dit tijdperk, ofschoon de lijderees zich, naar men voorgeeft, zwak gevoelt. Daar de opslorpende vaten in verhoogde opgewektheid en te bovenmatig opgevuld zijn, kan men ligtelijk op nieuws pijn en zwelling verwekken, of in stede van een' gelukkigen afloop, door volkomene verdeeling, de ziekte op den langen weg schuiven, en eene grootere verwoesting, langdurige verlamming van het lid, een lympha- of etter-*Absces* voortbrengen. De *Salammoniac* opgelost alleen met een weinig *Vinum stibiatum* of MINDER'S geest (*Acetis Ammoniae liquida*) in een afkooksel van heemstwortel, bij slapeloze nachten, onrust en nog aanhoudende pijnen; elken avond een *Doyersch* poeder, en ingeval van groote prikkelbaarheid der zenuwen en vaten met aanmerkelijke zwakte en overhelling naar het zenuwachtige een zwak aftreksel van valeriaan met den *Spiritus Mindereri* of het zuur van HALLER (*Elixer acidum HALLERI*), het *Acidum muriaticum oxygenatum*, waren de middelen, welke wij meestal toegediend hebben. Soms schreven wij ook nog een braakmiddel voor, indien er eenige vuile stoffen en eene groote werkeloosheid voorhanden waren, eensdeels om op het zenuwgestel, anderdeels om de werktuigen der voeding en der herstelling krachtadig op te wekken, en zoo doende de werking der opslorpende vaten te versterken. — In een geval, waar de *Diarrhoe* vrij hebbelijk en sterk werd, en de krachten der lijdende te zeer verzwakte, waren



*Emulsiën* met *Opium* en toongevende middelen, de *Columbo* en de kaneel in vereeniging met het heul-  
sap, en wel onder slijmige middelen gemengd, nood-  
zakelijk en nuttig.

§. 424.

Gaat de ziekte in het derde tijdperk (*Stadium Sequelærum*) over, dan is het gunstigste geval dat-  
gene, waar de zwelling zich verdeelt en met hare  
afneming gaandeweg alle de, haar verzellende, ver-  
schijnselen in dezelfde orde verdwijnen, als zij te  
voorschijn gekomen waren. Vindt men deswege de  
lijdende zonder koorts, heeft de *Urin* geen bezinkfel  
meer, is zij helder en vormt zij enkel eene wolk,  
is het aangetaste lid niet zeer pijnlijk bij de aan-  
raking, begint de lijderes zich zonder pijnen in het  
bed te bewegen, kan echter het lid, bij voorbeeld  
de dij, of het been zich niet van zelve bewegen  
en opligten; is de knie stijf, dan kan men tot een  
meer prikkelend en versterkend geneesplan overgaan;  
inwendig komen in aanmerking de *Lichen islandi-  
cus*, *China*, *Myrrhe*, de ijzerpraeparaten, waarmede  
men te gelijker tijd eenen meer voedenden en ver-  
sterkenden eetregel pare. Als uitwendige middelen  
zijn aangewezen specerijachtige kruidenzakjes, die  
ook met geestrijke middelen besprengd kunnen wor-  
den, aldan de vlugtig prikkelende en versterkende  
inwrijvingen, *Linimentum volatile* enkel, of met  
kamfer, de *Tinctura balsamica* en naderhand zeep-,  
loog- en aromatieke kruidenbaden, voorts de *Ther-  
mal*baden te *Ems*, *Töplitz*, *Wiesbaden* en bij voort-  
doring der verlamming in vereeniging met dropbaden;  
wij.

wijders de baden te *Kissingen*, de zouten en koolstof-baden, de ijzerhoudende te *Pyrmont*, *Schwalbach*, *Driburg*, *Bockler*, *Brückenau* enz.

§. 425.

Somwijlen blijven er aan het lid, inzonderheid aan een der onderste nabij de knie, of rondom dezelfde, knobbelige en verharde plaatsen over, of de vethuid wordt zoo hard, dat zich eene soort van *Elephantiasis* schijnt te ontwikkelen. In deze omstandigheid moet men bij herhaling de inwrijvingen der aschkleurige kwikzalf (*Unguent. Hydrargyri cinereum*, *Ung. Nitratis Hydrargyri*), van die der *Althaea*, der *Digitalis purpurea* en de meergemelde Thermalbaden in het werk stellen; wijders moet men inwendig *Diuretica* in vereeniging met *Tonica*, *Roborantia* en uitwendig de inwrijvingen der *Tinctura Digitalis purpureae*, van de *Oleum terebinth.* en dergelijken aanwenden. Dreigt de ziekte tot een lympha- of ettergezwel over te gaan, dan trachte men den vochten, zoo spoedig mogelijk, een' uitweg te banen, opdat zij niet naar de diepte verzakken, en ondersteune de verzwakte voeding en onderhouding inwendig door versterkende en voedzame middelen. Nopens de heilkundige behandeling verwijzen wij ten eenemale naar datgene, wat bij de zogenaaemde zogverplaattingen daaromtrent gezegd en aangeprezen werd.



## L I T T E R A T U R.

§. 426.

FR. MAURICEAU, *Traité des maladies des femmes grosses.*  
T. 1. C. XX.

BOER'S *Abhandlungen und Versuche geburtshülfflichen Inhalts.* Wien 1791. Th. I. p. 119.

J. FERRIAR, *Medical Histories und Reflexions.* London 1798, übersetzt in den Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch pract. Aerzte XIX. 1. 2. 1800.

WHITE, CARL, *Untersuchung der Geschwulst bei Kindbetterinnen an den unteren Gliedmassen.* A. d. Engl. Wien 1802.

*Einzelne Aufsätze: Evans in Dunc. med. comment.*  
Vol. X.

HULL, in *physic. med. Journal* nach BRADLEY und WIL-  
LICH, bearbeitet von KÜHN. Bd. III. Leipzig 1802.

DAVIS, über die nächsten Ursachen der *Phlegmatia dolens*, übersetzt in den Sammlung auserlesen.  
*Abhandl. z. gebr. pr. Aerzte.* III. Bd. 4tes St. N<sup>o</sup>. 5,  
oder neue Sammlung. vij Bd. Leipzig 1803.

SIMONS, in *Lond. med. and. physic. Journal* 1806.

SACHTLEBEN, in STARK'S *Archiv für Geburtshülfe.* II. Bd.  
2, 33, 47.

WYER, on *Lymphatic dissention*, in *London medical and physical Journal* for 1810. XXIII. p. 301.

SANKEY, *Observations on Phlegmatia dolens*, in *Edin-  
burgh medical and Surgical Journ.* 1814. X. p. 402.

SCHMALZ, *diagnost. Tabellen.* Dresden 1816. p. 37.

CASPER, JOH. LUD. *Diss. inauguralis de phlegm. alba  
dolens.* Hal. 1819. 8<sup>o</sup>.

HORN'S *Archiv.* 1819. 4tes Hest.

HUFELAND'S *Journ.* Bd. L. ites St. 70—90.

FREYBERG, *Annotationes in Phlegmatiam albam.* Halae  
1820.

CARUS, *Gynäkologie.* 2ter Theil. Leipzig 1820.

BURNS, *Principles of Midwifery.* 5. Edit. Lond. 1820.

THOMAS, *Modern. Practice of Physic.* Lond. 1820.

JÖRG'S *Handbuch u. s. w.* Zweite Aufl. Leipzig 1821. 8<sup>o</sup>.

VON SIEBOLD'S *Journ.* 1823. Bd. IV. St. 1.

*Lond. med. et phys. Journ.* Febr. 1824.

L. A. STRUVE, *Commentatio de phlegmatia alba dolens.*  
*Tubing.* 1825.





## Z E V E N D E H O O F D S T U K .

*Van de verlamming der kraamvrouwen.*

## §. 427.

Na de verlosfing blijven fomwijlen verlammingen van bijzondere deelen over. BURNS is voorzeker de eenige, die er bijzonder van gewag maakt, en wij vinden ons verpligt dezelve hier insgelijks niet voorbij te gaan, en bijzonder twee vormen te vermelden, die niet zeer zelden voorkomen. De eerste ontftaat gewoonlijk ten gevolge van de drukking des kinderhoofds bij een eng bekken, foms reeds tijdens de zwangerschap (\*), ten gevolge van de beklemming deszelven bij de geboorte, inzonderheid als het fcheef ftaat, en na zware instrumentale verlosfingen, namelijk met de tang,

(\*) Deze verlamming zag ik in de eerste jaren mijner verloskundige praktijk in mijne geboorteplaats *Wurzburg* bij eene zwangere met een naauw bekken, waar het kinderhoofd fcheef in het bekken en onbewegelijk ftond, reeds in de laafte maanden der zwangerschap ontftaan; zij was niet in ftaat te gaan, moest liggen, en eerst na de verlosfing, waartoe de tang noodzakelijk was, kwam het vermogen om te gaan van lieverlede terug, waarbij zij aanvankelijk zich van krukken bedienen moest.

tang, en is dikwijls zeer lastig en langdurig. De lijderees klaagt na de bevalling over eene hevige pijn in het heiligbeen en den rug; waarbij het gaan meer of min bezwaarlijk is. De lijdereesfen worden ligt moede, hebben eene in het oog loopende zwakte in het heiligbeen en eene voort van krachteloosheid en moêheid in de beenen; zij kunnen niet lang staan en hebben dikwijls een' hinkenden gang, of kunnen zelfs in het geheel niet gaan. Hier moet men het heiligbeen door een stevig verband, door een pasfend keurslijf ondersteunen, en pijnstillende, versterkende inwrijvingen en waschingen te baat nemen. Naderhand gaat men dan van natuurlijke baden gebruik maken: dergelijke lijdereesfen brenge men naar *Töplitz* in *Bohemen*, *Warmbrunn* in *Sileziën*, *Ems* aan de *Lahn* in het Hertogdom *Nassau*, *Kissingen* en *Bocklet* in de benedenkreits van den *Mein* in het koninkrijk *Beijeren*; ook verdienen de zeebaden aanprijzing. Ik heb van de *Kissinger*-baden voortreffelijke uitwerkselen gezien, na wier gebruik ik in dit en andere gevallen het bad van *Bocklet*, als meer ijzer bevattende, ter verdere herstelling aanrade. De tweede vorm ontstaat zelfs na ligte en natuurlijke verlosfingen, doch over het algemeen slechts bij zoodanige vrouwen, die reeds vele kinderen ter wereld gebragt hebben: zij krijgen namelijk eene, naar den graad sterkere of geringere, verlamming der onderste ledematen, als wanneer de spieren soms pijnlijk worden en belette pislozing zich opdoet. Men zorge hier voor geregelde buiksontlasting, geve inwendig versterkende middelen, uitwendig stelle men inwrijvingen, smeersels

en



dropbaden in het werk , en late van zeep- specerij-achtige kruiden en door kunst gemaakte staalbaden , daarna van de baden te *Töplitz* , *Ems* , *Warmbrunn* , en van de natuurlijk staalhoudende baden te *Pirmont* , *Driburg* , *Schwalbach* , *Böcklet* en anderen meer , gebruik maken.

—

## A C H T S T E   H O O F D S T U K.

*Van den dikken buik der kraamvrouwen.*

## §. 428.

Na eene volbragte natuurlijke verlosfing neemt de buik bij eene gezonde vrouw van lieverlede weder zijne vorige gedaante aan, als voor de zwangerschap. De *Uterus* trekt zich te zamen; de vroeger teruggedrongene buiksingewanden nemen hunne natuurlijke plaats weder in, en alles komt weder op denzelfden voet als voor de zwangerschap. In vele gevallen echter houdt de kraamvrouw, de verlosfing reeds lang voorbij zijnde, een' dikken buik, die meer of min opgezet is, en der vrouw zelve, nadat alles in het kraambed is afgeloopen, dikwijls het voorkomen eener hoog zwangere geeft. Genees- en Heelkundigen hebben dit toeval meestal aan de verzuimde aanlegging van een' doelmatigen buikband toegeschreven; doch in het meerendeel der gevallen voorzeker ten onregte, aangezien door het misbruik en voornamelijk door de te vroegtijdige aanwending van een' buikgordel reeds zoo vele nadeelen in het kraambed, als daar zijn uitzakkingen, achteroverbuiging, ontsteking van den *Uterus* en den onderbuik enz. zijn veroorzaakt geworden (\*). En

eens

(\*) C F. HERMANN, *de abusu fasciarum abdominalium in puerperis*. Berolini 1819. 8°.



eens toegegeven, dat de dikke buik een gevolg van de verzuiming des buiksgordels is, dan liggen toch menigwerf geheel andere oorzaken ten grondslag, die noch Verloskundige, noch een buikgordel verhoeden kan, en die dikwijls reeds in de zwangerschap zich ontwikkeld hebben. Het komt er dus hier hoofdzakelijk op aan, dat men de *Aetiologie* van dit volstrekt lastig en dikwerf bedenkelijk verschijnsel nader in overweging neme, naardien het gevaar en de aangelegenheid der ziekte, als ook hare behandeling ten eenemale van de bijzondere oorzaken afhangen, welke tot haar ontstaan aanleiding gegeven hebben.

### *Oorzaken.*

#### §. 429.

Wij zouden te ver gaan, indien wij al de oorzaken, die dit gebrek kunnen te weeg brengen, hier breedvoerig wilden behandelen. Het is alleenlijk hier ons oogmerk, zulke oorzaken nader te beschouwen, die voornamelijk in het kraambed en onmiddellijk na hetzelfde menigvuldiger zich opdoen, en grootendeels uit hetgeen de verlossing voorafging, of uit de vorige zwangerschap verklaard moeten worden. Daartoe behooren nu boven alle andere dingen de buikbreuken (*Hernia ventralis*, *Hypogastrocele*, *Coeliocèle vera*), te weten diegene, welke ter weërszijden der witte lijn (*Linea alba*), of in de witte lijn zelve, zelfs tusschen den navel en de schaambeenderen zich ontwikkelen. Over het algemeen treedt hier de breukzak tusschen de bundels van de buikspieren onder de huid te voorschijn,

en

en bijgevolg kan alles, wat de buikspieren met geweld uitzet, en de tuschenruimten derzelve verwijdt, tot de wording van buikbreuken aanleiding geven. Ontstaan er derhalve buikbreuken bij kraamvrouwen, dan worden zij gemeenlijk door de zwangerschap, door te sterke inspanningen bij de baring, door verplaatsingen der baarmoeder tijdens dezelve veroorzaakt, en zoo veel te ligter, hoe menigvuldiger de kraamvrouw reeds gebaard heeft, en hoe schielijker de eene zwangerschap de andere opgevolgd is. Wat de verplaatsingen der baarmoeder aanbelangt, geene derzelve is van meerdere aangelegenheid, dan die baarmoederbreuk, welke in de witte lijn zelfs alreede gedurende de zwangerschap hare zitplaats neemt. Deze breuken kunnen niet zelden eene aanmerkelijke grootte hebben, waarin alsdan, behoudens de baarmoeder, meer of minder andere buiksingewanden kunnen begrepen zijn. Dat hier de buikgordel, al wierd hij nog zoo vroegtijdig aangelegd, dit gebrek niet verhoeden kan, spreekt van zelve: want altijd ligt hier eene zekere voorbeschiktheid ten grondslag, die uit de bovengenoemde oorzaken, welke eene sterke uitzetting en verflapping van het buikvlies en der uitwendige bekleedselen der buikholte te weeg brengen, verklaarbaar is. Verscheidene malen zag ik, onlangs eerst in het kraamgesticht der Univerfiteit alhier, de vaneenwijking der *Linea alba* boven den navel, en men kan als zeker aannemen, dat ook de buikbreuk in het kraambed haren oorsprong ontleent uit de, bij de vroegste vorming, onvolkomene vereeniging dier deelen. Het zou evenwel grove onkunde en gebrek aan



kennis dezer oorzaak verraden, indien men de verschijning van een' dikken buik in dit geval aan het niet dragen van een' buikgordel wilde toeschrijven, alhoewel echter het aanleggen van een', ter binnenhouding dezer buikbreuk, opzettelijk vervaardigden, buikband aanmerkelijke voordeelen in zich sluit. Daar, waar de buikbreuken door de *Linea alba* zelve te voorschijn treden, is ook eene beklemming mogelijk, die nimmer plaats grijpt, wanneer, gelijk het somwijlen gebeurt, het buikvlies te gelijk met de buikspieren uitgerekt is, en dikwijls een zeer uitgebreid gezwel met eene zeer breede grondvlakte aan den buik vormt. Uit de algemeene, bij iedere breuk, zich openbarende verschijnselen leert men dit gebrek kennen, hetgeen over het algemeen gemakkelijk is, dat wil zeggen, het is gemeenlijk niet moeilijk te bepalen, of de dikke buik door eene breuk veroorzaakt wordt, of niet: daarentegen kan men dikwijls niet gemakkelijk onderscheiden, welke bijzondere ingewanden in den breukzak, of het gezwel begrepen zijn, daar de verschijnselen hier, naar gelang van omstandigheden, zeer kunnen uiteen loopen. Wij verwijzen te dezen aanzien naar heelkundige Handboeken. Ontleent nu de dikke buik uit deze oorzaken zijnen oorsprong, dan mag men wel op geen volkomene genezing hopen, en er zal, op zijn best genomen, bij kleine, zeer versch ontsane buikbreuken, alleen fluiting der buikspleet kunnen volgen. Ik heb eenige, op dit oogenblik weder twee, zeer belangrijke gevallen van dezen aard, in mijne bijzondere praktijk bijgewoond, waar eene *Hernia Lineae albae* zich ontwikkeld heeft,

heeft, en waar in het eene derzelve de buikspieren zeker in hare gansche lengte van elkander geweken zijn. Opmerkelijk zijn daarbij de *hysterische* toevallen, die zich dikwijls in een' hoogen graad vertoonen. Het bestendig dragen van een' buikgordel, door welke de spleet van den onderbuik door middel van een snoer zou kunnen vereenigd worden, gedurende ligging op den rug met het bovenste gedeelte des ligchaams in de hoogte, zorgdraging voor geregelde buiksondlasting en *antihysterische* middelen in geval van *hysterische* gebreken, namen gewoonlijk het gebrek zoo geheel en al weg, dat er geen spoor meer van te ontdekken was.

#### §. 430.

Eene andere oorzaak van den dikken buik bij kraamvrouwen is de trommelzucht (*Tympanitis*), drooge buikwaterzucht (*Hydrops ascites siccus*). In haren haastigen, met koorts verbonden vorm openbaart zij zich, in het gemeen, spoedig na de verlossing; zij is eene zeer ernstige ziekte, die veelal doodelijk afloopt. De lijderessen koortsen hevig, vervallen in een' hoogen graad van zwakte, waarbij de onderbuik, zonder pijnlijk te zijn, trommelzuchtig opgezet is. Over het algemeen prijst men ontlast- en versterkende geneesmiddelen aan. BURNS vermoedt, dat deze ziekte eene wijziging der kraamvrouwskoorts is. Eene andere soort van *Tympanitis*, die ook buiten het kraambed bij ontbreking der maandstonden menigmaal zich vertoont, en ligtelijk in waterzuchtige aandoeningen overgaat, en in het kraambed dikwijls bij andere ziekten zich



voegt, openbaart zich ook somwijlen op zich zelve als eene eigenaardige ziekte, bijzonder na het vatten van koude: de darmen zwellen op, de onderbuik wordt uitgezet, zonder dat hij bij de aanraking pijnlijk is. Hier schijnt eene verflapping van de spiervezelen der darmen ten grondslag te liggen, en de genezing is zeer moeilijk. Men heeft daarentegen ontlast-, windenafdrijvende middelen, *Mercurialia*, *Tonica*, baden, zelfs zeebaden, uitwendig inwrijvingen, drukkingen en dergelijken beproefd, doch somwijlen mislukken alle, eindigende de ziekte meestentijds in waterzucht van bijzondere ingewanden des onderbuiks, of algemeene waterzucht. Buitendien kunnen nu ook in en buiten het kraambed vele andere oorzaken tot het ontstaan dezer ziekte aanleiding geven, van welke wij hier alleenlijk de onderscheidene soorten van buikwaterzucht, en de opzetting van sommige ingewanden van den onderbuik, bij voorbeeld van de lever en milt, ten gevolge eener *chronische* ontsteking, of *Plethora abdominalis sanguinea* en *lymphatica*, vooral bij vrouwen, die niet zogen, opzetting van winden, en aandoeningen der speenaderen, als de gemeenzaamste oorzaken vermelden willen. Geen band, al wordt hij ook nog zoo vast aangelegd, zal in deze gevallen den dikken buik beteugelen: een doelmatige eetregel, werkzame leefwijze en drukke beweging, ontlastmiddelen, dikwijls een glas bitterwater, zullen hier meer moeten uitwerken. Bij gebreken van de speenaderen heeft ons het aanhoudende gebruik van het meermalen aangeprezene poeder uit *Tartarus depuratus*, *Rad. Rhei*, *Cort.*

*Chi-*

*Chinae regalis*, *Elaeosacchar. Foeniculi*, of uit *Tartar. depurat.* met *Rad. Rhei*, *Sulph. praecipitat.*, *Carb. Magnesiae*, en bovenal het bestendige gebruik van de *Kisfinger* mineraalbronnen heerlijke diensten bewezen en de gestalte verbeterd. Wat de gebreken der piswerktuigen, als oorzaken van den dikken buik betreft, deze vinden in het onmiddellijk hierop volgende hoofdstuk derzelve plaats.

RICHTER'S *Chirurgie. Bd. VI.*

BURN'S *Midwifery.*



## NEGENDE HOOFDSTUK.

*Van de ziekelijke veranderingen der pisafscheiding  
bij kraamvrouwen.*

## §. 431.

Gelijkèrwijze alreede in de zwangerschap velerlei gebreken in de piswerktuigen ontstaan kunnen, even zoo vertoonen zich ook dezelfde ziektevormen na de bevalling, waar zij gewoonlijk uit moeilijke verlosfingen hunnen oorsprong ontleenen, schoon zij ook door andere oorzaken na ligte verlosfingen kunnen verwekt worden. Wij hebben hier drie vormen nader in overweging te nemen:

A) Belette pislozing, *Retentio Urinae*,  
*Ischuria*,

B) Moeijelijke pislozing, *Dysuria*, *Stranguria*,

C) Onwillekeurige afvloeiing der pis,  
*Enuresis* s. *Incontinentia Urinae*,

en voornamelijk aan te toonen, waardoor zij inzonderheid bij kraamvrouwen ontstaan, en hoe zij te behandelen zijn.

A) Belette pislozing, *Retentio Urinae*.

## §. 432.

Onder belette pislozing, *Retentio Urinae*, *Ischuria*, in den striksten zin des woords, verstaan wij

wij de door eenigerhande oorzaak volkomen verhinderde ontlasting der *Urin* uit de blaas door den pisweg. De pisaffcheiding gaat in dit geval in de nieren altijd geregeld haren gang; er verzamelt zich derhalve altijd *Urin* in de blaas, doch zij kan niet ontlast worden. De belette pislozing onderscheidt zich dien ten gevolge werkelijk van de onderdrukte pisaffcheiding (*Suppressio Urinae, Ischuria notha s. spuria*), door dat bij de laatste in het geheel geene *Urin* in de nieren afgescheiden wordt en bijgevolg de teekenen van ophooping van *Urin* in de blaas ontbreken. — Bij de belette pislozing nu zijn de verschijnselen naar gelang van de zitplaats en de oorzaken des gebreks onderscheiden. Wat de zitplaats betreft, deze kan of in de pisleiders, of in de pisblaas, of eindelijk in de pisbuis haar verblijf hebben, en wij dienen om die reden onderscheid te maken tusfchen *Retentio ureterica, vesicalis* en *urethralis*, en moeten alleen hierbij aanmerken, dat bij kraamvrouwen de belette pislozing meestal in de blaas te zoeken is. Naar de oorzaken verdeelen wij de ziekte in *Ischuria paralytica* (door verlamming), die voornamelijk bij oude lieden zich opdoet; in *Ischuria inflammatoria* (ontstekingachtige), die gemeenlijk ten gevolge van ontsteking der blaas (*Cystitis*) zich openbaart, of ook ligt daarin overgaat; in *spasmodica* (krampachtige) en eindelijk in *mechanica* (door werktuigelijke oorzaken), die zeker bij zwangeren en kraamvrouwen het meeste zal aangetroffen worden. Het spreekt van zelve, dat wij ons slechts bij die oorzaken hier bepalen kunnen, die de ontwikkeling



dezer ziekte bij kraamvrouwen hoofdzakelijk begunstigen, aangezien eene volledige behandeling van de gebreken der piswerktuigen hier ten eenemale buiten ons bestek ligt.

### *Diagnosis.*

#### §. 433.

Uit welke oorzaken de belette pislozing ook ooit haren oorsprong moge ontleenen, zij geeft zich in het gemeen door de volgende, gemeenschappelijke verschijnselen te kennen: de afvloeiing der *Urin* is ten eenemale onderdrukt; de in de blaas verzamelde en teruggehoudene *Urin* hoopt zich in dezelve al meer en meer op, zet dezelve uit, niet zelden tot een' aanmerkelijken omvang, zoodat eindelijk eene ware *Ascites vesicalis* veroorzaakt wordt. Daaruit ontstaat eene buitengewone zwelling der opgevulde blaas, welke men boven de schaambeenderen door de scheede, door den endeldarm duidelijk voelt, en waarin men meestentijds duidelijke vochtgolving ontwaart, wanneer men boven de schaambeenderen met de hand, en in den endeldarm met de vingeren dezelve bij afwisseling drukt. De lijderes ontwaart aanvankelijk een' menigvuldigen en lastigen aandrang, om de *Urin* te lozen, doch zonder dat er eenige ontlasting volgt, of de lijderes raakt in het vervolg eenige droppels, met pijn en branding in de pisbuis, kwijt; het gezwel wordt bij de aanraking, en zelfs zonder deze, gevoelig en pijnlijk; de lijdende klaagt over omschrevene pijnen in den onderbuik, die meer of minder hevig zijn; gaandeweg wordt de

ge-

geheele onderbuik opgezet en pijnlijk , eindelijk wordt de vergaderde *Urin* rotachtig , terwijl de lijderes door angst , beklemming , misfelijkheid en flauwten gekweld wordt ; zij is met een koud zweet bedekt en niet zelden bezwijkt zij plotseling onder haar lijden . De gevolgen dezer terughouding der *Urin* echter zijn naar gelang van de hevigheid en de oorzaken des gebreks zeer verschillende , en wij willen om die reden alvorens die oorzaken van naderbij onderzoeken , welke bij kraamvrouwen ten opzichte der *Aetiologie* eene bijzondere aandacht verdienen , om dan eindelijk tot de uitgangen en de behandeling over te stappen .

### *Oorzaken.*

#### §. 434.

De oorzaken , die meestal de terughouding der pis bij kraamvrouwen te weeg brengen , zullen hier altijd van dien aard zijn , dat zij tot eene *Ischuria inflammatoria mechanica* den grond leggen . Wat de eerste nu betreft , dan kan allereerst uit de bellette pislozing eene ware ontsteking voortvloeijen , en deze wordt geboren uit verzuimde ontlasting der *Urin* voor de bevalling , door de ruwe inbrenging van den katheter , ten einde dezelve later nog te ontlasten . Door drukking van den *Uterus* op de blaas , of door ontsteking van den *Uterus* , wanneer deze deszelfs voorsten , naar de pisblaas gekeerden , wand voornamelijk aandoet ; door koudevatting ; door eene ziektestof ten gevolge van onderdrukte kraamzuiveringen enz . Een oorspronkelijk , te naauw , of



in vergelijking van de grootte des kinderhoofds betrekkelijk te klein bekken geeft ligtelijk daartoe aanleiding. Tot de werktuigelijke oorzaken, die insgelijks over het algemeen ontstekingsachtige toevallen te weeg brengen, behooren namelijk: drukking van den *Uterus* op den hals der blaas en de blaas zelve; hier kan, of de hoeveelheid van het vruchtwater te groot zijn, of de *Uterus* is door eene onnatuurlijke grootte der vrucht te sterk uitgezet, of er heeft eene onregelmatige ligging van het kinderhoofd, bij voorbeeld de ligging van het hoofd met het aangezicht naar de schaambeenderen, of eene zoogenaamde dubbele geboorte plaats, als wanneer het kind zich met de billen voordoet, beklemming des hoofds door een der, naar de schaambeenderen liggende, ledematen, of onnatuurlijke ligging van den *Uterus* zelve, die of uitgezakt, of omgebogen, voor- of achterwaarts gekeerd kan zijn; of de hulp der kunst met de handen of instrumenten, inzonderheid echter eene verlossing met de tang, door welke de hals der blaas en de blaas zelve veel van drukking te lijden hebben en dergelijken meer. In al deze gevallen wordt de pisblaas geprikkeld; er ontstaat of ontsteking derzelve en hare gevolgen, of bijaldien de pisblaas meer gedrukt wordt, zwelling der pisbuis en van hare monden, waarbij zij pijnlijk en gevoelig, en de uitvloeijing der *Urin* of gedeeltelijk, of geheel belemmerd wordt, en de binnenbrenging des katheters zelfs onmogelijk kan maken. Als het hoofd des kinds groot is, de verlossing uit dien hoofde langzaam voortgaat en het hoofd lang op de schaambeenderen staat, eer het-  
zel-

zelve in den doortogt komt, dan wordt de hals der blaas niet zelden gekneusd en verlamd, en er ontstaat, als gevolg daarvan, of eene *paralytische* terughouding der pis, zoo veel te eerder, als reeds vroeger toevallen van verzwakking (*atonische*) in de piswegen voorhanden waren en de ontlasting der *Urin* voor de verlossing verzuimd werd, — of er treden toevallen eener krampachtige en ontstekingsachtige, verhinderde pislozing, vooral bij prikkelbare voorwerpen, te voorschijn. Wijders kunnen ook veranderde liggingen der blaas tot de wording des gebreks gelegenheid geven. Wanneer uit de eene, of andere oorzaak eene uitzakking des *Uterus*, der scheede, of van den endeldarm ontstaat, dan kan de blaas ook daardoor op velerlei manieren beleedigd worden en in hare natuurlijke ligging verandering ondergaan; de hals der blaas, of de pisbuis wordt mede beleedigd, gekneusd, meer of min te zamengedrukt; verder kan de blaas zelve uitzakken, zich omkeeren en zich zelve den uitgang beletten. Eindelijk nog kan ook de belemmerde pislozing zich toevallig met andere ziekten der kraamvrouwen vereenigen: zoo vertoont zich namelijk bij *asthenische* koortsen, niet zelden eene, naar haren aard, door kramp verwekte, verhinderde pislozing; of zij treedt bij buikvliesontstekingen, onderdrukte kraamzuiveringen enz. als een zeer lastig toeval te voorschijn.



*Uitgangen.*

## §. 435.

Deze nu kunnen zeer onderscheiden zijn, en wel

- 1) de met *Urin* gevulde blaas zet zich zoo langer zoo meer uit; de wanden der blaas worden eindelijk door den ziekelijken prikkel in ontsteking gebragt en de ontsteking gaat in verrotting en den dood over.
- 2) De blaas wordt zoo geweldig uitgezet, dat hare wanden den aandrang niet langer wederstaan kunnen, en alzoo de gansche blaas, zonder voorafgegane ontsteking, barst.
- 3) Somwijlen opent zich de blaas op eene enkele plaats, en de *Urin* wordt dan dikwerf op de meest verschillende plaatsen uitgestort, al naarmate de pisblaas aan haren bodem, of van voren, of van achteren, aan den hals der blaas enz. vaneengescheiden is. Dit is alsdan of terstond doodelijk, of er vormen zich pislustels, er ontstaat onwillekeurige afvloeiing der pis (*Enuresis*) — meer of minder langdurig en gevaarvol.
- 4) Menigmaal wordt de blaas zoo sterk uitgezet, dat daardoor de afvloeiing der *Urin* van de nieren langs de pisleiders ten eenemale gestremd wordt; er vormen zich, als het ware, dan stofverplaatsingen van *Urin*; de *Urin* gaat in de bloedkolom over, of ontlast zich op de meest onderscheidene wijze door de huid, door kwijling, braking en dergelijken.

*Voorzegging.*

## §. 436.

Zij is over het algemeen zeer slecht, hetgeen uit het boven vermelde van zelve voortvloeit. Hoe moeilijker de aanleidende oorzaken te vermijden en te beteugelen zijn, hoe hooger graad de ziekte bereikt, des te erger is de uitgang. Is de afvloeiing der *Urin* geheel onderdrukt, dan is het altijd gevaarlijker, dan wanneer nog eenige *Urin* geloosd wordt. In het laatste geval namelijk zijn althans de natuurlijke uitgangen niet geheel en al gesloten en er is derhalve nog eerder hoop te scheppen, om door eene geschikte behandeling hulp aan te brengen.

*Geneeswijze.*

## §. 437.

De behandeling is natuurlijk ook naar gelang der oorzaken en het verloop der ziekte zeer verschillende, en komt over het algemeen met diegene overeen, welke bij dezelfde toevallen, als zij in de zwangerschap zich opdoen, noodzakelijk is. Bovendien drage men zorg, dat de kraamvrouw kort voor de aanvangende baring, de *Urin* volkomen ontlaste, en als dit niet van zelve gaan wil, dan neme men te regter tijde den katheter te hulp, die in deze omstandigheid over het algemeen eenen platachtigen vorm hebben en met de grootste voorzigtigheid ingebracht moet worden. Men toeve echter hier niet te lang mede; want heeft men eens  
het



het regte tijdstip voorbij laten gaan, dan gelukt het zetten van den katheter niet meer en het daaruit ontspruitende nadeel is niet weder te verhelpen. Openbaren zich ontstekingsachtige toevallen, dan ga men streng ontlastwerend te werk, door algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, koude *Emulsiën*, *Calomel* en afleidende middelen. Heeft het gebrek zulk een' hoogen graad nog niet bereikt, dan gaat men tot uitwendige omslagen van *Species resolventes* op het *Perinaeum* en op de *Regio hypogastrica* over; men verordineere laauwe halve of geheele baden. Bij *paralytische*, of krampachtige toestanden moet een meer prikkelend of krampstillend geneesplan ingeslagen worden, gelijk zulks in geneeskundige Handboeken het beste te vinden is. Helpen al deze middelen niets, dan moet men tot eene kunstbewerking de toevlugt nemen; waarover wij op het einde dezes hoofdstuks nog nader spreken zullen; wij gaan thans tot de andere foorten der gebreken van de blaas over, en kunnen hierbij veel korter zijn, vermits zij meestentijds dezelfde oorzaken ten grondslag hebben.

B) Moeijelijke pislozing, *Dysuria*, druppelswijze afvloeijing, *Stranguria*.

#### §. 438.

De moeilijke pislozing is eigenlijk van de *Retentio Urinae* alleen door den minderen graad onderscheiden; zij bestaat in eene onvolkomen belemmerde pislozing. De afvloeijing der *Urin* is daarbij wel niet ten eenemale verhinderd, trouwens  
toch

toch moeilijk (*Dysuria*), of met hevige branding en vaak met aanmerkelijke pijnen verbonden, als wanneer de *Urin* zich meestentijds druppelswijze ontlast (*Stranguria*). Ook deze ziektevorm vertoont zich menigwerf na de verlossing, en kan of oorspronkelijk (*idiopatisch*) of toevallig (*symptomatisch*) zijn. Het laatste ziet men in het kraambed het gemeenzaamste en ontstaat uit zulke oorzaken, die eene ontsteking en opzwellling van den hals der blaas en der pisbuis te weeg brengen, of eene kneuzing dezer deelen veroorzaken. De *idiopatische*, moeilijke waterlozing ontleent altoos haren oorsprong uit eene ongesteldheid in de nieren, en zij is natuurlijk zoo veel te ongunstiger, wanneer zij zich met het kraambed vereenigt, naardien de hier aangewezen geneesmiddelen te groote omzigtigheid vereischen en dikwijls in het geheel niet aanwendbaar zijn. De behandeling sluit hier insgelijks niets bijzonders in, en kan men over het algemeen hetzelfde geneesplan volgen, hetwelk wij bereids bij de volkomene terughouding der pis hebben opgegeven. In alle gevallen nogtans kan men bij dit toeval eenigzins gunstiger voorspelling doen; de genezing geschiedt hier dikwijls gemakkelijker; bij de *Stranguria* betoonen *Opiaten*, vermengd met slijmige middelen, niet zelden de heilzaamste uitwerkselen.



C) Onwillekeurige afvloeiing der Urin,  
*Enuresis s. Incontinentia Urinae.*

§. 439.

Bij de *Enuresis* loopt de pis volstrekt onwillekeurig af, zonder pijnlijke gewaarwording en zonder dat de lijderes het vermogen heeft, haar op te houden, ofschoon zij ook de behoefte nog gevoelt, om dezelve te lozen. Menigmaal vloeit de *Urin* gestadig droppelswijze af, onmerkbaar en zelfs na volkomene ontlediging der blaas nog aanhoudende, of in eens, zonder dat de lijderes eene nieuwe verzameling bespeurd heeft, en voor zij zich tot de pislozing gereed kan maken. Zulk een onvermogen, om de *Urin* op te houden, ontstaat nu niet zelden na de bevalling, en kan dikwijls zeer hardnekkig zijn, ja zelfs gedurende het gansche leven blijven bestaan. Deze onwillekeurige afvloeiing duurt dan of onafgebroken voort, of er volgen kleine tusschenpoozen, in welke de lijderesfen de pis bij zich houden. De onderkenning is natuurlijk ligt; de ziekte niet te miskennen; het gezigt alleen duidt ons den aard der ziekte aan.

*Oorzaken.*

§. 440.

De oorzaken zijn verschillende; wij onderscheiden namelijk twee hoofdoorzaken, en bij gevolg ook twee hoofdvormen dezer ziekte: a) *Enuresis paralytica s. atonica*. Hier ligt eene zwakte, of  
 eene

eene volkomene verlamming van de sluitspier der blaas ten grondslag, waardoor het alsdan komt, dat de uit de nieren komende *Urin* zich niet eerst tot eene zekere hoeveelheid in de blaas verzamelt, maar dadelijk door den openstaanden hals der blaas loopt. Dit krachtverlies van de sluitspier ontstaat in het kraambed gemeenlijk uit plaatselijke oorzaken en is veelal het gevolg eener moeilijke verlossing, waarbij de hals der blaas sterk en zeer lang gekneusd wordt, wanneer, bij voorbeeld, het kindshoofd zeer lang op de vereeniging der schaambeenderen, inzonderheid bij beklemming en sterke inspanning bij de baring, staat, voor het in den doortogt komt. *b) Enuresis mechanica*, bij welke plaatselijke gebreken in de bewerktuiging voorhanden zijn, die, over het algemeen, door de meer of min zware hulp der kunst bij moeilijke geboorten, veroorzaakt wordt. Een ruw, te dikwijls herhaald onderzoeken; de onvoorzigtige aanwending der tang; de aanwending van scherpe instrumenten, de doorboring der vliezen (*Embryotomie*), de onthefening, de schaambeensnede en dergelijke, kunnen ligtelijk tot verwonding der onderhavige deelen, en wel tot eene verscheuring van den hals der blaas, gelegenheid geven, die dan noodwendig eene *Incontinentia Urinae* met zich brengt. Zij kan evenwel ook het gevolg eener, gedurende eene hardnekkige pisopstopping, ontstane pislustel zijn, of eener zich vormende opening in het ligchaam der blaas zelve, of door het afvallen van eene, na ontstekings gevormde, doode korst en daaruit voortvloeiend verlies van zelfstandigheid. Uit welke

IV. D. 3°. en 4°. st.                      A a a                      oor.



oorzaken echter de ziekte ook mag ontstaan zijn, zij is altijd een zeer lastig en niet zelden ongeneeslijk gebrek. De onophoudelijk afdruppelende *Urin* houdt bestendig de teeldeelen en de naburige deelen nat, als ook de kleederen, verspreidt een ondragelijken stank rondom de lijdende, waardoor zij zich zelve en anderen tot last wordt, en verwekt jeuking, branding en ontvelling der aangrenzende deelen. Hierbij voegt zich nu soms op het laatste eene sluipkoorts, welke de ongelukkige lijdere geheel en al ten onder brengt.

*Voorzegging.*

§. 441.

De voorzegging is naar mate van de aanleidende oorzaken onderscheiden. Ontleent de ziekte uit bloote zwakte en verlamming van de sluitspier haren oorsprong, dan mag men altijd nog hoop voeden, om het gebrek door den tijd te genezen. Heeft echter eene beleediging of verscheuring van het deel schuld aan de afvloeiing der *Urin*, dan is de voorzegging altijd hoogst ongunstig, en bijaldien de verscheuring van den hals der blaas tot over de sluitspier zich uitstrekt en eene aanmerkelijke opening, met verlies van zelfstandigheid en binnen-buitenwaartskeering der blaas, plaats vindt, aan geen volkomene genezing te denken; nog minder als de blaas zelve gescheurd is. In al deze gevallen kan men het gebrek slechts dragelijk houden, waarbij nogtans de lijdere lang kan blijven leven.

## Geneeswijze.

§. 442.

Bij de *Enuresis* door verlamming moet men de geneeskrachten der Natuur door zulke middelen ondersteunen, welke het vermogen bezitten om de verslapte vezelen hare spanning en veerkracht weder te geven. Van inwendige middelen is hier niet veel te verwachten; men heeft daartoe echter den aluin in vereeniging met Arabische gom, of in den vorm van aluimelken, de kina in poeder en in groote hoeveelheden, de Spaansche vliegentinctuur, enz. aangeprezen. Wij hebben in de bijgebrachte gevallen meermalen van de pillen van POCTAS veel goeds gezien.

R. *Puly. Cantharid.* gr. iij.

*Camphorae* gr. x.

*Sapon venet.* 3i.

*M. f. pil* xxxx d.

S. dagelijks drie pillen in te nemen.

De uitwendige middelen nogtans doen hier meer af, welke men echter, zoo lang de kraamvloed nog aanwezig is, behoedzaam moet in het werk stellen, opdat dezelve niet onderdrukt worde. Men late het derhalve aanvankelijk bij het gebruik van specerijachtige versterkende stovingen berusten, en ga later tot meer zamentrekkende middelen over, bij voorbeeld, tot een afkooksel van de *Tormentilla*, tot het uitwendige gebruik van den aluin, van het zwavelzure ijzer enz., die men of door eene, in de scheede gelegde, spons aanlegt, of ook in den



vorm van inspuitingen in de blaas aanwendt, als wanneer men de vrouw in dier voege laat liggen, dat zij niet dadelijk weder afloopen. Kant zich het gebrek tegen alles aan, dan moet men de afvloeiing der *Urin*, zoo veel mogelijk, onschadelijk trachten te maken, tot welk einde men allerhande toestellen uitgedacht heeft, waarbij wij lager nog zullen stilstaan. Daar, waar de *Enuresis* uit eene beleediging van den hals der blaas of de blaas zelve voortvloeit, kan men blootelijk *palliatief* te werk gaan, en zelfs in die gevallen, waar er nog genezing mogelijk is, kan dezelve slechts door eene heilkundige behandeling geschieden, waarover aanstonds meer.

*Heilkundige kunsthulp bij de onderscheidene gebreken  
in de pisafzondering bij kraamvrouwen.*

§. 443.

A) Van den katheter. In de meeste gevallen van pisopstopping is dit instrument het voornamelijk middel, om de ziekte of te verhoeden, of haar het grootste gevaar te ontnemen. Het inbrengen van denzelven is bij vrouwen altijd gemakkelijk; of het moest zijn, dat er plaatselijke beletselen voorhanden waren; men doet het beste, zich van een' buigzamen, veerkrachtigen katheter te bedienen, daar men hem dikwijls een' geruimen tijd moet laten liggen. Bij de binnenbrenging laat men de lijdere op den rug liggen, en de beenen van elkander voeren en naar den buik trekken; alsdan brengt men den katheter in de pisbuis, door welke zij ge-

gemeenlijk ligt en spoedig in de blaas gaat. Moet hij een' zekeren tijd blijven liggen, dan maakt men hem door middel van een paar bandjes vast. Van tijd tot tijd echter moet men hem uitnemen en schoonmaken, naardien het bezinkfel der *Urin*, of ook slijm en dergelijken zich ligt aan de uitwendige oppervlakte van denzelfven vastzetten. Deszelfs aanwending komt bij alle soorten van pisopstoppingen te pas, zoodra de *Urin* zich eenigermate heeft aangehoopt, en de in het werk gestelde middelen vruchteloos geweest zijn. Bij de ontstekingsachtige pisopstopping moet men nogtans eerst de ontstekingsachtige toevallen uit den weg ruimen en, over het algemeen, nimmer den katheter met geweld inbrengen. Daar, waar de blaas niet volkomen ontledigd wordt, gelijk het gemeenlijk het geval is, als de blaas sterk uitgezet is, en haar zamentrekkingsvermogen verloren heeft, daar moet men de afvloeiing door eene, zoo veel mogelijk, loodlijnige plaatsing der lijderes, en door eene gelijktijdige drukking op de blaasstreek ondersteunen. Naderhand moet men bij iedere nieuwe verzameling van *Urin* op nieuws den katheter gebruiken, en men kan hem daarom meermalen daags inbrengen, of een' tijd lang liggen laten. Doch bijaldien men dit doet, dan moet men zijne uitwendige opening digt maken en de *Urin* alle drie tot vier uren aftappen. Laat het werktuig zich gemakkelijk inbrengen, of bezit de lijderes zelve reeds de vaardigheid, om hetzelfde in te brengen, dan is het altoos beter, het zoo dikwijls aan te wenden, als het vereischt wordt, dan dat men het voortdurend liggen laat. Zoodra dan ein-



delijk de *Urin* met een' vollen straal uit den katheter loopt, is het tijd, om deszelfs aanwending geheel te laten varen, met dien verstande, dat de kranke dan ook het vermogen heeft, zonder hem volkomen de blaas te ontledigen. Bijaldien dit zoo niet zijn mogt, gaat men met deszelfs gebruik voort, tot de pisopstopping volkomen weggenomen is, en de lijderes in staat is, ook de laatste droppels uit te drijven. De beste buigzame katheters zijn, volgens RICHTER's opgave, die van PICKEL in *Wurzburg* en BERNARD in *Parijs*.

#### §. 444.

B) De kaarsjes of bougies. Daar, waar de pisopstopping uit eene vernauwing der pisbuis ontspruit, moeten deze in het werk gesteld worden. Bij vrouwen, voornamelijk bij kraamvrouwen, heeft dit zelden plaats. Hare behandeling is anderzins ligter en eenvoudiger, dan bij manspersonen; doch volkomen hetzelfde. Men kan ze het beste vastmaken, door het, uit de *Urethra* stekende, gedeelte om te buigen en hetzelfde met banden en kleefpleister te bepalen. Het beste bereidt men dezelve uit één pond was, drie pond olijfolie en anderhalf pond *Menie*.

#### §. 445.

C) De Punctie of de blaassteek. Heeft de pisopstopping een' hoogen graad bereikt; kan de *Urin* langs den natuurlijken weg niet ontlast worden; zijn al de, daartegen in het werk gestelde, middelen vruchteloos geweest; wil de binnenbren-  
ging

ging van den katheter volstrekt niet gelukken, dan doet men de blaassteek door middel eener *Troiquart*. Zij is gemakkelijk en zonder gevaar, en mag vooral niet te lang uitgesteld worden. Bij vrouwen verrigt men de kunstbewerking het beste en zekerste boven de schaambeenderen; de wijze van *opereren* is in het geheel zeer eenvoudig; doch de Heelkundigen wijken in hunne wijze van bewerking eenigzins van elkander af. De meeste doen de steek anderhalf duim boven de schaambeensvereening. BINGHAM keurt dit echter af, en meent, dat men, door de steek zoo ver boven de schaambeenderen te verrigten, tot zamentrekkingen der blaas aanleiding geeft, bijgevolg ook tot het afglijden van het instrument, en men ook het buikvlies ligt daarbij beleedigen kan. Reden, waarom hij den raad geeft, digt boven de schaambeensstreek de *Punctie* te verrigten, en de *Troiquart* in eene schuinsche rigting naar beneden en achteren in te stooten. Is de *Urin* ontlast, dan laat men de buis in de wonde liggen, terwijl men eenige banden door den ring, of de gaatjes derzelve trekt, deze om den buik vastmaakt en de *Urin* op deze wijze ontlast, tot het beletsel weggenomen is, waarom de blaassteek verrigt werd. Een ander geschilpunt nu is, of men de *Troiquart* dadelijk door de uitwendige bekleedfelen henen in de blaas stooten, of dat men eerst een' kunstigen weg banen zal, zoodat de blaas bloot komt te liggen. Wij zijn van gedachten, dat bij magere personen en bij zulke, waar de blaas duidelijk boven de schaambeenderen ontdekt kan worden, de eerste *Methode* ten eenemale de voorkeur verdient, overmits zij



eenvoudig is en geen nadeel daarvan te wachten staat. Bij vette personen evenwel kan men, voor de *Punctie*, de huid in de rigting der *Linea alba* eene vinger breed in de dwarste doorsnijden; de piramiedswijze spieren van elkander scheiden, en dan de *Troiquart* in de ontbloote blaas voeren. De blaas hecht zich zeer spoedig in den omvang der snede aan de buikspieren vast, terwijl men van de spoedig intredende verettering geen nadeel te wachten heeft.

#### §. 446.

d) Van de pisontvangers. Deze wordt aangewend, wanneer de *Enuresis* allen daartegen in het werk gestelden middelen wederstand biedt, ten einde althans de daaruit ontspruitende gebreken te verminderen, dien ten gevolge vooral in die gevallen, waar *organische* beletfelen ten grondslag liggen, bij voorbeeld, wanneer zich eene opening in de blaas zelve gevormd heeft, waardoor nu de pis gedurig uitzijpelt. — Het gemeenzaamste en eenvoudigste middel is de spons, welke men in de scheede legt; doch zij baat inderdaad zeer weinig, naardien zij schielijk met pis gevuld wordt en dezelve dan even zoo goed afvloeit, als of er geene spons was; voorts wordt dezelve uitgedrukt als de lijdende gaat zitten, en zij verhoedt zodoende de verontreiniging der naburige deelen en kleedingstukken volstrekt niet. Dit gebrek heeft men door moederringen, die eene drukking op de pisbuis uitoefenen, willen wegnemen. Doch ook daarmee heeft men zijn oogmerk niet bereikt, dewijl of de druk-

drukking te sterk is, en dan schadelijk wordt, of niet sterk genoeg is, als wanneer zij ook niet veel helpt. Om die reden is men op middelen bedacht geweest, om ook vrouwen, even als manspersonen, in staat te stellen eene flesch te dragen, die de *Urin* opvangt. Het *Receptaculum* van FRIED (*desfen Anfangsgrunde der Geburtshülfe, Strassburg 1769. 8°. Tab. 17. Fig. 1.*) is ongeschikt en de daaraan bevestigde blaas begint zeer schielijk te stinken. De toestel van BÖTTCHER is, wel is waar, zeer vindingrijk, doch hij heeft een bezwaar, dat namelijk de lijderes er bij het zitten zeer door gehinderd wordt; dergelijke beletselen bezit ook de, met een' langwerpigen trechter voorziene pisontvanger, welken J. CHR. STARK beschreven en afgebeeld heeft, en het verbeterde toestel van RICHTER zal dit bezwaar ook niet geheel uit den weg ruimen (cf. *Ejd. Chirurg. Bd. 17. §. 402.*) BINGHAM stelt voor, om eene flesch van veerkrachtige gom in de scheede te brengen, en door een zeker, door hem beschreven werktuig eene zachte, gelijkmatige drukking op de beleedigde deelen aan te brengen (cf. *Op. Cit. pag. 240*); het uitzieperen der *Urin* nogtans wordt daardoor ook niet verhinderd. Het beste is, volgens onze meening, het door WINTER in zijn, onder nader te vermeldene, geschrift naauwkeurig beschrevene, scheepvormige werktuig, dat de meeste in het oogloopende gebreken van alle andere, ons bekende, toestellen niet bezit, en zoowel bij het zitten als het liggen op den rug der lijdende, aan deszelfs doel beantwoordt. Wij gevoelen ons verplicht, naar het



kleine geschrift zelve te verwijzen, daar het ons hier te ver zou afleiden, wilden wij eene naauwkeurige beschrijving van dit toestel geven, en elke verkorting der eigene beschrijving van den Heer Dr. WINTER der duidelijkheid afbreuk doen zoude.

### §. 447.

e) De pisfistels en derzelve behandeling. Zonder ons in eene breedvoerige beschouwing van de *Diagnosis*, *Aetiologie* en *Therapie* der onderscheiden pisfistels in te laten, die hier niet op de regte plaats zou zijn, willen wij alleenlijk diegene, die na moeilijke verlossing het menigvuldigste voorkomen, eenigzins nader in overweging nemen. Wij bedoelen diegene, welke zich uit de pisblaas in de scheede openen, die men het ligtste kan ontdekken, wanneer men een' vinger in de scheede en in de blaas eene *Sonde* of katheter brengt. De geneeswijze is hier zeer duidelijk en wel van een' dubbelen aard: 1) men verhindere, dat de pis door de fistelopening in de scheede vloeije en 2) trachte men de randen der fistelopening te vereenigen en te genezen. De uitvoering echter van dit geneesplan, althans van het laatste, is hier zeer moeilijk, en de Heelkundigen hebben de meest onderscheidene middelen verzonnen, ten einde dit doel te bereiken, niettegenstaande dit, is het tot dus verre aan niet een' mogen gelukken, eene *Methode* uit te vinden, waarbij niet meer te herinneren zou vallen, en die haar doelwit spoedig en zeker bereikte. — Om de afvloeiing der *Urin* in de scheede te verhoeden, heeft men het aan-

hou-

houdend gebruik van een' buigzamen katheter aangeprezen en DESAULT een' bijzonder' toefstel uitgevonden, om denzelven in eene onbewegelijke ligging in de blaas te houden, doch, behalve dat de lijderes ook in het gaan en zitten er door gehinderd wordt, zij zal echter de uitvloeijing der *Urin*, de lijderes op den rug liggende, niet verhoeden (\*). Om aan de tweede aanwijzing te voldoen, moet men eene plukfelwiek, met veerkrachtige hars of met was overtrokken, en zoo dik, dat zij de scheede opvult, in deze brengen, waardoor de wondlippen tot elkander naderen, tot zij zich eindelijk vereenigen. Deze geneeswijze nogtans is, alhoewel zij ook soms gelukt, zeer langdurig en vordert een taai geduld, zoowel van den Arts als der lijderes. Bovendien heeft NAËGELE voldoende bewezen, dat deze bewerking bij fistelopeningen met verlies van zelfstandigheid, zeker geen goede gevolgen zal kunnen hebben, en over het geheel veel nadeel in zich sluit. Hij slaat deswege eene andere soort van kunstbewerking voor, die, in het algemeen genomen, daarin bestaat, de randen der fistelopening tot eene versche wonde te maken en door heilkundige hulp te vereenigen. Men brengt tot dat einde de lijderes op een tamelijk hoog, dwars bed, of op eene tafel, bijkans in dezelfde ligging als bij de steensnede, doch zonder de ledematen vast te binden. Dan brengt men een' zilveren katheter in de pisblaas, welken men met de linker hand houdt.

Met

(\*) De ligging op den buik verdient in vele gevallen de voorkeur.



Met den wijsvinger, of een paar vingeren der rechter hand gaat men nu binnen de scheede en onderzoekt men de grootte en gedaante der fistelopening en de gesteldheid van hare randen op het nauwkeurigste. Indien de randen der opening verouderd, omgekruld, eeltachtig zijn, neemt men ze met eene schar, of eene verborgen *Bistouri*, weg. De vereeniging der fistelranden door aaneenbrenging geschiedt nu, of door de tang zonder bindsel, of door het bindsel, namelijk door de ontsteking door middel van eene naald en terughaling derzelve, of door de tang benevens het bindsel, of door de omgewondene hechting. Eindelijk kan ook bij fistuleuze openingen aan den achtersten wand der pisblaas de doorsteking der wondlippen van de inwendige vlakte der pisblaas af aangedaan worden, waartoe men zich van eene eenigzins veranderde *Sonde*, of buis van LAFORET bedient. Ten aanzien van het bijzondere dezer verschillende soorten van kunstbewerkingen verwijzen wij naar de genoemde Schriften zelve, en merken alleenlijk aan, dat wij hier eenmaal deze *Methode* beproefden, offchoon de vereeniging ten eenemaal mislukte; even zoo min gelukte het, in een dergelijk geval met verlies van zelfstandigheid, eenen ervaren en zeer bekwamen heel- en verloskundige. — Nog eenvoudiger is de behandeling van den Heer COXE (*Journ. Univers. des Sciences médicales*, Sept. 1819), die door een' cilindcr in de scheede, welke den voorsten wand derzelve te zamendrukt, de katheter een' geruimen tijd blijvende liggen, de fistelranden tot elkander brengen wil. Doch deze be-

behandeling zal voorzeker veel tijd behoeven, en der lijderes zeer veel moeilijkheden veroorzaken. De ondervinding moet verder nu nog beslissen, welke van alle *Methoden* de beste is: te voren hield ik de door NAËGELE beschrevene voor de geschiktste. Voor het overige zijn zulke ongelukkige vrouwen, waar de volkomen genezing door vereeniging der wonden niet plaats kan grijpen, vanwege de bestendige afvloeiing der pis, hoogst ongelukkig. Men trachte alsdan door eene doelmatige dieet de *Urin* zacht te houden, opdat zij door hare scherpte de deelen niet te veel ontvelle; daartoe zijn slijmige voedfelen, de garsten-, haver- en boekweitengort, en bij vermagering en uitterende koortsen afkookfels van faleb, ijslandsche mos en dergelijken de geschiktste middelen. Wijders moet men door zachte, doelmatig gekozene ontlastmiddelen voor behoorlijke buiksontlasting zorgen. De scheede en de uitwendig ontvelde deelen late men vlijtig met slijmige afkookfels, waarbij men loodwater en *Opium* voegt, afwasfchen. Bovendien neme men steeds de grootste zindelijkheid in acht, zoowel omtrent het linnen als het beddegoed, terwijl er voornamelijk bij arme lieden niets overschiet, dan ze op stroo te leggen en eenigerhande kuip onder de bedstede te zetten. Indien de pisbuis alleen beledigd is, dan kan men over dag nog van een doelmatig *Compressorium Urethrae* gebruik maken; dat van HAHN (s. o. HAHN, *Diss. sist. observat. medic. ac. chirurg. c. t*, Götting. 1788. 8°. p. 47) is nog het bruikbaarste, hetwelk uit een' stalen veer bestaat, waarop eene spons wordt vastgemaakt en dat met een'



een' riem voorzien is. Wij laten dan, aangezien ook dit middel door vele vrouwen niet verdragen wordt, niets dan eene spons dragen, die, op de manier van het windsel van FRIED, op een T-verband bevestigd, zuiver gehouden en dikwijls met eene andere verwisseld wordt. Ten bewijze, welk een misbruik soms van het *Magnetismus* gemaakt is geworden, verhaal ik de volgende geschiedenis. Voor eenige jaren riep eene zekere vrouw, die sedert hare verlosfing aan eene *Incontinentia Urinae* leed, mijne hulp in. Ik ondervroeg haar eerst, of zij ook reeds eenen Arts geraadpleegd had, en of haar gebrek onderzocht was geworden. Ja, antwoordde zij mij, een' Arts heb ik gebruikt, die mij reeds sedert vele maanden dagelijks gemagnetiseerd, doch mij nooit onderzocht, en mij ook anderzins niets geboden heeft. Bij het door mij dadelijk in het werk gestelde onderzoek en binnenbrenging des katheters vond ik een gat, ter grootte van eene zestehalf, aan den voorsten wand der scheede; tevens was de hals der blaas doorgescheurd en mijn vinger kwam onmiddellijk in de blaas. *Sapienti satis.*

#### L I T T E R A T U U R.

#### §. 448.

BERNSTEIN's *Handbuch für Wundärztze. Th. 1, 2.*

CALISSEN's *System der neuen Wundarzneykunst. Aus dem Lat. von KUHN. 2ter Theil. Kopenh. 1791.*

RICHTER's *Chirurgie. 6ter Bd.*

*Ejd., Therapie. 4ter Bd.*

CAPURON, *op. cit.* pag. 400. sqq.

BURNS, *op. cit.*

JÖRG'S *Handbuch.*

*Theoret. prakt. Abhandl. über die Geburtshülfe u. s. w.*  
Aus dem Franz., mit Zusätzen von STARK. 2ter Theil.  
Erfurt 1800.

NAEGELE, *Vorschläge zur curativen Behandlung der in  
die Mutterscheide sich öffnenden Harnblasenfistel,  
nebst Beschreibung und Abbildung einiger Instrumen-  
ten, in dessen Erfahrungen und Abhandlungen aus  
dem Gebiete der Kr. des Weiblichen Geschlechts.*  
S. 367.

WINTER, *Beschreibung eines Harnrecipienten für Frauen,  
nebst einer kupfer tafel.* Heidelberg. 1817.

MEISSNER, *die Umstülpung der Gebärmutter und der Ge-  
bärmutterbruch.* Leipzig und Sorau 1822.

BINGHAM, *Krankheiten und Verletzungen der Blase.* Aus  
dem Engl. von Dr. DOHLHOFF. Magdeb. 1823.



## TIENDE HOOFDSTUK.

*Van de ziekten van den endeldarm en  
deszelfs verrigtingen.*

## §. 449.

De gebreken van den endeldarm, aan welke de kraamvrouw onderworpen is, en de afwijkingen van zijne verrigtingen bestaan goeddeels in zulke toevalen, die noch aan het kraambed, noch over het algemeen aan het vrouwelijke geslacht bij uitsluiting toebehooren; wij kunnen om deze reden het hier zoo veel te korter maken, daar hier altemaal ziekte-soorten zijn, die op zich zelve genoeg bekend zijn, en wier onderkenning bereids door de verschijning der ziekte zelve blijkt, en het onze taak slechts is, die oorzaken te vermelden, welke dit gebrek inzonderheid bij kraamvrouwen veroorzaken. Wij brengen daartoe: A) speenadergezwellen, B) verscheuring en C) verlamming van den endeldarm, D) *Diarrhoe* en eindelijk E) belette ontlasting.

## A) Speenadergezwellen.

## §. 450.

Wat de speenadergezwellen betreft, deze zijn ten aanzien van hunnen verschillenden vorm, uitgebreid-

breidheid en grootte genoegzaam bekend, en het is niet te verwonderen, dat ook kraamvrouwen, vooral bij voorhanden zijnde aanleg daartoe, dikwijls door dezelve gekweld worden, als men in overweging neemt, dat alles, wat den bloedsomloop in de buikholte, vooral in het poortaderstelsel belemmert, de speenvaten prikkelt en verzwakt — tot aanbeijen aanleiding geeft en dezelve verwekt. De aanleg daartoe wordt over het algemeen reeds door de voorafgegane zwangerschap, door de, daardoor te weeg gebragte, drukking van den *Uterus* op de speenvaten gegeven, en de ziekte verdwijnt in dit geval meestentijds eerst na de afgeloopene verlossing in het kraambed, of nog later. Moeijelijke verlossingen, verplaattingen der baarmoeder, prikkeling op den endeldarm door vele lavementen, verstoppingen van den buik, en daardoor gedurige persingen bij den stoelgang echter kunnen den voorhanden zijnde aanleg nog vermeederen, of het gebrek eerst in den laatsten tijd doen ontwikkelen. Zoodanige speenadergezwellen der kraamvrouwen openbaren zich dan gewoonlijk eerst na de zogkoorts, en zijn alsdan veelal zeer pijnlijk. De behandeling derzelve sluit niets bijzonders in zich: alle uit- en inwendige middelen doen alleenlijk op geregelde buiksondasting. Men rigt zich dien ten gevolge naar den graad en de uitgebreidheid des gebreks, als ook naar de bijzondere, aanleidende oorzaken, en men moet om die reden of ontstekingswerende middelen, of meer omwindende, verzachtende, slijmachtige, pijnstillende zalven in het werk stellen, of men stapt tot eene kunstbewerking over, die op zich zelve zeer een-

IV. D. 3°. en 4°. st.      Bbb      vou-



voudig is en waarbij men of onderbindt, of, hetgeen het beste is, eenige gezwollen met eene schaar uitsnijdt, trouwens zij mogen niet te pijnlijk of ontstoken zijn.

## B) Inscheuring van den endeldarm.

### §. 451.

De inscheuring van den endeldarm grijpt of bij natuurlijke verlosfingen, die zeer langdurig zijn, evenwel zelden en dan alleen nog plaats, wanneer men den bilnaad geheel niet, of gebrekkig ondersteund heeft, of ook na zeer schielijke, als het ware, verrassende verlosfingen, of eindelijk het menigvuldigste, bij zware, moeilijke baringen, waar men de verlosfing door de tang volbrengen moet. In al deze gevallen begint de inscheuring gemeenlijk bij het toompje der schaamlippen, zich verder uitstrekende, dikwijls zoo ver, dat de endeldarm eenige vingeren breed ingescheurd wordt. Is de sluitspier van den aars gescheurd, dan raakt de vrouw de drekstoffen onwillekeurig kwijt, en in vervolg van tijd openbaart zich uittering en uitterende koorts, of het moest zijn, dat de sluitspier slechts gedeeltelijk beleedigd is, en de natuur zelve zich langzamerhand door hare herstellingskracht hulp verschaft. In alle andere gevallen is er natuurlijk alleen iets van heelkundige hulp te verwachten; zonder de hechting zal men voorzeker niet veel kunnen uitrigten. De kunstbewerking is dikwijls moeilijk en altijd zeer pijnlijk. Heeft men de wonde verzuimd te behandelen; zijn de randen verdeeld en vereeld, dan moet men

men dezelve eerst op nieuws raauw maken, en vervolgens hechten. Het bijzondere dezer bewerking hoort bij de Heelkunde te huis.

### C) Verlamming van den endeldarm.

#### §. 452.

De verlamming van den endeldarm ontstaat uit al zulke oorzaken, die reeds tijdens de baring eene uitzakking van dit ingewand kunnen veroorzaken. Zij is meestal het gevolg van zware verlosfingen, als het kinderhoofd inzonderheid tegen het einde der verlosfing, sterk op den endeldarm drukt, en men verzuimd heeft, denzelven voor het begin van den arbeid te ontlasten. In die gevallen, waar slecht onderrigte Vroedvrouwen het staartbeen door de binnenvoering van den vinger achterwaarts drukken, onder het voorwendfel van de onderste engte des bekvens te verwijden, en in het geheel ter ontwikkeling des hoofds allerhande kunstgrepen in den endeldarm maken, viel de verlamming van den endeldarm meer voor, en wordt even zoo zeer begunstigd, als door de handgreep van HOFFMANN om den endeldarm te ondersteunen. Voor het overige verwijzen wij naar datgene, wat wij van de uitzakking des endeldarms bij barenden breeder gezegd hebben.

### D) *Diarrhoe*.

#### §. 453.

De *Diarrhoe*, welke somwijlen bij kraamvrouwen voorkomt, ontstaat vroeger of later na de bevalling,



en is ten aanzien van hare hevigheid zeer onderscheiden, al naar gelang zij sterker, of onbeduidender is, en naarmate zij op de pas verlorene van een' heilzamen of nadeeligen invloed is. In dit laatste opzigt onderscheiden wij eene gunstige (*critische*) en eene (*symptomatische*) toevallige *Diarrhoe*, wier uitwerkselen dikwijls regtstreeks tegen elkander inloopen, naardien gene onder verligting van de aanwezige, ziekelijke toevallen en als eene heilzame poging der natuur (*Conamen Naturae salutare*) te voorschijn treedt; deze echter niet zelden de lijdende ten grave voert en zich als toeval eener zeer boosaardige ziekte opdoet. De *critische* buikloop ontstaat gemeenlijk te gelijker tijd met de zogkoorts, en de lijderes heeft daarbij noch koliekaardige pijnen, noch koorts, de buik zelf is daarbij week en niet gespannen; bij de *symptomatische Diarrhoe* daarentegen vertoonen zich vrij hevige koliekaardige pijnen; de buik is opgezet, gespannen, pijnlijk; de *Lochiën* zijn verminderd of onderdrukt; er openbaart zich een lastige aandrang tot ontlasting en het gansche ligchaam wordt er in betrokken, menigmaal zoo sterk, dat krampen en flauwten ontstaan. De afgang zelf is meestal zeer stinkend, of waterig, graauwachtig of bruin van kleur, of met bloed vermengd, wegsmeltend enz. Bij de *critische Diarrhoe* moet men niet terstond de te overvloedige ontlasting tegengaan. Men late het daarom berusten bij zacht versterkende, slijmige middelen en dergelijke klisteren, en schrijve eene eenigzins krachtige, voedzame, niettemin ligt verteerbare diët voor. Worden de stoelgangen te druk, dan geve men een zacht ont-

ontlastmiddel, waardoor over het algemeen de oorzaak van den buikloop en tevens deze zelf weggenomen wordt. Bij de toevallige *Diarrhoe*, bestaat de hoofdzaak, in dezelve te stuiten. Aanvankelijk geve men bittere ontlastmiddelen, ten einde de schadelijke stoffen te ontlasten; alsdan regele men den eetregel en diene versterkende, zamentrekkende middelen toe, als: *Aromatica*, *Ratanhia*, *Columbo*, *Simaruba*, *Cort. Cinnamomi*, *Peruvian.* en dergelijken. In die gevallen, waar krampachtige toevallen aanwezig zijn, zal men van het *Opium*, althans in klisteren, gebruik moeten maken.

#### E) Belette Stoelgang.

##### §. 454.

Eindelijk lijden de kraamvrouwen ook aan een juist tegengesteld gebrek, aan beletten stoelgang. De grond daarvan ligt dikwijls in eene hebbelijke gesteldheid, die door de zwangerschap nog vermeerderd werd en waarmede niet zelden ongesteldheden in de speenaderen gepaard gaan. Dikwerf heeft de verzuimde ontlediging van den endeldarm voor de verlossing schuld daaraan; de drekstoffen hoopen zich te sterk op; de uitwerpselen zijn te hard en de endeldarm door de drukking van het kinderhoofd verzwakt, of verlamd; of er zijn vernauwingen in den endeldarm ontstaan. Somwijlen is hij ook een toeval van *Prolapsus*, of *Retroversio Uteri*. De geneeswijze is zeer eenvoudig en duidelijk, het gebrek echter is vaak zeer lastig en hardnekkig. Wij moeten naar de geneeskunde verwijzen, waarin dit onderwerp breedvoerig behandeld wordt.



## L I T T E R A T U U R.

## §. 455.

Behalve de meermalen aangevoerde Schriften van  
BURNS, CAPURON, JÖRG, RICHTER enz. vermelden  
wij alleen nu nog:

TH. COPELAND'S *Bemerkungen über die vorzüglichsten  
Krankh. des Mastdarms und Afters. Aus dem Engl.  
v. Dr. FRIEDREICH. Halle 1819.*

*E. von SIEBOLD,*  
OVER DE  
ZIEKTEN  
VAN HET  
VROUWELIJKE  
GESLACHT.  
IV.

*E. von SIEBOLD,*  
OVER DE  
ZIEKTEN  
VAN HET  
VROUWELIJKE  
GESLACHT.  
IV.

*E. von SIEBOLD,*  
OVER DE  
ZIEKTEN  
DER  
KRAAMVROUWEN.

*E. von SIEBOLD,*  
OVER DE  
ZIEKTEN  
DER  
KRAAMVROUWEN.















